


# الآفات الحشرية

في مصر والبلاد العربية وطرق السيطرة عليها

## الجزء الثاني

الآفات الحشرية التي تصيب بساتين الخضار والفاكهة والزينة

د. أحمد لطفي عبد السلام



المكتبة الأكاديمية

# **الآفات الحشرية**

**فى مصر والبلاد العربية  
وطرق السيطرة عليها**

مع تحيات د. سلام حسين الهلالي [salamalhelali@yahoo.com](mailto:salamalhelali@yahoo.com)

# الآفات الحشرية

فى مصر والبلاد العربية  
وطرق السيطرة عليها

الجزء الثانى

الآفات الحشرية التى تصيب  
بساتين الخضر والفاكهة والزينة

تأليف

د. أحمد لطفى عبد السلام

أستاذ الحشرات الاقتصادية - كلية الزراعة

جامعة الأزهر



الناشر

المكتبة الأكاديمية

١٩٩٣

## حقوق النشر

الطبعة العربية الأولى : حقوق التأليف والطبع والنشر © ١٩٩٣  
جميع الحقوق محفوظة للناشر:

### المكتبة الأكاديمية

١٢١ ش التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٢٤٩١٨٩٠ / ٢٤٨٥٢٨٢

تلكس: ABCMN U N ٩٤١٢٤

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤٩١٨٩٠

لا يجوز إستنساخ أى جزء من هذا الكتاب أو نقله بأى طريقة كانت إلا بعد  
الحصول على تصريح كتابى من الناشر.



## الإهداء

إلى مدينة سراييفو والباسلة الصامدة الى أبناء البوسنة  
والهرسك الذين أعيش معهم في محنتهم بكل وجداني  
وقلبي - أزال الله عنهم الغمة ونصرهم بفضله وكرمه

## المؤلف

**بسم الله الرحمن الرحيم**

مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

<https://scholar.google.com/citations?>

[user=t1aAacgAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=t1aAacgAAAAJ&hl=en)

[salamalhelali@yahoo.com](mailto:salamalhelali@yahoo.com)

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.facebook.com/groups/  
/Biothesis](https://www.facebook.com/groups/Biothesis)

[https://www.researchgate.net/profile/  
/Salam\\_Ewaid](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Ewaid)

07807137614



## مقدمة الجزء الثانى

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين -  
ويعد - فهذا هو الجزء الثانى من كتاب الآفات الحشرية فى مصر والبلاد العربية وطرق  
السيطرة عليها ،،

ويضم هذا الجزء كافة الآفات الحشرية التى تصيب بساتين الخضر والفاكهة وأشجار  
الغابات والأشجار الخشبية وآفات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وأخيرا آفات النباتات  
التي تزرع فى البيوت المحمية.

وهذا الجزء شامل جامع شمل كل الآفات الحشرية الموجودة فى العالم العربى من المحيط  
إلى الخليج بل إمتد ليصل إلى بلاد العرب الإستوائية الإفريقية مثل السودان والصومال  
وإريتريا.

وقد إستعان المؤلف بحشد ضخم من المراجع العربية والأجنبية ونتائج الأبحاث التى تمت  
فى العالم العربى وخارجة، وفى سبيل ذلك بذل المؤلف جهدا ضخما واهتماما كبيرا فى جمع  
كم من الصور الفوتوجرافية للآفات الحشرية التى تناولها فى كتابة ومظاهر الإصابة بها  
بصورة لم يسبق لها مثيل، لذلك كان هذا الجزء من الكتاب شامخا جليلا فريدا يستطيع أى  
فرد أن ينهل من منهل العذب سواء كان عالما أم دارسا أم مزارعا.

أرجو من الله العلى الكبير ان اكون قد وفقت الى تقديم ما فيه نفع الأمة العربية وخيرها وما  
توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.

## محتويات الكتاب

٥	الإهداء
٩	مقدمة الجزء الثانى
١١	المحتويات
	القسم الأول
٤١	الآفات الحشرية التى تصيب الخضر
٤٣	الباب الأول الآفات الحشرية التى تصيب خضر الفصيلة الباذنجانية
٤٥	آفات البطاطس
٤٧	١- أنواع المن <i>AphidS</i>
٤٨	١- من الخوخ الأخضر <i>Myzus persicae</i> (Sulzer)
٤٩	ب - من البطاطس <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas)
٤٩	ج - من النبق أو السدر <i>Aphis nasturtii</i> Knltenbach
٤٩	د- من قفاز الثعلب <i>Myzus solani</i> (Kaltenbach)
٥١	هـ- من القطن <i>Aphis gossypii</i>
٥٨	٢- الحفارات أو كلاب البحر
٥٨	أ- كلب البحر العادى <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L.
٥٨	ب - كلب البحر الإفريقى <i>Gryllotalpa africana</i>
٦٠	٣- الديدان القارضة
٦٠	أ- الدودة القارضة السوداء أو العادية <i>Agrotis ipsilo</i> n

- ٦٠ ب - الدودة القارضة البنية *Agrotis spinifera (H)*
- ٦٠ ج - دودة اللفت القارضة *Agrotis segtum*
- ٦٠ د- الدودة القارضة المرقطة *Limax c. nigrum (Linnaeus)*
- ٦٥ ٤- الديدان الجياشة *Army Worms*
- ٦٦ ٥- دودة درنات البطاطس
- ٧١ ٦- حفار ساق الذرة الأوربي
- ٧٣ ٧- الديدان نصف القياسة
- ٧٤ أ- فراشة دودة الطماطم نصف القياسة
- ٧٦ ٨- الذباب الأبيض *Whiteflies*
- ٧٧ أ- ذبابة القطن البيضاء *Bemisia tabaci (Gennandiu)*
- ٧٨ ب - ذبابة اليرس البيضاء *Aleyrodes spiracoides Quaintance*
- ٨١ ٩- نطاطات أو قافزات الأوراق
- ٨٢ أ- نطاط أوراق البطاطس
- ٨٣ ب - نطاط أوراق القرعيات
- ٨٤ ج- نطاط الأوراق ذو الست نقط
- ٨٥ ١٠- الذباب صانع الأنفاق
- ٨٧ ١١- التريس
- ٩٠ ١٢- الديدان السلكية *Wireworms*
- ٩٠ أ- فرقع لوز بني *Agrypnus notodonta*
- ٩٣ ب - فرقع لوز بنجر السكر *Limoniuss californicus*
- ٩٣ ج- فرقع لوز التبغ *Conoderus vespertinus (Fabricius)*
- ٩٣ د- فرقع لوز القمح *Agriotes mancus (Say)*
- ٩٣ هـ - فرقع لوز الرمل *Horistonotus whlerii*

- ٩٤ و- فرقع لوز البرارى أو المروج *Ctenicera aeripennis destructor* (Brown)
- ٩٤ ز- فرقع لوز الخليج *Conoderus amplicollis* (Gyllenhal)
- ٩٤ ١٣- الجعل الاسود أو الجعل نو الظهر الجامد
- ٩٦ ١٤- قمل النباتات القافز *Potato Psyllid*
- ٩٩ ١٥- دودة بذور الذرة *Seed corn maggot*
- ١٠٠ ١٦- دودة حفار ساق الباذنجان
- ١٠٣ ١٧- الخنافس البرغوثية
- ١٠٣ أ- الخنفساء البرغوثية الزرقاء *Phyllotreta curiciferae* Goetz
- ١٠٤ ب - خنفساء البطاطس البرغوثية *Epitrix cucumeris* HarriS
- ١٠٦ ج-خنفساء التبغ البرغوثية *Epitrix hirtipennis* (Melshimer)
- ١٠٧ ١٨- البق الدقيقى
- ١٠٩ ملاحظات هامة على مكافحة الآفات الحشرية للبطاطس
- ١١٤ الآفات الحشرية التى تصيب الطماطم
- ١١٤ ١- الحفارات
- ١١٤ أ- الحفار العادى *Cryllotalpa gryllotalpa* L.
- ١١٤ ب - الحفار الأفريقى *Gryllotalpa africana*.
- ١١٥ ٢- الديدان القارضة
- ١١٥ أ- الدودة القارضة العادية *Agrotis ipsilon* (Huf)
- ١١٥ ب - الدودة القارضة البنية *Agrotis spinifera* (hubn)
- ١١٥ ج- دودة اللفت القارضة *Agotis segetum* (Schi)
- ١١٩ ٣- الديدان الجياشة *Amy wormS*
- ١١٩ ٤- دودة الطماطم نصف القياسية أو الدودة نصف القياسية ذات النقطتين الذهبيتين
- ١٢٢ ٥- الدودة نصف القياسية ذات الخط المتعرج *Chrysodiexis circumflexa* (L)

- ١٢٣ ٦- دودة الطماطم القياسة الكبيرة (*Scopula coenosaria luridata* (Zell))
- ١٢٥ ٧- دودة الطماطم القياسة الصغيرة (*Scopula ochroleucaria* (H.S))
- ١٢٦ ٨- دودة ثمار الطماطم أو دودة اللوز الأمريكية
- ١٢٩ ١- الطفيل *Apanteles rufirus* Hei
- ١٢٩ ٢- الطفيل *Microplitis rufiventris* Kōk
- ١٢٩ ٣- الطفيل *Techina larvarum* L.
- ١٢٩ ٤- الطفيل *Trichogramma* sp.
- ١٣٠ ٩- دودة درنات البطاطس *Phthorimaea operculella*
- ١٣٠ ١٠- دودة ورق السمسم
- ١٣١ ١١- ذبابة القطن البيضاء (*Bemisia tabaci* (Gennadin))
- ١٣١ حصر لآفات الطماطم في مصر والتوزيع الموسمي لها
- ١٣١ ١- حصر آفات الطماطم في مصر
- ١٣٢ ٢- التوزيع الموسمي لأهم آفات الطماطم في مصر
- ١٣٣ الآفات الحشرية التي تصيب الباذنجان
- ١٣٣ ١- الحفارات
- ١٣٣ أ- الحفار العادي *Gryllotalpa gryllotalpa* L
- ١٣٣ ب - الحفار قصير الأجنحة *Gryllotalpa gryllotalpa* var. *cophta* de Ham
- ١٣٤ ج - الحفار الإفريقي *africana* Pal de Beauv
- ١٣٤ ٢- النطاطات
- ١٣٤ أ- نطاط البرسيم *Euprepohnemus plorans* (Charp)
- ١٣٥ ب - نطاط البرسيم المتشابه *Thisioicetrus littoralis* Ramb
- ١٣٥ ج- نطاط الأرز *Aiolopus strepens*
- ١٣٦ ٣- نطاطات الأوراق



١٣٧	٤- حفار ساق الباذنجان <i>Euzophora osseatella</i>
١٣٧	٥- خنفساء الباذنجان البرغوثية
١٣٨	٦- خنفساء الباذنجان السلحفائية
١٣٩	٧- سوسة الخضر
١٤١	٨- بق الهبسكس الدقيقى
١٤١	الآفات الحشرية التى تصيب الفلفل
١٤٣	الباب الثانى الآفات الحشرية التى تصيب الخضر البقولية
١٤٥	الآفات الحشرية التى تصيب الفاصوليا
١٤٥	١- الحفار والدودة القارضة
١٤٥	٢- المن
١٤٦	٣- الذبابة البيضاء ونطاطات الأوراق والتربس
١٤٦	٤- أبو دقيق البقوليات أو دودة قرون البقوليات
١٤٨	٥- ذبابة الفاصوليا
١٥١	الآفات الحشرية التى تصيب البازلاء (البسلة)
١٥١	١- ذبابة أوراق البازلاء
١٥٣	٢- من البازلاء
١٥٤	الآفات التى تصيب اللوبيا
١٥٤	دودة قرون اللوبيا
١٥٩	الباب الثالث الآفات الحشرية التى تصيب خضر الفصيلة الصليبية
١٦١	١- من الصليبيات أو من الكرنب
١٦٢	٢- ذبابة القرنبيط البيضاء
١٦٣	٣- حفار ساق الكرنب <i>Hellula undalis</i> F.
١٦٥	٤- أبو دقيق الكرنب الصغير

- ١٦٨ ٥- دودة ورق الكرنب الكبرى
- ١٦٨ ٦- ذبابة أوراق الصليبيات
- ١٧٠ ٧- سوسة اللفت
- ١٧٣ **الباب الرابع الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة القرعية**
- ١٧٥ ١- الخنفساء الحمراء
- ١٧٨ ٢- خنفساء المقات
- ١٨٠ ٣- ذبابة المقات
- ١٨٣ ٤- بقعة ورق البطيخ (البقة السمراء)
- ١٨٤ الحشرات الثاقبة الماصة التي تصيب القرعيات
- ١٨٤ أ- الذبابة البيضاء
- ١٨٤ ب - المن
- ١٨٤ ج - نطاطات الأوراق
- ١٨٥ تفضيل آفات القرعيات لبعض العوائل أكثر من البعض الآخر
- ١٨٥ أ- ذبابة المقات
- ١٨٥ ب - الخنفساء الحمراء
- ١٨٦ ج - خنفساء المقات
- ١٨٧ **الباب الخامس الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة الخبازية**
- ١٨٩ ١- أبو دقيق الخبازي
- ١٩١ الآفات التي تصيب البامية
- ١٩١ ٢- دودة اللوز الشوكية
- ١٩١ ٣- الحفار *Gryllootalpa gryllootalpa*
- ١٩٢ ٤- الدودة القارضة *Agrotis ipsilon (H)*
- ١٩٢ ٥- البقة الخضراء أو بقة القطن *Nezara viridula*

١٩٣	٦- بق الهبسكس الدقيقى <i>Moconelliococcus hirsutus</i>
١٩٣	آفات أخرى تصيب البامية
	<b>الباب السادس الآفات الحشرية التى تصيب خضر الجذور والسيقان</b>
١٩٥	<b>الأرضية</b>
١٩٧	الآفات الحشرية التى تصيب البطاطا <i>Sweet potato</i>
١٩٧	١- الحفار <i>Grylloidalpa grylloidalpa</i>
١٩٨	٢- الدودة القارضة <i>Agrotis ipsilon</i>
١٩٨	٣- دودة ورق القطن العادية والصغرى
١٩٩	٤- دودة ورق البطاطا
٢٠٠	آفات أخرى تصيب البطاطا
٢٠٢	الآفات الحشرية التى تصيب القلقاس
٢٠٢	١- الحفار
٢٠٢	٢- الحشرات ذات أجزاء الفم الثاقب الماص
٢٠٣	٣- دودة ورق القطن العادية والدودة الخضراء
٢٠٣	٤- البق الدقيقى الأسترالى
٢٠٦	الآفات الحشرية التى تصيب الجزر
٢٠٧	<b>الباب السابع الآفات الحشرية التى تصيب الفراولة</b>
٢١٠	أولا الآفات التى تصيب أوراق الفراولة
٢١٠	١- المن
٢١٥	٢- الذباب الأبيض
٢١٧	٣- صانعة انفاق أوراق الفراولة
٢١٨	ثانيا الآفات التى تصيب الأزهار والثمار
٢١٩	١- فراشة ثمار الحديقة <i>Ptycholoma peritana</i> (Clem)

- ٢٢١ - ٢- لآفة أوراق الفراولة (*Ancylus comptana fragariae* (Wond R)
- ٢٢٢ ٣- طابوية الأوراق الكانسة (*Cnephasia longamna* (Haw)
- ٢٢٥ ٧- إبرة العجوز
- ٢٢٥ أ- إبرة العجوز الكبير (*Labidnra riparia*
- ٢٢٦ ب - إبرة العجوز الصغيرة (*Labia mino*
- ٢٢٦ ج - إبرة العجوز الأوروبية (*Forfcula auricu*
- ٢٢٧ ٨- الديدان القارضة
- ٢٢٩ ٩- ديدان ورق القطن
- ٢٣٠ ثالثا الآفات الحشرية التي تهاجم التاج والجنود
- ٢٣٠ ١٠- فراشة تاج الفراولة (*Ramosia biblionipennis*
- ٢٣٣ ١١- خنفساء الهوليا (*Hoplia oregona*
- ٢٣٦ ١٢- الجعل ذو الظهر الجامد (*Pentadon bispinosu*
- ٢٣٦ ١٣- سوس العنب الأسود
- ٢٣٧ أ- (*Brachyrhinus sulcatu*
- ٢١٧ ب- (*B. meridiona*
- ٢٣٧ ج - (*B. cribricollis*
- ٢٤٠ ١٤- الديدان السلكية
- ٢٤٠ آفات الخضر الأخرى

## القسم الثاني

- ٢٤١ الآفات الحشرية التي تصيب أشجار الفاكهة
- والغابات ونباتات الزينة
- ٢٤٣ الباب الثامن الآفات الحشرية التي تصيب الحمضيات (الموالح) وطرق السيطرة عليها

٢٤٦	١- من الموالح الأسود <i>Toxoptera aurantii</i>
٢٤٧	الحشرات القشرية
٤٤٨	٢- الحشرة القشرية السوداء <i>Chrysomphalus Ficus</i>
٢٥٢	٣- الحشرة القشرية الحمراء <i>Aonidiella auranti</i>
٢٥٥	٤- الحشرة القشرية البرسونافس <i>Mycetaspis pesonata</i>
٢٥٥	٥- حشرة الموالح المحارية <i>Lebidosaphes</i>
٢٥٨	٦- حشرة الموالح الشمعية <i>Ceroplastes floridensis</i>
٢٥٩	٧- بق الموالح الدقيقى <i>Pseudococcus citri</i>
٢٦١	٨- ذبابة الموالح البيضاء <i>Aleurotrachilus citri</i>
٢٦٢	٩- فراشة أزهار الليمون أو دودة أزهار الليمون <i>Prays citri</i>
٢٦٤	رتبة الحشرات زوجية الأجنحة
٢٦٤	فصيلة ذبابة الفاكهة
٢٦٤	١٠- ذبابة حوض البحر الأبيض المتوسط <i>Ceratitis capitata</i>
٢٦٩	الباب التاسع الآفات الحشرية التى تصيب أشجار الحلويات
٢٧١	أولا الآفات الحشرية التى تصيب الفواكه ذات النواة الحجرية (المشمش والخوخ والبرقوق)
٢٧١	١- إبرة العجوز <i>Eeawig</i>
٢٧٣	٢- حشرات المن
٢٧٤	أ- من البرقوق الدقيقى <i>Hyalopterus arundini</i>
٢٧٥	ب - من الخوخ الأخضر <i>Myzus persic</i>
٢٧٦	ج - من القلف
٢٧٦	٣- الحشرات القشرية

- ٢٧٧ أ- حشرة الحلويات المحاربة *Lepidosaphes ulmi*
- ٢٧٨ ب - حشرة البرقوق القشرية *Parlatoria oleae*
- ٢٧٩ ٤- لافة أوراق أشجار الفاكهة *Archips argyrospila*
- ٢٨٢ هـ- الديدان القياسة
- ٢٨٢ أ- دودة المشمش القياسة الخريفية *Alsophila pomotarsi*
- ٢٨٣ ب - دودة المشمش القياسة الربيعية *Paleacrita varnata*
- ٢٨٤ ٦- التربس
- ٢٨٥ أ- *Franklinella occidentalis*
- ٢٨٥ ب - *E. minula*
- ٢٨٦ ٧- حفار ساق الخوخ *Anarsia lineatella*
- ٢٨٩ ٨- حفار ساق الحلويات رائعة الأجنحة *Synanthedon myopiformis*
- ٢٩٠ ٩- دودة ثمار التفاح *Laspeyrsia pomonella*
- ٢٩٤ ١٠- خنفساء الخيار المنقطة *Diabrotica undecimpunctata*
- ٢٩٦ ١١- حفار ساق البرقوق *Ptosima undecim maculata*
- ٢٩٧ ١٢- حشرة المشمش القشرية البنية *Lecanium corni*
- ٣٠٠ ١٣- حشرة الزيتون القشرية السوداء *Saissetia oleae*
- ٣٠٢ ١٤- الجعال
- ٣٠٢ أ- جعل الخوخ *Pachnoda fasciata*
- ٣٠٣ ب - جعل الورد الزمردى *Ptosia cuprea spp ignicollis*
- ٣٠٣ ج- جعل الورد الزغبي *Tropinota squilida*
- ٣٠٥ ١٥- سوسة قلف أشجار الخوخ المصرية *Eccoptogaster aegyptiacus*
- ٣٠٧ ١٦- سوسة قلف أشجار الخوخ الأوروبية *Scolytus regulosus*

- ٣١٠ ١٧- ذبابة ثمارحوض البحر الأبيض المتوسط(ذبابة الفاكهة) *Ceratitis capitata*
- ٣١٠ ١٨- دودة ثمار النبق *Carpaamyia incompleta*
- ٣١٢ ثانيا الآفات الحشرية التي تصيب التفاحيات
- ٣١٢ أ- الآفات الحشرية التي تصيب التفاح
- ٣١٢ ١- فراشة ثمار التفاح أو دودة ثمار التفاح أو حفار ثمار التفاح *Cydia pomonella*
- ٣١٧ ٢- لافة أوراق البرتقال *Argytaenia citrana*
- ٣٢١ ٣- لافة أوراق أشجار الفاكهة *Archips argyrospila*
- ٣٢٤ ٤- فراشة البراعم ذات البقعة العينية *Spilonota ocellana*
- ٣٢٦ ٥- حفار ساق التفاح *Zeuzera pyrina*
- ٣٢٩ المن على أشجار التفاح
- ٣٢٩ ٦- من التفاح الصوفى *Eriosoma lanigera*
- ٣٣٤ ٧- من التفاح الوردى *Anuraphis rosea*
- ٣٣٧ ٨- من التفاح *Aphis pomi*
- ٣٤٠ الحشرات القشرية التي تصيب قلف أشجار التفاح
- ٣٤٠ ٩- الحشرة القشرية سان جوزيه *Quadrupidiotus perniciosus*
- ٣٤١ ١٠- حشرة الزيتون القشرية *Parlatoria oleae*
- ٣٤٢ ١١- حشرة الحلويات المحاربة *Lepidosaphes ulmi*
- ٣٤٢ حفارات جذع أشجار التفاح وفروعها الرئيسية
- ٣٤٢ ١٢- حفار أشجار التفاح ذو الرأس المبطط *Chrysobothris mali(scolytus)*
- aegyptiacus*
- ٣٤٤ ١٣- سوسة قلف أشجار الخوخ المصرية
- ٣٤٤ ١٤- سوسة القلف الأوربية *Scolytus regulosus*

- ٣٤٦ ١٥- تريبس المدرونة *Thrips madroni*
- ٣٤٨ ١٦- نطاطات الأشجار الجاموسة *Sticotocephala bubalus*
- ٣٥٠ الآفات الحشرية التي تصيب الكمثرى
- ٣٥٠ أ - الآفات التي تهاجم الثمار
- ٣٥٠ ١- دودة ثمار التفاح أو الكمثرى *Cydia (carpocapsa) pomonella*
- ٣٥٢ ٢- البقعة الناقرة كريهة الرائحة *Euschistus conspersus*
- ٣٥٥ ب - الآفات الحشرية التي تصيب المجموع الخضرى لأشجار الكمثرى
- ٣٥٥ ٣- تريبس البقول *Hercotrips fassiatuS*
- ٣٥٧ ٤- قمل الكمثرى القافز *Psylla pyricola*
- ٣٦٠ ٥- المن *Psylla pyricola*
- ٣٦٢ ٦- صانعة أنفاق أوراق الكمثرى الخيمية
- ٣٦٦ ج- الآفات التي تصيب المجموع الخضرى وثمار الكمثرى
- ٣٦٦ ٧- بق العنب الدقيقى *Pseudococcus maritimuS*
- ٣٦٩ ٨- لافة أوراق أشجار الفاكهة *Archips argyrospiluS*
- ٣٧١ ٩- لافة أوراق البرتقال *Argyrotania CitranE*
- ٣٧٣ ١٠- ديدان الربيع والخريف الآكلة:
- ٣٧٣ أ- دودة الربيع الآكلة ٥٧٤٧ *Paleacrita verna*
- ٣٧٣ ب - دودة الخريف الآكلة *Alsophide pametari*
- ٣٧٤ ج- الآفات التي تصيب الأزهار والثمار
- ٣٧٤ ١١- تريبس الكمثرى *Teniothrips inconseauenS*
- ٣٧٦ هـ - الآفات الحشرية التي تصيب الأغصان والأفرع
- ٣٧٩ ١٢- الحشرة القشرية المرقطة *Lecanium cerasorum*



٣٨١	١٣- الحشرة القشرية سان جوزيه <i>Aspidiotus perniciosus</i>
٣٨٤	١٤- حشرة الكمثرى القشرية الإيطالية <i>Epidiaspis pericola</i>
٣٨٦	١٥- نطاط الأشجار الجاموسة <i>Stictocephala bublauS</i>
٣٨٦	١٦- حفار البرقوق الأمريكي <i>Euzophera semifnralis</i>
٣٨٧	١٧- سوسة قلف أشجار الحلويات
٣٨٩	و - الآفات الحشرية التي تهاجم جذور أشجار الكمثرى
٣٨٩	١٨- من الكمثرى الصوفى
٣٩١	<b>الباب العاشر الآفات الحشرية التي تصيب اللوزيات</b>
٣٩٣	أولاً الآفات الحشرية التي تصيب اللوز
٣٩٣	١ - الآفات الحشرية التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة التي تصيب اللوز
٣٩٣	١- حفار ساق الخوخ
٣٩٧	٢- دورة البرتقال أبو سرّة
٤٠١	٣- لافة أوراق الفاكهة
٤٠٢	٤- حفار ساق البرقوق (أو ساق الكمثرى) الأمريكي
٤٠٢	٥- دورة ثمار التفاح
٤٠٣	٦- دودة الدقيق الهندية
٤٠٣	٧- بق النباتات
٤٠٦	٨- الحشرات القشرية التي تصيب اللوز
٤٠٦	٩- الخنافس التي تصيب اللوز
٤٠٧	ثانياً الآفات الحشرية التي تصيب الجوز
٤٠٧	١- دودة ثمار التفاح والكمثرى
٤١٨	٢- دودة البندق

- ٤٢١ ٣- دودة البرتقال أبو سرّة
- ٤٢٧ ٤- اليسروع ذو السنام الأحمر
- ٤٣٤ ٥- لافة أوراق أشجار الفاكهة
- ٤٣٦ ٦- دودة الجوز القياسة
- ٤٣٧ ب - الآفات الحشرية التي تصيب الجوز والتابعة لفصيلة متشابهة الأجنحة
- ٤٣٧ أولاً - المنّ
- ٤٣٧ ٧- منّ الجوز
- ٤٤٢ ٨- منّ الجوز المغبر للعروق
- ٤٤٤ ثانياً - الحشرات القشرية
- ٤٤٥ الحشرات القشرية غير المدرعة (الرخوة)
- ٤٤٥ ٩- الحشرية القشرية ثلجية المظهر
- ٤٤٨ ١٠- حشرة أشجار الفاكهة القشرية الأوربية *Lecanium corni*
- ٤٥٠ ١١- الحشرة القشرية المرفطة *Lecanium cerasorum*
- ٤٥٠ الحشرات القشرية المدرعة
- ٤٥١ ١٢- حشرة الحلويات المحاربة *Lepidsaphes ulmi*
- ٤٥٣ ١٣- حشرة الكمثرى الإيطالية *Epidiaspis piricolle*
- ٤٥٤ ١٤- حشرة بتنام القشرية *Diaspidiotus ancyloS*
- ٤٥٥ حشرات قشرية مدرعة أخرى تصيب الجوز
- ٤٥٦ حفارات الخشب التي تصيب الجوز
- ٤٥٦ ١٥- حفار الباسفيك ذو الرأس المبطط *Chrysobothris mali*
- ٤٥٩ ١٦- حفار الأشجار المنقط *Synaphaeta guexi*
- ٤٦٠ أنواع أخرى من الحفارات تصيب الجوز

٤٦١	١٧- ذبابة الغلاف الخارجى لثمار الجوز <i>Rhagoletis competa</i>
٤٦٧	الآفات الحشرية التى تصيب ثمار الجوز فى المخزن
٤٦٨	ثالثا الآفات الحشرية التى تصيب الفستق والحبّة الخضراء
٤٦٨	أفات الفستق والحبّة الخضراء التى تنتمى لرتبة غمدية الأجنحة
٤٦٨	١- خنفساء براعم الفستق <i>Aricerus vestitus</i>
٤٧٠	٢- خنفساء قلف أشجار الفستق <i>Polygraphina perrisi</i>
٤٧٠	٣- حفار ساق الفستق الكبير <i>Capnodis carios</i>
٤٧١	٤- من أوراق الحبّة الخضراء <i>Pemphigus riccobonii</i>
٤٧٢	٥- بق الفستق الدقيقى
٤٧٣	الباب الحادى عشر الآفات الحشرية التى تصيب العنب والموز
٤٧٥	الآفات الحشرية التى تصيب العنب
٤٧٥	أولاً - الآفات الحشرية التى تصيب أوراق العنب
٤٧٥	١- نطاط أوراق العنب <i>Erythroneneura elegantula</i>
٤٧٩	٢- لافة أوراق العنب <i>Desmia funeralis</i>
٤٨٣	٣- دودة هيكلية أوراق العنب <i>Harrissina brillian</i>
٤٨٧	٤- بقّة الفراش المزيفة <i>Nysius ericae</i>
٤٨٩	٥- فراشات أبى الهول التى تصيب العنب:-
٤٨٩	أ- دودة أوراق العنب <i>Chaerodampa cleri</i>
٤٩١	ب - دودة ورق العنب المتشابهة <i>Deilphilla livornica</i>
٤٩٢	ج- دودة أبى الهول أشمون <i>Pholus achemon</i>
٤٩٤	٦- ذبابة العنب البيضاء <i>Trialeurodes vitatus</i>
٤٩٥	٧- الحشرات الثاقبة الماصة (الناقلة للأمراض الفيروسية)

- ٤٩٨ ثانيا الآفات الحشرية التي تصيب أزهار وثمار العنب
- ٤٩٨ ٨- خنفساء الهوليا *Holia oregona*
- ٥٠١ ٩- بق العنب الدقيقى *Pseudococcus maritimus*
- ٥٠٢ ١٠- تريس العنب *Derlanothrips reuteri*
- ٥٠٥ ١١- تريس الأعشاب
- ٥٠٧ ١٢- البقة الناقرة كريهة الرائحة *Ensehistus consperus*
- ٥١٠ ثالثا الآفات الحشرية التي تصيب السلاميات والأفرع والجذع
- ٥١٠ ١٣- حفار الأفرع والأغصان *Polycan conferus*
- ٥١٢ ١٤- حفار ساق العنب *Clorophorus varius*
- ٥١٤ ١٥- الحشرات القشرية
- ٥١٥ حشرة المشمش القشرية البنية *Lecanium corni*
- ٥١٦ حشرة القيقب القطنية *Pulvinaria viti*
- ٥١٧ حشرة العنب القشرية *Diaspidiotus uva*
- ٥١٨ ١٦- السبكادا أو نطاطات الأوراق
- ٥٢١ ١٧- الأرضة أو النمل الأبيض
- ٥٢٣ رابعا الآفات الحشرية التي تهاجم البراعم والنموات الصغيرة
- ٥٢٣ ١٨- الديدان القارضة
- ٥٢٤ ١٩- خنفساء براعم العنب *Glyptoscelis squamulata*
- ٥٢٧ ٢٠- الخنفساء المفرقة (فرقع لوز) *Agrypnus notodonta*
- ٥٢٨ ٢١- الخنفساء البرغوثية *Altica torquata*
- ٥٣٠ خامسا الآفات الحشرية التي تصيب جنود العنب
- ٥٣٠ ٢٢- فلوكسيرا العنب *Dactylosphaera vitifolia*

٥٣٢	٢٣- البق الدقيقى الأرضى <i>Rhizoecus falcifer</i>
٥٣٣	سادسا الآفات الحشرية التى تصيب الزبيب
٥٣٣	٢٤- فراشة الدقيق الهندية
٥٣٦	٢٥- فراشة الزبيب
٥٣٩	٢٦- خنفساء الثمار الجافة
٥٤٢	٢٧- خنفساء الحبوب المنشارية
٥٤٥	الآفات الحشرية التى تصيب الموز
٥٤٥	١- من الموز <i>Pentalonia nigronirvosa</i>
٥٤٧	٢- سوسة الموز <i>Cosmopolites sordidus</i>
٥٥٠	٣- التريبس:-
٥٥٠	أ - <i>Hercotrips picinervis</i>
٥٥٠	ب - <i>Hercotrips femoralis</i>
٥٥٠	ج - <i>Frankliniella insularis</i>
٥٥٠	هـ - <i>Chaetanaphothrips orchidii</i> ويطلق عليه تريبس الموز
٥٥٠	٤- بق الموز الدقيقى <i>Pseudococcus comstocki</i>
٥٥١	٥- فراشة جرب الموز <i>Lamprosema octasema</i>
٥٥١	٦- الحشرة لقشرية برسوناتا <i>Mycetaspic personata</i>
٥٥٢	٧- البق الدقيقى أورثيزيا <i>Orthezia insignis</i>
٥٥٥	<b>الباب الثانى عشر الآفات الحشرية التى تصيب نخيل البلح</b>
٥٥٧	الآفات الحشرية التى تصيب نخيل البلح
٥٥٨	أولا الآفات الحشرية التى تصيب الجنود والجذع
٥٥٨	١- حفار جنوع النخيل <i>Pseudophilus testaceus</i>

- ٥٦٢ ٢- خنفساء النخيل الكركدية *Strategus julianus*
- ٥٦٢ ٣- حفار ساق السنط *Macrotoma palmatia*
- ٥٦٣ ٤- الأرضة أو النمل الأبيض *Microcerotermes diversus silvestrii*
- ٥٦٤ ثانيا الآفات الحشرية التي تصيب السعف والعراجلين
- ٥٦٤ ٥- حشرة النخيل القشرية *Parlatoria blanchardi*
- ٥٦٧ ٦- الحشرة القشرية الخضراء *Asterolecanium phoenicis*
- ٥٦٩ ٧- حشرة النخيل القشرية الحمراء *Phoenicoccus marlatti*
- ٥٧٠ ٨- حشرة النوباس *Ommatissus binotatus lybicus*
- ٥٧٥ ٩- دودة طلع النخيل أو فراشة البلح العظمى أو ثاقبة العراجلين
- ٥٧٨ ١٠- ناقبة النخيل أو حفار القلف أو حفار ساق الرمان *Phonapathes frontalis*
- ٥٨٠ ١١- خنفساء النخيل *Oryctes elegans*
- ٥٨٣ ١٢- حفار عزق النخيل المتشابهة *Dryctes sinicus*
- ٥٨٣ ثالثا الآفات الحشرية التي تصيب الثمار
- ٥٨٣ ١٣- دودة البلح الصغرى أو الحميرة *Batrachedra amydraulia*
- ٥٨٨ ١٤- حشرة الآباشى *Diceroprocta apache*
- ٥٩١ ١٥- أبو دقيق الرمان أو دودة ثمار الرمان *Viracola livia*
- ٥٩٢ ١٦- دودة البلح العامرى أو دودة البلح الكبرى أو دودة التين
- ٥٩٥ ١٧- دودة بلح الواحات *Ephesia cautella*
- ٥٩٦ ١٨- دودة الشيكولاته *Ephesia calidella*
- ٥٩٧ ١٩- دودة بلح كاليفرونيا *Ephesia figulilla*
- ٥٩٨ ٢٠- فراشة الدقيق الهندية *Plodia interpunctella*
- ٥٩٩ ٢١- دودة ثمار الخروب *Myelosia ceratonia*

- ٥٩٩ ٢٢- زنبور البلح أو الزنبور الأحمر المصرى *Vespa orientalis*
- ٦٠٢ ٢٣- زنابير أخرى تصيب البلح
- ٦٠٣ ٢٤- ذبابة الدروسوفلا *Drosophila meanogaster*
- ٦٠٦ ٢٥- خنفساء الثمار ذات البقعتين *Carpophilus hemipterus*
- ٦٠٧ ٢٦- خنفساء سورينام أو خنفساء الحبوب ذات الصدر المنشارى
- ٦٠٩ ٢٧- خنفساء الدقيق المتشابهة *Tribolium confsum*
- ٦١١ ٢٨- خنفساء الدقيق الصدئية *Tribolium castaneum*
- ٦١٢ ٢٩- خنفساء نوى البلح *Coccotrypes dactyliperda*
- ٦١٤ بعض الأبحاث الهامة التى أجريت على آفات النخيل الحشرية فى مصر  
والبلاد العربية
- ٦١٤ مقدمة
- ٦١٥ ١- الإصابة فى الثمار العالقة بالعراجين والثمار الساقطة
- ٦١٧ ديناميكا المجتمع اليرقى للآفات
- ٦١٩ ٢- قابلية بعض أصناف البلح فى الواحات للإصابة ببعض الآفات وتأثير  
ارتفاع النخيل على معدل الإصابة
- ٦٢٠ ٣- تأثير التزميط وسبله وموعده فى وقاية عراجين البلح من الإصابة  
بالحشرات فى الوادى الجديد
- ٦٢١ ٤- تأثير أصناف البلح وارتفاع النخيل على إصابة البلح بخنفساء نوى البلح
- ٦٢٣ الباب الثالث عشر الآفات الحشرية التى تصيب الفواكه الأخرى
- ٦٢٥ الآفات الحشرية التى تصيب الجوافه
- ٦٢٥ ١- حشرة الجوافه القشرية الرخوة *Parasaissetia nigra*

- ٦٢٦ ٢- حشرة الجوافة القشرية
- ٦٢٦ ٣- بق الموالح الدقيقى *Pseudococcus citri*
- ٦٢٧ ٤- بق الهبسكس الدقيقى *Moconellioccus hirsutS*
- ٦٢٩ ٥- البق الدقيقى المصرى *Icery aegyptiaca*
- ٦٢٩ ٦- حشرة التين الفنجانية *Asterolecanium putuians*
- ٦٣٠ ٧- من القطن *Aphis gossypii*
- ٦٣٢ ٨- ذبابة ثمار البحر الأبيض المتوسط *Ceratitis capitata*
- ٦٣٣ الآفات الحشرية التى تصيب التين
- ٦٣٣ ١- بق الموالح الدقيقى *Pseudococcus citri*
- ٦٣٣ ٢- حشرة التين الشمعية *Cerophstes rusci*
- ٦٣٤ ٣- حشرة التين الفنجانية *Asterolecanium pustuians cock*
- ٦٣٥ ٤- حفار ساق العنب *Clorophorus varius varius*
- ٦٣٦ ٥- ثاقبة الأفرع الكبرى أو السودانية *Sinoxylon sudanicum*
- ٦٣٧ ٦- ثاقبة أفرع التين *Sinoxylon ceratoniae*
- ٦٣٨ ٧- ثاقبة أفرع التين الصغرى *Scobica chevrieri*
- ٦٣٨ مكافحة حفارات ساق التين ومنزوعة وحشرات القلف
- ٦٣٩ ٨- ذبابة ثمار التين *Sibla adipate*
- ٦٤٠ ٩- حفار ساق التين نو القرون الطويلة *Heserophanes griseus*
- ٦٤٠ أ- طور البيضة
- ٦٤١ ب - طور اليرقى
- ٦٤١ ج - طور ما قبل العذراء
- ٦٤١ د - طور العذراء



٦٤٣	هـ - طور الحشرة الياقة
٦٤٣	١- خروج الحشرات
٦٤٣	٢- التلقيح
٦٤٤	٣- وضع البيض
٦٤٤	٤- مدة حياة الحشرات الياقة
٦٤٥	٥- النسبة الجنسية
٦٤٧	الآفات الحشرية التي تصيب الزيتون
٦٤٧	الحشرات القشرية
٦٤٧	١- حشرة الزيتون الشمعية <i>Parasa oissetia olea</i>
٦٤٨	٢- حشرة الزيتون القشرية البيضاء <i>Aspidiotus hederne</i>
٦٤٩	٣- الحشرة القشرية السوداء <i>Chrysomphlus ficus</i>
٦٥٠	مكافحة الحشرات القشرية التي تصيب الزيتون
٦٥١	٤- خنفساء قلف أشجار الزيتون <i>Phloeotribus olea</i>
٦٥٢	٥- خنفساء قلف أشجار الزيتون الكبيرة <i>Hylesinus oleiperda</i>
٦٥٢	٦- حفار قلف أشجار الزيتون <i>Phloeotribus scabaeoides</i>
٦٥٥	٧- سوسة قلف أشجار الزيتون <i>Rhynchites cribripenniS</i>
٦٥٦	٨- حفار ساق التفاح <i>Zeuzera pyrina</i>
٦٥٧	٩- قمل الزيتون القافز أو حشرة الزيتون القطنية <i>Euphyllura olivina</i>
٦٥٨	١٠- دودة أوراق الزيتون الخضراء (فراشة الياسمين) <i>Palpita unionalis</i>
٦٦٠	١١- ثاقبة أوراق الزيتون أو فراشة الزيتون <i>Prays oleallus</i>
٦٦٢	١٢- ذبابة ثمار الزيتون <i>Dacus olea</i>
٦٦٧	١٣- ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط <i>Ceratitis capitata</i>

- ٦٦٨ ١٤- هاموش أوراق الزيتون *Dasyneura oleae*
- ٦٦٩ ١٥- تريبس الزيتون *Liothrips oleae*
- ٦٧١ الآفات الحشرية التي تصيب المانجو
- ٦٧١ ١- حشرة المانجو القشرية الرخوة *Kilifia acuminata*
- ٦٧٦ ٢- حشرة المانجو المحاربة *Inulaspis pallidula*
- ٦٨٠ ٣- الحشرة القشرية السوداء *Chysomphalus ficus*
- ٦٨٠ ٤- الحشرة القشرية الحمراء *Aonidiella auranti*
- ٦٨١ ٥- بق الموالح الدقيقى *Pseudococcus citri*
- ٦٨١ ٦- ثاقبة لأفرع الكبرى *Sinoxylon sudanicum*
- ٦٨١ ٧- ذبابة ثمار البحر الأبيض المتوسط *Ceratitis capitata*
- ٦٨٣ الآفات الحشرية التي تصيب أشجار القشطة
- ٦٨٣ ١- البق الدقيقى المصرى
- ٦٨٣ ٢- بق الهبسكس الدقيقى
- ٦٨٤ ٣- حشرة التين الفنجانية.
- ٦٨٥ الآفات الحشرية التي تصيب الرمان
- ٦٨٥ ١ - من الرمان أو من الدورانتا *Aphis durantae*
- ٦٨٦ ٢ - ذبابة الرمان البيضاء *Siphoninus granati*
- ٦٨٦ ٣ - أبو دقيق الرمان أو بودة ثمار الرمان *Virachola Livia*
- ٦٨٩ آفات أخرى تصيب الرمان
- ٦٩١ الباب الرابع عشر الآفات الحشرية التي تصيب الأشجار الخشبية وأشجار الغابات
- ٦٩٣ أولاً: الآفات الحشرية التي تصيب المجموع الخضرى للأشجار الخشبية والأوراق

٦٩٤	١ - الفراشة الفجرية <i>Lymantria dispar</i>
٦٩٥	٢ - حشرات ليرقات جياشة أخرى من الفراشات الليلية
٦٩٥	أ - دودة ورق القطن العادية <i>Spodoptera littoralis</i>
٦٩٥	ب - دودة ورق القطن الخضراء <i>Spodoptera exigua</i>
٦٩٥	ج - الدودة الجياشة ذات الخطوط الصفراء <i>Prodenia arnithogali</i>
٦٩٦	٣ - دودة المستنقعات المالحة <i>Estegmene acrea</i>
٦٩٩	٤ - دودة أوراق السنط الصغيرة <i>Nadiasa undata</i>
٧٠٠	٥ - دودة أوراق السنط الكبيرة <i>Nadiasa acaciae</i>
٧٠١	٦ - دودة أوراق العجل <i>Nadiasa repanda aegyptiaca</i>
٧٠٢	٧ - البق الدقيقى:
٧٠٢	أ - البق الدقيقى المصرى <i>Icerya aegyptiaca</i>
٧٠٢	ب - البق الدقيقى الاسترالى <i>Icerya purchasi</i>
٧٠٣	ج - بق الهبسكس الدقيقى <i>Moconellococcus hirsutus</i>
٧٠٣	٨ - الحشرات القشرية
٧٠٤	ثانيا: الآفات الحشرية التي تصيب الجذع والأفرع
٧٠٤	أ - الحشرات الناقرة في قلب الأشجار
٧٠٥	١ - الحشرات التابعة لجنس <i>Dendroctonus</i>
٧٠٦	٢ - حشرات من جنس <i>Ips</i>
٧٠٦	٣ - خنافس جنس <i>Phloesinus</i>
٧٠٦	٤ - الخنافس التي تنتمي لجنس <i>Scolytus</i>
٧٠٦	٥ - خنافس الأمبروزيا <i>Ambrosia Beetles</i>
٧٠٧	ب - الحشرات الناقرة في الخشب

- ٧٠٧ ٩ - حفار ساق العبل *Steraspis squamoso*
- ٧٠٨ ١٠ - خنفساء الليكتس الأفريقية *Lycus africanus*
- ٧٠٩ ١١ - ثاقبة الأفرع الكبرى أو السودانية *Sinoxylon sudanicum*
- ٧١٠ ١٢ - حفار ساق الكازورينا *Stromatium fulvum*
- ٧١٢ ١٣ - حفار ساق السنط *Macrotoma plamatia*
- ٧١٣ ١٤ - حفار ساق الشنار *Rhesus serricollis*
- ٧١٣ ١٥ - حفار ساق اللبغ *Xystrocera globosa*
- ٧١٥ ١٦ - النمل الأبيض أو الأرضة:
- ٧١٦ ١- المظاهر التناسلية
- ٧١٧ ٢- المظاهر التناسلية الإضافية
- ٧١٧ ٣- الشغالات
- ٧١٧ ٤- العساكر
- ٧١٩ فصيلة هودوتر ميتيدي *Fam. Hodotermetidae*
- ٧١٩ فصيلة راينوتر ميتيدي *Fam. Rhinoteretidae*
- ٧١٩ فصيلة كالوتر ميتيدي *Fam. Kalotermetidae*
- ٧٢٣ نتائج بعض الأبحاث التي أجريت في مصر علي ناخرات الأخشاب
- ٧٢٣ ١ - حصر العوائل النباتية المصابة بثاقبة الأفرع السودانية في مصر
- ٧٢٤ ٢ - دراسة المحتوى المائي للخشب كعامل محدد لدرجة الضرر الناتج عن  
الاصابة بناخرة الخشب السودانية
- ٧٢٥ ٣ - دراسة المظاهر البيولوجية لناخر الخشب في مصر
- ٧٢٧ ٤ - دراسة تأثير العائل المفضل لناخرتي الخشب بوستريكويس ريشتي،  
ودينوديرس بابفيولاس في مصر

٧٢٨	٥ - دراسة التذبذبات والتغيرات الموسمية للمجموع الحشري للناخر بوستريكويس ريشي في منطقة الجيزة - مصر
٧٢٩	٦ - دراسة تأثير درجات الحرارة والرطوبة النسبية الثابتة علي النشاط البيولوجي لحشرة بوستريكويس ريشي في مصر
٧٣٠	٧ - دراسات بيولوجية علي ناخرة الخشب بوستريكويس ريشي في مصر
٧٣٣	<b>الباب الخامس عشر الآفات الحشرية التي تصيب نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية</b>
٧٣٥	أولا الآفات الحشرية التي تصيب نباتات الزينة
٧٣٥	١ - تربس نباتات الزينة
٧٣٦	٢ - تربس القرنفل
٧٣٦	٣ - تربس الفيكس نندا
٧٣٧	٤ - تربس العنب
٧٣٧	٥ - تربس الجلاديوس
٧٣٨	٦ - الحشرات القشرية:
٧٣٨	أ - مجموعة الحشرات القشرية المدرعة أو الحقيقية ومنها:
٧٣٨	حشرة الأوليندر القشرية <i>Aspidiotis hedrac</i>
٧٣٨	حشرة اللاتانيا القشرية <i>Aspidiotis latania</i>
٧٣٨	الحشرة القشرية السوداء <i>Chrysomphalus ficus</i>
٧٣٨	الحشرة القشرية الحمراء <i>Aonidiella aurantii</i>
٧٣٨	حشرة النخيل القشرية <i>Parlatoria blanchardii</i>
٧٣٨	حشرة الورد القشرية <i>Aulacaspis rosae</i>
٧٣٨	حشرة الكاميليا القشرية <i>Aspidiotus camelliae</i>

٧٣٨	حشرة الكاميليا القشرية الارجوانية <i>Lepidosaphis Camelliae</i>
٧٣٨	الحشرة القشرية برسوناتا <i>Mycetaspis personata</i>
٧٣٩	ب - مجموعة الحشرات القشرية الرخوة ومنها:
٧٣٩	حشرة الموالح الشمعية <i>Ceroplastes floridensis</i>
٧٣٩	حشرة التين الشمعية <i>Ceroplastes rusci</i>
٧٣٩	الحشرة القشرية الرخوة <i>Coccus hesperidum</i>
٧٤٠	حشرة الزيتون الشمعية <i>Parasaissetia oleae</i>
٧٤٠	٧ - البق الدقيقي:
٧٤١	بق الهبسكس الدقيقي <i>Moconellicoccus hirsutus</i>
٧٤١	البق الدقيقي الاسترالي <i>Icerya purchasi</i>
٧٤١	البق الدقيقي المصري <i>Icerya aegyptiaca</i>
٧٤٢	٨ - المن:
٧٤٢	من البنفسج <i>Macromyzus violae</i>
٧٤٢	من الورد <i>Macrosiphum, rosae</i>
٧٤٢	من الكريزانتيم <i>Myzus rosatum</i>
٧٤٢	من البسلة <i>Macrosiphum pisi</i>
٧٤٢	من البقول <i>Aphis laburni</i>
٧٤٢	من الفول <i>Aphis fabae</i>
٧٤٢	من القطن <i>Aphis gossypii</i>
٧٤٢	من الخوخ <i>Myzus persicae</i>
٧٤٢	٩ - الذباب الأبيض:
٧٤٣	ذبابة القطن البيضاء

٧٤٣	١٠ - الذباب الصانع للأنفاق الورقية: <i>Phytomyza atricornis</i>
٧٤٤	١١ - ذباب النرجس
٧٤٤	ذباب النرجس الكبيرة <i>Meredon equestris</i>
٧٤٤	ذباب النرجس الصغيرة <i>Eumeres strigatus</i>
٧٤٥	١٢ - الذباب المسبب للأورام:
٧٤٥	ذباب البنفسج <i>Daysmeura offinis</i>
٧٤٥	ذباب الورد <i>Rose Midge</i>
٧٤٥	ذباب الكريزانثيم <i>Chrysanthemum midge</i>
٧٤٦	١٣ - حفار ساق الذرة الأوروبي <i>Ostrinian ubilalis</i>
٧٤٦	١٤ - الجعال:
٧٤٦	أ - جعل الخوخ <i>Pachnoda fasiata</i>
٧٤٦	ب - جعل الورد الزمردى <i>Potosia cuprea igincollis</i>
٧٤٦	ج - جعل الورد الزغبى <i>Tropinata squalide</i>
٧٤٧	ثانيا الآفات الحشرية التي تصيب النباتات الطبية والعطرية
٧٤٧	أهم النباتات الطبية والعطرية التي توجد في أقطار العالم العربي
٧٥١	الباب السادس عشر الآفات الحشرية التي تصيب النباتات المزروعة
٧٥٣	في البيوت المحمية
٧٥٣	أولا في الصوب والبيوت المحمية المخصصة لإنتاج الشتلات
٧٥٤	أهم الحشرات التي تصيب شتلات الخضر في البيوت المحمية
٧٥٤	١ - المن
٧٥٥	٢ - الذبابة البيضاء
٧٥٥	طرق مكافحة المن والذبابة البيضاء والحشرات ذات الفم المثاقب الماص

٧٥٦	أ- مشاتل الطماطم
٧٥٧	ب - مشاتل الفلفل
٧٥٧	ج - مشاتل القرعيات (الخيار والكتنالوب)
٧٥٨	١- العروة الخريفى
٧٥٨	٢- العروة الربيعى
٧٥٩	ثانيا الآفات الحشرية في الصوب والبيوت الزجاجية الإنتاجية
٧٦١	تعقيم التربة
٧٦١	أ - بروميد الميثايل
٧٦١	ب - البازاميد المحبب
٧٦١	الاحتياطات الواجب توافرها عند التعقيم
٧٦٣	البرامج الوقائية والعلاجية للآفات والأمراض في الصوب الإنتاجية
٧٦٣	أ - الطماطم - البرنامج الوقائي من الأمراض
٧٦٤	البرنامج الوقائي من الآفات الحشرية
٧٦٤	الذبابة البيضاء
٧٦٤	المن
٧٦٤	العنكبوت الأحمر
٧٦٥	دورة ورق القطن وديدان الثمار
٧٦٥	ب- القرعيات (الخيار- الكتالوب)
٧٦٥	البرنامج الوقائي من الأمراض
٧٦٥	١- عروة سبتمبر وأكتوبر
٧٦٦	٢- العروة الصيفية المبكرة (يناير وفبراير)
٧٦٧	عفن الثمار الرمادى والأبيض



٧٦٧	انتبغ الزاوى البكتيرى
٧٦٨	مرض الأنثراكنوز
٧٦٨	برنامج وقائي من الآفات الحشرية
٧٦٩	ج - الفلفل
٧٦٩	البرنامج الوقائي من الأمراض
٧٧٠	البيضا الدقيقى وأعفان الثمار
٧٧٠	برنامج وقائي من الآفات الحشرية
٧٧١	ارشادات عامة
٧٧٢	المراجع
٧٧٢	أولا المراجع العربية
٧٧٧	ثانيا: المراجع بلغات أجنبية.

# **القسم الأول الأفات الحشرية التي تصيب الخضر**

## الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة الباذنجانية

## آفات البطاطس

تعد البطاطس من أهم المحاصيل الغذائية التي تزرع في جميع أقطار العالم ذات الجو البارد والرطب، وفي العالم العربي أصبحت البطاطس من أهم المحاصيل الرئيسية التي تزرع في معظم أقطاره، وهي مصدر رخيص للغذاء الكربوهيدراتي كما تستخدم في صناعة النشا والكحول، ويستخدم عرش البطاطس كعلف للحيوان، وتزرع البطاطس في مصر في عروتين، العروة الصيفية من منتصف يناير حتى آخر فبراير، والعروة النيلية وتزرع خلال شهر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

وتخزن البطاطس في مصر إما في الثلاجات الكبيرة (بغرض إستعمالها ككتاوى) أو في مخازن تسمى النوالات - وتوجد النوالات في المناطق المعتدلة المناخ في شمال الدلتا وتخزن فيها البطاطس خلال فصل الصيف، وهذه النوالات لها مواصفات خاصة، أما في خلال فصل الشتاء فتخزن البطاطس في مخازن عادية - وتصدر مصر كميات كبيرة من محصول البطاطس إلى البلاد الأوروبية والعربية.

وتصاب البطاطس في جميع مراحل نموها وفي أثناء تخزينها بالكثير من الآفات التي تحتاج إلى جهد كبير لمكافحتها، والضرر الناشئ عن اغتداء هذه الحشرات على البطاطس أو بنقلها للأمراض لها قد يؤثر بشدة على نمو النباتات وما يتبعه من نقص في المحصول أو يحط من صفات الثمار ويجعل تسويقها أمرا صعبا.

وبعض هذه الآفات تقرض أوراق نباتات البطاطس أو تصنع فيها أنفاقا والبعض ينخر في سوق النباتات، والبعض من هذه الآفات مثل نطاطات الأوراق تمتص عصارة النباتات وتقفز هنا وهناك ويمكن رؤيتها وملاحظة الضرر الذي تحدثه، ولكن توجد آفات أخرى لا يمكن رؤيتها فهي تحدث الضرر وهي بعيدة عن الملاحظة مثل حفارات الساق والديدان السلكية والخنافس

البرغوثية وهي تعمل وهي مختبئة في انفاقها أو في التربة ولا يظهر الضرر الذي تسببه إلا بعد مدة عن الإصابه أو حتى حين الحصاد، كذلك فإن الضرر الذي تحدثه الآفات التي تمتص العصارة مثل المن وقافزات الأوراق من الصعب أحياناً ملاحظته، وأحياناً يتعاضد هذا الضرر قبل أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمكافحة، وهذه الآفات الماصة للعصارة تنقل غالباً الأمراض الفيروسية التي يفوق ضررها كل حد.

وبينما نجد أن حشرات خنفساء كلورادو، والخنفساء البرغوثية وقافزات الأوراق والنطاطات والمن والحفار لها أضرارها على النباتات في كل من طورها اليافع وأطوارها غير اليافعة (الحوريات) فإن الدودة القارضة والديدان السلوكية وحفارات الساق وبودة القطن تحدث الضرر فقط وهي في طور اليرقة.

ونورد هنا أهم الآفات التي تصيب محصول البطاطس ونتناولها بالوصف الدقيق ونبين دورة حياتها والأضرار التي تسببها لنباتات البطاطس والطرق المناسبة للمكافحة، وحيث أن محصول البطاطس يعتبر من المحاصيل الغذائية الهامة التي تصاب بالآفات سواء كانت في الحقل أو في المخزن، فإننا سوف نجتهد في إتباع أفضل طرق المكافحة والسيطرة على هذه الآفات بما لا يترك أثراً سيئاً على المحصول أو المستهلك.

# 1 - أنواع المن Aphids

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة المن أو قمل النبات Fam. Aphididae

تصاب البطاطس بالعديد من أنواع المن، والمن عموماً حشرات لينة الجسم، توجد عادة على الأسطح السفلية لأوراق النباتات وتغذى بامتصاص العصارة النباتية باستخدام أجزاء فمها الثاقب الماص، والأنواع المختلفة من المن التي تصيب نباتات البطاطس يبلغ حجم الواحد منها قدر رأس الدبوس ولونها إما أن يكون مصفراً أو أخضراً، والأطوار غير اليافعة للمن (ويطلق عليها الحوريات) تشبه الأطوار اليافعة تماماً، ولعظم الأنواع زائدتان إسطوانيتان قرب نهاية البطن وبمحاذاتها، وعند الإنزعاج ترفع حشرات المن هاتين الزائدتين إلى أعلى في وضع الدفاع، وليس لهاتين الزائدتين علاقة بإفراز الندوة العسلية التي تفرزها حشرات المن من فتحة الشرج، ولكنها تفرز قطيرات صغيرة من سائل يعتقد بأنه يعتبر وسيلة من وسائل الدفاع .

ومعظم أنواع المن تكون غيرمجنحة خلال فترة حياتها، ولكن في بعض الفترات، ينمو لعدد من حشرات الأطوار الغير يافعة بعض الإنبعاثات على جانبي الصدر تتضخم فيما بعد لتكون أزرار الأجنحة، وهذه الأفراد هي التي تصبح مجنحة عندما تصل إلى طورها اليافع، أفراد المن المجنحة تفتقر عن الأفراد غير المجنحة في صدرها العريض ولونها الذي يكون أقتم من لون الأفراد غير المجنحة.


ويوجد أربعة أنواع من المن التي تهاجم نباتات البطاطس، ولكن من الخوخ الأخضر ومن البطاطس يعتبر من أخطر أنواعها وهذان النوعان أيضاً يصيبان الكثير من الحشائش

والمزروعات الأخرى، وتختلف الكثافة العددية للمن من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى - ونورد هنا أهم هذه الأنواع:

### ١ - من الخوخ الأخضر (*Myzus persicae* (Sulzer)

#### وصف الحشرة:

يبلغ طول الحشرة اليافعة نحو  $\frac{1}{4}$  من البوصة ويختلف لون المظهر غير المجنح منه والذي يتواجد طوال فصل الصيف من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الداكن (شكل ١)، وفي نهاية فصل الصيف والخريف يختلف لون البعض من القرمزي إلى الأحمر، والطور المجنح (شكل ١، أ، ج) يكون لونه عادة بني قاتم فيما عدا لون البطن الذي يكون مصفرا، والتي يوجد على السطح الظهري الأمامي منها شريطان يغطيها بقع قاتمة غير منتظمة الشكل، ويبلغ طول الجزء الطرفي من العقلة النهائية من عقل قرن الإستشعار ما يعادل ٥ أمثال طول باقى نفس العقلة، كما يوجد على العقلة الطرفية للخرطوم شعرتان طويلتان عند نصفها القاعدي وثلاثة أزواج من الشعيرات عند قاعدتها؛ كما توجد كذلك شعرتان على العقلة القاعدية من عقل رسغ الرجل الخلفية.



(شكل ١) من الخوخ الأخضر

## عوائل الحشرة

لن الخوخ عوائل كثيرة بخلاف البطاطس فهو يصيب الخوخ والبرقوق والمشمش والليمون البلدي والجريب فروت والبرتقال بإصنافه ونباتات الخضر التابعة للفصيلة الباذنجانية والبقولية والصلبية والقرعية والمركبة والخبازية وغيرها، كذلك يصيب أزهار الكريزاتيم والأنترهيم وكثير من الحشائش مثل كيس الراعى والخردل.

ب - من البطاطس (*Macrosiphum euphorbiae* (Thomas)

## وصف الحشرة

يبلغ طول الحشرة اليافعة نحو  $\frac{1}{4}$  من البوصة، والمظاهر المجنحة وغير المجنحة منه لها نفس اللون، وقد يكون لونها أخضر فاتحاً أو متوسطاً أو قرنفلياً أو خليط من القرنفلى والأخضر، وكثير من الأفراد الخضراء شرائط خضراء داكنة تمتد طولياً فوق قمة البطن، ويعرف في بعض الأقطار باسم من الطماطم الأخضر أو القرنفلى (شكل ٢)

ج - من النبق أو السدر *Aphis nasturtii* Kaltentbach

## وصف الحشرة

يبلغ طول الحشرة اليافعة  $\frac{1}{17}$  -  $\frac{1}{4}$  من البوصة، ويختلف لونه من الأخضر المصفر الى الأخضر الغامق أو حتى الأسود وذلك باختلاف الفصول، ويشابة المظهر المجنح منه المظهر غير المجنح في اللون فيما عدا لون رأسه وصدره الأسودين.

د - من قفاز الثعلب (*Myzus solani* (Kaltenbach) أو من الباذنجنيات

## وصف الحشرة:

يبلغ طول الحشرة اليافعة  $\frac{1}{4}$  من البوصة، وأطواره اليافعة تشابه من الخوخ الأخضر



إلى حد كبير، ولكنها أكبر قليلا من من الخوخ الأخضر وجسمها ليس بالإستدارة الى يبدو بها جسم من الخوخ الأخضر ولكنه أشبه ما يكون بشكل زجاجة اللبن، وأيضا فإن لون رأس وصدر المظهر المجنح يكون بنيا مصفرا، ولون المظاهر غير المجنحه إما أن يكون أخضرا مصفرا أو أخضرا تفاحيا، ويوجد عادة مساحة دائرية داكنة حول كل قرن من قرون لستشعار هذا المن.



(شكل ٢) من البطاطس يتغذى على ساق نبات البطاطس

## هـ- من القطن *Aphis gossypii*

### وصف الحشرة:

سبق وصف هذا النوع من المن فى مواضع أخرى، وعليه فإن الحشرة اليافعة صغيرة الحجم، وتتميز بأن طول الجزء الطرفى من العقلة النهائية من عقل قرن الاستشعار تعادل ما مقداره ٢,٢ مرة من طول الجزء القاعدى من نفس العقلة، وتحمل عقلة الخرطوم (الشفة السفلى) الطرفية شعرتين ثانويتين فقط كما تحمل العقدة القاعدية بين عقل رسغ الأرجل الخلفية شعرتين كذلك.

وتشتد الإصابة بهذا النوع من المن فى شهر إبريل حيث توجد أفراد مجنحة وأخرى غير مجنحة وكلها ولودة. ويختلف لون هذا المن من الأسود إلى الأخضر الداكن إلى الأصفر الفاتح وقد تنتشر هذه الألوان جميعاً بين حشرات المن التى تصيب نفس العائل، والأفراد المجنحة التى تظهر فى الشتاء والربيع كبيرة الحجم نوعاً ولونها أخضر غامق بينما لون المجنح منها أصفر زيتوني، أما الأفراد غير المجنحة التى تظهر صيفاً فتكون أصغر حجماً ولونها أصفر أو برتقالي بينما المجنح منها يكون لون صدره ورأسه أسود والبطن بنى أو برتقالي وينتشر هذا المن فى جميع الأقطار العربية ويطلق عليه فى المملكة العربية السعودية من الحبيب أو عسال أو ديس الحبيب، وتقل أفراد المن فى مصر تدريجياً فى الصيف، حتى تنعدم فى منتصف يونية حتى منتصف أغسطس، ويصيب المن كثيراً من العوائل منها نباتات العائلة الخبازية، كالقطن واليامية وأكثر نباتات العائلة القرعية والجزر والخرشوف والرجلة والبطاطس وبعض نباتات الزينة.

### الأضرار التى تنشأ عن إصابة البطاطس بحشرات المن:

تتغذى أنواع المن المختلفة بغرس أجزاء منها الإبرية فى أنسجة النبات . وتسحب العصارة النباتية، وعادة ما تتجمع أفراد المن حول العرق الوسطى للورقة وباقى عروقها الموجودة على السطح السفلى وتتغذى على العصارة النباتية التى تنساب فى أوعية حزم اللحاء الوعائية، وعندما تتزايد أفراد من البطاطس فإنها تحتشد وتتغذى بالقرب من القمم النامية للسوق والأفرع (شكل ٢)، وتسحب هذه الحشرات العصارة من النبات بواسطة مضخة المريء

المحاسة ولكن عندما تكبر النباتات وتصبح تامة النضج فإن ضغط العصارة النباتية فيها يكون شديدا جدا ويصبح إغتناء المن عليها لا إرادى دون ضغ أو مص، ففي الظروف المناسبة يمتص الفرد الواحد من من الخوخ من العصارة النباتية ما يساوى ثلث وزنه فى الساعة الواحدة، ويقدر أن الكثافة العددية المتوسطة من افراد المن تستطيع أن تمتص ما مقداره طنا من العصارة النباتية المزروعة فى مساحة أكر واحد فى خلال فترة زمنية مقدارها ثلاثة أسابيع.


وتسبب الإصابة المتوسطة بالمن فى تجعيد أوراق البطاطس الصغيرة إلى أسفل (شكل ٣) وكذلك فى ذبول الأوراق السفلية (الأكبر عمرا) وموتها بسبب شدة إصابتها عن الأوراق الصغيرة، وعندما تظهر هذه الأمراض فإن غالبية الضرر تكون قد حدثت، وكلما زادت حرارة الجو وجفاف التربة كلما أوى ذلك إلى إنخفاض أعداد المن المهاجمة للبطاطس، حتى إنه إذا وصلت درجة الحرارة إلى ٩٥ فهرنهايت لمدة ٣ أو ٤ أيام فإنها سوف تؤدي إلى موت السواد الأعظم من حشرات المن ثم إختفائها من حقول البطاطس.

وحيث أن حشرات المن تسحب من العصارة ما هو فوق إحتياجاتها الغذائية بكثير فإن الباقي منها سوف ينساب من فتحة الشرج فى صورة سائل سكرى أو ما يسمى الندوة العسلية وتلطخ أجزاء الورقة المصابة، وتحتوى الندوة العسلية على ٨٥٪ من الكربوهيدرات، ٣٪ من بروتينات، وبعد مدة من الإصابة فإن معظم أجزاء النبات تغلف بالندوة العسلية التى توقف عمليات التنفس الطبيعية والتمثيل الضوئى فضلا عن أنها تكون وسطا ملائما لنمو أنواع من الخميرة والعفن، والإصابة الشديدة بالمن تؤدي فى الغالب إلى موت نباتات البطاطس وضياع المحصول.

### نقل المن للأمراض الفيروسية

تستطيع أنواع المن الخمسة التى تصيب البطاطس أن تنقل إليها أمراضا فيروسية معينة، وهذه الأمراض تقلل من كلاً القيمتين الكمية والنوعية لمحصول البطاطس، وتكون الأمراض الفيروسية أشد وطأه فى حالة إستخدام تقاوى مصابة بالأمراض عنها فى حالة استخدام التقاوى السليمة، وأخطر هذه الأمراض هو مرض التفاف أوراق البطاطس التى يمكن أن تخفض الإنتاج إلى نحو ٥٠٪ ويعتبر من الخوخ الأخضر هو أهم أنواع المن جميعا كناقلا

لبعض الأمراض الفيروسية المعينة مثل مرض موازيك تجعد الأوراق ومرض التفاف الأوراق وهذا المرض يؤدي إلى موت الأنسجة الحية في الدرنات المعروف بأسم النكروز الشبكي Necrosis كذلك مرض التقزم الاصفراري ومن البطاطس هو المسئول الأول عن نقل المرض المسمى مرض التبرقش العفن Mild Mosaic . أما من النبق أو من السدر فهو المسئول على نقل مرض موازيك التجعد وكذلك مرض التفاف الأوراق، ويمكن لمن قفاز الثعلب (أو من الباذنجانيات) أن ينقل مرض التبرقش العفن ومرض التفاف الأوراق، ويوجد العديد من الأمراض الفيروسية الأخرى التي تصيب البطاطس بنقلها نوع أو أكثر من أنواع المن المذكورة.



(شكل ٣) أوراق بطاطس مجعدة وتحولت إلى شكل الفنجان بسبب إغذاء من البطاطس عليها

وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن المن ليس له دور هام في نقل مرض «الدرنات المغزلية» كما كان يعتقد في السابق، ولكن النقل الميكانيكي لفيروس هذا المرض هو العامل الأساسي في انتشار هذا المرض.

### الدورة الموسمية للمن وعاداته:

عندما تنزل درجات حرارة الجو عن النطاق الملائم تتكون مظاهر مجنحة من أنواع المن المختلفة التي تصيب البطاطس وتهاجر لتقضى فترة التشتية على عوائل أخرى ويحدث ذلك

في أواخر الصيف وفي الخريف، وفي المناطق الباردة فإن المظاهر غير المجنحة للمن المهاجر تتخذ من الأشجار الخشبية عوائل لها حيث تبيض عددا قليلا من البيض ذو الشكل البيضاوي المستطيل بجوار البراعم أو في شقوق فلق الأشجار المسنة أو الصغيرة، ولون هذا البيض يكون أخضرا زيتونيا عند وضعه ولكنه سرعان ما يتحول إلى الأسود اللامع، وفي الربيع الباكر أو عند بدء نشاط البراعم يفسد البيض وتخرج منه حوريات بيضاء رمادية اللون يطلق عليها الأمهات، وتبدأ هذه الحوريات في الإغذاء على عصارة البراعم، ويقضى من الخوخ الأخضر الشتاء بنجاح في صورة بيض على أشجار البرقوق في كندا ووسط واشنطن (شكل ٣) أما من البطاطس فيقضى الشتاء وهو في طور البيض أيضا والذي يوضع على أشجار الورد القديمة أما من السدر فيقضى الشتاء في طور البيضة على أشجار السدر المائية (شكل ٤) وفي مصر لم يثبت أن أى نوع من المن يستطيع أن يضع بيضاكما هو الحال في البلاد الباردة،

وفي الربيع تتكون أفراد مجنحة ومهاجرة من المن الذي تربى على العوائل الشتوية ولكن بعد أن يتكون جيلان أو ثلاثة من الأفراد التي تبحث عن نفس البيض المشتى، وتطير الأفراد المجنحة الربيعية من عوائلها الشتوية إلى الحشائش والبطاطس وغيرها من المحاصيل وطوال فترة نمو محصول البطاطس، تتوالد أنواع المن التي تصيبها توالدا بكريا بولادة الحوريات الصغار، وجميع أفراد المن من الإناث فيما عدا القليل من الأفراد المجنحة التي تتكون في الخريف وتكون ذكورا وتظهر في حالة تكون جيل من المن غير المجنح الواضع للبيض فوق العوائل الخشبية.

وفي خلال الصيف، يمكن للفرد الواحد من المن أن يضع من ٥٠ - ١٠٠ بيضة في خلال ٢ - ٣ أسابيع، وتنضج الحوريات في خلال ١ - ٢ أسبوعا، وتتزايد أعداد عشيرة المن بسرعة كبيرة وفي حالة من الخوخ الأخضر ومن قفاز الثعلب ومن السدر فإن هذه الأنواع تصيب أوراق البطاطس عادة من سطحها السفلى، وغالبا ما تكون الأوراق المصابة موجودة في وسط النبات أو الجزء السفلى منه وبذلك يضعف ملاحظتها، وذلك فإنه عند تقدير كثافة الإصابة، يجب فحص الأوراق الموجودة في وسط النبات وقرب قاعدته مع ملاحظة أن الإصابة تكون على السطح السفلى للأوراق.



(شكل ٤) بيض من السدر على جذع شجرة السدر المائية التي يقضى عليها فصل الشتاء

### طرق المكافحة:


#### المكافحة الكيميائية:

يجب عدم اللجوء الى المكافحة الكيميائية لحشرات المن على البطاطس الا عندما تكون النباتات صغيرة، ويشترط أن يصل المبيد الى الأسطح السفلى للأوراق حيث يوجد المن، ومن الأفضل ترك الأعداء الحيوية للمن تقوم بعملها في مكافحته وتشجيعها وعدم استعمال المبيدات إذا كانت هذه الأعداء متواجدة في حقول البطاطس حتى لا يقضى عليها، وفي حالة زيادة الكثافة العددية لحشرات المن بدرجة تنذر بالخطر يمكن استعمال المبيد مارشال ٢٥٪ (مسحوق قابل للبلل) بمعدل ٦٠٠ جم للفدان أو ريلدان ٥٠٪ (مستحلب) بمعدل ٥٠٠ سم<sup>٢</sup> للفدان هذا وتوصي وزارة الزراعة المصرية بمعاملة البطاطس كيماويا عند وجود إصابة مشتركة بالمن والذبابة البيضاء أو نطاطات الأوراق وذلك باستعمال مبيد اكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان - ويكرر العلاج إذا لزم الأمر - كذلك يمكن استعمال ملاثيون ٥٧٪ بمعدل لتر واحد للفدان لمعالجة الإصابة بالمن.

## مكافحة المن بواسطة الأعداء الحيوية:


يوجد للمن كثير من الأعداء الحيوية فى البيئة من طفيليات ومفترسات حشرية ومسببات أمراض فطرية، وهذه كلها تعمل على الحد من كثافة عشيرة المن علي حقول البطاطس بدرجة كبيرة، وعند ما تنشط هذه الأعداء، يمكن الإعتماد عليها فى مكافحة ونبذ المكافحة الكيميائية ما أمكن- وإذا اضطرننا لإستخدام المكافحة الكيميائية فيجب إختيار المبيدات المختارة التى لا تضر بهذه الأعداء الحيوية ضررا كبيرا، وكذلك يجب إستخدام هذه المبيدات فى أوقات خمول هذه الأعداء الحيوية حتى لا تتعرض للخطر.

ومن أهم الطفيليات التى تصيب المن أنواع من الزبابير الصغيرة الحجم والتى تضع إناثها بيضها داخل حشرات المن، وعند فقس البيض وخروج اليرقات تقوم هذه اليرقات بالإغذاء على جسم المن من الداخل حتى يصبح الجسم فارغا (شكل ٥).




(شكل ٥) أجسام حشرات المن بعد أن خرجت منها المتطفلات من خلال الفتحات الدائرية

وهذه الزنابير تنتمي لأجناس *Aphelinus*, *Aphidius*, *Encarsia* وتعتبر حشرات أوى العيد من أهم مفترسات المن، حيث تغتذى حشرات الياقة ويرقاتها على أعداد كبيرة من حشرات المن (شكل ٦)، ومن مفترسات المن الهامة أيضا أنواع من العناكب والبق وذباب السرفس ويرقات أسد المن التي تفترس أعدادا ضخمة من حشرات المن، وترى هذه اليرقات وهي تتحرك بنشاط وتلتهم أفراد المن بشراهة (شكل ٧)، وتوجد عدة أنواع من الفطريات التي تصيب المن وتقتل أعدادا كبيرة منه مثل الفطر *Entomothora aphidis*، وهذه الفطريات تكون فعاله ونشطة فى الأجواء الرطبة عنها فى الأجواء الجافة.



(شكل ٦) حشرات إلى العيد المفترسة للمن أ - حشرة يافعه ب - عذراء ج - يرقة



(شكل ٧) أسد المن أ - حشرة يافعه ب - يرقة تاكل المن



وعند ما يكون الظروف مناسبة لنشاط هذه الأعداء الحيوية فإنها تعمل على الحد من خطورة المن الى درجة كبيرة.

### المكافحة الزراعية للمن:

يصيب المن الحشائش الموجودة في الحقول قبل زراعة البطاطس وبعد زراعتها، لذلك يجب التخلص من هذه الحشائش في المناطق المحيطة بزراعات البطاطس وداخل حقول البطاطس لمنع المن من التكاثر عليها والإنتقال منها للبطاطس، وحيث أن من الخوخ الأخضر يقضى فصل الشتاء بين قلف الأشجار، وركام النباتات، فيجب معاملة هذه الأشجار (ولا سيما الخوخ) بالكيماويات أثناء فصل الشتاء حتى تقضى على أفراد المن الموجودة عليها كذلك يجب التخلص من الأحطاب وركام النباتات، وعليه فإن المعاملات الزراعية لها فضل كبير في الحد من كثافة عشائر المن ودرء أخطاره.

## ٢ - الحفارات أو كلاب البحر

رتبة مستقيمة الأجنحة Order Orthoptera

فصيلة الحفارات Fam. Gryllotalpidae

الاسم العلمي للحشرة


أ - كلب البحر العادي *Gryllotalpa gryllotalpa* L.

ب - كلب البحر الإفريقي *Gryllotalpa africana*

يوجد النوعان من الحفارات في جميع البلاد العربية، ويفضل الثاني البلاد المرتفعة الحرارة، وكما سبق أن ذكرنا فإن هذه الحشرات تقوم بحفر أنفاق في التربة وعلى أعماق كبيرة والأنفاق متشعبة منها أنفاق تخزن فيها الغذاء وأنفاق لوضع البيض وتربية الصغار وقد تبدو الأنفاق واضحة مرتفعة قليلا عن سطح الأرض، والحشرة جيل واحد في السنة (شكل ٨).

ويقرض الحفار جنور نباتات البطاطس، وهي بادرات - تحت سطح الأرض مباشرة مما

يؤدي إلى موت النباتات، وتفضل الحشرات الأراضي الخفيفة والمسمدة بالسمدة العضوية مثل السماد البلدي.



(شكل ٨) الحفار

أ - حورية عمرها ٢ أيام      ب - أنثى يافعة

### مظهر الإصابة والضرر

كما ذكرنا تصاب نباتات البطاطس الصغيرة بالحفار فيقرض جنور هذه النباتات تحت سطح التربة ويسبب موتها، وفي حالة تكون الدرنات، يهاجم الحفار الدرنات ويحدث بها ثقوبا وتجاويفا ويعرضها للتعفن (شكل ٩).

### مكافحة الحفارات:

تكافح جميع أنواع الحفارات باستخدام الطعم السام، ويستخدم نفس الطعم في مكافحة الحفارات والدودة القارضة معا عند وجود إصابة مشتركة بهما، ويتكون الطعم السام من مبيد فعال يضاف الى جريش الذرة أو نخالة القمح ويبلل الخليط بالماء تدريجيا حتى يتماسك، وينصح باستخدام مبيد هوستاسيون ٤٠٪ بمعدل ١,٢٥ كم للفدان يضاف إلى ٢٠ كم جريش أو نخالة، أو مبيد مارشال ٢٥٪ بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان يضاف إلى نفس كمية الجريش أو النخالة، ولاستعمال الطعم السام تروى الأرض بالماء ويعد أن تتحمل السير عليها ينثر الطعم بين خطوط المزرعة نثرا منتظما قرب الغروب.



(شكل ٩) التلف الذي حل بالبطاطس من الإصابة بالحفار

### ٣ - الديدان القارضة

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الفراشات الليلية Fam. Noctuidae

أ - الدودة القارضة السوداء أو العادية *Agrotis ipsilon* (H)

ب - الدودة القارضة البنية *Agrotis spinifera* (H)

ج - دودة اللغت القارضة *Agrotis segtum* (schi)

د - الدودة القارضة المرقطة *Limax c. nigrum* (Linnaeus)

وتوجد الأنواع الأربعة من الديدان القارضة في كافة أقطار العالم العربي، ولكن النوع الثاني (ب) والنوع الثالث (ج) يفضل البلاد المجاورة للصحارى. أما النوع الرابع فيفضل المناطق الجبلية وذات الحرارة المنخفضة.

## وصف الحشرات اليافعة:

سبق أن قمنا بوصف هذه الحشرات وبورة حياتها فى الجزء الأول من هذا الكتاب، ولكننا نقدم هنا وصفا موجزا لفراشات كل نوع وبورة حياة بعضها.

### فراشة الدودة القارضة السوداء

متوسطة الحجم يبلغ طولها ٢,٨ سم، وعرضها ٤,٥ سم عند فرد الأجنحة الأمامية، ولون الجسم والأجنحة الأمامية رمادى غامق مع وجود أشرطة أفقية سوداء على الثلث الخارجى للجناح الأمامى، كما توجد على الجناح المذكور بقعتان مميزتان على هيئة الأذن والكلية، ولون الأجنحة الخلفية العام أبيض ولكن حوافها وعروقها غامقة وتميز الأنثى عن الذكر بأن قرن الإستشعار فى الأنثى خيطى وفى الذكر مشطى مضاعف.

### فراشة الدودة القارضة البنية:

تعتبر هذه الآفة ثانى الديدان القارضة فى الأهمية بعد الدودة القارضة السوداء، وهى واسعة الانتشار فى مصر، والفراشة أصغر من سابقتها فطولها يصل إلى ٦,٥ سم وعرضها ٣,٥ سم بعد فرد الأجنحة، لون الجسم والأجنحة الأمامية بنى فاتح مع وجود خط غامق مواز للحافة الخارجية للجناح الأمامى، كما يوجد على الجناح المذكور أشرطة غامقة على هيئة مثلثات موازية لطول الجناح، والعلامتان اللتان بشكل الأذن والكلية واضحتان أما الأجنحة الخلفية فلونها أبيض فضى، ويتشابه كل من الذكر والأنثى فى الحجم واللون إلا أن قرن الإستشعار فى الذكر مشطى مضاعف وفى الأنثى خيطى.

### دورة حياة الدودة القارضة البنية

تضع الإنثى الملقحة من ٥٠ - ٢٠٠ بيضة فرديا أو فى مجاميع لا تزيد عن ٣ بيضات، يفقس البيض بعد ٣ - ٤ أيام ولليرقة ٦ أعمار، وتبلغ مدة الطور اليرقى من ٢٤ - ٤٠ يوما تبعا لدرجة الحرارة والرطوبة الجوية، واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ٣,٢ - ٣,٧ سم فى الطول ولونها أصفر أو بنى مخضر أو بنى فاتح ورأسها أسمر، وفى وسطها من أعلى خط طولى أسمر، ويغطى الصدر الأول بصحيفة سمراء كما تغطى ترجة الحلقة البطنية العاشرة

بصفحة لونها رمادي فاتح، كما يوجد أسفل الخط الظهرى خطان أخران على كل جانب وعند إكمال نمو اليرقة تعذر داخل التربة في شرنقة من الطين مبطنة بطبقة من الحرير، ويبلغ طول مدة العذراء نحو ١٠ - ١٥ يوما وتعيش الحشرة اليافعة بعد خروجها من العذراء نحو ٣ - ٦ أيام .

### فراشة دودة اللفت القارضة

هذه الحشرات واسعة الإنتشار في جميع أنحاء العالم، فتوجد في الولايات المتحدة والجزر البريطانية وأقطار أوروبا والأقطار العربية، ويبلغ طول الفراشة ١,٥ سم، وعرضها ٣ سم بعد فرد الأجنحة، والأجنحة الأمامية لونها يختلف من رمادي إلى بني محمر، ويوجد على الحافة الخلفية للجناح الأمامي خط متعرج غامق اللون، وتظهر علامتان (الأذن والكلية) بوضوح على كل من الجناحين الأماميين وحواف الجناحين الأماميين في الأنثى لونها رمادي غامق، قرن الاستشعار خطي في الذكر وخطي في الأنثى .

### دورة الحياة


تقضى هذه الحشرة الشتاء على هيئة يرقة في التربة وتعذر من فبراير إلى إبريل، وتخرج الفراشات من مارس حتى مايو وتضع الإناث البيض على سوق العوائل النباتية من محاصيل وحشائش قرب سطح الأرض، يفقس البيض بعد حوالي ٢٠ - ٦٤ يوما والبيضة من النوع نصف الكروي كالحبة وعليها من الخارج تضاريز مميزة كما في باقي الديدان القارضة تتغذى اليرقات في أوائل عمرها على المناطق السفلية من النباتات القريبة من سطح الأرض، ويبلغ طول اليرقة التامة النمو ٢,٥ - ٣,٥ سم ولونها رمادي مخضر وعلى ظهرها خط وسطى غامق على جانبيه خطوط أخرى طويلة خفيفة، وعلى السطح العلوى لكل من حلقات الجسم أربع بقع سوداء اللون، إثنان منها على كل جانب من جانبي الخط الوسطى العلوى الغامق، ويوجد على كل من جانبي كل حلقة أيضا بخلاف البقعتين السوداوين السابقتين ثلاث بقع جانبية سوداء، وسطح اليرقة السفلى رمادي فاتح ورأسها رمادي اللون وعليها خطان غامقان متقاطعان على شكل X.

والعذراء مكبلة ملساء بنية اللون، وعلى نهاية بطنها شوكتان، وتبلغ نحو ١ - ١,٢ سم في الطول، والتعذير يتم داخل شرنقة من البطن في التربة والشرنقة تكون مبطنة من الداخل بطبقة من الحرير.

ولهذه الحشرة جيل واحد وجزء من جيل ثان في السنة، وتدخل يرقات هذا الجيل الثاني بيانا شتويا مع بعض يرقات الجيل الأول.

### فراشة الدودة القارضة المرقطة ويرقاتها

الأجنحة الامامية لهذه الحشرة لونها أصفر داكن أما الأجهزة الخلفية فلونها أبيض، وفيما عدا ذلك فهي تشبه فراشات الديدان القارضة (شكل ١٠) وحواف الأجنحة الامامية مرقطة ببقع سوداء يفصل بينها خطوط سمراء تمتد حتى الحافة الخلفية للجناح، وتظهر علامتان (الأذن والكلية) بوضوح على الجناحين الامامين، وقرن الاستشعار مشطى في الذكر وخيطى في الانثى. ويوجد على جسم اليرقة ختان داكنين بطول جانبي الجسم وعده أزواج من العلامات الوتدية الشكل على الجزء الخلفى من الظهر.



(شكل ١٠) الدودة القارضة المرقطة

أ - فراشة ب - ج - يرقة

### عادات الديدان القارضة ومظهر الإصابة والضرر

يصيب البطاطس في العالم نحو ١٢ نوعا من الديدان القارضة تتشابه عاداتها جميعا ومظهر إصابتها، فاليرقات تقرض سوق نباتات البطاطس فوق سطح الأرض مباشرة أو بعده بقليل ومن هنا جاء اسمها، وتمارس اليرقات نشاطها في الإغذاء ليلا وفي أثناء ساعات النهار

الباردة، واليرقات لها عادة طى الجسم على هيئة هلال فى حالة سكونها أو عند إزعاجها ويرعد فقس البيض تبقى اليرقات الصغيرة على النبات العائل عدة أيام لتغذى عليه قبل نزولها إلى التربة، وفى الليل تتسلق اليرقات النباتات لتغذى عليها ولكن عند تمام نضج اليرقات تفقد القدرة على تسلق النباتات، فتضطر لقرض سوق النباتات عند سطح التربة فتسقط هذه النباتات وتصبح فى متناول أجزاء فم اليرقات، وتقرض اليرقة الواحدة عدة نباتات فى الليلة الواحدة وبذلك يزداد خطرها، وبالكشف عن النباتات المقروضة أو الساقطة تشاهد اليرقات ملتوية على نفسها بحيث يكون الرأس ملامسا لنهاية البطن ويمكن لليرقات البقاء على هذا الوضع فترة من الزمن. وعادة ما تهاجم يرقات الديدان القارضة درنات البطاطس وتحدث بها حفرا وتجاويف مما يؤدي الى تعفن الدرنات (شكل ١١).



(شكل ١١) درنات بطاطس مصابة بالبوذة القارضة

## طرق المكافحة

### المكافحة الزراعية واليدوية

تفيد عمليات حرث الأرض كثيرا فى التخلص من عذارى الديدان القارضة الموجودة فى التربة وكذلك التخلص من الحشائش التى تتربى عليها هذه الديدان — لذلك يجب إجراء عمليات الحرث والتخلص من الحشائش قبل زراعة محصول البطاطس.

ومن طرق مكافحة اليدوية النافعة، البحث عن اليرقات أسفل النباتات المصابة والتخلص

منها بالحرق، وهذا الأمر يتعذر إجراءه فى المساحات الشاسعة،

### المكافحة الكيماوية

سبق ذكرها فى مكافحة المشتركة للحفار والديدان القارضة.

## ٤- الديدان الجياشة Army Worms

يطلق على يرقات أو يساريع caterpillars بعض أنواع الحشرات حرشفية الأجنحة من فصيلة الفراشات الليلية (الديدان الجياشة) بسبب عاداتها فى التواجد بأعداد ضخمة على المحاصيل، وعندما ينضب معين الغذاء فى حقل ما بسبب إغتها على المحصول الموجود به فانها تتحرك فى شكل جيش وتهاجر إلى الحقول القريبة لتهاجم ما فيها من محاصيل.

ويوجد فى العالم العربى من أنواع هذه الحشرات دودة ورق القطن العادية أو الكبرى *Spodoptera littoralis* (Boisd) ودودة ورق القطن الصغرى أو الدودة الخضراء *Spo-doptera exigua* (HB) وهما تابعتان لفصيلة الفراشات الليلة Fam Noctuidae، رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera.

ويتشابه عادات الحشرتين وقد سبق شرح دورة حياتهما وعاداتهما فى الجزء الأول من هذا الكتاب.

### الأضرار التى تسببها لمحصول البطاطس

تتغذى يرقات دودة ورق القطن الكبرى والصغرى على أوراق نباتات البطاطس، وقد تحدث ضررا كبيرا بالمحصول، وغالبا لا تجرى مكافحة كيماوية لدودة ورق القطن وحدها على البطاطس، بل يجرى علاجا مشتركا لها وللبقعة الخضراء والديدان القياسة والنصف قياسا وبودة ثمار الطماطم الأمريكية، ويمكن إتباع جدول المكافحة الكيماوية الآتى الذى توصى به وزارة الزراعة المصرية.



الآفة	المبيد الموصى به	تركيز المادة الناعلة	المسورة	الكمية اللازمة للحدان الواحد	كمية الماء اللازمة	ملاحظات
دودة ورق القطن	لانيت	٩٠٪	SP	٢٠٠ جرام	٤٠٠ - ٦٠٠ لتر	يعتبر هذا علاجاً مشتركاً لدودة ورق القطن والبقة الخضراء والديدان القياسية والنصف قياسية ودودة ثمار الطماطم الأمريكية.
	أوثافيت	٩٠٪	SP	٢٠٠ جرام		
	أو لانيت	٢٠٪	سائل	١,٢٥ لتر		
	أوريلدان	٥٠٪	مستحلب	واحد لتر		
	أو سليكرون	٧٢٪	EC	٧٥٠ سم ٣		
	أوريلدان محلي	٥٠٪	EC	واحد لتر		
	إونيوندين	٢٥٪	IS	واحد لتر		

## ٥ - دودة درنات البطاطس

الاسم العلمي للحشرة *Phthorimaea (Gnorimochema) operculella* (zeller)

رتبة الحشرات خرسفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة جليشييدى Fam. Gelechiide

وهي حشرة هامة تصيب كثيراً من محاصيل الفصيلة الباذنجانية، ويعتقد أن أمريكا الجنوبية هي الموطن الأصلي لها على أساس أنها هي الموطن الأصلي للدخان والبطاطس وهما أهم عائلتين لهذه الحشرة، ويرجع أن تكون قد دخلت إلى مصر في رسالة للبطاطس مستوردة من مالطة في أغسطس ١٩١٦ عن طريق ميناء بور سعيد، وتصيب هذه الحشرة أكثر من ٢٠ نباتاً من أفراد الفصيلة الباذنجانية وفي مصر يعتبر البطاطس والطماطم والباذنجان من أهم عوائلها، وتشتد الإصابة بها في العروة الصيفية وتسبب خسائر كبيرة للمحصول في الحقل قبل التخزين يقدر بنحو ٧٪، وتقل الإصابة بها في العروة النيلية ولا تتجاوز ١٪.

وهي تهاجم المجموع الخضري والثمار وتصنع أنفاقاً في الأوراق والبراعم وشتلات الأزهار والسوق، ولهذه الآفة انتشاراً واسعاً داخل جمهورية مصر العربية وخصوصاً المناطق

الشمالية وعلى الأخص منطقة الاسكندرية، وقد ذكر أيضا أن هذه الحشرة ذات انتشار عالمي واسع يشمل جميع القارات حيث تصيب العوائل النباتية الآتية: -

Ground cherry, False heath, cat tail, bitters weet tomato, potato, Jimposn weed hound's togun horse nettle, henbone, night, black night shade, mullein, matrimong vine, tood flax, red pepper.

هذا ولقد وجد أن أقصى درجة حرارة لنشاط الحشرة هي ٣٥°م وأدنى درجة حرارة هي ١٠°م وأفضل درجة حرارة هي ما بين ٢٨ - ٣٥°م، كما لوحظ أن بعض اليرقات تستطيع أن تتحمل درجات حرارة منخفضة تبلغ ١,٧ - ٤,٤°م لمدة ٥ أشهر تصل بعدها إلى طور الحشرة اليافعة. ووجد أن الذكور اليافعة يمكنها أن تتحمل درجة حرارة ٤١°م والأنثى درجة ٤٦°م لمدة ساعات. وتقلل الرطوبة العالية وكذلك الأمطار الشديدة من أعداد هذه الآفة في بيئتها بنسبة كبيرة، وعلى ذلك فإن أنسب الأجواء لتكاثرها هو الجو الجاف الدافئ.

وتبدأ الإصابة في الحقل بوضع الإناث الملقحة بيضها على المجموع الخضري لنباتات البطاطس والطماطم والباذنجان أو على درنات البطاطس المتكونة تحت التربة عند تشقق وجفاف التربة أو على درنات البطاطس بعد جمعها وتركها بالحقل دون تغطية أو على ثمار الباذنجان والطماطم الغضة قرب الكأس. وبعد فقس البيض تدخل اليرقات في الورقة قرب قاعدتها محدثة أنفاقا غير منتظمة خيطية الشكل Linear ويسير النفق ويدخله إلى الساق، وقد تجف الأوراق المصابة تبعا لذلك. وعند فقس البيض الموضوع على الدرنات تحت سطح التربة تدخل اليرقات الدرنات عند العيون محدثة أنفاقا بها تبطنها بمادة كلسية وتطرد إفرازاتها إلى خارج الدرنه فتظهر متكاثفة عند مداخل الأنفاق حول تلك العيون كما تصاب الدرنه بعد ذلك بأنواع من الفطر والبكتريا تسبب تلفها (شكل ١٢).


### الحشرة اليافعة:

(شكل ١٢ مكرر) تبلغ نحو ٠,٦ سم في الطول، ١,٥ سم عند فرد الجناحين الأماميين منبسطين على الجناحين، ولونهما بني رمادي.

### دورة الحياة:

يحدث التزاوج بعد خروج الفراشات من العذارى وتستغرق عملية التزاوج نحو ١ - ٣ ساعات (وأحيانا تستمر لمدة ٢٤ ساعة)، وفي اليوم التالي للتزاوج تبدأ الأنثى الملقحة في وضع


بيضاها فرديا أو في مجموعات صغيرة (تحتوى المجموعة نحو ٢ - ٥ بيضات أو حتى ٢٥ بيضة) ويستمر وضع البيض لمدة ٤ - ٩ أيام تضع الأنثى خلالها ٩٠ بيضة في المتوسط. وإذا حدث ووضعت أنثى غير ملقحة بيضاها فإنه لا يفقس البيض بعد ٣ - ٤ أيام، ولقد وجد أن أعلى درجة يمكن أن يفقس عندها البيض هي ٣٦°م وأقل درجة هي ١٠°م. والبيضة بيضاوية الشكل وتبلغ نحو ٥٦ مم في الطول و ٣٧ مم في العرض ولونها أبيض لؤلؤى عند الوضع ثم تصفر ثم تصبح بنية ثم يتغير اللون إلى الرمادى قبل الفقس.



(شكل ١٢) - دودة بطاطس مقطوعة نصفين ليظهر بها الأنفاق التي أحدثتها دودة درنات البطاطس



(شكل ١٢) ب - دودة درنة البطاطس



فراشة



يرقة

(شكل ١٢ مكرر) دودة درنات البطاطس

وليرقة ٤ - ٥ أعمار، واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ١,٥ سم في الطول، ولونها مائل للاحمرار أو الاخضرار ولها درقة بنية غامقة على ترجة الحلقة الصدرية الأولى. وتبلغ مدة طور اليرقة نحو ٢٠ - ٢٠ يوما. ولقد وجد أن نمو اليرقة يكون بطيئا في درجات الحرارة التي تقل عن ١٨°م.

وتعذر اليرقات في شرائق حريرية بيضاء اللون داخل الدرنات أو خارجها أو عند نهاية الأنفاق أو في المخلفات الجافة القريبة منها بالحقل أو قرب سطح التربة. والعذراء المكبلة تبلغ نحو ٦,٥ سم وتبلغ مدة طور العذراء نحو ٢ أيام ولكن قد تطول إلى ٥٠ يوما عند حرارة ٥٥ - ٦٢°ف أو حتى ١٠٠ يوما عندما تقل الحرارة عن ذلك. وطور العذراء أكثر الأطوار تحملا للحرارة المرتفعة والمنخفضة وهو الطور الوحيد الذي يصمد للبرودة عندما تقضى على جميع الأطوار الأخرى.

وليس لهذه الحشرة بيات شتوي في جمهورية مصر العربية إذ توجد جميع أطوارها على مدار السنة، ولكن دورة الحياة تستغرق فترة طويلة في الشتاء عنه في الصيف إذ أن أطول فترة هي في الأجيال التي توجد في ديسمبر ويناير بينما أقصر فترة هي في الأجيال التي توجد أثناء يونيو ويوليو وأغسطس. ولقد وجد أن هذه الحشرة ٩ أجيال متداخلة في السنة.

## المكافحة:

### أولا - المكافحة الزراعية

- ١ - التوسع في زراعة البطاطس في العروة النيلية لقلّة تعرضها للإصابة.
- ٢ - زراعة التقاوى السليمة الخالية من اليرقات أو العذارى.
- ٣ - زراعة درنات البطاطس على أعماق لا تقل عن ١٠ سم حتى لا تتعرض للإصابة إذا انشقت التربة نتيجة للجفاف.
- ٤ - جمع الأفرع والنباتات المصابة وإعدامها قبل هروب اليرقات منها وكذلك حرق عروش المحصول بعد الجمع وعدم تغطية المحصول بعد جمعة ووضعه بالحقل أو بالمخزن (النواله) بالعرش حتى لا تنتقل الإصابة إلى الدرنات بل يستعمل قش الأرز أو التبن أو الرمل بدلا من العرش وذلك قبل غروب الشمس يوم الجمع حتى لا تضع الفراشات بيضها ليلا على البطاطس المجموعة قبل تغطيتها.

### ثانيا: المكافحة الحيوية:

- ١ - استعمل بنجاح الفطران *Beanveria's porotrichum*, *Glulnliferum bassiana* مقاومة هذه الآفة
- ٢ - نجحت الطفيليات *Microbracon gelechia*, *Eulimneria*, *Chllonus s* من انتشارها.

### ثالثا: المكافحة الكيماوية:

- ١ - في الحقل:  
ترش النباتات بالسيفين ٨٥٪ القابل للبلل أو الجاردونا (٧٠٪) بنسبة ٤, ٠٪ لكل منهما ويكرر كل عشرة أيام إذا استدعى الأمر ذلك.
- ٢ - في النواله أو المخزن:  
أ - تطهير النواله قبل نقل البطاطس اليها بالمطهرات المناسبة مثل مستحلب السولار والصابون (لتر سولار + ١, ٥ لتر ماء + ٢٠ جم صابون).

ب - تعفير الدرنات بمسحوق السيفين ١٠٪ بنسبة كيلو جرام واحد لكل طن درنات للوقاية من الإصابة على أن يكون التعفير منتظما بواسطة العفارة.

ج - إذا كان التخزين في مخازن يمكن إحكام قفل فتحاتها فيمكن تبخير الدرنات بعد التخزين بحوالي أسبوع بغاز ثاني كبريتور الكربون بنسبة ٣٠سم<sup>٣</sup> / متر مكعب من الفراغ لمدة ٣٦ ساعة.

د - عند تخزين تقاوى العروة النيلية في الثلجات يجب أن يكون التخزين على درجة حرارة ٤م ورطوبة ٨٥ - ٩٠٪، وهذه الدرجة الواطئة من الحرارة تمنع من تكاثر ونمو الحشرة.

## ٦ - حفار ساق الذرة الأوروبي

الاسم العلمى للحشرة *Ostrinia nubilalis* Hbn

رتبة الحشرات خرسغية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بيروستدى Fam. Pyraustidae

تصيب هذه الحشرة أكثر من ٢٠٠ عائل نباتى منها محاصيل حقلية وخضر ونباتات وحشائش، ولكنها عائلها الأساسى هو الذرة - وتنتشر هذه الآفة إنتشارا واسعا فى كافة الأقطار العربية والأوروبية والولايات المتحدة وجزء من آسيا وإفريقيه.

وقد سبق شرح كل مايتعلق بهذه الآفة بتوسع فى الجزء الأول من هذا الكتاب عند ذكر آفات المحاصيل النجيلية، وتصاب البطاطس بحفار ساق الذرة الأوروبى وينزل بها أحيانا خسائر فادحة. ونوردها هنا وصفا مقتضبا لأطوار هذه الحشرة.

### الفراشة أو الحشرة اليافعة:

يبلغ طول الفراشة الأنثى نحو ١,٥ سم وعند فرد جناحيها يصل الطول الى ٢,٥ الى ٣سم، وطول الفراشة الذكر ١ - ١,٢ سم، ٨,١ - ٢,٣ سم عند فرد الجناحين، ولون الجناحين

الأمامي والخلفى فى ناحيتهم الداخليه والخارجية من السطح العلوى بنى فاتح يتخلله بقع صفراء، أما المنطقة الوسطى من كلا الجناحين فلونها يتخلله تعاريج دقيقة ولونها بنى فاتح، أما الناحية السفلية فلون الجناحين أبيض فضى فى الأنثى وأبيض مشوب بلون بنى فاتح فى الذكر أو رمادى غامق فى الذكر. قرن الاستشعار خيطى فى الأنثى ومشطى فى الذكر.

### واليرقة التامة النضج

ذات رأس لونها بنى قاتم أو أسود طولها نحو ٢,٥ سم (شكل ١٢)، ولون السطح العلوى للجسم رمادى أو أخضر فاتح أو قرمضى مع وجود صف من البقع البنية القاتمة على كل حلقة ويضع خطوط بنية أو قرمزية تمتد بطول الجسم، والسطح السفلى لليرقة لونها لحمى وبدون علامات وتتلف يرقات حفار ساق الذرة الأولى نباتات البطاطس باغتذائها على السوق أو الدرنات، وتصاب الدرنات عندما تموت سوق النباتات وتجف من جراء الإصابة فتترك اليرقات السوق الجافة بحثا عن الغذاء وتصيب الدرنات.



(شكل ١٢) يرقة حفار ساق الذرة الأوروبية

### دورة الحياة والطباع

تضع الفراشات الإناث بيضها فى مجموعات مكونة من ١٥ - ٢٠ بيضة فوق السطح السفلى للأوراق، وتضع الإناث فى المتوسط نحو ٤٠٠ بيضة، ولكن البعض منها قد يضع نحو ١٩٠٠ بيضة، ويكون لون البيض أبيضاً عند وضعه ولكنه يتحول إلى اللون الأصفر الباهت ثم اللون القاتم قبل الفقس، وتنسلخ اليرقة من ٥ - ٦ مرات قبل بلوغها درجة النضج، وعند تمام نموها تغزل اليرقة شرنقة حريرية وتتحول داخلها إلى عذراء وبعد مدة تخرج منها الحشرة اليافعه أى الفراشة ويكون التعذير داخل أنفاق النبات العائل.

وتتقضى الحشرة بياتها الشتوى فى صورة يرقة تامة النمو داخل أعواد الذرة وفى سوق النباتات العائلة الأخرى والحشائش، وفى الربيع تتحول اليرقات إلى عذارى، ولحفار ساق الذرة الأوروبى من جيل إلى ثلاثة أجيال فى السنة حسب المنطقة التى يوجد فيها، وفى مصر يبلغ عدد أجيال الحشرة من ٥ - ٦ أجيال فى السنة.

### طرق المكافحة

من أفضل طرق المكافحة حرق أحطاب الذرة وعروش النباتات العوائل الأخرى فى الشتاء وقبل حلول فصل الربيع وكما ذكرنا فإن هذه الآفة تقضى الشتاء فى صورة يرقات داخل هذه الأحطاب.

### المكافحة الكيماوية

نفس المعاملة التى تعامل بها دودة درنات البطاطس والعلاج مشترك للآفتين.

## ٧ - الديدان نصف القياسة

من رتبة خرسفوية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الغراشات الليلية F. Noctuidae

ويوجد من هذه الديدان القياسة اثنتان تصيبان محصول البطاطس وهما:

دودة الطماطم نصف القياسة *Chrysodeixis chalcites* (Esper)

ودودة محاصيل الخضر نصف القياسة *Trichoplusia ni* (H)

وتصيب هاتان الآفاتان محاصيل خضر الفصيلة الباذنجانية أهم عوائلها الطماطم والبطاطس والخبيزة والقطن والقرنبيط ويكثر وجود الأولى فى الفترة من أكتوبر حتى مايو أما الثانية فتوجد طول العام ونورد وصفا للحشرتين.



## ١ - فراشة دودة الطماطم نصف القياس

لونها بنى مصفر ويتميز الجناح الأمامى بوجود نقطتين ذهبتين فى وسطه، والجناح الخلفى لونه أبيض مع وجود بقعه غامقة عند حافته الخارجية، ويصل طولها إلى ٦,٥ سم وعرضها ٤ سم بعد فرد الجناحين، وقرن الاستشعار خيطى فى كلا الجنسين.

## دورة حياة دودة الطماطم نصف القياس

تخرج الفراشات فى الربيع وأوائل الصيف، وتضع الأنثى الملقحة بيضها بعد خروجها من طور العذراء بنحو ١ - ٧ أيام ويستمر وضع البيض لمدة ٢ - ١١ يوما أخرى تضع فيها الفراشة الأنثى نحو ٢٧٠ - ٦٢٠ بيضة ثم تنقطع عن وضع البيض لمدة ٦ - ٧ أيام وذلك حسب درجة الحرارة والرطوبة الجوية ثم تموت، ولذلك يكون طول مدة طور الحشرة اليافعة ٥ - ٢٣ يوما.

ويوضع البيض فرديا على سطحى الورقة، ويوضع على الورقة الواحدة نحو ٤ بيضات، والبيضة لونها أبيض أو أصفر عند وضعها ثم يغمق لونها بعد الفقس وهى دائرية الشكل ويحمل سطحها الخارجى تقارير شبكية، بفقس البيض بعد ٣ - ٧ أيام حسب درجة الحرارة والرطوبة والمليحة ٦ أعمار، وتتغذى اليرقة الحديثة الفقس على أنسجة البشرة الخارجية للأوراق ثم تبدأ يرقات العمر الثانى والثالث فى ثنى حافتى الورقة وضمها إلى بعضها البعض، وترى خيوطا حريرية كثيرة فوق الورقة أثناء إغتنائها على الورقة المصابة، ويبلغ طول فترة الطور اليرقى كله من ١٥ - ٢٠ يوما. واليرقة التامة النضج تبلغ ٨,٠٣ سم طولاً ولونها أخضر فاتح ورأسها نولون بنى فاتح - ويوجد خطان لونها أخضر غامق على جانبيه الجسم.

تعذر اليرقات بعد تمام نموها بين الأوراق داخل شرنقة من الحرير، والعذراء لونها أخضر فى اليوم الأول ثم يغمق لونها تدريجياً وتبلغ نحو ١,٥ - ٢ سم فى الطول وتحمل فى نهاية بطها ٨ أشواك صغيرة - وللحشرة ٨ أجيال إذا ربيت فى المعمل.

## – دودة محاصيل الخضر نصف القياسة (أو الدودة نصف القياسة

ذات حرف 8): *Trichoplusia ni*(H.)

توجد هذه الحشرة طوال العام في محافظات سيناء والاسماعيلية والبحيرة والاسكندرية والقاهرة وبنى سويف وأسيوط وقنا والواحات وسيوة، كما توجد هذه الحشرة في معظم الأقطار العربية وتصيب الكرنب والفجل والذرة والبطاطس والبطاطس – كما توجد هذه الحشرة في معظم الأقطار العربية .

### وصف الحشرة

وتشابه الحشرة السابقة في الحجم، وتتميز بلونها البنى الرمادى المذهب ويوجد نقطتين تكونان معا حرف ٨ بالانجليزية (8) على الجناح الامامى.

### دورة الحياة :

لم تدرس بعد بالتفصيل دورة حياة هذه الحشرة بمصر. هذا وتقضى الحشرة بياتها الشتوى على هيئة عذاراء مخضرة أو بنية اللون طولها حوالى ١,٥ سم ومحاطة بشرنقة رقيقة من خيوط الحرير وبقايا أوراق النبات العائل وموجودة على أوراق النبات. وفى الربيع التالى تخرج الفراشات ويحدث التزاوج وتضع الأنثى الواحدة الملقحة نحو ٢٧٥ – ٣٥٠ بيضة، ويوضع البيض فرديا على السطح العلوى أو السفلى للأوراق. والبيضة مستديرة، ولونها أصفر فاتح عند إبتداء وضعها يصبح لونها قرمزيا خفيفا قرب الفقس، وعلى سطح القشرة من الخارج تضاريز شبكية الشكل كما فى الحشرة السابقة.

واليرقات خضراء اللون ورأسها لونه أخضر أيضا أو بنى مخضر، تبلغ اليرقة التامة النمو نحو ٣سم فى الطول، وعليها خمسة خطوط طولية بيضاء ولون مركز الثغر التنفسى أصفر فاتح (كريمى) بينما حافته لونها بنى. وتبلغ مدة الطور اليرقى نحو ٢ – ٤ أسابيع.

والعذاراء المكبلية تبلغ نحو ١,٥ – ٢سم فى الطول وتحمل فى نهاية بطنها ٨ خطاطيف كما

في عذارى الحشرتين السابقتين. وتبلغ مدة طور العذراء نحو أسبوعين صيفا أو أكثر من ذلك كلما انخفضت درجات الحرارة.

ولهذه الحشرة ٢ - ٤ أجيال أو أكثر في السنة. وتظهر فراشات هذه الحشرة في جميع أشهر السنة بأعداد قليلة، ولا تظهر مطلقا في شهرى يناير وفبراير وتظهر بأعداد كبيرة في خلال شهر سبتمبر.

**المكافحة الكيميائية للديدان نصف القياسة:**

سبق ذكر طرق مكافحة هذه الآفات مكافحة مشتركة مع دودة ورق القطن.

## ٨ - الذباب الأبيض Whiteflies

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الذباب الأبيض Fam. Aleyrodidae

الذباب الأبيض حشرات صغيرة لا يزيد طولها عن ٢ - ٣ مم في الغالب، والحشرات اليافعة نشطة وهى بيضاء اللون تتغذى بامتصاص عصارة أوراق النبات وكلا الذكر والأنثى مجنحان، والأجنحة الخلفية فى طول الأجنحة الأمامية تقريبا. والأجنحة جميعا معطاه بغبار أبيض شمعى ولا يوجد بالجنح الأمامى العرق M ، والوسادة الموجودة فى نهاية رسغ كل من الأرجل الصدرية شكلها مدبب رفيع كالنصل، والتطور يختلف عن تطور معظم حشرات رتبة متشابهة الأجنحة الأخرى، فالحورية فى عمرها الأول تكون نشطة ولكن فى أعمارها التالية تكون ساكنة تشبه الحشرات القشرية فى مظهرها وتكون مغطاء بإفراز شمعى له مظهر خاص مميز تفرزه الحورية نفسها، ويطلق على الحورية فى أعمارها الأولى يرقة أما فى عمرها الأخير فتسمى عذراء.

هذا ويصيب البطاطس من أنواع هذه الحشرات ما يلى:

## ١ - ذبابة القطن البيضاء (*Bemisia tabaci* (Gennandiu))

سبق شرح كل ما يتعلق بهذه الآفة في الجزء الأول من هذا الكتاب وتنتشر هذه الحشرة في مصر وكافة الأقطار العربية ذات الجو الدافئ والرطوبة العالية ودول حوض البحر المتوسط، وتصيب هذه الآفة ما يزيد عن ١٢٦ عائلاً نباتياً تابعه لسبعة وعشرين فصيلة نباتية، وتصيب كافة محاصيل الخضر ومنها البطاطس.

هذا وقد اشتد ضرر هذه الحشرة في السنين الأخيرة في مصر والولايات المتحدة وعدد كبير من الأقطار، وأصبحت من الآفات المدمرة لنبات القطن والطماطم والبطاطس وغيرها، وتجري الأبحاث في كل مكان لإيجاد وسيلة للسيطرة عليها والحد من أضرارها، وتبلغ ذروة إصابة نباتات البطاطس بها في مصر في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.

### وصف الحشرة اليافعة

صغيرة الحجم، طول الأنثى من ٩٨ - ١,٢٠ مم والذكر ٧٥ - ١ مم والحشرة الحديثة الخروج من طور العذراء يكون لونها أصفر باهتا وجسمها ليناً رهيفاً، وبعد فترة وجيزة تغطي الأجنحة والجسم بإفراز شمعي يكسبها اللون الأبيض، والرأس مثلث الشكل، قرن الإستشعار خيطي طويل نسبياً يتكون من ٧ عقل، والعين المركبة مقسمة إلى قسمين يختلفان في شكل وحجم العدسات وتوجد عين بسيطة بجوار كل من العينين المركبتين، أجزاء الفم في الحشرة اليافعة ثاقب ماص ولها زوجان من الأجنحة يفوقان البطن طولاً ويغطيها مسحوق شمعي أبيض، الأرجل طويلة ورفيعة والرجلان الأماميتان أقصر من الخلفيتين. وللأنثى آلة وضع بيض تتركب من زوجين من الصفائح المدببة - أما آلة السفاد في الذكر فتتكون من قضيب وقابضين.

### مظهر الإصابة والضرر

الذبابة الأبيض حشرات سريعة التكاثر، تتزايد أعدادها بسرعة على نباتات البطاطس في خلال موسم نموها، وتوجد الحشرات عادة على السطح السفلي للأوراق وتمتص منها العصارة النباتية، فتتكون على الأوراق بقع صفراء نتيجة لإغذاء الحشرة، وتكون هذه البقع متفرقة أولاً ثم تتصل ببعضها مكونة مساحات غير منتظمة صفراء اللون، ويعزى نقص

الكورفل في تلك المساحات إلى التأثير السام للآفة الحشرة الذي تفرزه في ثقب التغذية وينشأ عنه قلة أو إنعدام وجود النشا، تخرج الحشرات إفرازا عسليا ينمو عليه الفطر فيزيد الضرر على النباتات وتنقل الذبابة البيضاء مرض فيروسى خطير هو مرض التفاف الأوراق، ومرض آخر هو تجعد الأوراق وتنتشر هذه الأمراض بسرعة بين نباتات البطاطس، وتذبل النباتات المصابة بشدة خصوصا خلال الجو الحار.

### ب - ذبابة الـإيرس البيضاء *Aleyrodes spiracoides* Quaintance

تصيب هذه الحشرة البطاطس بشدة خصوصا في بعض الأقطار العربية خصوصا في المناطق الجبلية. ونورد هنا وصفا لهذه الحشرة.

#### الحشرة اليافعة:

يبلغ طول الحشرة اليافعة نحو  $\frac{1}{18}$  من البوصة وشكلها العام مثلثي تقريبا (شكل ١٤)، وتغطي الرأس والأجنحة بقشور شمعية دقيقة جدا لونها أبيض فيما عدا زوج من البقع الرمادية الباهتة فوق كل جناح، والسطح السفلى للجسم رمادى، وفي أثناء وضع الأنثى للبيض تنذبذب أجنحتها في اتجاه الورقة فتفصل كمية من القشور الشمعية البيضاء عن جسم الأنثى وتغطي مجموعات البيض، وتوجد هذه الحشرة طوال العام وتستطيع أن تتحمل درجات من البرودة، لذلك تنتشر في الحقول المنزرعة في الهضاب والمناطق المرتفعة.

#### دورة الحياة والطباع

تضع الأنثى البيض على الأسطح السفلى للأوراق وطول البيضة  $\frac{1}{16}$  من البوصة تقريبا، وهى بيضاوية الشكل ومحمولة على حامل قصير، ويوضع البيض في مجموعات صغيرة من ١ - ٣ بيضة والبعض يكون لونه أبيض عند الوضع، ولكنه يصبح رماديا قبيل الفقس، وفترة حضانها للبيض من ١ - ٣ أسابيع، ويمكن أن يوضع على الورقة الواحدة من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ بيضة كما يظهر في نهاية فصل الصيف، ويفقس البيض وتخرج منه يرقات رفيعة مفلطحة شفافة، وبعد قليل تصبح اليرقة بيضاوية الشكل بيضاء اللون (شكل ١٥)، تزحف اليرقات الحديثة الفقس لمسافة قصيرة ثم تثبت في مكانها وتغطي نفسها تماما بطبقة من الشمع وتبقى

ساكنة هكذا طول طورها اليرقي والعذري، ويستغرق الطور اليرقي من ١٠ - ١٥ يوما، والعذراء تشبه اليرقة فيما عدا بقعتان عينيتان حمراوان تظهران في نهاية العمر العذري، والفتره ما بين البيضة إلى الحشرة اليافعة تستغرق من ٣٢ - ٦٠ يوما.



(شكل ١٤) ذبابة الإيرس البيضاء اليافعة

## طرق المكافحة

### المكافحة الزراعية:


يكافح الذباب الأبيض زراعيا بنطاقه الأرض من الحشائش والإعتناء بعمليات الحرث والعزيق.

### المكافحة الحيوية

تتعرض حشرات الذباب الأبيض إلى تطفل عدد من الطفيليات غشائية الأجنحة منها:

*Encarsia* sp., *Ereimocrus diversililiatus* Silvi, *Prospalella* sp.

كما تفترس يرقات حشرات أسد المن بيض ويرقات الذباب الأبيض.



(شكل ١٥) يرقة ذباب الإريس الأبيض.

#### المكافحة الكيميائية:

سبق ذكر المكافحة الكيميائية كعلاج مشترك للمن والذباب الأبيض وبطاطات الأوراق، ويمكن تلخيصها فيما يلي: ترش حقول البطاطس المصابة بأحد هذه الآفات أو بها جميعا بأحد المبيدات الآتية:

بريمور ٥٠٪ (مسحوق قابل للبلل بمعدل ٢٥٠ جم للفدان).

أو أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان.

أو ملايين ٥٧٪ بمعدل ١ لتر للفدان.

أو توكوثيون ٥٠٪ بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان.

يضاف إلى أى منهم من ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء.

## ٩ - نطاطات أو قافزات الأوراق

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة نطاطات أو قافزات الأوراق Fam, Cicadellidae (jassidae)

توجد نطاطات (أو قافزات) الأوراق على معظم النباتات بما في ذلك أشجار الزينة والفاكهة والغابات والشجيرات والأعشاب والأزهار والكثير من المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر. وتتغذى بامتصاص عصارة أوراق عائلها النباتي، وهناك تخصص غذائي لمعظم الأنواع، وعلى ذلك فإن بيئة كل منها محدودة تماما. وينقل الكثير الأمراض الفيروسية.

ولمعظم نطاطات الأوراق جيل واحد في السنة، ولكن للقليل منها ٢ - ٣ أجيال، وتقضى الشتاء على صورة حشرة يافعة (مختفية في مخابىء بالحقول المصابة) أو حوريات أو بيض (داخل سيقان العائل) حسب النوع. والبيض رفيع متطاوول ويوضع في صفوف طويلة في سيقان النباتات أو الأوراق أو البراعم. والحوريات تنسلخ بعد خروجها من البيضة ٥ - ٦ مرات لتصل إلى الطور اليافع.

وتكون الإصابة بنطاطات الأوراق في جمهورية مصر العربية عموما طوال العام، ولكن تكثر الإصابة في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر وأهم مظهر من مظاهر وأعراض الإصابة هو تبقع الأوراق حيث تبدأ الإصابة بنقط صفراء على سطوح أوراق النباتات خصوصا عند الحواف وتمتد إلى الداخل ثم تصير هذه البقع بنية اللون على سطح الورقة كلها. وعند اشتداد الإصابة تتجدد الأوراق وتجف وتتساقط.



ويوجد في جمهورية مصر العربية نحو ٣١ نوعاً من نطاطات الأوراق أهمها نطاط أوراق القرعيات ونطاط أوراق الباذنجان ونطاط أوراق اللوبيا ونطاط الخروع ونطاط أوراق البطاطس.

وتوجد معظم هذه الأنواع في البلاد العربية الأخرى ونشرح منها ما يلي:

## ١ - نطاط أوراق البطاطس

الاسم العلمي للحشرة *Empoasca faba* (Harris)

### وصف الحشرة اليافعة:

هذه الحشرة صغيرة الحجم لها شكل وتدي ضيق (شكل ١٦) ويغتنى هذا النطاط بامتصاص العصارة النباتية من السطح السفلي لأوراق البطاطس، وعندما تهز النباتات تقفز هذه الحشرات أو تطير بعيداً عن النبات ويبلغ طول الحشرة اليافعة  $\frac{1}{8}$  من البوصة ولونها أخضر أو أخضر مصفر، وعلى الجسم بقع بنية اللون.



(شكل ١٦) نطاط أوراق البطاطس بالحشرة اليافعة.

## مظهر الإصابة والضرر

عندما تزداد اعداد نطاطات أوراق البطاطس فإنها تمتص مقادير كبيرة من العصارة النباتية للأوراق وبذلك تزيل الكلوروفل من الأوراق تاركه اياها تبدو وكأنها مبرقشة ببقع كبيرة، وحتى ولو كانت أعداد هذه الحشرات قليلة، فإنها قادرة على نقل أمراضا فيروسية أو شبه فيروسية الى النبات، مثل أمراض التفاف الأوراق (شكل ١٧)



(شكل ١٧) التفاف أوراق بطاطس بسبب إصابتها بنطاط أوراق البطاطس

## ب - نطاط أوراق القرعيات

الاسم العلمي للحشرة: *Empoasca discipiens paoli*

### وصف الحشرة:

حشرة رهيقة صغيرة الحجم، يبلغ طولها ٣ مم ولونها أخضر، ترتفع نهاية الجسم قليلا إلى أعلى، الأرجل الخلفية طويلة لتساعد الحشرة على القفز.

## دورة الحياه

تظهر الحشرات اليافعة على عوائلها في أوائل الربيع، وتضع الأنثى البيض داخل أنسجة العرق الوسطى أو داخل عنق الورقة من الجهة السفلية. وتضع الأنثى من ٢ - ٣ بياضات يوميا، يفقس البيض من ١٠ أيام والبيضة صغيرة يبلغ طولها ٢ مم وهي بيضاء مستطيلة، ولون الحوريات يكون باهتا عند خروجها من البيض. ولذلك يصعب رؤيتها على النباتات في هذا العمر المبكر، ثم يأخذ لونها في الإخضرار تدريجا، تتحرك الحوريات جانبيا على حواف الاوراق عند إمتزاجها، وتتسلخ الحورية ٤ مرات خلال أسبوعين تصل بعدها إلى الطور اليافع، ولهذه الحشرة من ٨ - ١٠ أجيال في السنة.

## مظهر الإصابة والضرر:

تصيب هذه الحشرة الكثير من محاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية، وتنتشر في زراعات الطماطم والبطاطس والباذنجان وتصيب القرعيات مثل الفاصوليا خصوصا ما يزرع منها في العروة الصيفية المتأخرة وتصيب القرعيات مثل الخيار والبطيخ والشمام والقرع كما تصيب البنجر والكرنب والقطن والارز والبصل والبرسيم، وتنقل هذه الحشرة بعض الأمراض الفيروسية التي تسبب تدهور تقاوى البطاطس في مصر، مما يؤدي إلى إستيراد تقاوى العروة الصيفية من الخارج.

## جـ- نطاط الأوراق ذو الست نقط

الاسم العلمي للحش *Fascifrons fascifrons* (Stal)

## وصف الحشرة

حشرة صغيرة الحجم لونها أصفر أو أصفر مخضر وتتميز بوجود ٦ فقط سوداء صغيرة الحجم جدا فوق الرأس، وينتشر هذا النطاط في معظم الأقطار العربية،

وبالرغم من أن الوفرة العددية لها النوع من النطاطات هي أقل من غيره من الأنواع المعروفة إلا أنه أشدها نقلا لبعض الأمراض الفيروسية الخطيرة على البطاطس وأهمها مرض

الإصفرار النجمي، ومرض تورد القمة الذبولي، ويصيب الإصفرار النجمي أكثر من ١٧٥ نوعاً من العوائل النباتية، ونباتات البطاطس التي تؤخذ تقاويها من الدرنات المصابة بمرض الإصفرار النجمي، تعطى نباتات ضعيفة مصابة تكون مصدر لإنتشار العدوى بواسطة هذا النشاط في جميع زراعات البطاطس المجاورة محدثاً دماراً شديداً بالمجموع الخضري لها (شكل ١٨).



(شكل ١٨) تجعد وريقات نباتات البطاطس التي نشأت من إغذاء نطاطات الأوراق فقط عليها

المكافحة الكيماوية:

سبق ذكرها في مكافحة الذبابة البيضاء والمن مكافحة مشتركة باستخدام مبيد اكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان.

## ١٠ - الذباب صانع الأنفاق

رتبة زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة الذباب صانع الأنفاق Fam. Agromyzidae

وتحتوي هذه الفصيلة على أنواع من الذباب الصغير الحجم أسود اللون تضع الإناث بيضها على أوراق النباتات الصغيرة وأجزاء الغضة وتحفر اليرقات أنفاقاً ضيقة ملتوية بين

البشريتين العليا والسفلى للورقة، ويتسع النفق كلما نمت اليرقة، وتعذر اليرقات إما في نهاية النفق أو تخرج منه وتعذر في التربة.

واليرقة إسطوانية الشكل طرفها الأمامى مدبب ويحمل في نهايته أجزاء الفم الصلبة ذات اللون الداكن، ولأجزاء الفم هذه المقدرة على البروز والإنكماش أثناء قيامها بالحفر في أنسجة النبات - والطرف الخلفى لليرقة عريض، ويوجد على السطح البطنى للعقلة الأخيرة عضو بارز كالمص، وتوجد فتحتان تنفيسيتان خلفيتان على طرف أنبوتين ملتحمتين وقد تضحلان أحيانا. والعذراء مغزلية الشكل وعقل جسمها واضحة.

ويمكن مشاهدة اليرقة أثناء عملها في حفر النفق إذا وضعت ورقة مصابة في مواجهة الشمس، ويتسع النفق تدريجيا كلما يعد مكان الفقس نتيجة لنمو اليرقة وازدياد حجمها تدريجيا والنفق قد يكون ضيقا ملتويا أو يتحول إلى رقعة متسعة bloch mine ويصيب البطاطس من هذه الفصيلة نوعان يطلق عليهما *Liriomyza spp.*

وتحفر يرقاتها وتغذى على الأنسجة اللينة الموجودة بين بشرتى الورقة العلوية والسفلية، ويمكن أن يوجد على ورقة واحدة بين يرقات البطاطس نحو ٥٠ نفقا لونها رمادى دقيقة أو ضيقة أو قد توجد على الورقة بضع أنفاق عريضة من نوع الرقع المتسعة. وتؤدي الإصابة الى ضعف الوريقة وتكون مدخلا للعديد من مسببات أمراض العفن.

والحشرة اليافعة التى تهاجم البطاطس إما أن تكون سوداء اللون لامعة أو سوداء ذات علامات صفراء على الأرجل وعلى كل من جوانب البطن، وتغذى الحشرات اليافعة على العصارة النباتية التى تسيل من جروح اليرقات والمتسببة عن حفر يرقاتها، وفى أثناء وضع الإناث للبيض تغذى على العصارة التى تسيل من الجروح التى تحدثها آلة وضع البيض فى الأنسجة.

## دورة الحياة والعادات

يفقس البيض الصغير الأبيض اللون فى خلال ٣ - ٨ أيام، تقوم اليرقات الصفراء اللون بعد خروجها من البيض بالتجول قليلا على الورقة ثم تشرع فى حفر النفق باستخدام أجزاء فمها الصلبة ويستغرق ذلك من ٣ - ١٢ يوما، ويبلغ طول اليرقة التامة النمو  $\frac{1}{8}$  بوصة.

وإذا كان الجو جاف، تعذر اليرقات داخل الأنفاق والعذراء صغيرة الحجم بنية اللون، ولكن عادة ما تترك اليرقة النفق وتعذر فى التربة، ويبلغ طول فترة الطور العذرى من ٨ - ٢٨ يوما،

ومتوسط طول فترة الجيل الواحد نحو ٢٣ يوما، وهذه الحشرات قد تقضى فصل الشتاء على صورة عذارى، وقد يستمر تواجدها دون بيات شتوى فى الأجواء الدافئة. ولهذه الحشرات من ٢ - ٦ أجيال فى السنة.

### المكافحة:

#### أولا المكافحة الزراعية:

- ١ - خدمة الأرض جيدا والعزيق والتسميد الجيد بال أسمدة الكيماوية لتقوية النباتات مع الإعتناء بتنقية الأرض من الحشائش.
- ٢ - تقطيع النباتات المصابة وحرقها، والتخلص من عروش النباتات بعد جمع المحصول إما بتغذية الحيوانات عليها أو حرقها بما فيها من يرقات وعذارى.

#### المكافحة الكيماوية:

تعتبر مكافحة هذه الحشرات وقائية أى تجرى قبل ظهور الإصابة، ويجب اجراؤها بعد ظهور النباتات فوق سطح الأرض مباشرة لأن العلاج لا يجرى بعد حدوث الإصابة إلا فى إيقاف الإصابة الجديدة وتكافح هذه الحشرات كيماويا برش النباتات بالدائى مثويت ٤٠٪ بنسبة ١٥، ٠٪ وتجرى الرش الأولى بمجرد الإثبات، ويعاد الرش ثلاث مرات بين الرش والآخرى ١٢ - ١٥ يوما مع إيقاف الرش بعد تكون الدرنات حتى لا تلوث الدرنات بنى أثر من آثار المبيد.

## ١١ - التربس

رتبة هدية الأجنحة Order Thysanoptera

فصيلة Thripidae

توجد بضعة أنواع من التربس تصيب المجموع الخضرى للبطاطس، والتربس حشرات دقيقة ذات أجسام رفيعة يبلغ طول الفرد ٥، ٢ - ٥ مم (ولو أنه فى المناطق الحارة تبلغ بعض الأنواع نحو ١٢ مم فى الطول). يستطيل الرأس من الامام على هيئة بوز، أجزاء الفم هارسة

ماصة غير متماثلة الجانبين وتقع في مؤخرة الرأس من الجهة البطنية، وتكون الشفة العليا الجزء الامامي من البوز وتوجد ثلاثة أشواك (رماح) هي الفك العلوى اليسر (الفك العلوى الأيمن أثري) واللاسني في كل من الفكين السفليين، والملامس الفكى والشفوية موجودة ولكنها قصيرة، قرن الاستشعار قصير ومكون من ٦ - ١٠ عقل، والصدر كبير وحر الحركة، والأجنحة قد تكون موجودة أو غير موجودة، وعندما تكون هذه الأجنحة مكتملة النمو يكون عددها أربعة طويلة ورفيعة وبها قليل من العروق أو ليس بها عروق وعلى حوافها شعر طويل، الرسغ مكون من ١ - ٢ عقلة وينتهى بكيس يمكن الانكماش والانفداد، آلة البيض موجودة في بعض الأنواع وغير موجودة في البعض الآخر حيث يكون طرف البطن الخلفى عندئذ أنبوبيا، القرون الشرجية غير موجودة.

التطور في التريس وسط بين البسيط والكامل، ففي تحت رتبة Terebrantia نجد أن العمر الأول عديم الأجنحة ويوجد داخل أنسجة النبات ولا يتغذى ويسمى Pronymph، والعمران الثانى والثالث ليس لهما أجنحة أيضا ويسميان باليرقات Larvae، ثم العمر الرابع وهو طور ساكن لا يتغذى وله أجنحة خارجية ويطلق عليه طور العذراء (الذى يوجد داخل شرنقة في بعض الأنواع) أما في تحت رتبة Tubulifera فيكون نهاية عمر الحورية الثالث وكل عمرها الرابع (وله أجنحة خارجية) ما يسمى بطور ما قبل العذراء الساكن والذى يتغذى، ثم يكون عمر الحورية الخامس ما يسمى بطور العذراء، وهو مجنح وساكن ولا يتغذى. وفي كلا الرتبين المذكورتين يلي طور العذراء طور الحشرة البالغة.

ويتشابه الجنس في التريس ولكن الذكور دائما تكون أصغر من الإناث ويوجد التكاثر البكرى في كثير من الأنواع حيث تكون الذكور غير موجودة أو قليلة. وأنواع التريس التى بها آلة وضع تفرس بيضها عادة في أنسجة النبات، أما أنواع التريس التى لا توجد بها آلة وضع بيض أنها تضع البيض في الشقوق وتحت القلف.

## الضرر:


ويهاجم التريس كثيرا من المزروعات من محاصيل حقلية وخضر وفاكهة ونباتات زينة. كما يهاجم أيضا الحشائش وغيرها، ويصيب الفروع الصغيرة والبراعم والأوراق والأزهار والثمار وتقضى على خلايا النباتات المصابة نتيجة لتغذيته عليها. ويتميز إصابة التريس بوجود بقع

فضية على الأجزاء المصابة نظرا لوجود تلك الخلايا بها فتتملىء بالهراء فيسبب إنعكاس الضوء عليها ظهور اللون الفضى وتتغذى أنواع قليلة من التربس بجراثيم الفطر، وقليل منها أيضا يفترس غيره من الحيوانات الصغيرة من قبيلة مفصليات الأرجل، وقليل من الأنواع يحدث وخزا في الأماكن المعرضة من جسم الإنسان، وتنقل بعض أنواع التربس الأمراض النباتية.

### ومن أنواع التربس التى تصيب البطاطس:

أ - تربس القطن: *Thrips tabaci* Lindeman (شكل ٢٠)

ب - تربس التبغ: *T. frankliniella*



(شكل ٢٠) حشرة تربس القطن البالغة

### مكافحة التربس

لم يدخل التربس برنامج مكافحة الكيماوية لآفات البطاطس حتى الآن، ولكن المكافحة التى تجرى لآفات أخرى على البطاطس تفيد فى مكافحته.



## ١٢- الديدان السلكية Wireworms

رتبة غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة خنافس فرقع لوز Fam. Elateridae


تعد هذه الآفات من الآفات الخطيرة على محصول البطاطس في مصر وكافة الأقطار العربية، وهي تصيب كثيرا من المحاصيل الأخرى خصوصا الدرنية منها فضلا عن نباتات الزينة، وقد جاء الاسم الذي تعرف به « الديدان السلكية (Wireworms) » من شكل يرقاتها الاسطوانية الرفيعة المفلطحة شيئا ما والتي تشبه السلك في مظهرها، وتضم فصيلة فرقع لوز عددا كبيرا من الأنواع التي أخذ اسمها من طبيعة هذه الخنافس التي إذا قلبت الواحدة منها على ظهرها وقبض على بطنها برفق فإنها تحدث صوتا يشبه الفرقعة ولذلك أطلق عليها هذا الاسم باللغة العربية ويقابله بالانجليزية Skipjacks أو Click beetles ، وخنافس هذه الفصيلة بنية اللون أو رمادية أو سوداء وشكلها مطاول نوعا ومدبب من كلا الطرفين، وتميز بقرون الاستشعار الخيطية أو المنشاوية أو المشطية، ويوجد على إسترته الحلقة الصدرية الأولى فتوء مدبب الطرف يتجه للخلف ليدخل في تجويف موجود على إسترته الحلقة الصدرية التالية، وتساعد حركة دخول الفتوء في التجويف على أن تأخذ الحشرة وضعها الطبيعي بحيث يكون الظهر متجها إلى أسفل، وأثناء هذه الحركة يصطدم الصدر الأمامي بالغمذين فيحدث صوتا يشبه الفرقعة.

وكما ذكرنا فإن الكثير من أنواع فرقع لوز ضار بمحصول البطاطس، ومعظم الضرر ينشأ عن اليرقات السلكية التي توجد في التربة وتتغذى على الدرنات النامية، كذلك يمكنها الإغذاء على تقاوى البطاطس في التربة وعلى سوق النباتات النامية مما يحدث بها دمارا شديدا، ويوجد في العالم العربي أكثر من ٢٠ نوعا من هذه الخنافس - نذكر هنا أكثرها إنتشارا:

أ - فرقع لوز البنس *Agrypnus notodonta*

وصف الحشرة اليافعة

(شكل ٢١) تبلغ نحو ٢,٥ سم في الطول ولونها بني مائل للسواد وقرن الإستشعار منشاري.



(شكل ٢١) فرقع لوز

### دورة الحياة:

تقضى هذه الحشرة بياتها الشتوى على هيئة يرقات أو حشرات يافعة فى التربة. وفى الربيع تنشط الحشرات اليافعة وتتزاوج وتحفر الإناث الملقحة فى التربة وتضع بيضها حول جذور النباتات. ويفقس البيض بعد بضعة أيام إلى بضعة أسابيع والبيضة بيضاوية الشكل ولونها لؤلؤى.

ويبقى الطور اليرقى بالتربة بعد فقسه نحو ٢ - ٦ سنوات ليكتمل نموه. وتتحرك اليرقة ببطء للتغذية على جذور النباتات السابق ذكرها، ولا تزيد المسافة التى تنتقل فيها اليرقة بالتربة طول حياتها أكثر من بضعة أمتار قليلة وتبلغ اليرقة التامة النمو نحو ٢ سم فى الطول ولونها أبيض عند خروجها من البيضة ثم تصبح صفراء غامقة وعلى نهاية بطنها شوكتان واضحتان.

تعذر اليرقات التامة النمو بالتربة عند نهاية فصل الصيف أو أوائل الخريف عادة ويستغرق طور العذراء، عدة أسابيع والعذراء حرة بيضاء اللون رهيبة وتوجد داخل شرنقة من الحرير المغطى بالطين، ويغمق لون العذراء قبل التحول إلى حشرة يافعة.

وعند خروج الحشرات اليافعة من العذارى تبقى في أماكنها بالتربة حتى الربيع التالي، وتعيش الحشرات الكاملة من ١٠ - ١٢ شهرا.

## المكافحة:

### أولا: المكافحة الزراعية:

- ١ - العزق العميق لتنقية الحاشئ في أوائل الصيف.
- ٢ - الحرث العميق في أوائل أغسطس وترك التربة معرضة لأشعة الشمس بدون تسويتها لقتل عدد كبير من اليرقات والعذارى.
- ٣ - إتباع دورة زراعية لتلافى تعاقب زراعة النباتات المفضلة لهذه الحشرات مثل المحاصيل النجيلية والبرسيم والمحاصيل الدرنية.
- ٤ - الصرف الجيد إذ تفضل هذه الحشرات الأراضي الضعيفة الرديئة الصرف.
- ٥ - غمر التربة بالماء لارتفاع عدة بوصات لمدة أسبوع لقتل جميع أطوار الحشرة، وتجري هذه العملية فقط عندما يكون الجو حارا وحرارة التربة تبلغ ٦°م على عمق ١٥ سم تقريبا.

### ثانيا: المكافحة الكيماوية:

تكافح هذه الحشرة بأحد المعاملات الآتية:

- ١ - رش أو تعفير الهيتا كلور (١,٥ كجم للفدان من المادة الفعالة) وذلك قبل الزراعة وتقليب هذه المواد جيدا بالتربة عند الحرث.
- ٢ - تدخين التربة بحقنها بآلة خاصة لعمق ٢٠ - ٣٠ سم بسائل مادة ثاني برومور الايثيلين

بمعدل ١٠ - ١٥ لترا للفدان بعد تخفيفه ببتروال النفثا Naphtha إلى تركيز ٤٠ - ٨٥٪ (التركيزات الخفيفة للأراضي الرملية) ثم حرث الأرض بعد الحقن وتسويتها وتجهيزها للزراعة كالمعتاد ويكون حقن سائل برومور الإثيلين قرب أماكن النباتات المراد زراعتها بقدر الامكان، كما يجب عدم الزراعة قبل مضي ٣ أسابيع من معاملة التربة بالمبيد المذكور، كما يجب أيضا ألا تكون الأرض رطبة عند معاملتها ولا تقل درجة حرارتها عن ١٨ م على عمق ١٥ سم . كما يمكن حرث الأرض أولا ثم صب سائل التدخين خلف الحراث في المساحات الصغيرة وبالات خاصة تجرها الجرارات في المساحات الكبيرة ثم تغطية سائل التدخين بعد الحرث مباشرة . وفي المشاتل مثلا أو ما شابهها يمكن صب نصف معلقة شاي من سائل التدخين هذا (بتركيز ١٠٪ في حفر يبلغ عمقها نحو ٢٠ سم، وبين الحفرة والأخرى مسافة ٣٠ سم ثم تغطي الحفرة مباشرة .

٣ - معاملة التقاوى المراد زراعتها بمبيد سيفيدول ٨٪ أو ديازنيون ٥٪ مع إضافة مبيد فطري مثل الثيورام Thiuram أو الكابتان Capitan أو الكلورانييل Chloranil أو الدايكلون Dich-lone إلى التقاوى أيضا .

٤ - وضع مسحوق مبيد سيفيدول ٨٪ بمعدل ٤٠ كجم للفدان أو ديازنيون ٥٪ بمعدل ٢٥ كجم للفدان أو ديازنيون ١٠٪ بمعدل ٢٠ كجم للفدان على عمق ٨ - ١٠ سم أثناء الزراعة مع التقاوى (وهو العمق الذي تزرع عليه الدرنات) .

هذا ومن الأنواع الأخرى من هذه الحشرة الموجودة في البلاد العربية ما يلي :

**ب - فرقع لوز بنجر السكر** *Limoni californicus* (Mannerheim)

**ج - فرقع لوز التبغ** *Conoderus vespertinus* (Fabricius)

**د - فرقع لوز القمح** *Agriotes mancus* (Say)

علما بأن يرقات هذا النوع تتغذى على بنور تقاوى القمح في التربة حيث تاكل الجنين وتترك الحبوب فارغة .

**هـ - فرقع لوز الرمل** *Horistonotus whlerii*

وينتشر هذا النوع الأرضي الخفيفة والرملية والصحارى المنزرعة .

و - فرقع لوز البرارى أو المروج *Ctenicera aeripennis destructor* (Brown)

وتتغذى يرقاته على الحبوب الموجودة فى التربة والتقاوى وتزل بالمحاصل المزروعة فى البرارى خسائر فادحة

ز - فرقع لوز الخليج *Conoderus amplicollis* (Gyllenhal)

## ١٣ - الجعل الأسود أو الجعل ذو الظهر الجامد

الاسم العلمى للحشرة *Penitodon bispinosus* Kust

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة الجعال Fam . Scarabeidae


تلاحظ الإصابة بخنافس الجعال فى الاراضى الصحراوية أو طرح النهر والاراضى الرملية المسمومة بالتسميد العضوى . وفى الربيع تتزاوج الحشرات وتخرج اليرقات بعد ٢ - ٣ أسابيع فى شكل يرقات مقوسة يصل طولها عند تمام النمو نحو ٥ سم وتتغذى هذه اليرقات بالتربة فى شرنقة من الطين تخرج منها الحشرات اليافعة فى صورة خنافس ذات لون اسود ابتداء من شهر أغسطس حتى أكتوبر وتدخل فى بيات شتوى إلى أن تنشط فى الربيع التالى حيث تصل إلى ذروة تعدادها وبعد التزاوج تبحث اناث الخنافس عن مكان مناسب لوضع البيض مثل المحاصيل الدرنية أو الجذرية مثل البطاطس والجزر والبطاطا وغيرها .

هذا ولا تنجذب اناث الجعل إلى وضع البيض فى المساحات الصغيرة المزروعة بالحبوب الصغيرة مثل القمح والشعير أو المساحات الكبيرة من المحاصيل البقولية عميقة الجذور مثل البرسيم المصرى أو البرسيم الحجازى أثناء ذروة تعدادات الاناث المحملة بالبيض المخصب .

### مظهر الإصابة والضرر :

تتغذى اليرقات اليافعة للجعل السود على اجزاء النبات أسفل سطح التربة مثل الجنور والسوق والدرنات المتكونة حيث يبدو بها نحت ثقب متحللة على سطح الدرنات مما يسبب

تشوه الدرنات وتقليل قيمتها التسويقية، وعند الكشف أسفل الجورة المصابة نشاهد اليرقات أسفلها . وتسبب يرقات وخنافس الجعال أضرار كبيرة قبل أن يتدارك الزراع وجود الحشرات بالحقل.



(شكل ٢٢) يرقة الجعل نو المظهر الجامد

### المكافحة :

١ - خدمة الارض جيدا مع إزالة الحشائش وزراعة محصول بقولى ثنائى الحول مثل البرسيم الحجازى .

٢ - عمل نظام لتعاقب المحاصيل إذ تزرع الارض بالقمح يتبعها برسيم ثم بطاطس .

٣ - معاملة التربة بمبيد ديانيون ٥٪ محبب بمعل ٣٥ كجم أو ديازنيون ١٠٪ محبب بمعل ٢٠ كجم عند معرفة الاصابة بالجعال ويوضع المبيد بالسرسبة فى بطن الخط ثم تغطى مباشرة بالتراب حيث يتخلل المبيد التربة ويقضى على اليرقات، وعند ظهور بؤر اصابة

بالجعال عند وجود نباتات قائمة يحفر خندق حول كل بؤرة بعمق ٣٠ سم وعرض ٣٠ سم ويسرسب داخله كمية كافية من المبيد ويردم الخندق في الحال .

ويعتبر معاملة الأرض بالمبيدات النيماطودية مثل التميك ١٠٪ أو الفيورايدان ١٠٪ محبب بمعدل

١٠ كجم للفدان علاجاً مشتركاً ضد النيماطودا والجعال والحفار وغيرها من حشرات التربة.

## ١٤- قمل النباتات القافز Potato Psyllid

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة قمل النبات القافز Fam. Psyllidae


وحشرات هذه الفصيلة دقيقة ذات قرن استشعار شوكة الشكل طويل، وبالرأس ٣ عوينات - التعريق مختزل في الأجنحة الأمامية حيث اندمجت كل من العروق R, M, Cu، الحرقفة الأمامية متضخمة طويلة، وتتشابه هذه الحشرات تشابهاً كبيراً مع حشرات السيكاذا (نطاطات الأوراق).

والحشرات اليافعة لهذه الفصيلة نشطة للغاية مستعدة للقفز والطيران إذا ما أثرت، والحوريات كسولة وتركيبها المورفولوجي أكثر وضوحاً من اليوافع وأجسامها مقلطحة مندمجة، وبذرة الحياة بسيطة، وهي ذات جيل واحد أو عدة أجيال في العالم، ولهذه الحشرات أهمية اقتصادية كبيرة بسبب نقلها للأمراض أو بسبب التأثير السام للعابها الذي تحقنه في العوائل. هذا ويوجد من أفراد هذه الفصيلة نوع شديد الخطورة على محصول البطاطس هو قمل البطاطس القافز *Paratrioza cockerelli* (Sulc).

وترجع خطورته على البطاطس إلى أنها حين إغذائها على نبات البطاطس فإنها تحقن في النبات مادة تسبب تجعد الأوراق وأصفرارها فيما يعرف بمرض (الإصفرار البزيليدي Psyllid yellows).

## وصف الحشرة اليافعة:

الحشرة اليافعة حشرة دقيقة يبلغ طولها نحو ٣ مم (شكل ٢٢)، والأجنحة راتقة وتغطي البطن، ويوجد شريط أبيض عريض يمتد في وسط الجسم الرمادي اللون، كما يوجد رسم يشبه حرف Y مقلوبا فوق السطح الظهري لحافة البطن، وأرجل الحشرة اليافعة محورة للقفز وذلك يطلق عليها قمل النباتات القافز، وهذه الحشرات ذات قرابة وثيقة بحشرات المن، ومن الصعب ملاحظة هذه الحشرات فوق نباتات البطاطس بسبب قفزها أو طيرانها عند أى حركة.



شكل ٢٢) قمل البطاطس القافز

١ - حشرة يافعة ب - بيضة ج - حوريات

## مظهر الإصابة والضرر:

كما ذكرنا تسبب هذه الحشرة مرض الاصفرار البزبليدي لنباتات البطاطس، ويحدث هذا المرض بسبب إغذاء حوريات هذه الحشرة على الأوراق، وهذا المرض يشبه مرض الإصفرار النجمي astor yellows ومرض التفاف الأوراق، والمظهر المميز الأول لمرض الاصفرار البزبليدي والذي يظهر على وريقة مصابة يبدأ بالتفاف الجزء القاعدي للورقات الطرفية المصابة إلى أعلى ثم يتحول لونها من الأخضر الطبيعي إلى الأخضر الباهت ثم الأصفر وفي بعض أنواع من البطاطس يتحول لون الجزء المصاب من الورقة إلى اللون الأحمر أو القرمزي، وعند تقدم الإصابة يمتد الالتفاف إلى الأوراق الأولية الأكبر سنا حيث تلتف الأوراق حول العرق الوسطى ثم تصفر وتموت بسرعة وتسقط، وبعد مدة من الإصابة، تبدو النباتات كسيقان عارية تماما من أوراقها ثم يتحول لونها إلى اللون البني وتموت، ويتأثر نمو درنات البطاطس في النباتات المصابة وتصغر أحجامها .



## دورة الحياة والطباع:

تضع الإناث اليافعة بيضا مقزلى الشكل لونه أصفر برتقالى على طول العرق الوسطى للورقة والعروق الجانبية وعلى كلا السطحين السفلى والعلوى للورقة) وتحمل البيضة فوق حامل قصير ( شكل ٢٣ ب) ويوضع البيض عادة على هيئة صفوف، ويوضع البيض عادة بعدد اكبر على الوريقات الطرفية الصغيرة، وتوضع الأنثى الملقحة الواحدة أكثر من ٨٠٠ بيضة فى خلال فترة وضعها للبيض والتي تستغرق ٣ أسابيع، بمتوسط ٣٠٠ - ٤٠٠ بيضة، ويقفص البيض إلى حوريات فى خلال ٣ - ٩ أيام فى الجو الدافئ، ولكن تطول هذه الفترة إذا كان الجو باردا - والحوريات مفلطحة ذات لون أخضر باهت تشبه القشور تتحرك ببطئ وتشبه إلى حد كبير حوريات الذباب الأبيض (شكل ٢٣ ج)، والحوريات ه أعمار عادة، وتفرز الحوريات كريات دقيقة مغلقة بالشمع الأبيض وتحتوى على مادة عسلىة فى داخلها، وتسقط هذه الكريات فوق الأوراق السفلية للبطاطس ويمكن رؤيتها على قمم هذه الأوراق وعلى الأرض عند قواعد النباتات، ويستغرق نمو الحوريات وتحولها إلى حشرات يافعة نحو أسبوعين فى حالة الجو الدافئ، ولهذه الحشرة نمو ١٠ أجيال فى الموسم الواحد، وعند إرتفاع درجة حرارة الجو فى شهر يونية ويولية يتناقص تعداد هذه الحشرة على البطاطس وغيرها من النباتات، وليس لهذه الحشرة بيات شتوى، ولكنها تهاجر إلى الحشائش فى فصل الشتاء ويستمر تكاثرها ويزيد تعدادها إلى درجة كبيرة فى الربيع وعندئذ تتحرك فى أسراب وتهاجم البطاطس وغيرها من النباتات، ويتوقف الضرر الذى تحدثه هذه الحشرة بنباتات البطاطس على كثافة تعدادها، وكما ذكرنا فإن إرتفاع درجات الحرارة يحد من كثافة تعدادها، ويقلل من خطورتها على البطاطس .

## طرق المكافحة

لم تدخل هذه الآفة برنامج المكافحة فى مصر رغم خطورتها، وعلى أى حال فإنه يمكن مكافحتها مكافحة مشتركة مع حشرات المن بنفس الكيماويات ونفس المقادير، وتبدأ المكافحة عندما يصبح طول بادرات البطاطس نحو ٢٠سم، وقبل المكافحة يجب أن تؤخذ عينات من هذه الحشرات بالشبكة الكانسة من أجزاء مختلفة من الحقل لتقدير مدى كثافة تعدادها وإن كانت تستحق المكافحة أم لا ويكرر أخذ هذه العينات كل أسبوع.

## ١٥- دودة بذور الذرة Seed corn maggot

الاسم العلمى للحشرة *Hylemya cilicrura* (Rondani)

رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة ماسكيدى Fam. Muscidae

تعتبر هذه الآفة من أخطر الآفات التى تصيب البطاطس والتابعة لهذه الفصيلة، والطور هو الطور اليرقى لنوع من الذباب أصغر فى حجمها من الذباب المنزلية (*Musca domestica*) (Linnaeus).

وتوجد هذه الحشرة فى كافة أقطار العالم العربى وهى تصيب فى الأساس تقاوى البطاطس وبادراتها كما تصيب الأجزاء المتعفنة من النباتات مثل الذرة، البطاطس، والفاصوليا، وتقاوى البطاطس المعدة من تجزئة الدرنات، وأحيانا وفى حالة الإصابة الشديدة تتعفن تقاوى البطاطس تماما مما يستدعى إعادة الزراعة، وتقوم الديدان أيضا بنقل البكتريا التى تسبب مرض الساق الأسود فى البطاطس.

واليرقة لونها أبيض مصفر ويبلغ طولها نحو ٦ مم عند تمام نضجها، وتحدث هذه اليرقات أقصى ما يمكنها من أضرار إذا كان الجو باردا رطبا وفى حالة التربة المسمدة بأسمدة عضوية أو التى تحتوى على نسبة عالية من المخلفات النباتية، وتدخل اليرقة جزء البطاطس المزروع كتقاوى من خلال القطع أو جرح فى أنسجة قطعة التقاوى إذا لم يلتئم هذا الجرح.

وتوجد حشرة أخرى تنتمى لنفس الفصيلة هى ودودة تقاوى البطاطس واسمها العلمى *Hylemya lorilega* (Zetterstedt).

وتشبه يرقات هذه الحشرة وحشرات اليرقات دودة بذور الذرة والأضرار التى تسببها يرقات هذه الآفة لتقاوى البطاطس تشبه تلك التى تحدثها سابقتها، وبالرغم من إنتشار دودة تقاوى البطاطس إلا أنها ليست بخطورة دودة بذور الذرة.

### دورة الحياة والطباع:

يبلغ طول الحشرة اليافعة (الذبابة) نحو ٥ مم، ولونها رمادى، والأجنحة أكثر إلتصاقا بالجسم عنها فى حالة الذبابة المنزلية، وتظهر الحشرات اليافعة لدودة بذور الذرة فى الربيع وتضع بيضها فى التربة التى تحتوى على نسبة عالية من الدبال والمواد العضوية المتحللة.

وفي المناطق المعتدلة الحرارة تتوالد الحشرة خلال فصل الشتاء وتهاجم بادرات البطاطس في الربيع الباكر، وللحشرة من ٣ - ٥ أجيال في العام.

### المكافحة:

أفضل طريق لمكافحة هذه الآفة هي زراعة تقاوى البطاطس بقطع من البطاطس التي التئمت جروحها تماما، وأفضل طريقة لإعداد مثل هذه التقاوى هي معاملة كل درنات البطاطس المعدة للتقاوى قبل تقطيعها بمادة كيميائية لها القدرة على قتل مسببات الأمراض الموجودة على سطح الدرنه ثم تجفف أجزاء هذه الدرنه تماما قبل زراعتها، لذلك يجب ترك أجزاء الدرنات المعدة للتقاوى بعد تقطيعها لمدة ١٠ أيام قبل زراعتها حتى تتمكن من إفراز غطاء فلينى يغطى مكان القطع مع إستعمال سكاكين حادة نظيفة فى تجزئة درنات التقاوى، ويجب تطهير هذه السكاكين بين فترة وأخرى بغمسها فى محلول كيميائى مطهر، كما يجب عند قطع درنات البطاطس ألا تعرض لضوء الشمس.

ويجب أن تطهر جدران وأرضية الغرفة التى يجرى فيها إعداد تقاوى البطاطس مع مراعاة ألا تزيد درجة حرارة هذه الغرفة وكذلك تلك التى تتخذ كمستودع عن ٦٠°ف، وينبغى أن نحافظ على درجة رطوبة مرتفعة فى الغرفة وذلك بتبليل الأرضية دائما بالماء أو بتعليق شكاير من الجوت المبلل فى الجدران وتغيرها يوميا، تصب أجزاء درنات البطاطس المعدة للتقاوى من وعاء إلى آخر بعد ٢٤ ساعة من تقطيعها ثم تنقل إلى وعاء آخر بعد ذلك بمدة ٤٨ ساعة.

وتحت هذه الظروف يمكن الإحتفاظ بأجزاء التقاوى بأمان لمدة ١٠ أيام وإذا كان من الضرورى الإحتفاظ بها لمدة أطول تخفض درجة حرارة الغرفة أو مستودعا إلى ٤٠°ف، وقبل الزراعة ييومين تنقل أجزاء الدرنات المعدة للتقاوى إلى مكان جيد التهوية لتمكين الأسطح المقطوعة من الجفاف والتصلب.

## ١٦ - دودة حفار ساق الباذنجان

الاسم العلمى للحشرة *Euzophora osseatella triet*

رتبة الحشرات خرسفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بيراليدى Fam Pyralidae

وتصيب هذه الحشرة البطاطس والباذنجان والفلفل إذ تتقب البيرقات فى السيقان والفروع

وينتج عن ذلك وقف النمو في الأفرع أو موتها، وتتميز الإصابة بوجود ثقب في الأفرع والسوق وعلى الأخص الجزء الأسفل فيها كما تظهر كتل من مواد كالنشارة عبارة عن براز الحشرة مختلط مع الأجزاء المنكسرة في آباط الأفرع على فوهة هذه الثقوب وتمضي اليرقات بياتها الشتوى داخل السوق المختلفة من المحصول أو في بقاياها والموجود في الأرض، هذا ويعتبر الباذنجان من أهم عوامل إنتشار هذه الآفة.

كما تحفر يرقات حفار ساق الباذنجان في درنات البطاطس وهي بالحقل مما يسبب تعفنها وظهورها ملوثة بلون أسود في الجزء المصاب مما يتلف الدرنات ويسبب خسارة كبيرة في المحصول. وتكثر الإصابة في البطاطس وفي العروة النيلية حيث تصاب السوق والدرنات، أما العروة الصيفية فإن الإصابة تكون أقل نسبياً ونلاحظ الإصابة بشكل ملحوظ في شون تخزين البطاطس (النوال)، وتختلف طبيعة إصابة هذه الحشرة لدرنات البطاطس عن الإصابة بدودة درنات البطاطس. *Phthorimaea operculella* Zell في أن اليرقات في الحالة الأولى تحفر في سطح الدرنه وهي أكبر حجماً بينما تحفر دودة درنات البطاطس في العيون وتدخل الدرنه عن طريقها.

### الحشرة اليافعة:

تبلغ نحو ١,٢ سم في الطول وتبلغ المسافة بين طرفي الجناحين الأماميين منبسطين نحو ٢,٥ سم ولون الجناحين الأماميين بني فاتح ويتوسط كل جناح بقعة لونها مائل للسواد يجاورها من جهة الحافة الخارجية خطان متجاوران ومتعرجان من نفس اللون، أما الجناحان الخلفيان فلونهما بني مشوب بصفرة خفيفة .

### دورة الحياة:

يوضع البيض فردياً أو في مجموعات على البراعم الموجودة على درنات البطاطس أو على سيقان النبات العائل، يفقس البيض بعد نحو ٤ أيام. والبيضة بيضاوية الشكل، وتبلغ نحو ٥,٦ مم في الطول، ٠,٨ مم في الطول ولونها بني فاتح، وعلى قشرتها من الخارج تضاريز شبكية.

تنقب اليرقات بعد فقسها مباشرة في السيقان أو الأفرع أو داخل درنات البطاطس وتبقى بالداخل حتى التعذر، وتبلغ مدة طور اليرقة نحو ٢٨ - ٥٢ يوماً (حسب درجة الحرارة).

واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ١,٧ سم فى الطول ولونها أصفر كريمى، وعلى ترجة كل من الصدر الأمامى والحلقة البطنية العاشرة صفيحة لونها بنى غامق.

وتعذر اليرقات داخل أنفاقها فى شرنقة من الحرير لونها رمادى، وتبلغ مدة طور العذراء بعد نحو ١٤ - ٢٠ يوما (تبعاً لدرجة الحرارة). والعذراء المكبلة تبلغ نحو ١,٢ سم فى الطول ولونها بنى فاتح، وتميز العذراء بوجود بروز أو إنتفاخ على كل جانب بين الحلقتين الأولى والثانية الصدريتين، كما توجد أيضا شوكة قصيرة وسميكة على كل جانب من جانبي ترجتي الحلقتين السابعة والثامنة البطنيتين وكذلك على كل جانب من جانبي استرنة الحلقة البطنية التاسعة.

وتعيش الفراشة نحو ٤ - ١٣ يوما (حسب درجة الحرارة)، وبهذا تكون مدة الجيل الواحد نحو ٥ - ٨٣ يوما.

## المكافحة:

### أولا - المكافحة الزراعية

- ١ - تقطيع الأفرع أو النباتات المصابة وحرقها بما فيها من الحشرات.
- ٢ - تقطيع الأجزاء المصابة من الدرنات وإعدامها.
- ٣ - بما أن الحشرة الحشرة بياتها الشتوى فى سوق النباتات فلذلك يجب إستعمال هذه السيقان المصابة كوقود بمجرد الانتهاء من أخذ المحصول.

### ثانيا: المكافحة الكيميائية:

ترش النباتات وقائيا بإستخدام المبيدات السابق ذكرها فى مكافحة بودة درنات البطاطس.

### ثالثا: المكافحة الحيوية:

يتطفل على يرقات حفار ساق الباذنجان طفيل من رتبة عسائنية الأجنحة تابع لفصيلة Ichneumonidae هو Exeristes corborator Fabr كما يوجد مفترس لهذه اليرقات من فصيلة Embiidae التابعة لرتبة Embioptera.

## ١٧- الخنافس البرغوثية

رتبة غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة الخنافس الورقية Fam. Chrysomelidea

تضم هذه الفصيلة نحو ٢٥,٠٠٠ نوع، وهي خنافس صغيرة الحجم وجسمها أملس ناعم بيضاوي الشكل وقرن الاستشعار قصير نوعا ما، وتتغذى الأطوار الياقة واليرقات أساسا على الأوراق الخضراء والبعض يتغذى على الجذور والبعض ثاقب لسوق النباتات، وسميت بهذا الاسم نظرا لأن أرجلها الخلفية متضخمة تسمح لها بالقفز لمسافات بعيدة مثل البراغيث، وتهاجم أنواع عدة منها محصول البطاطس، ولكن أربعة منها فقط لها أهميتها الاقتصادية، وثلاثة أنواع منها متشابهة تماما حيث يبلغ طول الطور الياق نحو ٣ مم وشكله بيضاوي قاتم اللون، وأهم نوعين منها نواتي لون أسود لامع ومن الصعب التفريق بينهما، ونعرض هنا لأهم هذه الأنواع :-

### أ - الحنفساء البرغوثية الزرقاء *Phyllotreta curiciferae* Goeze

تصيب هذه الحشرة نباتات الفصيلة الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط واللفت والجرجير والخردل، وتصيب أيضا البطاطس والباذنجان والفراولة، وتتغذى الحشرات الياقة في فصل الربيع على البذور وهي في مهدها تحت سطح التربة وتقضي عليها فيتحتم إعادة الزراعة، وبعد أن تكبر النباتات تظهر الحشرات الياقة فوق سطح الأرض وتتغذى على الأوراق وتلتفها، وعند اشتداد الإصابة تظهر الأوراق مثقبة بثقوب كبيرة مع ظهور الحشرات الياقة بأعداد كبيرة بعد الغروب، ولا يتوقف الضرر على الحشرة الياقة فقط بل إن اليرقات تتغذى على جذور النباتات .

### وصف الحشرة الياقة

تبلغ الحشرة الياقة نحو ٣ مم في الطول ولونها أزرق معدني، وأفخاذها كبيرة مما يجعلها سريعة القفز إذا ما شعرت بأي حركة.

### دورة الحياة والطباع

تقضي الخنافس بياتها الشتوى تحت الأوراق وعلى الحشائش الموجودة حول حواف الحقول والقنوات وغير ذلك من الأماكن المحمية، وتبدأ نشاطها في منتصف مارس حيث

تتجمع بأعداد كبيرة فوق الحشائش وتحت قلف الأشجار حتى يتيسر لها وجود عوائل فنهاجر إليها، رتضع الإناث بيضها في شقوق التربة وعلى عمق ١ - ٣ سم أو بالقرب من سوق عوائلها، وتضع الأنثى الواحدة نحو ٥٠٠ بيضة وتضع البيض فردياً أو في مجموعات صغيرة من ٦ - ٧ بيضاء أو أكثر من (٢٠ - ٣٠ بيضة) - يفقس البيض بعد ١٥ - ٢٢ يوماً وتزحف اليرقات الصغيرة إلى سوق العائل وتحفر في جزء الساق الموجود تحت سطح التربة أو في أعلى الجذور، ويكون النفق الذي تحفره اليرقة مستعرضاً تدخل فيه الجزء الأمامي من جسمها للتغذية بينما يبقى الجزء الخلفي خارج خارج النفق، وتتحول اليرقة إلى عذراء في التربة داخل خلية من الطين مبطنة بطبقة رقيقة من الحرير، وبعد ٦ - ١٧ يوماً تخرج الخنفساء من العذراء ولكنها تبقى داخل الشرنقة نحو ٢ - ٤ أيام ثم تخرج منها بعد ذلك لتتغذى على أوراق النباتات، ولهذه الحشرة جيل واحد أو جيلان في السنة في مصر.

### ب - خنفساء البطاطس البرغوثية *Epitrix cucumeris* Harris

#### وصف الحشرة


تشبه الحشرة اليافعة لهذه الآفة الحشرة السابقة إلا أن لونها أسود لامع (شكل ٢٤).

#### طبيعة الضرر

تقوم الخنافس اليافعة لهذه الحشرة بقرض أوراق البطاطس وإحداث ثقوب صغيرة مستديرة بها، وعندما تكون الإصابة شديدة تبو الأوراق وكأنها منخلة (شكل ٢٥- أ) لا تلبس الأوراق أن تذبل وتموت، وتهاجم يرقات خنفساء البطاطس البرغوثية أجزاء النباتات الموجودة تحت سطح التربة مثل الدرنات والجذور، وعلى أي فإن خنفساء درنات البطاطس تزداد خطورتها وذلك لقيام يرقاتها بجرح السطح الخارجي للدرنات ومنه تحفر (بعمق في لحم الدرنة (شكل ٢٥- ب) والأنفاق التي تحدثها اليرقة طويلة لونها رمادي أو أسود أو فليني وهذه يترتب عليها تلف جزء كبير من الدرنة .

#### دورة الحياة

تشبه دورة حياة الخنفساء البرغوثية الزرقاء .



(شكل ٢٤) خنفساء البطاطس البرغوثية



(شكل ٢٥) الضرر الذي أصاب بادرة بطاطس من خنفساء البطاطس البرغوثية - الثقوب في الأوراق من قرض الحشرات اليابعة، والأنفاق والجروح الموجودة في جزء من الساق تحت الأرض من فعل اليرقات .





(شكل ٢٥-ب) درنات بطاطس أصابها الضرر من يرقات خنفساء البطاطس البرغوثية، فالتقوب متواصلة في لحم الدرنة

### جـ- خنفساء التبغ البرغوثية (*Epitrix hirtipennis* (Melshimer))

توجد هذه الخنفساء في معظم أقطار العالم العربي، وهي تشبه خنفساء درنات البطاطس البرغوثية في الشكل والطباع، إلا أن يرقاتها تحدث أنفاقاً في الدرنة أقل عمقا مما تحدثه يرقات الحشرة السابقة .

### طرق المكافحة

١ - من أهم وسائل المكافحة تنقية الأرض من الحشائش التي تقضى فيها الخنافس ببياتها الشتوى، كذلك يجب الاعتناء بخدمة الأرض قبل الزراعة بالحرث وتقليب التربة وتعريضها للشمس .

٢ - التعفير أو الرش بمبيد فيتوكسيكول بمعدل ٧٥,٥٠ كجم مادة فعالة للفدان أو الثيودان ٢٥-٥٠, مادة فعالة للفدان أو السيقين ٨٥٪ أو الجاربونا ٧٠٪ بنسبة ٤٪ .

٣ - تكافح اليرقات في التربة بمعاملة التربة بالكوردين بعزل ١,٥ كجم للفدان مع تقليب هذه المادة بالتربة جيدا قبل الزراعة .

## ١٨ - البق الدقيقى

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homptera

فصيلة البق الدقيقى Fam. Pseudococcoidae

اشتق اسم الدقيقى من وجود إفرازات دقيقة أو شمعية تغطى جسم الحشرة، وجسم الأنثى بيضاوى مستطيل ومقسم ولها أرجل تامة النمو وتضع بعض الأنواع بيضا ويلد البعض الآخر، وعندما يوضع البيض فإنه يوجد فى طبقة شمعية قطنية مفككة.

والبق الدقيقى الذى يهاجم البطاطس عادة يشمل أنواعا عديدة منها :-

أ - بق العنب الدقيقى (*Phenacoccus vitis* (Niediel)

ب - بق التفاح الدقيقى (*Phenacoccus aceris* (Signoret)

ج - بق الباذنجانيات الدقيقى (*Phenacoccus solani* (Cokerell)


هذه الأنواع الثلاث هى الشائع وجودها على البطاطس، والحشرات اليافعة للبق الدقيقى بيضاوية الشكل لينة الجسم يبلغ طولها نحو ٣ مم (شكل ٢٦) . ويغطى أجسامها مادة شمعية دقيقة بيضاء .

وتسبب هذه الحشرات الضرر لنباتات البطاطس لإمتصاصها العصارة النباتية من المجموع الجذرى أو من الجذور أو الدرنات، وقد تصيب درنات البطاطس الموجودة فى المخازن، وعندما تصاب الورقة بأعداد كبيرة من البق الدقيقى فإنها تصبح مبقعة باللون الأصفر .

### دورة الحياة والطباع

تضع إناث حشرات البق الدقيقى بيضاها فى كيس قطنى شمعي يوجد فى نهاية بطنها ويحتوى هذا الكيس على ٣٠٠ - ٦٠٠ بيضة، وبالرغم من أن حشرات البق الدقيقى قد توجد

على أي جزء من أجزاء النبات إلا أنه يغلب وجودها على السوق الأفرع، ويفقس البيض في الربيع عن حوريات تزحف بعد خروجها من البيض على أجزاء النباتات، وقد تزحف هذه الحوريات لمسافات كبيرة نوعاً فمثلاً من الممكن أن تنتقل من بستان للتفاح زحفاً حتى تصل إلى حقل مجاور مزروع بالبطاطس، ويمكن أيضاً للرياح القوية أن تحملها من حقل إلى آخر، وبعد فترة قليلة من بدء إغتنائها، فإنها تبدأ في إفراز المادة الشمعية البيضاء التي تغطي بها أجسامها، والحوريات الإناث تأخذ في الزيادة في الحجم كلما إغتنت، أما حوريات الذكور فإنها تعذر داخل أكياس صغيرة بيضاء وبعد ذلك تتحول إلى حشرة طائرة لها زوج من الأجنحة - ويمكن لهذه الحشرات أن تتوالد بكتريا كذلك بجانب توالدها جنسياً وينتج عن التوالد البكري ذكورا وإناثا، ولهذه الحشرات ٨ أجيال في السنة حسب المنطقة التي تتواجد فيها، وتبلغ مدة الجيل من ٣٠ - ٩٥ يوماً حسب درجة الحرارة والرطوبة، وفي البيوت المحمية قد يستغرق مدة شهر وتتوالى الأجيال بدون توقف .



(شكل ٢٦) بق الباننجانيات الدقيقى

## طرق مكافحة

- ١ - يفترس هذه الحشرة فى الطبيعة يرقات أسد المن وحشرات أبى العيد والفيداليا وأنواع من الحلم والتربس والهاموش، كما يتطفل عليها حشرات من رتبة عشائىة الأجنحة .
- ٢ - فى حالة الإصابة الشديدة ترش النباتات بمبيد ملاثيون ٥٧٪ (مستحلب زيتى) بمعدل ١ لتر للفدان .

## ملاحظات هامة على مكافحة الآفات الحشرية للبطاطس

جاءت هذه الملاحظات فى نشرة لوزات الزراعة المصرية سنة ١٩٨٧ واليك ملخص هذه النشرة بـ

يعتقد البعض عند ذكر عمليات مكافحة آفات البطاطس أنها المكافحة بالكيماويات أو المبيدات الحشرية فقط وهذا خطأ كبير اذ أن المبيدات الحشرية هى إحدى الوسائل الفعالة لمكافحة حشرة معينة عند ظهورها بصورة وبائية، ولكن هناك من الوسائل التطبيقية البسيطة والتي لو وضعت فى الاعتبار لاعطت نتائج فعالة أيضا فى تقليل اعداد الآفة بدرجة تؤدى إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية فى أضيق الحدود ومن امثلة ذلك ما يلى :

### المكافحة الزراعية :

- ١ - العناية بتجهيز الارض للزراعة من حرث وتزحيف حيث أن الحرث يعرض أطوار الحشرات التى بالتربة إلى العوامل الطبيعية مثل الشمس والاعداء الطبيعية مما يقضى على اعداد كبيرة من تلك الحشرات والتزحيف أيضا يمنع تراكم المياه فى مناطق بون أخرى تكون ملائمة لتكاثر الحشرات .
- ٢ - اختيار تقاوى سليمة خالية من الإصابة وخاصة تقاى البطاطس المخزنة فى النوات لزراعة العروة الشتوية فتفرز وتستبعد الدرنات المصابة بدودة درنات البطاطس حيث أن التقاوى المصابة تتعفن بالتربة ويتأخر نمو هذه النباتات عن تلك التى تزرع من درنات سليمة تنمو بسرعة وتعطى نباتا قويا وكذلك اختيار الاصناف الاقل اصابة بالآفات الحشرية .

- ٤ - زراعة البطاطس على عمق ١٥ سم يقلل من الإصابة بدودة درنات البطاطس عن الزراعة السطحية .
- ٥ - الاهتمام بالتسميد والإعتدال في التوازن بين أنواع الأسمدة المختلفة حيث أن زيادة الأزوت يعطى مجموعا خضرىا كبيرا يؤدى إلى جذب آفات حشرية متعددة بينما زيادة الاسمدة الفوسفاتية البوتاسية تقلل من الإصابة الحشرية إلى حد ما ..
- ٦ - العناية بعمليات الخدمة أثناء نمو المحصول مثل العزيق حيث يعمل على تغطية الدرنات المكشوفة التى تصاب بدودة درنات البطاطس رتقيب التربة يعرض الاطوار الحشرية للعوامل الطبيعية مما يقلل من اعداد الحشرات، وإزالة الحشائش التى تتربى عليها الحشرات قبل ظهور المحصول داخل وخارج الحقل .
- ٧ - استعمال منظمات النمو التى تبكر فى الانتاج وكذلك مسقطات الاوراق مما يؤدى إلى الهروب من الاصابات الحشرية .
- ٨ - تنظيم الري والصرف لتقليل الحشرات الارضية والقضاء على الاطوار الحشرية التى تعيش بالتربة .
- ٩ - تقليب البطاطس بالنهار وقبل المساء حتى لا تتعرض للإصابة بدودة درنات البطاطس وتغطية البطاطس بقش أرز جديد وعدم التغطية بالعرش المصاب .
- ١٠ - اعدام الدرنات المصابة بعد التقليب وعدم تركها مكشوفة لمنع توالد الحشرات عليها وعدم زراعة البطاطس بجوار الباذنجان المعقر وإزالة بقايا المحصول السابق واعدامها قبل زراعة البطاطس لمنع الإصابة بحفار ساق الباذنجان .
- ١١ - اتباع دورة زراعية ثلاثية وعمل نظام لتعاقب المحاصيل بزراعة محاصيل بقولية كالبرسيم وغيرها بعقبها محاصيل نجيلية يعقبها محاصيل درنية تقلل من الإصابة بالآفات الحشرية لاختلاف آفات كل محصول عن الآخر .
- ١٢ - عند زراعة حقل تقاوى البطاطس تزرع بعيدا عن المحاصيل الباذنجانية وأشجار الفاكهة

كالطويات والاسوار النباتية لتقليل الاصابة بالمن ويفضل الزراعة فى الحقول البعيدة عن النوات لتقليل الاصابة بدرنات البطاطس.

### المكافحة الميكانيكية :

ويقصد بها ازالة الافات يدويا لتقليل اعدادها وتشمل :

١ - النقاوة اليدوية للطع بودة ورق القطن يرقات الديدان القارضة وازالة الاجزاء المصابة من اوراق البطاطس ببودة درنات البطاطس وحرقتها وذلك فى المساحات الصغيرة .

٢ - اقامة حواجز بعمل خنادق بطول الحقل وملئها بالماء المضاف إليه سولار ونثر جرجى على الجسور لمنع انتقال يرقات بودة ورق القطن من الحقول المصابة إلى حقول البطاطس السليمة .

٣ - وضع اسلاك على فتحات النوات لمنع دخول وخروج فراشات بودة درنات البطاطس .

٤ - ازالة النباتات المصابة بالمن أو حفر ساق الباذنجان وحرقتها أو اعدامها بعيدا عن حقول البطاطس .

٥ - استخدام المصائد بأنواعها لجذب الحشرات المختلفة واعدائها .

٦ - التخزين فى مخازن مبردة حتى ٤° ، ٨٠٪ رطوبة نسبية لايقاف الاصابة بالآفات أثناء فترة التخزين .

٧ - فرز الدرنات قبل التخزين واستبعاد المصاب واعدامه وعدم تكويم الدرنات المصابة أمام النوات أو الثلجات .

### المكافحة الحيوية :

ويقصد بها اناحة الفرصة للاعداء الطبيعية من طفيليات ومفترسات الموجودة فى بيئة الافات من احدث التوازن بها وبين الافات الحشرية المختلفة وذلك بحماية الاعداء الطبيعية من العوامل التى تقلل من اعدادها أو استيراد أعداء طبيعة ونشرها فى الحقول بعد اقلمتها

ونشرها على نطاق واسع للحد من ضرر الآفات الحشرية ويلزم لنجاح ذلك ما يلي :

- ١ - تقليل استخدام المبيدات الحشرية ما أمكن واستخدام المبيدات الحشرية الامنية الانتقائية .
  - ٢ - تعويد الزراع على تواجد الآفات الحشرية على محاصيلهم إلى ما قبل الحد الاقتصادي الحرج مما لا يؤثر على المحصول بل تؤدي إلى تكاثر الاعداء الطبيعية مما يقلل من ضرر الآفات مستقبلا .
  - ٤ - استخدام طرق المكافحة الزراعية والميكانيكية أطول فترة ممكنة .
  - ٥ - استخدام الأصناف لمقاومة واعداد برامج التربية لانتاج اصناف مقاومة تتحمل الاصابة بالحشرات .
  - ٦ - الاعتقاد بأن استخدام الكيماويات ليس هو الطريقة المثلى للقضاء على الآفات بل يؤدي إلى انتاج سلالات منيعة من الحشرات وتلوث البيئة .
- المكافحة الكيماوية :**

ويقصد بها استعمال مبيدات الآفات في المكافحة ويلجأ إليها الانسان عندما تفشل الطرق الطبيعية التطبيقية الاخرى في مكافحة الآفات أو الحد من اضرارها .

وتعتبر المبيدات ذات أثر ملموس في المكافحة عند ظهور الفورات المفاجئة للحشرات وتظهر نتائجها المرضية في القضاء على الحشرات عندما تعجز الوسائل الاخرى للمكافحة غير أنها تشوبها بعض المشاكل التي يتفاقم ضررها وهي :

تلوث بيئة الانسان والحيوان والنبات، وظهور سلالات حشرية مقاومة لفعل هذه المبيدات واخلال التوازن البيعى بين الآفات واعدائها الطبيعية وظهور حشرات جديدة لم تكن معروفة قبل التوسع في استخدام المبيدات وكذلك ارتفاع تكاليف المكافحة .

ويستعمل في مكافحة آفات البطاطس طريقة الرش بالحجم الكبير وتستعمل لذلك المبيدات المعلقة أو المستحلبة مع ضرورة التقليب المستمر في آلة الرش لضمان تجانس المحلول طوال عملية الرش .

ويقصد بطريقة الرش بالحجم الكبير تخفيف المبيد الحشري تخفيفا كبيرا بالماء وتمتاز بخروج محلول الرش في حالة قطرات مائية كبيرة يتراوح قطرها بين ٢٠٠ - ٤٠٠ ميكرون حتى يتوزع المبيد على جميع اجزاء نبات البطاطس حتى يمكن القول أنها «عملية غسيل للنبات» وتحتاج هذه الطريقة إلى وقت ومجهود في تنفيذها وايضا إلى كمية ماء من ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء للفدان .



## الآفات الحشرية التي تصيب الطماطم

تعتبر الطماطم من أوسع محاصيل الخضر انتشاراً في العالم العربي، وهي تمثل مكانة خاصة بين أنواع الخضر التي تصلح لفرض الاستهلاك المحلي والتصدير وتزرع الطماطم على مدار العام في مصر، وتعتبر من أفضل أنواع الخضر في قيمتها الغذائية وذلك لإحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين C، وكمية مناسبة من الأملاح المعدنية اللازمة للجسم، ويصنع عصير الطماطم (الصلصة) ويعبأ في الكثير من الأقطار العربية .

وتصاب الطماطم بالعديد من الآفات الحشرية من بدء الزراعة حتى جمع المحصول وتورد هنا أهم الآفات الحشرية التي تصيب الطماطم وطرق السيطرة عليها .

### ١- الحفارات

#### أ- الحفار العادي *Cryllotalpa gryllotalpa* L.

ويوجد في مصر وشمال إفريقيا والسعودية وسوريا والعراق .

#### ب- الحفار الإفريقي *Gryllotalpa africana* P

وهو أصغر في الحجم من الحفار السابق، وتتشابه الحشرات في الصفات والعادات وينتشر هذا النوع في صعيد مصر والواحات والسودان والصومال واليمن والسعودية، ويفصل البلاد الحارة.

وهذه الحشرات سبق لنا وصفها بالتفصيل مع دورة حياتها وأضرارها عند ذكر في الآفات التي تصيب البطاطس .

وتصاب الطماطم منذ بدء زراعتها في المشتل بالحفارات إذ تتغذى الحفارات على البذور في التربة، وعند ظهور البادرات تقوم بقرض بنور النباتات تحت سطح التربة مباشرة مما يؤدي أحيانا إلى إعادة الزراعة، وتصاب ثمار الطماطم القريبة من سطح الأرض فتحدث الحفارات بها ثقوبا تتعفن بعدها الثمار وكما سبق أن ذكرنا فإن الحفارات تتبع رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة Order Orthoptera فصيلة الحفارات Fam. Gryllotalpidae.

## مكافحة الحفارات

عند ظهور أعراض الإصابة بالحفارات تكافح بطعم سام مكون من مبيد هو ستانيون ٤٠٪ بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان تضاف إلى ١٥ كجم نخالة ناعمة مبللة بالماء (٣٠ لتر ماء)، ينثر الطعم بين خطوط الزراعة قرب الغروب، ويستحسن رى الأرض قبل ذلك حتى تخرج الحشرات من مخابنها وينثر الطعم بها عندما تجف قليلا بحيث تحمل سير الأقدام.

## ٢- الديدان القارضة

أ- الدودة القارضة العادية *Agrotis ipsilon* (Huf)

ب- الدودة القارضة البنية *Agrotis spinifera* (hubn)

ج- دودة اللفت القارضة *Agrotis segetum* (Schi)

وتوجد هذه الأنواع جميعا في الأقطار العربية ولو أن الأولى منها تفضل الأماكن المعتدلة الحرارة والباردة وتختفي عند ارتفاع درجة الحرارة وفي خلال فصل الصيف، أما دودة اللفت فتنتشر في المناطق الساحلية والصحراوية، ويكثر وجودها من مارس حتى يوليو ثم تختفي وتظهر ثانيا في أكتوبر.

ولكن الدودة القارضة البنية تنتشر في جميع المناطق وتحمل مختلف الأجواء، وهي من أشد الآفات خطرا على نباتات الطماطم، وتعرض سوق النباتات فوق سطح التربة، وعند تكون الثمار تثقبها وتتغذى على محتوياتها.

والديدان القارضة كلها تنتمي لرتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera وفصيلة

الفراشات الليلية Noctuidae وسبق شرح كل ما يتعلق بوصفها وتاريخ حياة بعضها عند ذكر آفات البطاطس، ونورد هنا وصف وتاريخ حياة كل من الدودة القارضة البنية وبودة واللفت القارضة.

### ب - الدودة القارضة البنية . *Agrotis spinifera* (H.)

تعتبر هذه الحشرة ثانی آفة من الديدان القارضة فی الأهمية بعد الدودة القارضة السوداء، وتعتبر من آفات الطماطم الهامة إذ تقرض النباتات من عند سطح الأرض وتثقب الثمار لتتغذى على محتوياتها، ومن عوائلها الأخرى الشعير والنجيل والصفصاف والغاب . وهي واسعة الانتشار بجمهورية مصر العربية فتوجد فی الواحات الداخلة والخارجة ومحافظة أسوان وقنا وعند ساحل البحر الأحمر وسيناء ومحافظة الجيزة وجميع محافظات الوجه البحري .

### وصف الحشرة اليافعة :

فراشة هذه الحشرة أصغر من فراشة الدودة القارضة العادية إذ أنها تبلغ نحو ٦,٥ سم فی الطول، ٣,٥ سم فی العرض بعد فرد الجناحين . لون الجسم والأجنحة الامامية بنى فاتح مع وجود خط غامق مواز للحافة الخارجية للجناح الامامى، كما يوجد على الجناح المذکور أشربة غامقة على هيئة مثلثات موازية لطول الجناح، والعلامتان اللتان تكونان شكل الأذن والكلية واضحتان، أما الأجنحة الخلفية فلونها أبيض فضى . ويتشابه كلا من الذكر والأنثى فی الحجم واللون إلا أن قرن الاستشعار فی الذكر مشطى مضاعف وفى الأنثى خيطى .

### دورة الحياة :

تضع الأنثى الملقحة من ٥٠ - ٢٠٠ بيضة فرديا أو فى مجاميع لا تزيد عن ثلاث بيضات فى المجموعة الواحدة ، ويفقس البيض بعد ٣ - ٤ أيام . واليرقة ٦ أعمار، وتبلغ مدة الطور اليرقى نحو ٢٤ - ٤٠ يوما ( تبعاً لدرجات الحرارة والرطوبة ) . واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ٣,٢ - ٣,٧ سم فى الطول، ولونها أصفر أو بنى مخضر أو بنى فاتح ورأسها أسمر، وفى وسطها من أعلى خط طولى أسمر اللون، ويغطى الصدر الأول بصفيحة سمراء كما تغطى ترجة الحلقة البطنية العاشرة بصفيحة لونها رمادى فاتح، كما يوجد أسفل الخط الظهرى

مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

<https://scholar.google.com/citations?>

[user=t1aAacgAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=t1aAacgAAAAJ&hl=en)

[salamalhelali@yahoo.com](mailto:salamalhelali@yahoo.com)

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.facebook.com/groups/  
/Biothesis](https://www.facebook.com/groups/Biothesis)

[https://www.researchgate.net/profile/  
/Salam\\_Ewaid](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Ewaid)

07807137614



خطان آخران على كل جانب أو عند إكمال نمو اليرقة تعذر داخل التربة في شرنقة من الطين مبطنة بطبقة رقيقة من الحرير، وتبلغ مدة طور العذراء نحو ١٠ - ١٥ يوما . وتعيش الحشرة اليافعة بعد خروجها من العذراء نحو ٢ - ٦ أيام .

### جـ - دودة اللفت القارضة : *Agrotis segetum* (Schi)

سميت بهذا الاسم لأن إسمها بالإنجليزية هو The turnip Cutworm وهى ثالث أنواع الديدان القارضة من حيث الأهمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، فهي توجد في سيناء والواحات ومحافظة أسوان ومنطقة القاهرة والمناطق السياحية قرب الاسكندرية حيث تأتي لها من المناطق الصحراوية القريبة من الاسكندرية كالعامة وغيرها، وتشاهد فراشاتها بكثرة من مارس حتى يوليو ثم تختفى وتظهر ثانية خلال أكتوبر . وتصيب هذه الحشرة جذور الشعير والبرسيم كما تصيب الفاصوليا وغيرها من العائلة البقولية والبطاطس والخضر الجذرية كاللفت وبادات المحاصيل الصليبية والجزر، والكريزانثيم وجذور حشائش كبيرة مثل حشيشة اللوليم . *Lulium* وهذه الحشرة واسعة الانتشار في اجزاء أخرى من العالم إذ توجد في الولايات المتحدة وأوروبا فيها الجزر البريطانية .

### الحشرة اليافعة :

تبلغ هذه الحشرة نحو ١,٥ سم في الطول، ٣ سم في العرض بعد فرد الجناحين والأجنحة الامامية لونها يختلف من رمادي إلى نبي محمر، ويوجد على الحافة الخلفية للجناح الامامي خط متعرج غامق اللون ، وتظهر العلامتان اللتان تشبهان الأذن والكلية بوضوح على كل من الجناحين الامامين، والجناحين الامامين في الانثى حوافها ذات لون رمادي غامق . قرن الاستشعار مشطى في الذكر وخيطى في الانثى .

### دورة الحياة :

تقضي الحشرة الشتاء على هيئة يرقة في التربة، وتعذر اليرقات من فبراير إلى إبريل وتخرج الفراشات من مارس - مايو، وتضع الاناث البيض على سيقان العوائل النباتية من محاصيل أو حشائش قرب سطح الأرض . يفقس البيض بعد حوالي ٢٠ - ٦٤ يوما .

والبيضة من النوع نصف الكروي كالحبة وعليها من الخارج تضاريز مميزة كما في باقي الديدان القارضة .

وتتغذى اليرقات في أوائل عمرها على الجذور وأجزاء للنباتات القريبة من سطح الأرض ثم تنزل إلى داخل التربة وتتغذى على الجذور وأجزاء السيقان الموجودة تحت الأرض، وتتقصف السيقان الصغيرة عند سطح التربة . واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ٢,٥ - ٣,٥ سم في الطول، ولونها رمادي مخضر وعلى ظهرها خط وسطى غامق على جانبيه خطوط أخرى جانبية خطوط أخرى طولية خفيفة، وعلى السطح العلوى لكل من حلقات الجسم أربع بقع سوداء اللون إثنان على كل جانب من جانبي الخط الوسطى العلوى الغامق، كما توجد على كل من جانبي كل حلقة أيضا خلاف البقعتين السوداوين السابقتين ثلاث بقع جانبية سوداء، وسطح اليرقة السفلى رمادي فاتح ورأسها رمادي اللون وعليها خطان غامقان متقاطعان على شكل حرف x .

والعدراء المكبلة ملساء بنية اللون، وعلى نهاية بطنها شوكتان . وتبلغ نحو ١ - ١,٢ سم في الطول، والتعذير يكون داخل شرنقة من الطين في التربة والشرنقة مبطنة كالعادة من الداخل بطبقة رقيقة من الحرير .

ولهذه الحشرة جيل واحد كامل من جيل ثان في السنة، وتدخل يرقات هذا الجيل الثاني في بيئاتها الشتوى مع بعض يرقات الجيل الأول .

### مكافحة الديدان القارضة

تكافح كيماويا بالطعم السام المكون من الهوستاثيون ٤٠٪ بمعدل ١,٢٥ لترا للفدان يضاف إليه ٢٥ كجم نخالة ناعمة مبللة بالماء (٣٠ لتر ماء) وقد يستبدل الهوستاثيون بمبيد آخر مثل مارشال ٢٥٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان يضاف إلى نفس كمية النخالة، وينثر الطعم السام بين الخطوط عند ظهور أعراض الإصابة كما سبق أن ذكرنا في حالة الحفارات أو يوضع الطعم تكبيشا حول النباتات قبيل الغروب، ويجب لبس قفازات عند إجراء عملية الخلط مع الحذر من استنشاق المبيد أثناء هذه العملية.

### ٣- الديدان الجياشة Army worms

كما سبق أن ذكرنا في آفات البطاطس، فإن يرقات أو يساريع هذه الآفات تهاجم المحاصيل بأعداد كبيرة، وعندما ينضب معين الغذاء في حقل ما فإنها تتحرك بأعداد كبيرة فيما يشبه الجيش وتهاجر إلى حقل آخر ومنها جاء هذا المصطلح .

وتشمل هذه الديدان - دودة ورق البطن الكبرى، القطن الصغرى وينتشران في جميع أقطار العالم العربي، وليس لهاتين الالتهنتين تخصص محصولى، بل إنهما تصيبان كافة محاصيل الحقل والخضر ومنها الطماطم، حيث تلتهم أوراق النباتات بشراهة وتسبب خسائر كبيرة لها .

وتكافح هذه الديدان كيميائياً على محصول الطماطم إذ كثر أعدادها ويستخدم لذلك أحد المبيدات التالية :-

ريلدان ٥٠٪ بمعدل ١ لتر للفدان .

أو لانيت ٩٠٪ بمعدل ٣٠٠ جم للفدان .

أو سيليكرون ٧٢٪ بمعدل ٧٥٠ سم للفدان .

أو لانيت ٢٠٪ بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان .

يضاف إلى أي مبيد منها ٢٥٠ لتر ماء، ويعتبر هذا العلاج مشتركاً لديدان ورق القطن والديدان القياسية ونصف القياسية ودودة ثمار الطماطم الأمريكية.

### ٤- دودة الطماطم نصف القياسية أو الدودة نصف القياسية ذات النقطتين الذهبيتين

الاسم العلمى للحشرة (Espe) *Chrysodexis chalcites*

رتبة الحشرات حرشغية الاجنحة Order Lepidoptere

فصيلة الغرشات الليلة Fam. Noctuidae

من عوائل هذه الحشرة فى محاصيل خضر العائلة الباذنجية والداليا والسالفيا والقطن

والذرة وعباد الشمس والدخان ولالنتانا . وفي جمهورية مصر العربية توجد هذه الحشرة في سيناء ومنطقة القاهرة ومحافظات الجيزة والأسكندرية والدقهلية حيث تصيب الطماطم وهي أهم عوائلها والبطاطس والخبيزة والقطن والقربيط والخرشوف وذلك في المدة من أكتوبر حتى مايو في مصر - وتوجد في الأقطار العربية الأخرى .

### الحشرة اليافعة

(شكل ٢٧ - ٢٨) : لونها بني مصفر ويميز الجناح الأمامي بوجود نقتطين ذهبيتين في وسطه، والجناح الخلفي لونه أبيض مع وجود بقعة غامقة عند الحافة الخارجية، وتبلغ نحونحو ٦,٥ سم في الطول، ٤ سم في العرض بعد فرد الجناحين، وقرن الاستشعار خيطي في كلا الجنسين .


### دورة الحياة

تخرج الفراشات في الربيع وأوائل الصيف، وتضع الأنثى الملقحة بيضها وبعد خروجها من العذراء بنحو ١ - ٧ أيام وتستمر في وضع البيض لمدة ٣ - ١١ يوما أخرى حيث تضع نحو ٢٧٠ - ٦٣٠ بيضة ثم تنقطع الأنثى عن وضع البيض لمدة ٦ - ٧ أيام وذلك حسب درجة الحرارة والرطوبة .

ويوضع البيض فرديا على سطي الورقة، ويوضع على الورقة الواحدة نحو ١ - ٤ بيضات . والبيضة لونها أبيض أو أصفر عند وضعها ثم تعمق تدريجيا نحو الفقس، وهي دائرية الشكل، ويحمل سطحها الخارجى تضاريز شبكية الشكل . ويقفس البيض بعد نحو ٣ - ٧ أيام (حسب الحرارة والرطوبة) .

واليرقة لها ٦ أعمار وتغذى اليرقات الحديثة الفقس (العمر الأول) على البشرة الخارجية للأوراق ثم تبدأ يرقات العمر الثانى أو الثالث فى ثنى حافتي الورقة وضمها إلى بعضها البعض وترى خيوطا حريرية كثيرة فوق اليرقة أثناء تغذيتها على الورقة المصابة .





(شكل ٢٢) الديدان نصف القياسة

١ - يرقة بودة الطماطم نصف القياسة ٢ - فراشة بودة الطماطم نصف القياسة

٣ - فراشة البودة نصف القياسة ذات الخط التعرج

وتبلغ مدة الطور اليرقي كله ١٥ - ٢٠ يوما واليرقة التامة النمو تبلغ ٢ - ٣,٨ سم في الطول ولونها أخضر فاتح ورأسها نوليون بني فاتح، ويوجد خطان لونها أخضر غامق على جانبي الجسم .

تعذر اليرقات بعد تمام نموها بين الأوراق داخل شرنقة من الحرير . والعذراء لونها أخضر في اليوم الأول ثم يغمق لونها تدريجيا ، وتبلغ نحو ١,٥ - ٢ سم في الطول، وتحمل

في نهاية بطنها ٨ أشواك صغيرة . وتبلغ مدة طور العذراء نحو ٨ - ٩ أيام على الطماطم وتبلغ مدة الجيل الواحد على الطماطم نحو ٤٢ يوما في المتوسط، ووجد أن لهذه الحشرة بالمعمل ٨ أجيال في السنة .

هذا وتظهر فراشات هذه الحشرة في المصيدة الضوئية بمنطقة الاسكندرية من أواخر أبريل حتى أوائل نوفمبر وأكثر أعدادها كانت من منتصف يونيو حتى منتصف أكتوبر .

### المكافحة :

تكافح هذه الحشرة كيماويا كما في بودة ورق القطن الكبرى .

## ٥- الدودة نصف القياسية ذات الخط المتعرج

*Chrysodiexis circumflexa* (L.)

توجد هذه الحشرة طوال العام في جميع محافظات الوجه البحري ومحافظه القاهرة ومحافظه والجيزة والصحراء الشرقية ومحافظه أسوان، وتصيب البسلة وال Flox والطماطم وتوجد هذه الحشرة في السعودية وتصيب البرسيم الحجازي والخضر والذرة ويشتد ضررها في الخريف .

### الحشرة اليافعة

( شكل ٢٧ - ٣ ) : وهي تماثل الحشرة السابقة في الحجم، وتتميز بوجود خط متعرج أصفر اللون على النصف القاعدي للجناح الأمامي، أما الجناح الخلفي فهو برونزي اللون أو بني قاتم .

ولم تدرس بعد دورة حياة هذه الحشرة، وتظهر فراشاتها في المصيدة الضوئية بمنطقة الاسكندرية وبأعداد قليلة في أشهر إبريل ويونيو ويوليو وأغسطس ونوفمبر بأعداد كبيرة في سبتمبر ولم تظهر بالمرّة في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس .

## فصيلة الديدان القياسية (Fam.Geometridae (Loopers)

تعتبر فصيلة الديدان القياسية ثانی الفصائل الكبيرة في رتبة حرشفية الأجنحة إذ يوجد منها حوالي ٢٠٠٠ نوع منها نحو ٦٨ نوعا معروفا بجمهورية مصر العربية . ومعظم فراشات هذه الفصيلة صغيرة الحجم رقيقة ورقيقة الجسم وأجنحتها عريضة عادة ويغلب وجود خطوط عرضية متموجة . رقيقة على تلك الأجنحة وغالبا ما يختلف الجنسان في اللون وفي أنواع قليلة تكون الإناث غير مجنحة أو تكون لها أجنحة أثرية . وتطير الفراشات ليلا وتنجذب للضوء ويرقات هذه الفصيلة تمتاز بوجود زوج من الأرجل البطنية الكاذبة على الحلقة البطنية العاشرة أو زوجين على الحلقتين البطنيتين السادسة والعاشرة.

ومن الحشرات التابعة لهذه الفصيلة بمصر والعالم العربي ولها أهمية ملموسة بودة الطماطم القياسية الكبيرة وبودة الطماطم القياسية الصغيرة وبودة الذرة القياسية . وبودة الدريس القياسية .

### ٦. دودة الطماطم القياسية الكبيرة

*Scopula coenosaria luridata* (Zell.)

تصيب هذه الحشرة بادرار الطماطم في المشتل وتسبب لها ضررا بليغا، كما تصيب نباتات الطماطم بعد زراعتها في الأرض المستديمة، وتصيب هذه الحشرات أيضا الملوخية والبطاطا والأسبرجس.


#### الحشرة اليافعة:

لون الحشرة يغلب فيه اللون الرمادي الفاتح مع وجود بقع رمادية قاتمة على الجناحين، وتبلغ الحشرة نحو ١ - ١,٢ سم في الطول، ٢,٢ - ٢,٥ سم في العرض بعد فرد الجناحين. ويطن الأنثى على العموم أعرض من بطن الذكر كما أن قرن الاستشعار في الذكر أكثر شعرا منه في الأنثى .

#### دورة الحياة

(شكل ٢٨) : تضع الأنثى من ٣٢ - ٢٦٧ بيضة في فترة من ٢ - ٩ أيام وتبلغ فترة قبل وضع البيض نحو ١ - ٦ أيام وما بعد وضع البيض نحو ١ - ٣ أيام صيفا (٢٠ م) في حين

أن فترة ما قبل وضع البيض هي صفر - ٤ أيام وما بعد وضع البيض صف - ٣ أيام الشتاء (٢١م) ويوضع البيض فرديا أو في مجموعة تتكون من عدد قليل من البيض (٢ - ٤ بيضات) أو قد يوضع البيض في أكوام تبلغ ٩ - ١١ بيضة في الكومة الواحدة، ويفقس البيض بعد ٢ - ٥ أيام صيفا (٢٠م)، ٨ - ١٠ أيام شتاء (٢١م). والبيضة بيضاوية الشكل ولونها أخضر فسدي عند الوضع ثم يحمر اللون ويصير بنيا غامقا أو محمرا قبل الفقس وقشرة البيضة مزركشة من الخارج بتضاريز طولية وعرضية، وتبلغ البيضة نحو ٧,٠ مم في الطول، ٣,٥ مم في العرض



(شكل ٢٨) دورة الطماطم القياسية الكبيرة

بيضة - يرقة - عذراء - فراشة

وتخرج اليرقات الصغيرة وتتغذى على أوراق النبات، وتتميز تغذية هذه اليرقات بأكل قطع كاملة من حواف الأوراق، وفي حالة الإصابة الشديدة لا يبقى من البادرة إلا عنق الورقة فقط.

ويتم نمو اليرقة بعد حوالي ٢٣ - ٢٧ يوما صيفا (٢٠م)، ٣٥ - ٣٨ يوما شتاء (٢١م)، ولليرقة ٦ أعمار. واليرقة التامة النمو تبلغ ٣ - ٤ سم في الطول، ويختلف لونها من الرمادي إلى الرمادي المخضر مع وجود بقع سمراء أو بنية غامقة مثلثة الشكل على السطح العلوي، وتتميز اليرقة بوجود زوجين من الأرجل البطنية الكاذبة على الحلقيتين البطنيتين السادة والعاشرة.

وتتحول اليرقة إلى عذراء عند تمام نموها، والعذراء المكبلة لونها بني فاتح أو غامق وتوجد داخل شرنقة من الحرير مختلطة مع بقايا من المواد الغذائية الجافة والبراز، وقد يحدث التعذير بين الأوراق الملتفة للنبات العائل وتبلغ العذراء نحو ١٠ - ١٣ يوما صيفا (٢٠م)، ١٨ - ٢٧ يوما شتاء (٢٢م).

### المكافحة :

إذا أشدت ضررها يمكن مكافحتها كما تكافح بودة ورق القطن الكبرى .

## ٧- دودة الطماطم القياسة الصغيرة

*Scopula ochroleucaria* (H.S.)

توجد يرقات هذه الحشرة على نباتات الطماطم في المشتل وفي الحقل المستديم وكذلك على نباتات الملوخية والكوسة، وتتشابه أعراض الإصابة بأعراض الإصابة بالحشرة السابقة.

### الحشرة البالغة :

هذه الفراشة أضغر حجما من الفراشة السابقة إذ تبلغ نحو ٠,٧ - ٠,٩ في الطول، ١,٤ - ١,٨ سم في العرض بعد فرد الجناحين ولونها أغمق من لون الفراشة السابقة مع وجود خطوط مستعرضة غامقة على الجناحين.

## دورة الحياة :

تضع الأنثى الملقحة بين ١٥ - ٧٠ بيضة، ويوضع البيض فرديا أو في مجموعات نحو ١ - ٣ أيام في الأنثى الملقحة، ويفقس البيض بعد نحو ٤ - ٦ أيام صيفا (٢٠ م)، ٦ - ١٠ أيام شتاء (٢١ م) والبيضة تشبه في الحشرة السابقة تماما في الشكل إلا أنها أصغر حجما إذ تبلغ نحو ٠,٤٧ مم في الطول، ٠,٢٧ في العرض .

واليرقة ٦ أعمار كما في الحشرة السابقة ويتم نموها في ١٧ - ١٩ يوما صيفا (٢٠ م)، ٢١ - ٢٤ يوما شتاء (٢١ م)، واليرقة قريبة الشبه من يرقة الحشرة السابقة إنها أغمق لونا وأصغر حجما فتبلغ نحو ١,٨ - ٢,٢ في العرض .

وتشبه العذراء مثيلتها في الحشرة السابقة ولكنها أيضا زصفر في الحجم إذ تبلغ نحو ٥-٧ مم في الطول وبنهاية بطنها أيضا ٨ خطاطيف وتوجد أيضا داخل شرنقة من الحرير، ويستغرق مدة طور نحو ٩ - ٢١ يوما صيفا (٢٠ م)، ١٧ - ٢١ يوما شتاء (١٨ م) .

هذا، وتستغرق مدة الجيل الواحد من ٢٩ - ٤٧ يوما صيفا (٢٠ م)، ٦١ - ٧٠ يوما شتاء (٢١ م) .

## المكافحة :

إذا استدعت المكافحة فتكافح كيماويا كما في بودة ورق القطن الكبرى .

## ٨ - دودة ثمار الطماطم أو دودة اللوز الأمريكية

الاسم العلمي للحشرة *Heliothis armigera* (H)

رتبة حرشغية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الغراشات الليلية Fam.Noctuidea

تصيب هذه الحشرة نباتات كثيرة منها القطن والذرة والطماطم والفاصوليا وغيرها من

نباتات الفصيلة البقولية والكرنب وبعض الحشائش، وتصيب الأزهار والثمار في كل العوائل المذكورة، وتنتشر هذه الحشرة في جميع أنحاء العالم، وهي من أشد الآفات خطورة على محصول الطماطم في اليمن والمملكة العربية السعودية والعراق حيث تصيب الطماطم والبرسيم الحجازي والخضر وكثيرا من النباتات البرية الصحراوية والبطيخ .

### وصف الحشرة اليافعة

سبق وصف هذه الحشرة في الجزء الأول من الكتاب في آفات القطن، ونورد هنا موجزا لها، فهي فراشة صغيرة الحجم تبلغ نحو ١,٢٠ سم - ١,٦ سم فـ «الطول» ٥ - ٢,٢ سم في العرض عند فرد الجناحين، ولون الأجنحة الأمامية غالبا ما يكون رماديا فاتحا مع وجود خطوط رمادية فاقعة أو خضراء زيتونية غير منتظمة، وعلى الجهة الخارجية للجناح الأمامي توجد بقعة غامقة اللون، أما الأجنحة الخلفية فلونها أبيض مع وجود بقع غامقة عند الحافة الخارجية .

### دورة الحياة

تخرج الفراشات في الربيع وأوائل الصيف، وتفضل الطيران في الأيام الدافئة التي يكثر فيها الضباب خاصة قرب الغروب، وتتغذى الفراشات على رحيق كثير من الأزهار أثناء الليل، وتضع بيضها على النباتات التي تتغذى على رحيق أزهارها، وتضع الأنثى نحو ٥٠٠ - ٣٠٠٠ بيضة بواقع ٢٠٠٠ بيضة في المتوسط، ويوجد البيض فرديا ويفقس بعد ٢ - ١٠ أيام حسب درجات الحرارة والرطوبة .

واليرقة يختلف فلونها كثيرا فقد يكون لون ظهرها أخضر أو قرمزيا أو بنيا مسوداً، أما بطنها فونها فاتح، ويوجد على طول الجسم مناطق فاتحة وأخرى غامقة متبادلة، وقد يختلف لون هذا التخطيط الفاتح والغامق المتبادل من يرقة إلى أخرى، ولكن يوجد دائما خط طولي مزيج غامق اللون في وسط الجسم من السطح العلوي، أما عن الرأس فهي مصغرة اللون ومنطقة الأرجل سوداء اللون تقريبا، وتبلغ اليرقة التامة النمو نحو ٤ - ٥ سم في الطول .

وتتغذى اليرقات الصغيرة بعد خروجها من البيضة مباشرة على الأوراق والمجموع

الخضري لمدة ١ - ٢ يوم، ثم تبدأ في الحفر داخل ثمار العائل النباتي التي تتغذى عليه، ويبلغ طول مدة الطور اليرقي ٢ - ٤ أسابيع تنسلخ خلاله ٥ مرات .

ومن عادات اليرقة الانتقال من ثمرة إلى أخرى حتى إن اليرقة الواحدة قد تتلف من ٤ - ٥ ثمار، كما تأكل اليرقات بعضها بعضاً، لذلك لا يشاهد في مكان واحد أو داخل ثمرة واحدة سوى يرقة واحدة كبيرة فقط .

وعند إكتمال نمو اليرقة تخرج من أنفاقها وتزحف على النباتات حتى تصل إلى التربة وتعذر داخلها على عمق ٣ - ٨ سم داخل شرنقة من الطين مبطنة من الداخل بطبقة من الحرير، ويستمر طور العذراء نحو ١٠ - ٢٥ يوماً أو أطول من ذلك أثناء فترة الشتاء لأن هذه الحشرة تقضى بياتها الشتوى على هيئة عذراء وذلك في المناطق الدافئة الواقعة أسفل خط عرض ٤٠° ومنها مصر، وفوق هذا الخط تموت العذراى من برد الشتاء، وتحدث الإصابة الجديدة في الربيع التالي في مثل هذه المناطق الباردة من الفراشات المهاجرة من المناطق الجنوبية الدافئة، والعذراء مكبلية بنية اللون طولها نحو ١,٤ - ٢ سم .

## طرق المكافحة

### أولاً : المكافحة الزراعية

تعتبر عملية تنقية الحشائش من الحقول من الأسس الهامة في مكافحة هذه الحشرة لأنها تصيب الكثير من الحشائش وتتغذى عليها، كذلك يجب العناية بحرث الأرض وعزقها حت تتعرض العذراى الموجودة في التربة للهلاك بفعل عوامل الجو والاعداء الحيوية، ومن الأمور الهامة كذلك جمع الثمار المصابة وحرقها .

### ثانياً : المكافحة البيولوجية

لحسن الحظ يوجد الكثير من الطفيليات والمفترسات التي تصيب هذه الآفة وتقضى على أعداد كبيرة منها ومن ذلك ما يلي : -

يتطفل على بيض هذه الحشرة ويرقاتها عدد من الطفيليات منها :



### ١ - الطفيل *Apanteles rufirus* Hei

وهو طفيل يتطفل على يرقات هذه الآفة وتعذر يرقة الطفيل داخل شرنقة حريرية بيضاء الشكل مدببة الطرفين.

### ٢ - الطفيل *Microplitis rufiventris* Kok

ويتطفل على يرقات هذه الآفة ويستمر الطفيل مع اليرقة العائل حتى تتحول إلى عذراء ثم يثقب الطفيل الجزء الأمامي من العذراء ويخرج من الثقب .

### ٣ - الطفيل *Techina larvarum* L .

ويتطفل على يرقة هذه الآفة ويستمر معها حتى طور العذراء حيث يخرج من العذراء كسابقه .

### ٤ - الطفيل *Trichogramma Sp* . ويتطفل على البيض

هذا ويفترس البيض واليرقات عدة مفترسات منها .

أ - أسد المن *Chrysopa carnea* (Steph)

ب - بقعة الأورس *Oris laevigatus* (Ficth)

ج - أبو العيد نو ١١ نقطة *Coccinella undecimpunctata* L

وكذلك باقى أنواع أبى العيد

لهذا يجب إعطاء الفرصة للأعداء الحيوية للقيام بعملها في الحد من أعداء هذه الآفة دون اللجوء إلى إستخدام المكافحة الكيماوية فيكون ذلك إذا اضطر الأمر لإستخدام المكافحة الكيماوية فيكون ذلك في الوقت الذي لا تكون الأعداء الحيوية فيه نشطة حتى لا تتعرض لخطر إستخدام المبيدات .

وفي المكافحة الكيماوية على الخضر

يمكن إستعمال مبيد السيقين ٨٥٪ بنسبة ٤ في الألف أو الرلدان ٢٢,١٪ بنسبة ٥ في الألف .

## ٩ - دودة درنات البطاطس

*Phthorimaea operculella* (zeller)

سبق ذكر هذه الآفة وكل ما يتعلق بها في آفات البطاطس وهي تصيب جميع خضر  
الفصيلة الباذنجانية ومنها الطماطم حيث تهاجم كلا من المجموع الخضرى والثمار والسوق .

### طرق مكافحة

نفس الطرق المتبعة في مكافحتها على البطاطس .

## ١٠ - دودة ورق السمسم

الاسم العلمى للحشرة *Acherontia atrops* L.

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة فراشات أبى الهول Fam. *Sphingidae*

سبق ذكر هذه الآفة في الجزء الأول من هذا الكتاب في آفات السمسم وتتغذى يرقات هذه  
الحشرة على أوراق السمسم والبطاطا والزيتون والياسمين والبطاطس والطماطم والباذنجان  
واللبلاب والكرنب وغيره من نباتات الفصيلة الصليبية .

### المكافحة

نظرا لكبر حجم اليرقات فإنه يمكن جمعها باليد وإحراقها وليس لهذه الآفة مكافحة  
كيميائية .

## ١١ - ذبابة القطن البيضاء

*Bemisia tabaci* (Gennadin)

تصيب هذه الحشرة نباتات الطماطم كغيرها من محاصيل الخضر، في كثير من الأقطار .

حيث أنها تنقل إلى الطماطم مرض التفاف الأوراق ومرض تجعد الأوراق وهي من الأمراض الفيروسية شديدة الضرر .

### طرق مكافحة

نفس الطرق المتبعة في مكافحة هذه الآفة على محصول البطاطس .

## حصر آفات الطماطم في مصر والتوزيع الموسمي لها

أجرى عند الحى شاهين (١٩٧٧) بحثاً في مصر، حصر فيه أهم الآفات الحشرية التي تصيب الطماطم وتوزيعها على شهور السنة تلخصه فيما يلي :

### ١ - حصر آفات الطماطم في مصر :-

تتعرض الطماطم للإصابة بالحفار *Gryllotalpa gryllotalpa* L.

والدودة القارضة *Agrotis ipsilon* Reut

ومن الخوخ الأخضر ونطاطات الورق *Empoasca discipens* Paoli

وبقعة *Nesidicoris tenuis* Reut.

والذبابة البيضاء *Bemisia tabaci* Genn.

البقعة الخضراء *Nezara viridula* L.

وبودتى ورقة القطن الكبرى والصغرى *Spodoptera littoralis* Bois, *Spodoptera exigua*

وبودة ثمار الطماطم *Heliothis armigera* Hb.

وفراشة درنات البطاطس , *Phthorimaea operculella* Zeller

وحفار ساق الباذنجان *Euzophora osseatella* Treit.,s

والديدان نصف القياسية *Chrysodixis* Hb

والقياسية الكبيرة , *Scopula coenosaria* Luridata ,

نصف القياسية ذات الخط المتعرج *Chrysodixis (Syngrapha) circumflexa* L.

كذلك العناكب والطيور والفيضان.

## ٢ - التوزيع الموسمي لأفات الطماطم في مصر .

يصيب الحفار والدودة القارضة بادرآت الطماطم ونادرا ما تصيب الثمار ويعتبر من الخوخ الأخضر من أهم أنواع المن التي تصيبها طوال العام كثافة متناثرة ويعتبر العليق وعنب الديب من أهم عوائل أما نطاطات الأوراق فأهمها *Empoasca discipens paoli* وتصيبها في الفترة من مايو حتى نوفمبر وتبلغ ذروة الإصابة من أبريل حتى أغسطس أما بقعة *Nesidicoris tenuis* Reut فتصيب النموات الطرفية طوال العام بالغة ذروة الإصابة من أبريل حتى أغسطس أما الإصابة بالبقعة الخضراء فتكون على هيئة أفراد قليلة في أوائل الموسم بون أضرار تذكر ثم تتزايد أعدادها عندما تهاجر أفرادها من نباتات البرسيم والقمح والذرة عندما تجف وتقارب الحصاد من آخر مايو حتى نوفمبر .

تصيب الذبابة البيضاء نباتات الطماطم من أبريل حتى نوفمبر وتبلغ ذروة الإصابة من أغسطس إلى أكتوبر .

تصيب دودة ورق القطن نباتات الطماطم من يونيو حتى نوفمبر وتشتد الإصابة في أواخر يونيو وكذلك أواخر أغسطس حتى أكتوبر .

ويعتبر العليق والملوخية الشيطاني من أفضل العوائل لوضع البيض وتغذية اليرقات .

وتظهر إصابة دودة ثمار القطن متأخرة من أغسطس حتى فبراير وتشتد الإصابة خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر .

تصيب فراشة درنات البطاطس نباتات الطماطم في الفترة من مايو حتى ديسمبر وتشتد الإصابة من يونيو حتى نوفمبر .

أما الديدان القياسية والنصف القياسية فتصيب الطماطم في الفترة من يونيو حتى أكتوبر. والزراعات المتأخرة تشتد إصابتها بكل من الذبابة البيضاء ودودة ورق القطن ودودة ثمار الطماطم .

## الآفات الحشرية التي تصيب الباذنجان

يعتبر الباذنجان من الخضر الشعبية الشهيرة في العالم العربي، وهو يزرع في جميع أنواع الأراضي ويحتاج لجودا في أثناء نموه، لذلك يزرع صيفاً، ويظهر الباذنجان بصور مختلفة ويدخل في الأكلات الشعبية المحلية في كل قطر عربي .

ويصاب الباذنجان أثناء وجوده في الحقل بالعديد من الآفات الحشرية بعضها آفات عامة تصيب الباذنجان وغيره من المحاصيل، وبعضها متخصصة، هذا وسوف نعرض هنا أهم هذه الآفات وطرق السيطرة عليها .

### ١ - الحفارات

#### أ - الحفار العادي *Gryllotalpa gryllotalpa* L

وهو من أهم الحفارات كما سبق أن ذكرنا، ويفضل التواجد في الأراضي الصفراء المسامية والمناطق المجاورة لمصادر المياه، ويبلغ الحفار ذروة نشاطه في شهر مايو حيث يصيب نباتات الباذنجان في ذلك الوقت ويقرض جذور بأوراق الباذنجان تحت سطح الأرض فتذبل النباتات وتموت، وعندما تكون الثمار، قد يصيب منها الموجود قرب سطح الأرض ويحفر فيها فيسبب تعفنها، وتكثر أنفاق الحفار في الأرض المرتفعة الرطوبة .

هذا وقد سبق أن ذكر هذه الآفة بالتفصيل في أكثر من موضوع في هذا الكتاب .

هذا ويشترك مع هذا النوع من الحفارات في إصابة الباذنجان النوعان الآخران وهما :

#### ب - الحفار قصير الأجنحة *Gryllotalpa gryllotalpa* var. *cophta* de Ham

ويوجد هذا النوع في أماكن وجود الحفار العادي وهو يماثله حجما ولونا غير أن جناحه الخلفي أقصر من البطن، ويبدو ذلك عند إنطباقه تحت الجناح الأمامي .

### جـ- الحفار الإفريقي Gryllotlapa africana Pal de Beauv

وهو أصغر من النوعين السابقين ويوجد في المناطق الحارة، ولون الحشرة اليافعة بني مائل إلى الإصفرار .

### مكافحة الحفارات

سبق أن ذكرنا طرق مكافحة الحفارات عند ذكر آفات البطاطس . وتكافح هنا بنفس الطريقة ومن المفيد أن نذكر هنا أن الحفارات اليافعة تتجذب إلى الضوء، ولذلك يمكن وضع مصائد ضوئية في الأماكن الموبوءة بها لجمع الحفارات وإعدامها، وقد قام بعض الباحثين بتجربة استخدام هذه الوسيلة في مكافحة، ولاحظ إنخفاض حدة الإصابة بالحفارات بعد نواام استخدام المصائد الضوئية لمدة ٣ أسابيع - وهذه الطريقة تعد من أحدث طرق مكافحة وأقلها تكلفة مع عدم حدوث أى تلوث بيئي عند استخدامها .

## ٢- النطاطات

رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة Order Orthoptera

فصيلة النطاطات ذات القرون القصيرة والجراد Fam. Acrididae

تحتوى هذه الفصيلة في البلاد العربية على ما يقرب من مائة نوع من أنواع النطاطات ذات القرون القصيرة، ولكن أهمها وأكثرها إنتشارا هي نطاطات البرسيم المتشابهة ونطاطات الأرز، وضررها محدود إلى حد ما - ولكن أحيانا تتزايد أعدادها ويزيد خطرها ونذكر هنا بعض أنواعها :

### أ- نطاط البرسيم Euprepochnemus plorans (Charp)

وتنتشر هذه الحشرة في المناطق المعتدلة الحرارة، وتظهر في حقول البرسيم في شهر

مايو ثم تنتقل منه إلى باقى المزروعات ومنها الباذنجان فى شهر يونيو ويوليو ويستمر وجودها طوال فصل الصيف .

هنا وقد سبق وصف هذه الحشرة فى موضع آخر من هذا الكتاب، ولكن نوجز هنا وصف الحشرة اليافعة.

### الحشرة اليافعة

متوسطة الحجم طول الذكر ٢,٥ - ٣ سم والأنثى ٣,٥ سم - ٤ سم ولون الحشرة العام مائل إلى الصفرة، ويمتد على ترجة الحلقة الصدرية الأولى شريط أسود يصل إلى الرأس ولكن بانفصال واضح بين الرأس والصدر، والنصف الطرفى للجناح الخلفى أكثر شفافية من نصفه القاعدى والعروق الرئيسية فيه ذات لون داكن، ويوجد على الجناح بقع صغيرة أدكن لونا من الجناح نفسه، وساق الرجل الخلفية ذات نصفها القاعدى ذات لون أزرق والنصف الطرفى والرأس لونها أحمر .

#### ب - نطاط البرسيم المتهشبه *Thisioicetrus littoralis* Ramb

وتوجد هذه الحشرة فى نفس الأماكن التى يوجد به نطاط البرسيم، ويتشابه الحشرة اليافعة مع حشرة نطاط البرسيم فى الحجم والشكل ولكن يمكن التفريق بينهما بالشريط الأسود الذى يمتد منها إلى الرأس دون فاصل واضح، كذلك يوجد خط أصفر اللون على كل من جانبيه هنا الشريط الأسود، والجناح الأمامى أغمق لونا من نفس الجناح فى نطاط البرسيم وتظهر عليه بقعه لونها بنى غامق، وبعض أجزاء فخذ الرجل الأمامية ذات لون بنى غامق، والنصف القاعدى فى الساق الخلفية يميل إلى الزرقة .

#### ج - نطاط الأرز *Aiolopus strepens* (Latr)

توجد هذه الحشرة بكثرة فى الواحات والمناطق الصحراوية وتصيب محاصيل عديدة منها الأرز والقمح والشعير والبرسيم الحجازى والقطن محاصيل الخضر ومنها الباذنجان .

والحشرة اليافعة صغيرة الحجم نوعا ما، إذ أن طول الذكر يصل إلى نحو ٢ سم والأنثى

من ٢,٥ - ٣ سم، ولون الحشرة الياقة بني فاتح وأحياناً مائل إلى الخضرة، ويغلب في الجناح الأمامي اللون البني ويقطعه عرضاً مساحتان أو ثلاث صفراء اللون، ويميل لون الجناح الخلفي الشفاف إلى الإخضرار المزرق عند قاعدته والرمادي عند طرفه .

### طرق المكافحة

رغم أن إنتشار هذه الحشرات محدود، إلا إنها قد تتواجد أحياناً بأعداد كبيرة وتحدث أضراراً إقتصادية، يلزم حينئذ اللجوء إلى المكافحة الكيميائية .

وتكافح النطاطات بالطعم السام المكون من مبيد هوستاثيون ٤٠٪ بمعدل التتر للفدان يخلط مع ٢٥ كجم نخالة ناعمة ويضاف إليها تدريجياً ٢٠ لتر ماء ويستمر الخلط حتى تصبح الخلطة متجانسة، وقد يستعمل أى مبيد آخر لتكوين الطعم السام مثل مارشال ٢٥٪ بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان يضاف إلى نفس كمية النخالة والماء مع الحرص على لبس قفازات اليد عند إجراء الخلط، وينثر مخلوط الطعم السام بين خطوط الزراعة وحواف الحقل في الصباح الباكر ويعتبر هذا العلاج علاجاً مشتركاً للنطاطات والجراد والنودة القارضة .

## ٣ - نطاطات الأوراق

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة نطاطات أو قافزات الأوراق Fam. Cicadellidae

كما سبق أن ذكرنا في آفات البطاطس، فإن هذه الآفات تصيب محاصيل الخضر كافة بما فيها الباذنجان، وهي توجد طوال العام ولكن تكثر الإصابة بها في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ومن أعراض الإصابة بها تبقع الأوراق خصوصاً عند الطرف ثم امتداد هذه البقع إلى الداخل ثم تصبح هذه البقع بنية اللون وتنتشر على سطح الورقة كله، وتتجدد الأوراق بعد ذلك وتجف وتسقط، ويوجد من قافزات الأوراق أنواع كثيرة تتشابه كلها في طرق المعيشة ومظهر الإصابة، نذكر منها هنا نطاط أوراق الباذنجان *Orosius albicinctus* Dist.



ونطاطات أوراق البطاطس، وإذا كثرت اعداد هذه الآفات فإنها تسبب ضررا شديدا للمجموع الخضرى للباذنجان.

وتكافح قافزات الأوراق كيماويا باستخدام مبيد أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان - ويعتبر هذا العلاج علاجا مشتركا لكل من قافزات الأوراق والمن والذبابة البيضاء .

#### ٤ - حفار ساق الباذنجان *Euzophora osseatella*

رتبة حرشغية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بيراليدي Fam. Pyralidae

تصيب هذه الآفة خضر الفصيلة الباذنجانية، وقد سبق ذكرها بالتفصيل فى آفات البطاطس ، ويعتبر الباذنجان من أهم عوائل هذه الحشرة، وتتميز الإصابة بوجود ثقب فى الأفرع والسوق وخصوصا الجزء السفلى منها كما تظهر كتل من مواد كالنشارة عبارة عن براز الحشرة مختلطا مع الأجزاء المهشمة فى أباط الأفرع على فوهة هذه الثقوب وتقضى اليرقات بياتها الشتوى داخل السوق المتخلفة عن المحصول أو بقاياها الموجودة فى الأرض .

#### طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة زراعيا وكيمياويا كما سبق أن ذكرنا عند إصابة هذه الحشرة للبطاطس.

#### ٥ - خنفساء الباذنجان البرغوثية

الاسم العلمى للحشرة *Epitrix fuscula* Crotch

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة الخنافس الورقية Fam. Chrysomelidae

تشبه هذه الحشرة خنفساء البطاطس البرغوثية إلى حد كبير، ويصل طولها إلى ٢ - ٢,٥ مم ولونها أسود، وتتغذى هذه الخنفساء على أوراق الباذنجان محدثة بها ثقوبا صغيرة

مستديرة، وعند زيادة أعدادها وإصابتها الشديدة لا للباذنجان تبدو أوراق الباذنجان مثقبة بثقوب كبيرة تشبه ثقوب المنخل أو المصفاة ثم تجف الأوراق وتسقط، وتهاجم يرقات هذه الخنفساء الأجزاء السفلى من نباتات الباذنجان وتتغذى على أوراقها وقد تهاجم الثمار وتحدث بها ثقوبا يدخل منها العفن، وقد تقوم اليرقات المغتذية على الثمار بصنع أنفاق داخل لحم الثمار المصابة .

### طرق المكافحة

تكافح هذه الآفة زراعيًا وكيميائيًا كما سبق أن ذكرنا في مكافحتها على محصول البطاطس.

## ٦ - خنفساء الباذنجان السلحفائية

الاسم العلمي للحشرة *Nuzonia pallidula* (Boheman)

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة السوس Fam Curculunidae

حشرات هذه الفصيلة عبارة عن خنافس صغيرة مفلطحة، وتتميز هذه الخنافس بوجود بروز حافى حول الجسم يعطيها شكل السلحفاة، وتقوم كل من يرقات هذه الحشرة ويوافعها بقرض ثقوب دائرية في أوراق نباتات الباذنجان والبطاطس وتسبب تلفها، والثقوب التي تحدثها اليرقات أصغر من تلك التي تحدثها الحشرات الياقة .

ويبلغ طول الخنفساء الياقة نحو ٥ مم ولونها أخضر مغبر أو أخضر مصفر .

### دورة الحياة والطباع

تقضى خنفساء الباذنجان البرغوثية فصل الشتاء على هيئة حشرات يافعة داخل مخلفات الباذنجان والنباتات الأخرى وتستيقظ من بياتها الشتوى في بداية فصل الربيع، وتضع الأنثى بيضها في مجموعات مكونة من ١ - ٤ بيضات على أجزاء النبات العائل المختلفة وتغطيها بغشاء رقيق، والبيض لونه أبيض أو بنى، يفقس البيض بعد ٤ - ٥ أيام وتخرج منه يرقات مفلطحة لونها أبيض مخضر أو مصفر، وقد يأخذ البيض لون النبات العائل حتى يصبح من

الصعب تمييزه، وتصل اليرقة إلى تمام نموها بعد ١٢ - ٢٠ يوما، ثم تتحول إلى عذراء لامعة تتعلق بالنباتات ومدة الطور اليرقي من ٢ - ٧ في أيام، والحشرة ه أجيال في السنة .

### طرق المكافحة

تكافح الحشرة زراعيا بجمع مخلفات الباذنجان والنباتات الأخرى العائلة لها مثل البطاطس وإحراقها لأن الحشرة تقضى بياتها الشتوى بين هذه المخلفات .

### المكافحة الكيميائية

لم تدخل هذه الآفة ضمن برنامج مكافحة الكيميائية، ولكن إذا اشتد ضررها يمكن الرش بالسيفين ٨٥٪ الجاردونا ٧٠٪ بنسبة ٤٪ .

## ٧ - سوسة الخضر

الاسم العلمى للحشرة *Listroder costirostris obliquus* (Kiug)

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة السوس Fam. Curculunidae

تهاجم هذه الحشرة الباذنجان والبطاطس وغيرها من الخضر، والضرر الذى ينجم عن الإصابة بهذه الحشرة ينشأ من إغذاء الحشرات اليافة عليها، وإذ أن هذه السوسة تقوم بقرض سوق بادران الباذنجان والبطاطس قرب سطح التربة تماما مثل ما تفعل الدودة القارضة .

كذلك تغتذى الخنافس على البزاعم والأوراق وبذلك تقتل النباتات .

والضرر الذى ينشأ من إغذاء يرقات هذه الحشرة على النباتات يشبه ذاك الذى يحدث من إغذاء حشرات اليافة .

## وصف الحشرة اليافعة

يبلغ طول سوسة الخضر من ٩ - ٩,٥ مم، ولونها رمادي معبر مع وجود علامة على شكل حرف ٧ لونها بني فاتح عند حافة كل غمد من أغمدة الجناحين (شكل ٢٩)، وعند إنزعاج السوسة تدعى الموت وتسقط على ظهرها وتضم قرون إستشعارها وأرجلها وتبقى بلا حراك لعدة دقائق، وهذه العادة فضلا عن لونها الرمادي المغبر يجعل من الصعب رؤيتها فوق سطح التربة، وتعيش السوسة اليافعة فترة طويلة قد تصل إلى سنتين .

## دورة الحياة والطباع

تقوم الحشرات اليافعة الإناث بوضع البيض فوق البراعم أو أى جزء آخر من أجزاء النباتات أو فوق سطح التربة، ويقفص البيض بعد ١٥ - ٢٠ يوما، وتقوم اليرقات الصغيرة بالاغذاء على المجموع الخضرى أو جنور النباتات العائلة، ويستغرق فترة نمو الطور نحو ٤٠ يوما، ويبلغ طول اليرقة التامة النمو نحو ١,٧٥ سم وهى إسطوانية مقوسة، وتتحول بعدها اليرقة إلى عذراء داخل شرنقة من الطين فى التربة، وتوجد الشرنقة عادة على بعد ٥ سم فى التربة، ولكن يمكن أن توجد على بعد ١٥ - ٢٥ سم فى التربة، ويستغرق الطور العذرى نحو ١٣ - ١٤ يوما حسب درجة حرارة الجو، ويستغرق فترة الجيل الكامل من ١,٥ - ٤ أشهر - وللحشرة جيل واحد فى العالم .

## طرق المكافحة

١ - تصيب خنفساء الخضر الكثير من العوائل النباتية والتي قد يصل عددها إلى ٤٣ نوعا، ولذلك كانت أفضل طريقة للمكافحة هى حرق مخلفات النباتات وتنقية الحشائش كذلك يجب عدم تعقير الباذنجان، ومن طرق المكافحة الزراعية الناجحة حرث الأرض حرثا عميقا قبل الزراعة وتعرضها للشمس والهواء حتى تهلك العذارى الموجودة بالتربة .

٢ - تهاجم اليرقات طفيل داخلى من رتبة غشائية الأجنحة هو الطفيل *Brachyplecies euli-onis* ويقضى على أعداد كبيرة منها .

٣ - ليس لهذه الآفة حتى برنامج للمكافحة الكيميائية فى مصر، ولكن إذا اشتد ضررها

يمكن الرش بالملاثيون ٥٧٪ بنسبة ٠,٢٥٪ أو أي مبيد مناسب آخر، مع ملاحظة أنه يجب عدم جمع المحصول أو عرضه للبيع قبل مضي ٧ أيام على الأقل من المعاملة بالمبيد .

## ٨ - بق الهبّكس الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة *Maconillicoccus hirsutus* (Green)

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة البق الدقيقى Fam. *Pseudococcidae*

تنتشر هذه الآفة على أشجار المانجو والجوافة والعنب والموالح وثمار القشدة والتوت والنبق والسنط واللبخ والهبّكس، كما تصاب أيضاً نباتات القطن والتيل واليامية والفلّ السوداني والباذنجان ويتسبب من الإصابة بهذه الحشرة تضخم الفريعات المصابة وتوقف نموها ويكثر نمو الفطر الأسود، عليها، وتشتد الإصابة به فى نهاية الصيف والخريف وأوائل الشتاء .

أعراض الإصابة يوضع البيض فى مجاميع مكونة من ٦٠ - ٣٠٠ بيضة داخل أكياس من خيوط متماسكة، ويوضع البيض على سوق النباتات وفروعها وبين شقوق القلف التى تؤوى إليها الإناث لوضع بيضها ثم تموت، والبيض لونه أحمر قرنفلى، أما الحشرة اليافعة فجسمها بيضاوى ولونها أيضاً أحمر قرنفلى .

### طرق مكافحة

تكافح هذه الحشرة زراعياً بتقليم الأفرع المصابة وحرقها، ومن الأعداء الحيوية النشطة لهذه الحشرة طفيل من غشائيات الأجنحة هو *Heptowastix phenacocci* ومن المفترسات *Cryp-tolaemus montrouzeiri*.

## الآفات الحشرية التى تصيب الفلفل

تنتشر زراعة الفلفل فى كافة الاقطار العربية، ويحتاج هذا النبات لجو معتدل ولا يتحمل البرد، وتوجد منه أصناف عديدة منها ذات الثمار العادية وذات الثمار الحريفة، ويعتبر الفلفل

من الخضر الشعبية الشهيرة، ويصاب أثناء نموه بأفات حشرية عديدة سبق لنا ذكرها عند ذكر آفات البطاطس والطماطم والباذنجان، ففي بداية نموه تصاب النباتات الصغيرة بحشرات التريبس والمن ثم الذبابة البيضاء ونطاطات الأوراق، ويصاب بعد ذلك ببديدان ورق القطن العادية والخضراء، وكذلك يصاب الفلفل بدودة ساق الباذنجان ودودة درنات البطاطس، وتعرض الفلفل أكثر من غيره للإصابة بالذبابة البيضاء ونطاطات الأوراق، ولذلك يعتبر المصدر الأساسي لإصابة الطماطم بمرض تجعد الأوراق عند تجاور زراعتها .

وتوصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة كل من الذبابة البيضاء والمن ونطاطات الأوراق التي تصيب الفلفل بالرش بمبيد أكتليك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان يضاف إليها ٤٠٠ لتر ماء، وقد يكرر الرش عند تكرار الإصابة ولكن يجب أن يوقف الرش قبل جمع المحصول بمدة أسبوعين على الأقل أما باقى الآفات الحشرية الأخرى، فتعالج بما سبق ذكره من وسائل المكافحة الكيميائية إذ يشتد ضررها مع ملاحظة أن ثمار الفلفل تجمع على فترات قصيرة لذلك يجب الاحتراس من استعمال المبيدات، وألا تستعمل إلا عند الضرورة القصوى وقبل الإثمار، وإذا استخدم أى منها بعد الإثمار فيراعى عدم جمع المحصول وتسويته إلا بعد مرور مدة أقلها أسبوعين بعد المعالجة حتى لا تتعرض صحة المستهلكين للخطر .

## الآفات الحشرية التي تصيب الخضر البقولية

## الآفات الحشرية التي تصيب الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا من محاصيل الخضر البقولية الهامة الغنية بمحتواياتها البروتينية، وتستهلك قرون الفاصوليا الخضراء في الأسواق العربية المحلية، كما تجمد وتعبأ وتصدر للسوق الخارجية، أما الحبوب الجافة فتعتبر من البقول المرغوب فيها في كل مكان، وتتعرض الفاصوليا للعديد من الآفات الحشرية - بعضها آفات عامة تصيب الفاصوليا وغيرها من المحاصيل، وقد سبق ذكر هذه الآفات بالتفصيل في هذا الكتاب والطرق المختلفة لمكافحتها، لذلك سوف نذكر هذه الآفات هنا بإيجاز .

### ١ - الحفار والدودة القارضة

تصاب الفاصوليا بهاتين الآفتين بمجرد ظهور البادرات، ومن المعروف أن الفاصوليا تزرع في مصر في ثلاث عروات على مدار العام وهي : -

العروة الصيفية وتزرع في الأسبوع الأخير من أغسطس والأسبوع الأول من سبتمبر .  
والعروة الشتوية وتزرع في خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بذلك فبادرات العروة الصيفية أكثر تعرضا للإصابة بالدودة القارضة وكذلك بادرات العروة الشتوية .  
أما العروة النيلية فبادراتها أكثر تعرضا لهجوم الحفار وعند حدوث إصابة بهاتين الآفتين، يستعمل الطعم السام في مكافحتها، ويتركب الطعم العام السام من مبيد هو ستاثيون ٤٠٪ بعدل ١,٢٥ لتر للفدان يخلط مع ١٥ كيلو جريش ذرة في حالة الإصابة بالحفار، ويستبدل جريش الذرة بالنخالة الناعمة في حالة الإصابة بالدودة القارضة يضاف إليها ٢٠ - ٣٠ لتر ماء .

### ٢ - المن

تصاب الفاصوليا بمن البقوليات كما تصاب بمن القطن، وقد تشدد الإصابة وتنزل بالنباتات



أضراراً جسيمة، وعند ظهور أفراد المن على النباتات، يوصى برش المجموع الخضرى بمبيد البريمور ٥٠٪ بمعدل ٣٠٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء أو ترش بمبيد ملاثيون ٥٧٪ بمعدل ١,٥ لتر / ٤٠٠ لتر ماء أو مبيد أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر / ٤٠٠ لتر ماء أو بمبيد توكوثيون ٥٠٪ بمعدل ١,٢ لتر / ٤٠٠ لتر ماء، وهذه المقادير تستعمل في معالجة فدان واحد .  
ويوصى بعدم ترك المن دون علاج حتى لا يكون مستعمرات ويفرز المادة العسلية ويصعب بعد ذلك مكافحته .

### ٣ - الذبابة البيضاء ونطاطات الأوراق والتربس

تصاب الفاصوليا بهذه الآفات الثلاث وتنزل بها أضرار جسيمة، وعند ظهور أفراد من الذبابة البيضاء أو التربس أو نطاطات الأوراق، يرش المجموع الخضرى بمبيد أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر / ٤٠٠ لتر ماء للفدان وذلك في العروة النيلية، ويجب أن يصل محلول الرش إلى السطح السفلى للأوراق .

### ٤ - أبو دقيق البقوليات أو دودة قرون البقوليات

الاسم العلمى للحشرة . *Lampides boeticus* L.

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera


فصيلة هسبرييدي Fam. Hesperidae

تتغذى يرقات هذه الحشرة على الحبوب غير الناضجة في قرون الفاصوليا واللوبيا والفول الرومى والترمس .

#### وصف الحشرة اليافعة

(شكل ٣٠) : وتبلغ نحو ١,٢ سم فى الطول، ٣,٤ سم فى العرض بعد فرد الأجنحة منبسطة على الجانبين، ولونها أزرق قرمزي من السطح العلوى ، وتوجد على الزاوية الخارجية لكل من الجناحين الخلفيين بقعتان سوداوان قطيفتى المظهر وكل منهما محاطة بدائرة لونها

أزرق فاتح، كما يوجد على نفس الزاوية ذيل رفيع أسود بطرف مبيض، ولون السطح السفلى للأجنحة والجسم رمادي بني بخطوط بيضاء متموجة مع شريط أبيض جهة الحافة الخارجية للأجنحة، وعلى الزاوية الخارجية الخلفية بقعتان سوداوان ولكن حول كل منها دائرة أخرى لونها أزرق معدني.



(شكل ٣٠) أبو دقيق البقوليات

### دورة الحياة :

تضع الإناث الملقحة بيضا مستديرا لونه أبيض مصفر ثم يصبح رماديا قرب الفقس، وعلى القشرة من الخارج تضاريز شبكية أو بنية حمراء مع وجود شريط غامق في وسط الجسم من السطح العلوي بخطوط مزبوجة مائلة على الجانبين وخط أبيض أسفل الثغور التنفسية الصفراء الموجودة على كل جانب، العذراء لونها أحمر أو أصفر وعليها نقطة بنية، وتتصل العذراء بالنبات العائل برباط حريري حول وسطها، وتوجد العذراء بين الأوراق الملتفة.

### طرق مكافحة : -

١ - جمع اليرقات قبل دخولها القرون وإعدامها.

٢ - إذا وجدت بكثرة ترش النباتات قبل دخول اليرقات إلى القرون بالسفين أو الجاربونا بنسبة ٤٪ .

## ٥- ذبابة الفاصوليا

الاسم العلمي للحشرة (*Melanogromyza phaseoli* (Tryon)

رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة الذباب صانع الأنفاق Fam. Agromyzidae

شوهدت هذه الحشرة لأول مرة بجمهورية مصر العربية عام ١٩٣٥ على اللوبيا، وتوجد هذه الذبابة الآن في جميع المناطق ابتداء من الاسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا، وتصيب خلاف اللوبيا والفاصوليا (وهما شديداً التآثر بالاصابة بهذه الذبابة) وفول الصويا، وأظهرت أبحاث أبو النصر وعاصم (١٩٦١) أن صنف الفاصوليا ومنث كالم، هو من الأصناف المقاومة للإصابة وتصاب العروة النيلية بشدة عن العروتين الشتوية والصيفية .

وتصاب اللوبيا والفاصوليا وفول الصويا بذبابة الفاصوليا بمجرد انباتها وظهور أول ورقة خضرية وتستمر الاصابة حتى جمع المحصول ولو أن الاصابة في البادرات تكون شديدة لأن أنسجتها غضة ويتقدم النباتات في النمو فإنها تصاب بقلة وعند اصابتها وموت بعض فروعها فإنها تجدد غيرها وتستمر في النمو . وتتميز النباتات المصابة بذبولها واصفرار وتلف أنسجتها ووجود مجاميع من اليرقات والعذارى تحت بشرة الساق مباشرة ووجود انتفاخات بين الجذور والساق وعند قواعد الأوراق تحتوى على اليرقات والعذارى .

ويلاحظ أن عدد اليرقات في النباتات له تأثير في الضرر الذي تحدثه هذه الآفة ففي بعض النباتات التي تبدو سليمة ظاهرياً يمكن ملاحظة اليرقات فيها بعد قليل، أما النباتات الشديدة الاصابة فقد لوحظ في ساقها نحو ٣٠ يرقة وعذراء وتؤثر الاصابة تأثيراً سيئاً على المحصول فيقل تكوين القرون أو ينعدم وتكون الحبوب المتكونة ضامرة صغيرة الحجم وتصيب النباتات سهلة الكسر.

### الحشرة اليافعة :

ذبابة صغيرة الحجم إذ تبلغ في الطول نحو ٢,٢ مم في الذكر ١,٩ مم الأنثى ولونها أسود لامع عدا الأرجل وقرون الاستشعار وعروق الأجنحة فلونها بني فاتح . (شكل ٣١) .

## دورة الحياة :

تشاهد الحشرات اليافعة بأعداد كبيرة عند الغروب وفي الصباح الباكر على السطوح العلوية للأوراق وتختفي أثناء النهار هرباً من أشعة الشمس . وتضع الأنثى بيضها فردياً تحت بشرة الوريقات السفلى . والبيضة بيضاوية الشكل وتبلغ نحو ٠,٣٧ مم في الطول، ٠,١٧ مم في العرض وعلى قشرتها من الخارج تضاريز شبكية ويفقس البيض بعد نحو ٢ - ٤ أيام إلى يرقات صغيرة تسير بين بشرتي الأوراق العليا والسفلى صانعة أنفاقاً فضية اللون تؤدي إلى العروق الوسطى للورقة ثم إلى عنقها وتتسرب منها إلى الفروع ثم إلى الساق الذي تسير فيه حتى نقطة إتصالها بالجنور عند سطح التربة تقريباً حيث تستمر اليرقات في التغذية وتبقى إلى أن يتم نموها . ولليرقة ٣ أعمار واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ٣ مم في الطول وتحمل زوجاً من الثغور التنفسية على كل من الحلقة الصدرية الأولى والحلقة البطنية الأخيرة، وتبلغ مدة طور اليرقة نحو ٧ - ٨ أيام عند درجة حرارة ٢٠، ١٢ - ١٣ يوماً عند درجة حرارة ٢٣م، ١٢ - ١٥ يوماً عند درجة حرارة ١٩م . وتعذر اليرقات في مكان الأورام الموجودة عند قاعدة الساق أو بالتربة حول أو عند اتصالها بالساق وتكون قواعد الأوراق عندئذ منتفخة أيضاً وذات لون أسود يسيل كسرهما . والعذراء المستورة تبلغ نحو ٢,٣ مم في الطول، ولونها مصفر في بادئ الأمر ثم يغمق اللون بالتدرج حتى يصبح بنياً غامقاً قبل خروج الذبابة اليافعة مباشرة، ويوجد بالعذراء أيضاً زوج من الثغور التنفسية عند كل من مقدمتها ومؤخرتها، وتبلغ مدة طور العذراء نحو ٨ - ٢٢ يوماً، والنسبة الجنسية ١:١ ولهذه الحشرة ١٢:١٠ جيلاً متداخلاً في السنة من منتصف يونيو حتى أوائل سبتمبر يستغرق مدة الجيل الواحد نحو ١٩ يوماً من يونيو حتى سبتمبر ٢١-٢٧ يوماً من نهاية سبتمبر حتى أوائل ديسمبر، ٢٦ - ٤١ يوماً ، ولم تشاهد أي إصابة بذبابة الفاصوليا من نهاية يناير حتى أول يونيو .

## المكافحة :

### أولاً : المكافحة الزراعية

١ - التبكير بالعزقة الأولى مع الردم حول النبات والتبكير في رية المحاية لتشجيع نمو جنور عرضية كثيرة والتسميد الجيد بالأسمدة الكيماوية لتقوية النباتات والعناية بالعمليات الزراعية الأخرى المختلفة ونقاوة الحشائش .


٢ - الزراعة على جانب واحد من الخطوط لتسهيل خدمة الأرض .

٣ - تقليب النباتات المصابة وإعدامها حرقا بما فيها من حشرات، وإعدام العروش الجافة بعد جمع المحصول لاحتوائها على كثير من العذارى ثم عزق الأرض وتركها للتشميس لقتل ما قد يوجد من العذارى في التربة .

### ثانيا - مكافحة الكيماوية

تعتبر مكافحة هذه الحشرة وقائية أى تجرى قبل ظهور الإصابة خصوصا في العروة النيلية، ويجب إجراؤها بعد ظهور النباتات فوق سطح الأرض مباشرة لأن العلاج لا يجدى متى أصيبت الفاصوليا إلا في إيقاف الإصابة الجديدة .

وتكافح الحشرة برش النباتات بالدائى مئويت ٤٠٪ بنسبة ١٥ ، ٠٪ وتجرى الرشة الأولى بمجرد الإنبات ثم يكرر الرش ثلاث مرات بين الرشة والأخرى نحو ١٢ - ١٥ يوما مع إيقاف الرش بمجرد تكوين القرون لتفادى أى أثر سام لهذه المادة .



(شكل ٣١): ذبابة الفاصوليا

## الآفات الحشرية التي تصيب البازلاء (البسلة)

تصاب البازلاء مثل غيرها من البقوليات بالعديد من الآفات الحشرية - منها آفات عامة تصيبها وتصيب غيرها من المحاصيل، وقد سبق ذكر كل ما يخص هذه الآفات وطرق مكافحتها بالتفصيل، ومن الآفات العامة ما يلي :

التريس والذبابة البيضاء ومن البقول ونطاطات الأوراق والبودة القارضة وبودة ورق القطن وبودة قرون البقوليات والديدان نصف القياسية.

ويتبع في مكافحة هذه الآفات ما ذكر عن مكافحتها على المحاصيل الأخرى أما الآفات التي تختص بإصابة البازلاء وبعض البقول فمنها :

### ١- ذبابة أوراق البازلاء

الاسم العلمي للحشرة *Phytomyza atricornis* Mg


رتبة زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة الذباب صانع أنفاق الأوراق Fam. Agromyzidae

تصنع يرقات هذه الذبابة أنفاقاً خيطية في أوراق وقرون البازلاء وكذلك في أوراق البرسيم والجعشيض وأغلب النباتات ذات الفلقتين والكثير من نباتات الزينة وخاصة الكريزانتيم والسفاريا والحشائش ونباتات البيوت المحمية، وتعذر اليرقات غالباً داخل الأنفاق على أى سطح من سطح الورقة حيث يوجد النفق. وتنتشر هذه الذبابة في الوجه البحرى أكثر منه في الوجه القبلى حيث أنها تفضل الجو المعتدل والرطوبة العالية.

## الحشرة اليافعة

(شكل ٣٢): تبلغ نحو ٢ مم في الطول، ٦ مم في العرض بعد فرد الأجنحة منبسطة على الجانبين، لونها غامق والأرجل بنية وقرون الاستشعار وعروق الأجنحة وجبهة الرأس لونها أصفر .



١ - يرقة ٢ - حشرة يافعة  
(شكل ٣٢) ذبابة أوراق البازلاء

## اليريقة

(شكل ٣٢) : تبلغ عند تمام نمو ٢,٥ مم في الطول ولونها أبيض مصفر .

## المكافحة:

### أولا : المكافحة الحيوية

يتطفل على العذارى الطفيليات، الآتية وكلها من رتبة غشائية الأجنحة Hes Aphidins ervi, Haidipuis Sp, Chrysocharis Sp, (Braconidae) وهي من فصيلة (Eulophidae) وهي من

### المكافحة الكيميائية

كما في ذبابة الفاصوليا.

## ٢ - من البازلاء

الاسم العلمي للحشرة *Macrosiphum pisi* (Herris)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة المن Fam. Aphididae

يصيب هذا المن الفول والفاصوليا واللوبياء والبسلة والبرسيم والطماطم، وبجانب إمتصاصه لعصارة النباتات فإنه يفرز إفرازات سامة بداخلها وينقل لها أمراض الفيروس (متكالف وقلنت ومتكالف، ١٩٦٢).

هذا النوع من المن كبير إذ يبلغ نحو ٤ مم في الطول، ولونه العام أخضر والأعين حمراء وتحاط العيون البسيطة بمنطقة سوداء ولون العلقتين القاعدتين من عقل قرن الاستشعار أخضر بينما باقى العقل لونها أمسمر قاتم، ويبلغ طول الجزء الطرفى من العلقة النهائية (السادسة) من عقل القرن أكثر من ٣ أمتار أمثال طول الجزء القاعدى لنفس العلقة.

لون الخرطوم أخضر ولكن نهايته الطرفية فقط سوداء وتحمل ٤ شعيرات ثانوية .





(شكل ٣٣) من البازلاء إلى اليمن  
فرد مجنح. إلى اليسار - فرد غير مجنح

### المكافحة الكيميائية

عند ظهور إصابة بهذا المن ترش النباتات بمبيد ملاثيون ٥٧٪ بمعدل الترش للفدان أو أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٢ لتر للفدان تضاف إلى أى منها ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء، ويوقف الرش قبل جمع القرون الخضراء بمدة ١٥ يوما - وتحد مكافحة المن من الإصابة بالأمراض من الفيروسية .

## الآفات التي تصيب اللوبيا

تصاب اللوبيا بنفس الآفات الحشرية العامة التي تصيب الفاصوليا والبازلاء، وتتبع نفس الطرق في مكافحتها ولكن هناك آفة تختص بإصابة اللوبيا وعدد من المحاصيل البقولية الخضراء وهى دودة قرون اللوبيا وفيما يلي شرح لهذه الآفة .

## دودة قرون اللوبيا

الأسم العلمى للحشرة *Etiella zinckenella* Tr

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بيراليدي Fam. Pyralidae

تنتشر هذه الآفة فى كثير من بلدان العالم، فتوجد فى الولايات المتحدة وشرق أفريقيا

وتصيب هذه الحشرة فاصوليا الليما وفاصوليا السيفا واللوبياء واللبلاء ونبات الرتما Spar-tium lanceum ونبات *Madurensis crotalarala* في جميع المحافظات ولو أن الإصابة في الوجه القبلي أخف منها في الوجه البحري . ولا تصاب قرون البسلة والترمس والفل والبقول السوداني والفاصوليا العادية . وتتغذى اليرقات حديثة الفقس في مبدأ التزهير على البراعم الزهرية والقرون الصغيرة فتسبب تساقطها ، أما القرون الكبيرة فتتحمل الإصابة ولا تسقط حيث تدخلها اليرقات للتغذية على حبوبها ، وعند اكتمال نمو اليرقات وكثرة برازها داخل القرن تظهر بقع رمادية على السطح الخارجى للقرن ويصبح لبنا كريه الرائحة نتيجة لتعفن محتوياته .

هذا ، ولقد وجد أبو النصر وعوض (١٩٥٧) أن نسبة الإصابة في القرون الخضراء للوبياء نحو ١,٦٪ في منطقة بهتيم بجوار القاهرة ، ٤٣٪ في منطقة الجيزة في الزراعة النيلي ، كما أن كمية الفقد الحقيقي نتيجة للإصابة في الحبوب الجافة للوبياء وفاصوليا الليما في منطقة الجيزة في الزراعة النيلي كانت ٣٩,٥٪ ، ٦٢٪ على التوالي .


## الحشرة اليافعة

(شكل ٢٤) : تبلغ نحو ١,٥ - ١,٨ سم في الطول ، ٢,٤ - ٢,٧ في العرض عند فرد الجناحين منبسطين ، ولونها رمادي على الحافة الأمامية للجناح الأمامي شريط عريض أبيض اللون وعند الربع القاعدي لنفس الجناح يوجد شريط مصفر ، والجناح الخلفي رمادي اللون ولكن حافته الخارجية بنية وتمتد الملامس الشفوية أمام الرأس على شكل خرطوم طويل وعند عدم الطيران تقف الفراشة كوقف الحمامة رافعة الرأس والصدر وتاركة البطن ونهاية الأجنحة تلمس السطح الواقفة عليه ، ويميز الذكر عن الأنثى بأن العقلة الثانية من شمروخ قرن الاستشعار في الذكر طويلة ومقوسة نوعا ومزودة بخصلة من الشعر على جهتها الداخلية ، كما أن الملمسين الشفويين في الأنثى يكونان ممتدين أمام الرأس عند الراحة على شكل حرف ٧ في حين أنهما يكونان مضمومين في الذكر بدون وجود مسافة بينهما .

## دورة الحياة :

يحدث التزاوج بعد ٤٢ - ٢٠ ساعة من خروج الفراشات العذارى ثم تضع الأنثى البيض

على قرون اللوبيا أو الفاصوليا الليما في منطقة الكأس أو على أى جزء من القرن. يوضع البيض فردياً أو في مجموعات صغيرة بعد خروج الأنثى من العذارى بنحو ٣ - ٦ أيام صيفاً، ١٥ - ٢١ يوماً شتاً . والبيضة بيضاوية الشكل، ولونها أبيض عند أبتداء وضعها ثم تحمر بعد ١ - ٢ يوم ثم تصبح برتقالية غامقة قبل الفقس مباشرة، وعلى سطح القشرة من الخارج تضاريز هرمية الشكل تشبه القشور الموجودة على سطح ثمرة الأناناس .



(شكل ٣٤) فراشة دودة قرون اللوبيا

وتتجول اليرقات الحديثة الفقس على القرن لفترة قصيرة تثقب بعدها جلد القرن لتصل إلى الحبوب حيث تتغذى عليها . ولليرقة ٥ أعمار، ويسغرق طور اليرقة نحو ١٠ - ١٧ يوماً . واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ١,٥ - ١,٨ سم في الطول ولونها رمادي فاتح أو سمى وعليها أربعة خطوط طولية واضحة قرمزية اللون .

وتخرج اليرقة التامة النمو عن طريق ثقب عمله بجلد القرن وتسقط على الأرض وتعذر في التربة على عمق ٢ - ٥ سم داخل شرنقة من حبيبات التربة المتماسكة بخطوط حريرية . والعذارى المكبلة تبلغ نحو ٠,٨ - ١ سم في الطول، ولونها أخضر فاتح في مبدأ الأمر ثم تتحول بعد ساعات قليلة إلى البني الفاتح نحو ٣ أسابيع .

ولهذه الحشرة ٨ أجيال في السنة في المعمل، أما في الحقل فتتداخل هذه الأجيال على العوائل المختلفة، ففي الشتاء تمضى الحشرة جيلاً أو جيلين على اللبالب وفي الربيع تنتقل إلى اللوبيا ونبات الرتما وفاصوليا الليما الصيفية وتمضى عليها جيلين، ثم تنتقل بعد ذلك إلى

اللوبياء وفاصوليا الليما النيلية النيلية وتمضى عليها ٣ أجيال حتى شهر نوفمبر حيث تنتقل إلى اللبالب ثانيا وهكذا .

## طرق المكافحة

أولا المكافحة الزراعية : -

١ - ينصح بزراعة اللوبياء وفاصوليا الليما فى العروة الصيفية لتفادى شدة الإصابة على العوائل البرية مثل اللبالب والرتما .

٢ - عزق الأرض حول النباتات لتعريض الشرائق للعوامل الجوية أو دفنها فى التربة .

٤ - إحراق القرون المتبقية على النباتات بعد جمع المحصول لإعدام ما تحويه من يرقات .

## ثانيا المكافحة الحيوية

يتطفل على يرقات هذه الحشرة الموجودة فى القرون زنبور البمبلا وذلك فى نهاية موسم الزراعة النيلية فى أواسط شهر نوفمبر.

## المكافحة الكيميائية

ترش النباتات بمادة السيفين القابل للنيل بمعدل ١,٥ كجم للفدان يضاف إليها ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء عند ظهور الإصابة بدودة قرون اللوبياء وذبابة الفاصوليا ودودة ورق القطن ومجموعة الآفات الثاقبة الماصة ويوقف الرش قبل الجمع بأسبوعين .

## الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة الصليبية

## الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة الصليبية

خضر الفصيلة الصليبية هي الكرنب (الملفوف) والقرنبيط والفجل (البقل) والجرجير واللفت، وكل هذه الخضر تعد من أهم أنواع الخضر الشعبية التي تحظى بأولية كبيرة في العالم العربي وتشتهر بها الأكلات الشعبية، وتصاب خضر هذه الفصيلة بآفات حشرية متعددة منها آفات عامة تصيبها كما تصيب غيرها من الخضر ومنها ديدان ورق القطن والديدان القارضة والديدان السلكية والحفار والديدان نصف القياسية والخنفساء والبرغوثية وقد سبق لنا تناول هذه الآفات جميعا بالتفصيل في هذا الجزء من الكتاب وشرح طرق مكافحتها ، ولكن توجد آفات أخرى تصيب الصليبيات بصفة أساسية وربما أصابت غيرها من خضر الفصائل الأخرى، وسوف نعرض لهذه الآفات بالتفصيل فيما يلي :

### ١ - من الصليبيات أو من الكرنب

الاسم العلمي للآفة *Brevicoryne brassicae* (L)

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homptera

فصيلة المن Fam. Aphididae

لون الجسم العام أخضر ويغطي بافرزازات بيضاء، وتبلغ النهاية الطرفية الرفيعة للعقلة السادسة من عقل قرن الاستشعار ما يعادل ٢,٧ طول الجزء القاعدي لنفس العقلة وتحمل

العقلة الطرفية من الخرطوم ٨ شعيرات ثانوية، كما تحمل العقلة القاعدية من عقل رسغ الرجل الخلفية ٣ شعيرات، وتوجد صفائح مستعرضة سوداء على ترجات الحلقات البطنية .

ويصيب هذا النوع من المن محصول الكرنب والقرنبيط وغيرها من خضر الفصيلة الصليبية، وإذا اشتدت الإصابة بلوراق الكرنب، يزيد إفراز المادة العسلية التي تنمو عليها الفطريات وتتجمع عليها الأتربة ويقل حجم رعوس الكرنب ، وإذا أصاب القرنبيط يضمحل حجم الرعوس وتصبح غير قابلة للتسويق .

### المكافحة الكيميائية

عند ظهور الإصابة يرش الكرنب أو القرنبيط بمبيد الملاثيون ٥٧٪ ١ لتر للفدان، أو بريمرور ٥٠٪ بمعدل ٧٥٠ جم للفدان أو أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٢ لتر للفدان يضاف إلى أى منها من ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء ويوقف العلاج قبل الجمع بأسبوعين على الأقل .

## ٢- ذبابة القرنبيط البيضاء

الاسم العلمى للحشرة *Aleyrodes porletelli* LS

رتبة الحشرات المتشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الذباب الأبيض Fam. Aleyrodidae

توجد حوريات وعذارى هذه الحشرة ملتصقة بالأسطح السفلى لأوراق القرنبيط وغيره من خضر العائلة الصليبية .

والفول والشيكروريا والجعضيض، والعذراء لونها رمادى .

### دورة الحياة :

وتتكاثر هذه الحشرة بكريا وجنسيا ويفقس البيض بعد نحو ١٣ يوما (على درجة حرارة ١٥ ورطوبة نسبية ١٠٠٪) وللحورية ٤ أعمار مددها على التوالي هي : ٦ ، ٤ ، ٥ ، ٩ يوما (على درجة حرارة ١٦,٨م ورطوبة نسبية ١٦,٥٪) والثلاثة أعمار الأولى هي ما تسمى باليرقة والعمر الرابع والآخر هو ما يسمى بالعذراء . هذا ولقد وجد أنه فى حالة التكاثر البكرى تكون جميع الأفراد الناتجة من الذكور فقط .

## المكافحة :

- ١ - وجد أن الطفيل *Encarsia partenopea* (وهو نفس الطفيل الذي يتطفل على ذبابة الرمان البيضاء) يتطفل على ذبابة القرنبيط البيضاء .
- ٢ - تكافح كياويا كما في ذبابة القطن البيضاء .

## ٣ - حفار ساق الكرنب *Hellula undalis* F.

ربطة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بيراليدي Fam Pyralidae

تكثر هذه الحشرة في المناطق الشمالية من الدلتا حيث تصيب نباتات العائلة الصليبية وعلى الأخص الكونب والقرنبيط واللفت والفجل والجرجير والخردل وذلك بالمشتل وبالأرض المستديمة، وتعتبر الفترة من مايو حتى يناير هي فترة إنتشار هذه الآفة . وتتغذى اليرقات على أعناق الأوراق وسيقان النباتات وجذورها صانعة أنفاقا بالأجزاء المصابة، وتشاهد اليرقات متقلبة فوق سطح التربة من نبات إلى نبات وتنسج خيوطا حريرية تثبت بها نفسها على النباتات وأحيانا تنسج نسيجا كثيفا من ورقتين متقابلتين لتعيش بداخله وتخرج منه للتغذية ثم تعود إلى هذا النسيج ثانية .

## الحشرة اليافعة :

تبلغ نحو ١سم عند فرد الأجنحة منبسطة على الجانبين، ولونها بني، والأجنحة الامامية بها خطوط متعرجة موزاية للحافة الخارجية بيضاء اللون، والأجنحة الخلفية مبيضة، وعلى الحواف الخارجية والخلفية للأجنحة الامامية والخلفية أهداب (شكل ٢٥).

## دورة الحياة :


تنشط الحشرة اليافعة ليلا وخاصة قرب منتصف الليل، وبعد التزاوج تضع الأنثى الملقحة



حوالى ٥٠ - ١٠٠ بيضة وذلك بعد خروجها من العذراء بنحو ٦ - ١٢ ساعة، والبيض يوضع فرديا أو فى مجموعات غير منتظمة أو على هيئة سلاسل، وذلك على عروق الأوراق أو على بروزات سيقان النباتات، والبيضة بيضاوية الشكل بالتدريج قرب الفقس وعلى قشرتها من الخارج تضاريز شبكية .

يفقس البيض بعد ٣ - ٤ أيام فى الصيف والخريف، وتخرج منه يرقات صغيرة طولها نحو ١ مم تتغذى بعمل أنفاق فى أعناق الأوراق أو سوق النباتات أو جذورها مع نسجها للخيوط الحريرية، واليرقة التامة النمو طولها نحو ٢ سم ولونها بنى وعليها خطوط طولية متوازية غامقة، ويبلغ طول مدة الطور اليرقى ١٥ - ١٦ يوما فى الصيف والخريف .

وتنتشر أفراد هذه الفصيلة فى المناطق الإستوائية، وتوجد فى المناطق الأخرى بأعداد قليلة .



(شكل ٣٥) حفار ساق الكرنب

#### المكافحة الكيميائية

ترش نباتات الكرنب فى المشتل بمجرد الإنبات رشتين بينهما أسبوع بمبيد جاربونا ٧٠٪ بمعدل ٢ لتر للفدان يضاف إليها ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء ويراعى إنتخاب الشتلات السليمة قبل نقلها للحقل .

ويعتبر الرش بالجاربونا علاج مشترك ضد دودة ورق القطن ودودة ورق الكرنب والديدان النصف قياسية على أن يوقف الرش قبل جمع المحصول يمده أسبوع على الأقل .

## ٤- أبو دقيق الكرنب الصغير

الاسم العلمي للحشرة *Pieris rapae* EL.

رتبة الجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بييريدى Fam. Pieridae

وهي من الحشرات المهاجرة إذ تهاجر بأعداد كبيرة جدا من أوروبا إلى الجزر البريطانية [وليامز، ١٩٣٦] - وقد ذكر أنها توجد في المملكة العربية السعودية وتسمى هناك [سرو الملفوف] وتظهر في الخريف أحيانا في الشتاء على المناطق الساحلية .


وفي جمهورية مصر العربية توجد هذه الحشرة منتشرة من أسوان جنوبا حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا ولو أن أعدادها تقل كلما اتجهنا جنوبا ونقل أعدادها خلال أشهر الصيف، ويزداد نشاطها وتكاثرها إبتداء من شهر سبتمبر وأكتوبر، ويزداد نشاط الحشرة اليافة من الصباح إلى المساء وتطير إلى مسافات طويلة .

وتصيب الكرنب بجميع أنواعه والقرنبيط والمستردة واللفت والبنجر والفجل البلدي والأحمر والخس والحشائش الشتوية التابعة للعائلة الصليبية .

وتقرض اليرقات حواف الأوراق الأولى من النباتات المصابة بصورة منتظمة، كما تتغذى اليرقات أيضا على الطبقة السطحية من ساق الكرنب أو القرنبيط، ويشاهد براز اليرقات بكثرة في أباط الأوراق ولقد قدر مقدار الضرر الناتج عن هذه الحشرة بحوالى ٢٠٪ من المحصول.

### الحشرة اليافة

لونها أبيض، المساحة بين طرفي الجناحين منبسطين نحو ٥ سم، والجزء المجاور للزاوية الأمامية في الجناح الأمامي أسود اللون وعلى نفس الجناح من السطح العلوى في الذكر بقعة واحدة سوداء وفي الأنثى بقعتان (شكل ٣٦).



(شكل ٣٦) أبودقيق الكرنب الصغير

١ - أبودقيق ٢ - بيضة ٣ - يرقة

### دورة الحياة:

بعد خروج الفراشات في العذاري بيوم واحد تقريبا تبدأ عملية التزاوج بنحو ٢ - ٤ أيام شتاء و١ - ٧ أيام صيفا، ويوضع البيض في الغالب على السطح السفلي للأوراق [مقابل كل ٨ بيضات توضع على السطح السفلي توضع بيضة واحدة على السطح العلوي، وتفضل الإناث النباتات الصغيرة والقوية لوضع البيض .

يوضع البيض فرديا ونادرا في مجموعات صغيرة كل مجموعة مكونة من ٢ - ٣ بيضات،

ويلصق البيض عموديا بالسطح الموضوع عليه، وفي الحقل يوضع على كل نبات نحو ١٠ بيضات، وتستغرق عملية وضع البيض، ٧ - ١١ يوما شتاء، ٣ أيام صيفا، وتضع الأنثى الملقحة من ٧٠ - ٣٥٠ بيضة، ويفقس البيض بعد نحو ٨ - ٩ أيام في الشتاء، ٣ أيام في الصيف. والبيضة صغيرة وتبلغ ٠,٨ - ١,٢ مم في الارتفاع، ٠,٦ مم في القطر وهي برميلية الشكل وعلى قشرتها من الخارج تضاريز طويلة بينها أخرى عريضة غير منتظمة، ولونها عند ابتداء وضعها أبيض ثم تصفر بعد ذلك وتغمق قبل الفقس.

واليرقة ٥ أعمار، ويتغذى العمر الأول عند خروجه من البيضة على قشرة البيضة ويكون لونها أصفر في مبدأ الأمر ولكنه يخضر بمجرد تغذيته على أوراق النبات، ويظهر باليرقة إبتداء من عمرها الثاني شريط أصفر في الخط الوسطى للجسم، وتبلغ اليرقة عند تمام نموها نحو ٢ سم في الطول.

ويتغذى كل من العمر الأول والثاني على طبقة البشرة فقط في الأوراق محدثة جروحا سطحية وذلك لكونهما قليلي الحركة ومدة كل منهما ٣ - ٤ أيام في الشتاء، ٢ - ٣ أيام في الصيف، أما العمر اليرقي الثالث فهو نشط كثير الحركة ويهاجم البزاعم الطرفية والأوراق الجديدة ومدته ٣ - ٤ أيام شتاء، ٢ - ٣ أيام صيفا، والعمر الرابع نشط جدا ويهاجر من نبات إلى آخر ويسبب أضرار بالغة ومدته ٣ - ٦ أيام في الصيف والعمر الخامس أخطر الأعمار ومدته ٧ - ١٠ أيام في الشتاء، ٥ - ٦ أيام في الصيف وتتحول اليرقة في نهايته إلى طور العذراء.

والعذراء لونها أخضر غامق رمادي محمر، وتبلغ نحو ١,٥ - ٢ سم في الطول ومدتها أسبوع وتكون في وضع عمودي على أوراق العائل حيث تكون معلقة بنهايتها الخلفية بواسطة خيط حريري رفيع بواسطة أشواك موجودة بنهاية البطن وشوكة وسطية على الرأس. ويستمر طور العذراء نحو ١٣ - ١٧ يوما صيفا.

وتعيش الحشرة اليافعة ٨ - ١٥ يوما شتاء، ٥ - ٦ أيام صيفا. وتستغرق بودة الحياة كلها من البيضة حتى الحشرة اليافعة نحو ٥٠ - ٦٣ يوما شتاء، ٢٧ - ٣٢ يوما صيفا. والنسبة بين الذكور والإناث ١ : ١ ولهذه الحشرة ٩ - ١٠ أجيال في السنة [تحت ظروف المعمل]، وليس لها بيات شتوى في جمهورية مصر العربية.

## المكافحة :

- ١ - جمع اليرقات باليد وإعدامها حرقاً .
- ٢ - تنظيف الأرض من الحشائش التي تتربى عليها .
- ٣ - يتطفل على هذه الحشرة في جمهورية مصر العربية الطفيلي الداخلى *Brachymeria fe-morata* Panz [رتبة غشائية الأجنحة] ويتطفل على اليرقات التامة النمو والعذارى، كما يتطفل على العذارى ويقتلها أيضاً طفيل من فصيلة *Pieromalidae* من رتبة غشائية الأجنحة، ويخرج من العذراء الواحدة عدد من الطفيليات قد يصل إلى العشرين .
- ٤ - فى حالة الإصابة الشديدة ترش النباتات المصابة بمحلول الجاريدونا [٧٠٪] بنسبة ٤,٠٪ . وفى حالة الكرب المعالج حديثاً تزال الأوراق الخارجية قبل الإستعمال . ويراعى عدم علاج القرنيب بعد إزهاره.

## ٥- دودة ورق الكرب الكبرى

*Pieris brassicae*

تصيب هذه الحشرة نفس عوائل الحشرة السابقة ولكن أعدادها أقل وتقاوم بنفس الطرق .

## ٦- ذبابة أوراق الصليبيات

الاسم العلمى للحشرة *Liriomyza brassicae* Riley


رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة الذباب صانع الأنفاق Fam. Agromyzidae

تصيب يرقات هذه الحشرة نباتات الفصيلة الصليبية وتسبب أنفاقاً خيطية على السطوح العلوية والسفلية خصوصاً للأوراق الخارجية فى الكرب والقرنيب.


## الحشرة اليافعة :

تبلغ نحو ١,٦ مم فى الطول . لونها العام غامق . قرون الاستشعار وأفخاذ الأرجل صفراء اللون (شكل ٣٦ - ب).



اليرقة

(شكل ٣٦ - أ) يرقة ذبابة أوراق الصليبيات



(شكل ٣٦ - ب) ذبابة أوراق الصليبيات

## اليرقة :

طولها نحو ٢ مم عند تمام نموها . لونها أبيض مصفر. تترك اليرقات الأنفاق عند تمام نموها وتتحول إلى عذارى فى التربة (شكل ٢٦ - أ).

## المكافحة :

### ١ - المكافحة الحيوية :

تتطفل على اليرقات والعذارى طفيليات تتبع رتبة غشائية الأجنحة منها : *Achrysocharella* sp., *Diglyphus* sp., *Charpis* sp., *Diaeretilla rapae* Curtis

٢ - هذه الحشرة ليست بذات أهمية اقتصادية وضررها محدود ويكتفى بجمع الأوراق المصابة وإعدامها .

## ٧ - سوسة اللفت

الاسم العلمى للحشرة *Ceuthorrhynchus picitarsis* G.

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة السوس Fam Curculionida

تصيب هذه الحشرة اللفت والكرنب وتوجد فى مصر فى الفترة من نوفمبر إلى يناير.  
**وصف الحشرة اليافعة**

يبلغ طول سوسة اللفت من ٢ - ٤ مم ولونها بنى وجسمها بيضاوى ولها خرطوم طويل رفيع .

### ودورة الحياة

تضع السوسة بيضها فرديا على العروق الوسطى للأوراق وتبدأ اليرقات فى حفر أنفاقا

طويلة في العرق الوسطى بعد الفقس مباشرة وتمتد الأنفاق إلى عنق الورقة حتى تصل إلى الجذر، ولون الأنفاق بني أبيض مصفر ورأسها لونه بني فاتح، ويصل إلى ٦ مم وهي مقوسة من سطحها الظهري ومنبسطة من سطحها البطني، ويحمل الجسم عددا من الأشواك الشيتينية الرفيعة، وتتحول اليرقات إلى عذارى داخل الأنفاق .

## المكافحة

ليس لهذه الحشرة أهمية إقتصادية، وأفضل طرق المكافحة هي جمع النباتات المصابة وإحراقها فتهلك اليرقات والعذارى.

### المكافحة الكيميائية لديدان القطن على الكرنب والقرنبيط

إذا ظهرت إصابة شديدة بديدان ورق القطن على الكرنب أو القرنبيط تعالج بالرش بمبيد لانيت ٩٠٪ بمعدل ٢٠٠ مم للفدان أو لانيت ٢٠٪ بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان وبلدان ٥٠٪ مسنحلب بمعدل التر للفدان، إذ لزم الأمر على أن يوقف الرش قبل جمع المحصول بأسبوعين على الأقل، وفي حالة القرنبيط يوقف الرش عند بداية التزهير .



## الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة القرعية

# الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة القرعية

تشمل الفصيلة القرعية عددا كبيرا من أهم أنواع الخضر وتنتشر زراعتها في جميع أقطار العالم العربي منها القرع (والكوسة)، والقرع العسلى (الإستانبولى) والبطيخ والشمام والقاوون والكتالوب والخيار والقثاء وغيرها . ويطلق عليها في بعض البلاد خضر المقات.

وتصاب هذه الخضر بأنواع مختلفة من الآفات الحشرة، بعضها يصيبها ويصيب المحاصيل الأخرى مثل ديدان ورق القطن التي قد تسبب خسائر كبيرة لهذه الخضر وكذلك الديدان القارضة والديدان السلكية والنطاطات والحفار والبقعة الخضراء كما أن هناك آفات تخصصت في إصابة القرعيات فضلا من بعض المحاصيل الأخرى مثل بقعة ورق البطيخ ومن البطيخ وهو نفسه من القطن، والخنفساء الحمراء، وسوف نتناول هذه الآفات بالتفصيل فيما يلي :

## ١ - الخنفساء الحمراء

الاسم العلمى للحشرة *Raphidopalpa fovicollis* LucaS

رتبة غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة الخنافس الورقية Fam. chrysomelidae

تضم هذه الفصيلة نحو ٢٥,٠٠٠ نوع، وأفرادها صغيرة نسبيا في الجسم وجسمها أملس

لامع بيضاوى الشكل وقرن الاستعار قصير نوعا ما ، وتتغذى الاطوار اليافعة واليرقات أساسا بالأوراق الخضراء وبعضها صانع لأنفاق الأوراق وبعضها يتغذى بالجنور والبعض ثاقبات لسيقان النباتات .

تعتبر الخنفساء والحمراء من الآفات الشديدة الضرر بالنباتات القرعية كالبطيخ والشمام والقرع والخيار والقثاء ، وتتغذى الحشرة اليافعة بعد خروجها من بيئاتها الشتوى على أوراق النباتات الصغيرة، ثم تستمر فى غذائها على الأوراق والأزهار فتنزل بها أضرار جسيمة. أما اليرقات فتحفر فى الساق عند سطح التربة أو فى الجنور فيذبل النبات ثم يجف ويسهل عندئذ معرفة النباتات المصابة. وقد تحفر اليرقات الموجودة فى الأرض فى سطح الثمار الملامسة للتربة فتسبب تعفناتها . توجد هذه الحشرة فى المملكة العربية السعودية واليمن وتسمى الحمراء ويشتد ضررها فى فصل الربيع .

### الحشرة اليافعة

(شكل ٣٧): تبلغ نحو ٥,٧ مم فى الطول ولونها أحمر برتقالى والغمدان يغطيان مؤخرة البطن .

### دورة الحياة :

تختفى هذه الخنافس فى حالة بيات شتوى تحت الأوراق وعلى الحشائش أو البرسيم وتبدأ نشاطها فى أوائل الربيع حيث تشاهد بكثرة على البرسيم ثم تنتقل منه إلى المحاصيل الفرعية عند زراعتها، وتتزاوج وتضع الإنثى الواحدة نحو ٥٠٠ بيضة على أجزاء النبات الموجودة على سطح التربة أو الجزء السفلى من سوقها . يفقس البيض بعد حوالى أسبوعين ثم تحفر اليرقات فى سوق النباتات فى الجزء الواقع فى التربة، وتصنع كل يرقة لنفسها نفقا مستعرضا تدخل فيه جزؤها الأمامى للتغذية ويبقى جزؤها الخلفى خارجا من ساق النباتات. وتكمل اليرقة نموها بعد نحو ٢ - ٦ أسابيع تتحول بعدها إلى عذراء ويستمر طور العذراء نحو ١٠ أيام ثم تخرج الحشرة اليافعة من التربة وتكرر دورة الحياة . ولهذه الحشرة من ٢ - ٣ أجيال فى السنة .

### المكافحة


١ - اقتلاع النباتات الذابلة وإعدامها حرقا بما فى جنورها وسوقها من يرقات ، وتطهير مكان

الجور باضافة جير حي إليها وخلطه مع التربة .

٣- رش النباتات بالجاربونا (٥٠٪) أو السيفين بنسبة ٤,٤٪ أو الملاثيون بنسبة ٢٥,٢٪ ويكرر العلاج إذ لزم الأمر .

### والمعالجة الكيميائية

قاصرة على البطيخ والشمام فقط على أن يمر أسبوعان قبل جمع الثمار، ويمنع معالجة الخيار والكوسة لقصر فترات الجمع.



(شكل ٣٧) الخنفساء الحمراء ١ - حشرة يافعة ٢ - يرقة

## ٢ - خنفساء المقات

الاسم العلمي للحشرة *Epiachna chrysomelina* E.

رتبة غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة خنافس أبي العيد Fam coccinellidae

تخرج خنافس هذه الحشرة من بياتها الشتوى فى إبريل وتبدأ فى مهاجمة نباتات العروة الصيفية المبكرة لخضر العائلة كالبطيخ والشمام والكوسة والخيار والقثاء وغيرها، وتكون الاصابة شديدة الضرر بالنباتات لكثرة الحشرات اليافعة وتتغذى الخنافس على السطح العلوى للأوراق والأجزاء الخضرية الأخرى، وتشاهد ثقبوا منتظمة بالورقة تتسع باستمرار الاصابة تاركة بينها مساحات طويلة متوازية من أجزاء الورقة التى تبدو مزركشة مثل الدانتيل وبعد مدة تظهر يرقات الجيل الأول فيشتد الضرر على النباتات خصوصا وقت إزهارها لاشتراك اليرقات مع الحشرات اليافعة فى التغذى على النباتات، وتوجد اليرقات دائما على السطح السفلى للأوراق (بعكس الحشرات اليافعة) وتحدث أيضا ثقبوا بالأوراق . وفى أواخر الموسم عندما تجف الأوراق تتغذى الحشرات اليافعة واليرقات على الثمار الصغيرة وتثقبها .

وتشتد الاصابة بالخننافس واليرقات فى وسط الموسم خلال يوليو وأغسطس وأكتوبر ثم تقل بالتدريج خلال نوفمبر وتختفى تماما من أوائل ديسمبر وتوجد هذه الحشرة فى المملكة العربية السعودية، وتصيب القرعيات وتسمى الحريشا وتشتد الاصابة بها فى الربيع والصيف كما توجد فى اليمن والعراق والأردن .


### الحشرة اليافعة

(شكل ٢٨) : تبلغ نحو ٩ مم فى الطول ولونها أحمر ويوجد على غمديها ١٢ بقعة سوداء.

### دورة الحياة :

تقضى الحشرة اليافعة بياتها الشتوى مختبئة فى الشقوق وتحت النباتات الجافة وتنشط فى إبريل وتتزاوج وتضع الأنثى الملقحة الواحدة نحو ٣٠٠ - ٥٠٠ بيضة . والبيض يوضع عموديا متلاصقا فى مجاميع من ٢٠ - ٤٠ بيضة على السطح السفلى للأوراق والبيضة شكلها بيضاوية كالسيجار ولونها برتقالى مصفر وتبلغ ١,٧٥ مم فى الطول، ويفقس البيض بعد نحو ٣ - ٧ أيام . واليرقة ٤ أعمار ، واليرقة قصيرة غليظة ومغطاة بأشواك متفرقة لونها أخضر مشوب بصفرة، وتبلغ مدة طور اليرقة نحو ١٢ - ٢٠ يوما . وتحول اليرقة إلى عذراء

على أجزاء النباتات داخل الجلد اليرقي الأخير، وتبلغ مدة طور العذراء نحو ٣ - ٧ أيام .  
وتعيش الحشرة اليافعة لمدة شهر إلى شهرين وتتغذى لمدة ٣ أسابيع قبل أن تبدأ في وضع  
البويض وتستهلك أثناء تغذيتها أكثر مما تستهلكه اليرقة . ولهذه الحشرة ٣ أجيال متداخلة في  
السنة، وتتفرق خنافس الجيل الثالث لتقضى بيئاتها الشتوى كما سبق ذكره.



(شكل ٣٨) خنفساء المقات

### المكافحة :

١ - في المساحات الصغيرة وعندما تكون الإصابة خفيفة تجمع الحشرات اليافعة باليد في  
الصباح الباكر وقبيل الغروب وتعدم.

٢ - في المساحات الكبيرة تعفر أو ترش النباتات بالسيفن أو الجاربونا (٧٠٪) بنسبة ٠,٤٪  
لكل منهما أو بالملاثيون بنسبة ٠,٢٥٪ أو الروتينون بنسبة ٠,١ - ١,٥٪ أو بالميتوكسيكلور  
بنسبة ٠,٧٥٪.

وعلى العموم يجب أن تبدأ المعاملة بالمبيدات الكيماوية بمجرد مشاهدة البيض والحشرات  
اليافعة.

### ٣- ذبابة المقات

الاسم العلمى للحشرة *Dacus ciliatus* Loew

رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة الفاكهة Fam. Tephritidac (Trypetidae)

ظهرت هذه الحشرة لأول مرة في مصر عام ١٩٤٧ بمحافظة أسوان في ثمار قثاء، وتعم الإصابة الآن بهذه الحشرة جميع محافظات الوجه القبلى والوادي الجديد وجنوب الدلتا ومحافظات الاسماعيلية والسويس الشرقية . وقد صدر قرار وزارى بالحجر على هذه الآفة بحيث لا تنقل نباتات وثمار العائلة القرعية إلا بعد فحصها والتأكد من خلوها من الإصابة بهذه الحشرة .

وتصيب هذه الحشرة ثمار القثاء والفقوس والخيار والعجور والشمام والبطيخ والكوسة والقرع العسلى والحنظل . وفى دول أخرى تصيب هذه الحشرة بجانب القرعيات الموالح وثمار حشيشة اللبن وثمار نبات الـ Capsicum (الشطة) وثمار الكبر الهندى وغيرها . وتوجد هذه الحشرة فى المملكة العربية السعودية ولو أنها تخف فى المناطق المرتفعة كما توجد فى اليمن وتصيب القرعيات بشدة .

تضع أنثى هذه الحشرة البيض داخل ثمار القرعيات وتظهر أماكن وخز الأنثى لوضع البيض كأماكن طرية يخرج منها مادة لزجة ثم لا تلبث أن تجف هذه الأماكن ويظهر مكانها ثقب صغير مستدير . وبعد فقس البيض تتغذى اليرقات داخل الثمار، وتظهر الأماكن حول الثقوب طرية وتحول إلى اللون البنى، وتتسع الأماكن الطرية تدريجياً حسب زيادة تغذية اليرقات وربما تلتف الثمرة كلها . وتتغذى اليرقات أيضاً على البنور الصغيرة داخل الثمار ولا تصاب البنور الناضجة ويتسبب عن إصابة الثمار بهذه الذبابة دخول الفطر والبكتريا مما يزيد فى تلف الثمار .

وتتعرض الثمار للإصابة بهذه الحشرة بمجرد عقدها كما تصاب أيضاً الثمار الكبيرة وتصاب ثمار العروة النيلية فى محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وشرق الدلتا بشدة عن

ثمار العروة الصيفية، ويصاب الخيار بشدة عن أى ثمرة من ثمار العائلة القرعية الأخرى بالمناطق المذكورة وتعرض ثمار العروة الشتوية المبكرة بمحافظتى أسوان وقنا بشدة أكثر من ثمار العروة الصيفية، وأشد الثمار إصابة بهذه المناطق هى القثاء.

### الحشرة اليافعة :

تبلغ فى الطول نح ٧,٥ — ٨,٤ فى الذكر، والصدر والبطن لونهما بنى محمر ومغطيان بالشعر الكثيف .

### دورة الحياة :

يحدث التزاوج فى أى وقت من أوقات النهار صيفا أما فى الشتاء فلا يحدث تزاوج إلا فى الأيام الدافئة . وتضع الأنثى بيضها بعد نحو ٥ — ٦ أيام من خروجها من العذارى صيفا ونحو ٣٠ يوما فى الشتاء، ويوضع البيض فى مجاميع من ٥ — ١٥ بيضة أسفل القشرة على عمق نحو ٤مم، وتضع الأنثى نحو ٢١٠ بيضات.

والبيضة إسطوانية الشكل بيضاء اللون سطحها العلوى محدب وسطحها السفلى مقعر وسطح قشرتها من الخارج أملس وتبلغ نحو ١مم فى الطول ٢,٠مم فى العرض ويفقس البيض بعد نحو يومين صيفا وخمسة أيام شتاء ولليرقة ٢ عمر، وتبلغ مدة طور اليرقة ٤ أيام صيفا و١٣ يوما شتاء واليرقة التامة النمو تبلغ ٥,٥ مم فى الطول ولونها أصفر أو أخضر (وهو لون محتويات القناة الهضمية) وعند التعذير تخرج اليرقات من الثمار وتعذر فى التربة على عمق نحو ٣سم، وتبلغ مدة طور العذراء ٨ أيام صيفا و٤٠ يوما شتاء. والعذراء المستوردة برميلية الشكل ولونها بنى فاتح سرعان ما يتحول إلى اللون الذهبى . والنسبة الجنسية ١ : ١ . (شكل ٣٩).


### المكافحة :

#### أولا - المكافحة الزراعية :

١ - جمع الثمار المصابة بمجرد ظهور الإصابة وحرقتها .



- ٢ - الاهتمام بالعمليات الزراعية المختلفة من عزيق وتسميد واستئصال الحشائش والرى المنظم للعمل على تقوية النباتات وبالتالي مقارمتها للأصابة .
- ٣ - بعد جمع المحصول من حقل مصاب تعدم الثمار المصابة وتحرق العروش وتعزق الأرض جيداً وتترك للتشميس للقضاء على ما قد يوجد من العذارى في التربة .
- ٤ - إتباع تعليمات الحجر الزراعى الداخلى واستئصال العوائل البرية وأهمها الحنظل .



(شكل ٣٩) دورة حياة ذبابة المقات

## ثانيا - مكافحة الكيماوية :

رش نباتات القرعيات فى المناطق الموبوءة من بدء عقد الثمار بالدايمثويت (٤٠٪) بنسبة ١٥٪ مع إيقاف الرش قبل جمع المحصول وتسويقه بمدة ثلاث أسابيع على الأقل، ويكرر الرش إذ لزم الأمر، وهذا العلاج وقائى لقتل الحشرات اليافعة قبل وضع البيض .

## ٤ - بقعة ورق البطيخ (البقة السمراء)

الاسم العلمى للحشرة *Aspongopus viduatus* E.

رتبة نصفية الأجنحة Order Hemiptera

فصيلة البق كرية الرائحة Fam. pentatomidac

تتغذى هذه الحشرة وحوريتها بامتصاص عصارة أوراق البطيخ والمقات وكذلك الذرة، وتوجد بالمحافظات الجنوبية من الوجه القبلى من أسبوط حتى أسوان، كما أنها توجد أيضا بمحافظة الوادى الجديد . وتنتشر هذه الحشرة فى السعودية واليمن وغيرها من الأقطار العربية.

### الحشرة اليافعة :

بقعة حجمها متوسط تشبه بقعة ورق القطن ولكن لونها أسمر بزرقة خفيفة والأجزاء القاعدية من الأجنحة لونها محمر .

### دورة الحياة :

تقضى هذه الحشرة، بياتها الشتوى على هيئة حشرة يافعة وحوريات، وتنشط فى الربيع حيث تتزاوج وتضع الإثاث البيض على عروش النباتات والسطوح السفلى للأوراق - ويوضع البيض فى شكل كتل أشبه بالسلاسل، ولون البيض عند الوضع أبيض ثم يتحول إلى اللون القرنفلى الباهت قبل خروج الحوريات، تتسلخ الحورية خمسة إنسلاخات لتصل إلى طور الحشرة اليافعة .

## طرق المكافحة

- ١ - جمع الحشرات اليافعة والحوريات باليد لكبر حجمها ثم إعدامها .
- ٢ - تعفير النباتات أو رشها عند تجمع الحشرات عليها لقضاء البيات الشتوى بأى مبيد حديث مثل الجاردونا .

## الحشرات الثاقبة الماصة التى تصيب القرعيات

تصاب القرعيات بثلاث من الحشرات اليافعة الماصة والتي سبق لنا ذكر بالتفصيل فى مواضع أخرى من هذا الكتاب وهذه الآفات هى: المن والذبابة والبيضاء ونطاطات الأوراق، وهذه الحشرات تسبب خسارة كبيرة لخضر المقات، فهى فضلا عن إمتصاصها العصارة النباتية من الأوراق، تسبب ضعف النباتات وقلة إنتاجها فإنها تنقل إليها العديد من الأمراض الفيروسية مثل مرض التفاف الأوراق فى البطيخ والكوسة، وهذه الآفات تفضل بعض الخضر القرعية عن البعض الآخر ويمكن تلخيص ذلك فيما يلى : -

### ١ - الذبابة البيضاء

أكثر العوائل قابلية للإصابة بها هى الكوسة والقرع العسلى يليهما الخيار والشمام والبطيخ، وتعتبر القثاء أقلها قابلية للإصابة .

### ب - المن

والإصابة به فى العروة الصيفية فى مصر قليلة الأهمية إذا قورنت بالعروة النيلية، ويعتبر البطيخ والخيار أكثرها قابلية للإصابة .

### ج - نطاطات الأوراق

يعتبر الخيار والقثاء والشمام أكثرها قابلية للإصابة، أما البطيخ وقرع الكوسة فهما أقل قابلية للإصابة، بينما تكاد تنعدم إصابة القرع العسلى والقاوون .

### المكافحة الكيميائية للآفات الثاقبة الماصة على القرعيات :

ترش المساحات المصابة بأحد المبيدات التالية :

ملاثيون ٥٪ بمعدل ١ لتر للفدان .

أو أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٢٥ للفدان .

أو بريمر ٥٠٪ بمعدل ٧٥٠ جرام للفدان .

ويضاف إلى أي منهم ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء مع ملاحظة أن يصل محلول الرش إلى الحشرات الى توجد على السطح السفلى للأوراق، ونظرا لأن المن ينقل الأمراض الفيروسية يجب إجراء عمليات الرش ضد المن والنباتات فى دور البادرة .

## تفضيل آفات القرعيات لبعض العوائل أكثر من البعض الآخر

تدل بعض الدراسات التى أجريت فى مصر أن آفات القرعيات تفضل بعض العوائل أكثر من بعضها الآخر، وفيما يلى ملخصا لهذه الأبحاث :-

### أ - ذبابة المقات

يعتبر الخيار والقتاء والشمام مفضلة لها عن القرعيات، والبطيخ أقل إصابة من العوائل المذكورة ولكن قرع الكوسة والقرع العسلى والقاوون أقل العوائل إصابة ويصاب الحنظل بشدة بهذه الذبابة ويعتبر مصدر رئيسى لنقل الإصابة إلى القرعيات .

### ب - الخنافس الحمراء

تصيب القثاء والشمام بدرجة أكبر من غيرها، وتصيب البطيخ والقاوون بدرجة متوسطة بينما لا تصاب جنور قرع الكوسة والقرع العسلى والخيار . ولا توجد فروق جوهريه فى درجة إصابة الأصناف المختلفة للشمام والبطيخ والقتاء والقاوون .

## جـ - خنفساد الهقات

تفضل الشمام والقثاء والخيار على بقية القرعيات، والبطيخ أقلها قابلية للإصابة، ولا يصاب بها قرع الكوسة والقرع العسلى والقاوون إلا نادرا .

## الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة الخبازية

# الآفات الحشرية التي تصيب خضر الفصيلة الخبازية

تشتهر خضر الفصيلة الخبازية في العالم العربي، وأهم هذه الخضر هي البامية والخبازي وهي من الخضر المفضلة في كل مكان وتصاب خضر هذه الفصيلة ببعض الآفات الحشرية - نفضلها فيما يلي :

## ١- أبو دقيق الخبازي

الاسم العلمي للحشرة *Vanessa cardui* L

رتبة حرشفية الأجنحة *Order Lepidoptera*

فصيلة نيمفاليدي *Fam. Nymphalidae*

تنتشر هذه الحشرة في مصر وبعض أقطار العالم العربي خصوصا في الزراعات المجاورة للصحراء، وتنزل الحشرة أضرار بالغة بزراعات الخرشوف والخبازي التي تزرع بهذه المناطق، وتهاجم نباتات الخبازي البرية بشدة، وإذا لم تتوافر عوائل هذه الحشرة وهي الخرشوف والخبازي فإنها تهاجم محاصيل أخرى مثل البرسيم والترمس والفاصوليا والأرز وبعض نباتات وحشائش الفصيلة المركبة، وتشاهد فراشات هذه الحشرة بكثرة في منطقة الإسكندرية في شهر أغسطس حول حشيشة الليبيا ونبات اللانتانا، كما تشاهد أيضا وهي تلحق رحيق أزهار القطيفة والزينيا، وهذه الحشرة من الحشرات المهاجرة .

## وصف الحشرة اليافعة

أبو دقيق الخبازي كبير الحجم نوعا يصل إلى ١,٥ - ٢,٣ سم، والمسافة بين طرفي الجناح عند بسطها نحو ٤,٥ - ٦,٥ سم، والأجنحة مرقطة من السطح العلوي بألوان مختلفة، وقاعدة الجناح الأمامي بنية اللون متوسطة أحمر وطرفه به بقع سوداء وبيضاء، أما الجناح الخلفي فيغلب على سطحه العلوي اللون البرتقالي والبني والأسود والأزرق، وعلى سطحه السفلي توجد نفس الألوان ولكن أخف منها عما هو في السطح العلوي ويميز الذكر عن الأنثى برسغ الرجل الأمامية الذي يتكون من عقلة واحدة في الذكر، ٥ عقلة في الأنثى.

## دورة الحياة :

يوضع البيض فرديا على أوراق العائل، وتضع الأنثى الملقحة من ٧٥ - ١٠٠ بيضة، والبيضة لونها أبيض مخضر أو فسقي ولكنه يصبح أخضر مسودا قبل الفقس، وشكل البيضة برميلي وعليها تضاريز بارزة ويبلغ طول البيضة ٦٥ - ٧٥ مم، وعرضها ٣٥ - ٥٥ مم، ويفقس البيض بعد ٣ - ٥ أيام .

بعد الفقس تتغذى اليرقات على الأوراق وتلف أوراق العائل أو تفرز خيوطا حريرية تربط بها الأجزاء المتبقية من هذه الأوراق المصابة، واليرقة أعمار أطوالها على التوالي : ٤ - ٥ ، ٢ - ٣ ، ٢ - ٣ ، ٤ - ٣ ، ٤ - ٣ ، ٤ - ٣ أيام، ويبلغ طول اليرقة التامة النمو ٣ - ٤ سم ولونها أسمر أو أسود ويوجد على كل من جانبي اليرقة خط أصفر باهت، ويوجد على سطحها العلوي مجموعات من الأشواك المتفرعة .

أما طول العذراء فمدته نحو ٥ - ٧ أيام في الصيف، ١٠ - ١٢ يوما في الخريف، والعذراء ذهبية اللون، وتتدلى عموديا من سطحها الخلفي الذي يكون مربوطا في السطح السفلي للأوراق العائل، وطول العذراء نحو ١,٥ - ١,٧ .

وتعيش الحشرة اليافعة من ١٠ - ٣٠ يوما في المعمل عد تربيتها على محلول سكري مخفف ( جزء عسل + جزء ماء ) وتبدأ في وضع البيض بعد ٧ أيام من خروجها من العذراء، ولهذه الحشرة ٨ أجيال في السنة إذا ربيت في المعمل .



## طرق المكافحة

١ - يتطفل على اليرقات والعذارى الطفيل *Apanteles congestus* Ns من فصيلة *Braconidae* رتبة غشائية الأجنحة .

٢ - تكافح كيميائيا كما فى أبى دقيق الكرب .

## الآفات التى تصيب البامية

### ٢ - دودة اللوز الشوكية

تصيب هذه الحشرة ثمار البامية، وتضع الفراشة الأنثى البيض فرديا على الثمار والبراعم الزهرية، بعد الفقس تتغذى اليرقات على الأزهار - الورقية فى أول عمرها، ثم تدخل بعد ذلك إلى الثمار وتعيش بداخلها وتتغذى على محتوياتها وتتلف ما بها من بذور .

وتظهر الإصابة على قرون البامية على شكل ثقبوب بها براز اليرقة متكتلا فى كتل صغيرة متماسكة، ويزيد من تلف الثمار نمو الفطر الأسود عليها.

وتصاب البامية أيضا بدودة اللوز القرنفلية وتشتد الإصابة بهما فى نهاية الموسم .

## طرق المكافحة

١ - جمع القرون المصابة وإعدامها لقتل ما بها من يرقات .

٢ - عدم تعقير البامية حتى يقل تكاثر الحشرة ولا تكون مصدر عنوى للمحصول الجديد. هذا ولا تكافح هذه الآفة كيميائيا على البامية لقصر فترات جمع الثمار .

### ٣ - الحفار *Gryllotalpa gryllotalpa*

تصاب نباتات البامية بالحفار خصوصا تلك المزروعة فى الأراضي الصفراء والخفيفة والمجاورة للمجارى المائية، ويقرض الحفار جنور بادرار اليامية من تحت الأرض فتذبل البادرات وتموت، وقد تشتد الإصابة ويحتاج الأمر عندئذ إلى إجراء عمليات ترقيع للزراعة.

ويكافح الحفار في حقول البامية بالطعم السام الذي سبق ذكر تركيبه وطريقة إستعماله في مواضع أخرى من هذا الكتاب .

#### ٤ - الدودة القارضة *Agrotis ipsilon* (H)

تصيب هذه الآفة نباتات البامية وتقرض الساق عند اتصاله بالتربة وعند إشتداد الإصابة تعالج بالطعم السام كما سبق أن ذكرنا .

#### ٥ - البقة الخضراء أو بقة ورق القطن *Nezare virdula*

تنتشر هذه البقة في جميع أقطار العالم العربي، ولم يكن لهذه الآفة في الماضي أهمية إقتصادية، ولكنها أصبحت الآن في عداد الآفات الضارة إقتصاديا في مصر نظرا لإنقراض طفيل من رتبة غشائية الأجنحة كان نشطا في التطفل على بيض هذه الحشرة والحد من خطورتها، ولكن إستعمال الطائرات في رش مبيدات آفات القطن في مصر قضى تماما على هذا الطفيل، والاسم العلمي للطفيل هو *Microphanurus megalcephalus* Ashmeud وتتغذى الحشرات اليافعة وحوريات تلك البقة على عصارة أوراق البامية، وتهاجم البراعم الزهرية والثمار الصغيرة وتتغذى بامتصاص عصارتها مما يؤدي إلى إسقاطها ، وفي حالة إصابة الثمار الصغيرة تفرز هذه الثمار موادا راتنجية فتسود الثمرة وينمو عليها العفن المعروف باسم *Capondium sp*، ويظهر ضرر هذه الحشرة من مايو إلى يولية، ولا يوافقها الجو الجاف، وهذه الحشرة تنقل الأمراض الفيروسية والفطرية .

#### طرق المكافحة

- ١ - جمع الحشرات اليافعة والحوريات باليد وإعدامها .
- ٢ - تعفير أورش النباتات عند تجمع الحشرات عليها لقضاء بياتها الشتوى بأى مبيد فعال مثل الجاربونا .

## ٦- بق الهبّس الدقيقى

*Moconelliococcus hirsutus* (Green)

تصيب هذه الآفة ثمار البامية كما تصيب غيرها من النباتات مثل القطن والفاول السودانى والفاول والباذنجان، وتسبب الإصابة بهذه الآفة تضخم الفريعات المصابة وتوقف نموها ويكثر نمو الفطر الأسود عليها وتشتد الإصابة بها فى نهاية الصيف .

### المكافحة :

ليس لهذه الآفة مكافحة كيميائية على نباتات البامية، ولكن يكتفى بقطع الفريعات المصابة وإحراقها .

## آفات أخرى تصيب البامية

تصاب البامية مثل نباتات الفصيلة الخبازية بالحشرات الثاقبة الماصة مثل ذبابة القطن البيضاء ومن القطن ومن الخوخ الأخضر ونطاطات الأوراق وهذه الآفات تمتص العصارة النباتية من الأوراق والأفرع والثمار، وقد سبق لنا ذكرها فى مواضع أخرى، ويمكن مكافحة هذه الآفات على البامية كيميائياً كما سبق أن ذكرنا فى مواضع أخرى ولكن قبل جمع القرون بأسبوعين على الأقل، ويمنع استخدام المبيدات الكيماوية متى بدأ الجمع حتى لا تتعرض القرون للتلوّث ونظراً لقصر فترات الجمع .

## الآفات الحشرية التي تصيب خضر الجذور والسيقان الأرضية

## الآفات التي تصيب خضر الجذور والسيقان الأرضية

تزرع هذه الخضر في كافة الأقطار العربية، وتعد من أهم أنواع الخضر نظرا لقيمتها الغذائية العالية، من أهم أنواع هذه الخضر . البطاطا والقلقاس والجزر، ورغم إنتشار هذه الخضر وشعبيتها فإن الأبحاث التي أجريت على الآفات التي تصيبها في العالم العربي ما زالت قليلة، وسوف نذكر هنا أهم هذه الخضر وأهم الآفات التي تصيبها .

### الآفات الحشرية التي تصيب البطاطا Sweet potato

تعتبر البطاطا من المحاصيل الشائعة في البلاد العربية، ويطلق عليها في بعض الأقطار العربية البطاطا الحلوة أو الحالية تفريقا لها عن البطاطس والتي يطلق عليها بطاطا واسمها العلمي هو Ipomoea batatas Lam، وهي دائما رخيصة الثمن لوفرة غلتها والتوسع السريع في إنتاجها - ويستعمل العرش الأخضر للبطاطا كعلف للحيوان، والبطاطا محصول صيفي يحتاج إلى درجات حرارة عالية وموسم نمو طويل وتقاوى البطاطا رخيصة لأنها تؤخذ كعقل من عرش المحصول القديم وتصاب البطاطا من بداية زراعتها حتى الحصاد بالعديد من الآفات الحشرية منها

### ١- الحفار Gryllotalpa gryllotalpa

ويصيب بادران البطاطا في بداية نموها ويقرض الجذور تحت سطح التربة فتموت البادران، وعند تكون الدرنة في التربة تتعرض أيضا لهجوم الحفارات التي تتغذى عليها

وتصنع بها أنفاقاً سرعان ما تدخلها الفطريات فتصاب الدرنات بالعفن . وتكون الإصابة شديدة في الأراضي الصفراء والخفيفة والقريبة من مصادر المياه والمساقى .

### المكافحة

كما سبق أن ذكرنا في المحاصيل الأخرى

## ٢ - الدودة القارضة *Agrotis ipsilon*

وتصيب بإدرات البطاطا في بداية الموسم وتقرض الساق عند سطح التربة ولكنها تختفي بعد ذلك عند ارتفاع درجة حرارة الجو .

### المكافحة :

تكافح هي والحفار بالطعم السام كما سبق أن ذكرنا .

## ٣ - دودة ورق القطن العادية والصغرى

تصيب هاتان الآفتان البطاطا، وهي من العوائل المفضلة لديها، وتتغذى اليرقات على الأوراق، وعند اشتداد الإصابة يتأثر نمو النبات وبالتالي تكون الدرنات صغيرة الحجم خفيفة الوزن .

### طرق المكافحة

كما سبق أن ذكرنا في مكافحتها على المحاصيل الأخرى ومن المعتاد أن تعالج الحقول الملوثة بالرش بمبيد لانيث ٩٠٪ بمعدل ٢٠٠ جم للفدان أو لانيث ٢٠٪ سائل بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان أو ريلدان ٥٠٪ المستحلب بمعدل لتر واحد للفدان يضاف إلى أي منها من ٤٠٠ - ٦٠٠ لتر ماء، ويعتبر هذا علاجاً مشتركاً لدودة ورق القطن والبقعة الخضراء والديدان القياسة ونصف القياسة

## ٤ - دودة ورق البطاطا

الاسم العلمي للحشرة *Herse convolvuli* L

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة فراشات أبو الهول Fam. Sphingidae

تتغذى يرقات هذه الحشرة على أوراق البطاطا واللباب وست الحسن والعليق وغير ذلك من النباتات المتسلقة كما تتغذى على الكريز انتيم .

### الحشرة اليافعة

( شكل ٤١ ) : لونها رمادي غامق، وتبلغ نحو ٤ سم في الطول والمسافة بين طرفي الجناحين الأماميين منبسطين تبلغ نحو ٨ سم، وبالبطن أشرطة سوداء متبادلة مع أخرى حمراء .


### دورة الحياة :

تقضي الحشرة بياتها الشتوي على هيئة عذراء في التربة، وعند خروج الفراشات في الربيع يحدث التزاوج وتضع الأنثى بيضها هيئة كتل على السطح السفلي لأوراق العائل، وتطير الفراشات عادة بالليل ونادرا ما يمكن مشاهدتها .

والبيضة كبيرة الحجم نوعا وشكلها بيضاوي وطرفها الأمامي أرفع من طرفها الخلفي .

بفقس البيض نحو ١٠ - ١٥ يوما وتتغذى اليرقات الصغيرة على الأوراق بمجرد خروجها مباشرة، وتكون اليرقات في جماعات في مبدأ الأمر لا تلبث أن تتفرق وتنزل إلى التربة لتعذر فيها .

واليرقة النامية النمو كبيرة الحجم إذ تبلغ نحو ١٠ مم، ولونها أخضر، وعلى جانبي البطن خطوط مائلة. والعذراء (شكل ٤١) لونها أحمر مسمر، وتبلغ نحو ٤ - ٥ سم في الطول، ويتميز عن غيرها من عذاري بودة ورق السمسم وبودة ورق العنب بأن الخرطوم غير ملتصق بالجسم، ويكون على شكل مقبض . ولهذه الحشرة جيلان في السنة.



(شكل ٤) بودة ورق البطاطا  
١ - فراشة ج - يرقة ج - عذراء

### المكافحة :

تكافح هذه الآفة بجمع يرقاتها باليد وإعدامها حرقا إذ أن أضرارها محدودة .

### آفات أخرى تصيب بطاطا

تصاب البطاطا ببعض الآفات الأخرى مثل الحشرات ذات أجزاء الفم الثاقب الماص مثل  
ذبابة القطن البيضاء ومن القطن ونطاطات الأوراق .



هذا ولم تدخل هذه الآفات في برامج مكافحة الكيمائية في مصر رغم خطورتها، ولكن إذا إشتد ضررها يمكن أن تعالج كيميائيا بنفس العلاج المتبع في مكافحتها عند إصابتها للمحاصيل الأخرى وفي البلاد العربية الأخرى (غير مصر) تصاب البطاطا بأنواع من السوس الشديد الضرر بالدرنات ومن هذا السوس ما يلي :

#### أ - سوسة درنات البطاطا *Cylas formicarius* F.

#### ب - سوسة درنات البطاطا المتشابهة *Cylas brunneus* F

هما يتبعان رتبة غمدية الأجنحة Coleoptera وفصيلة السوس Curculionidae. وهما متشابهتان إلى حد كبير، والخنفساء اليافعة يبلغ طولها ٧ مم وغمد الجناح لونه أزرق مخضر، والصدر أحمر والأرجل حمراء اللون كذلك والرأس سوداء .

ويبلغ طول اليرقة التامة النمو ٩ مم ولون الجسم أبيض والرأس لونها بني فاتح، أما البيضة فلونها أبيض مصفر بيضاوية الشكل وبفقس البيض بعد ٥ - ٦ أيام بعد وضعه، وتصنع اليرقات أنفاقا متعددة وتعذر اليرقة في نهاية النفق ومدة الطور العذاري ٨ أيام، وبالنظر إلى قصر دورة الحياة وطول عمر الأنثى اليافعة فإن هذه السوسة تتكاثر بسرعة، وفضلا عما تحدثه اليرقة من أضرار بالدرنة فإن طعم الدرنة المصابة يكون غير مقبول .

وتوجد السوسة *C. brunneus* في تول غرب إفريقيا بينما توجد *C. formicarius* في جنوب أفريقيا وأوغندا والسودان ومدغشقر والهند واليابان وسيريلانكا - وكانت الخسارة في المحصول في الهند ٩٠٪ .

#### مظهر الإصابة والضرر

تتعرض الدرنات المصابة بالتلف والتعفن بسبب حفر الأنفاق بداخلها مما ينتج ذلك من دخول الفطريات والعفن، وهذه السوسة تصيب البطاطا في المخزن وتفسد المزيد من الدرنات.

#### المكافحة

يمكن مكافحة هذه الآفة باستخدام مبيد مناسب مثل باراثيون أو الألدرين وأفضل نتيجة للمكافحة في الهند جاءت من استعمال الألدرين .

ومن وسائل المكافحة الأخرى عدم تعاقب زراعة البطاطا في نفس الأرض، وإعدام تخزين درنات مصابة بالآفة حتى لا تعمر الدرنات السليمة .

## الآفات الحشرية التي تصيب القلقاس

القلقاس من المحاصيل الصيفية الذي يمكث في الأرض فترة طويلة، فهو يحتاج إلى نمو ٦ - ٧ أشهر مرتفعة الحرارة وشهرين آخرين تتكون فيهما الكورمات ويخزن فيها النشا، وبحلول البرد يتم النضج ويتعرض القلقاس طوال هذه الفترة الطويلة للكثير من الآفات الحشرية، ويقوم الفلاحون بتخزين المحصول في التربة حتى شهر يناير بدون رى أو تقليب ليبيعونه حينذاك بسعر مناسب، ويعطى الفدان في مصر من ٨ - ١٠ أطنان من كورمات القلقاس ولذلك فيعد من المحاصيل الراجعة - ونذكر الآفات الحشرية التي تصيبه فيما يلي :-

### ١ - الحفار

تصيب هذه الحشرة القلقاس مثل غيره من المحاصيل، حيث تقوم الحشرات اليافعة والحوريات بقرض جذور البادرات فتتموت هذه البادرات وقد تهاجم قطع التقاوى المزروعة في التربة وتمنع الإنبات بالمرّة مما يضطر المزارع لإعادة الزراعة أو ترقيعها.

### مكافحة الحفار

كما سبق أن ذكرنا باستعمال الطعم السام بنفس التركيب والكيفية التي سبق ذكرها .

### ٢ - الحشرات ذات أجزاء الفم الثاقب الماص

ومن هذه الحشرات من القطن والذباية البيضاء ونطاطات الأوراق، وهي فضلاء عن إمتصاصها للعصارة النباتية تقوم بنقل الأمراض الفيروسية للقلقاس مثل مرض التفاف الأوراق .

### ٣- دودة ورق القطن العادية والدودة الخضراء

ويعتبر القلقاس من المحاصيل المحببة إلى ديدان ورق القطن لزيادة نسبة الرطوبة في أوراقه وغضاصتها وقد تنزل بها خسائر جسيمة وإذا اشتدت الإصابة بهما يمكن معالجتها كيميائياً بالطريقة والكيفية التي سبق ذكرها في المحاصيل الأخرى .

### ٤- البق الدقيقى الأسترالى

الاسم العلمى للحشرة *Icerya purchasi* Mask


رتبة الحشرات نصفية الأجنحة Order Hemiptera

فصيلة الحشرات القشرية الماردة Fam. Margodidae

تصيب هذه الحشرة (شكل ٤٢) أشجار الموالح والسنط والبتسبورم وبعض محاصيل الخضر مثل القلقاس والملوخية وكثير من نباتات وأشجار الزينة وتمتص الإناث والحوريات عصارة النباتات وتتسبب في ذبولها وجفافها ثم موتها، وتفضل الحشرات الفروع الطرفية الغضة ولو أنها قد توجد على الأسطح السفلى للأوراق بجوار العروق الوسطية وتوجد هذه الحشرة في الجزيرة العربية وتصيب الموالح والعنب في المملكة العربية السعودية .

الأنثى شكلها بيضاوى وتبلغ نحو ٣ - ٤,٥ مم فى الطول ، ولونها أحمر بنى من سطحها العلوى ويرتقالي فاتح السفلى، وسطح الأنثى السفلى مستو وسطحها العلوى يكون مستويا بادىء الأمر ثم يصبح محدباً بالتدريج بعد ذلك ، والأرجل وقرون الاستشعار سوداء اللون، ويغطى الجسم بمادة شمعية بيضاء، وكيس البيض لونه أبيض ويرى وكأنه مقسم طولياً إلى ١٤ - ١٦ جزء ويبلغ كيس البيض هذا ٢ - ٦ مم فى الطول .

والذكر لونه أحمر قرمزى ويبلغ نحو ٣ مم فى الطول، وجناحاه الأماميان لونهما أزرق معدنى والجناحان متحوران على شكل دبوسين صغيرين .



(شكل ٤٢) البق الدقيقى الاسترالى

١- جزء من فرع شجرة مصاب ٢- أنثى مبكرة ٣- أنثى بالغة من السطح السفلى ٤- ذكر بالغ

### دورة الحياة :

تظهر أكياس البيض فى نهاية بطن الأنثى عادة فى شهرى ديسمبر ويناير، ويحوى كيس البيض نحو ١٧٠٠ بيضة فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والبيضة شكلها مستطيل وسطحها الخارجى أملس ولونها أحمر قرمزي، يفقس البيض بعد نحو ١٦ - ٢٥ يوما وتخرج منه الحوريات التى تصبح إناثا بالغة فى أكتوبر وتظهر بنهاية أجسامها أكياس البيض فى ديسمبر ويناير وتتكرر دورة الحياة . وللحوريات فى حالة الأنثى ٣ أعمار مدتها على التوالى هى : ١٢ - ١٩ ، ١٤ - ١٨ ، ١١ - ٢٣ يوما، وتبلغ فترة ما قبل وضع البيض نحو ١١ -

١٧ يوما في حال الذكر، تتحول الحورية في نهاية عمرها الثالث إلى طور ما قبل العذراء الذي ينسلخ ويدخل في عمر الحورية الرابع وهو طور العذراء الذي يوجد في شرنقة مستطيلة بيضاء ٦ - ١٠ مم في الطول، وعلى العموم فأعداد الذكور في هذه الحشرة قليلة جدا إذ تبلغ نحو ١٪ من أعداد الإناث، وعلى هذا فظاهر التوالد المبكرى هي السائدة ويعتقد بودنهايمر (١٩٥١) أنه حتى ولو تم تلقيح بين الذكر والأنثى فلن يحدث إخصاب بسبب عدم خصوبة حيوانات الذكر المنوية وفي هذه الحالة أيضا يكون التوالد بكريا .

ولهذه الحشرة ٣ - ٤ أجيال في السنة ومدة الجيل تتراوح بين ٨٠ - ٩٦ يوما .

### المكافحة :

١- في حالة الإصابة الخفيفة يكتفى بجمع الحشرات باليد وإعدامها ومسح مكان الإصابة بالماء والصابون .

٢ - تفترس البق الدقيقى خنفساء الفداليا (*Rodalia (Vedalia) cardinalis* (Muls) وحشرات أبى العيد، كما تتطفل على الحوريات الذبابة المسماة *Cryptochaetum iceryae* .

٢ - في حالة الإصابة الشديدة ترش النباتات بالملاثيون ٢ ألف مع ملاحظة عدم جمع الكورمات قبل مرور ٢٥ يوما من العلاج .

### البق الدقيقى المصرى *Icerya aegyptiaca* (Douglas)

وتوجد هذه الحشرة على الأوراق وخاصة الأسطح السفلية متجمعة حول العرق الوسطى . أهم عوائل هذه الحشرة أشجار الفيكس والمانجو والتوت والنبق والجوافة والقشدة وكثير من نباتات الزينة، كما تصيب أيضا القلقاس والملوخية .

تتميز إناث هذه الحشرة بإفرازاتها الشمعية على شكل زوائد سميكة تحيط بجوانب الحشرة (شكل ٤٣)، ويبلغ طول الأنثى نحو ٦ مم وكيس البيض (الذى يوجد مختفيا تحت الزوائد الشمعية) نحو ٤ مم، والبيض لونه أصفر . ولم يشاهد لهذه الحشرة ذكور بجمهورية مصر العربية، ولها ٢ أجيال في السنة .


## الآفات الحشرية التى تصيب الجزر

الجزر من الخضر المعروفة فى كافة الأقطار، ومنه أنواع كثيرة ويستعمل الجزر فى السلطة وتصنع منه مربى الجزر ويزرع الجزر فى مصر طول أشهر العام ما عدا شهرى يونية ويولية ويتعرض المحصول إلى الإصابة بعدد من الآفات الحشرية التى تصيب المحاصيل الأخرى ومنها :

الحفار والدودة القارضة ونطاطات الأوراق والبقعة الخضراء والذبابة البيضاء وأنواع المن وديدان ورق القطن والديدان السلكية وذبابة أوراق الطماطم .

ولقد سبق لنا شرح كل ما يخص هذه الآفات من دورة الحياة ومظهر الإصابة والضرر وطرق المكافحة .

وحتى الآن لم يدخل الجزر برنامج المكافحة الكيميائية للآفات وذلك لعدم جدوى هذه المكافحة من الناحية والإقتصادية .



(شكل ٤٣) البق الدقيقى المصرى

## الآفات الحشرية التي تصيب الفراولة

## الآفات لحشرية التى تصيب

### الفراولة ( الشليك )

تعتبر الفراولة أو الشليك من محاصيل الخضار الرئيسية، تزرع للأستهلاك المحلى والتصدير، وتدخل الثمار فى المربى التى يصدر معظم إنتاج مصر منها - كذلك تجمد ثمار الفراولة وتعبأ وتصدر للأسواق الخارجية ويوجد عليها إقبال شديد .

وقد حدث توسع كبير فى زراعة الفراولة فى مصر فى السنين الأخيرة فزعت مساحات من الإراضى بها، وامتدت زراعتها إلى الأراضى الرملية حديثة الإستصلاح، وكان لذلك أثره فى زيادة الإنتاج ووفرته حتى أصبحت الفراولة فى مصر من الخضار الشعبية رخيصة الثمن ويمكن أن توجد فى الأسواق طوال العام وتتعرض مزارع الفراولة إلى الإصابة بعدد كبير من الآفات الحشرية التى تؤثر على الإنتاج كما ونوعا، ومما زاد من خطورة هذه الآفات أن هذا المحصول كان يزرع فى منطقة معينة (جزء من محافظة القليوبية)، ومن عادة المزارعين أن يتركوها فى الأرض لموسمين متتالين، وهذا يسهل من سرعة انتشار الآفات من حقل إلى حقل وتوالى تكاثرها طول العام، أما الأراضى الحديثة الإستصلاح التى تم زراعتها بالفراولة فقد انتقلت منها إلى المحصول آفات متوطنة لم تكن تصيب الفراولة من قبل .

ولكافة آفات الفراولة مشاكل وصعوبات معقدة، بسبب طبيعة المحصول وطريقة زراعته، فكما سبق أن ذكرنا قد يترك المحصول فى الأرض لسنتين أو أكثر، وذلك يعطى الفرصة للآفات الحشرية فى التواجد المستمر من سنة لأخرى، وهذه الحقيقة ملموسة فى الآفات التى تهاجم المجموع الجذرى للفراولة والتى يصعب مكافحتها ما دام المحصول موجودا فى



الأرض ويظهر الكثير من آفات الفراولة في طوال السنة في الأشهر التي تعتبر من أشهر الإنتاج وجمع الثمار حيث تجمع هذه الثمار كل ثلاثة أيام إلى سبعة، ولهذا فإنه إستعمال المبيدات الكيماوية لمكافحة الآفات يعتبر من أخطر الأمور للحرص على عدم تلوث الثمار بهذه السموم.

وفي هذا الباب سوف نشرح أهم الآفات الحشرية التي تصيب هذا المحصول الهام وأفضل الطرق لمكافحتها .

## أولا الآفات التي تصيب أوراق الفراولة

### ١ - المن

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة المن Fam Aphididae

تصاب نباتات الفراولة بأكثر من نوع من أنواع المن أهمها :

أ - من الفراولة *Pentatrichopus fragefolii* (Cockrell)

ب - من الفراولة المشابه *Pentrichopus thomasi* Hillris & Lambers .

ومن الصعب التفريق بين هذين النوعين من المن، وتقل كثافتها العددية في الجو البارد وتتزايد أعدادها في الربيع ويسببان خسارة فادحة لنباتات الفراولة. وقد يطلق عليهما أيضا من الورد، من الورد المشابه.


من القطن *Aphis gossypii* Glover

ويظهر بشدة أيضا في الربيع في مصر ويصيب الفراولة، والمن بأنواعه ينقل للفراولة والأمراض الفيروسية مثل مرض التقاف الأوراق، ويتربى المن على الحشائش البرية ومنها ينتقل إلى الفراولة ويصيب النوعان أ ، ب الورد أيضا وقد يكون الورد مصدر العدوى للفراولة .

## مظهر الإصابة :

فى أثناء فصل الربيع، يُرى من الفراولة متجمعا على السوق والوريقات الصغيرة النامية، ويمكن أن يرى أيضا حول عروق الأوراق الكبيرة، ومن الورد حشرة صغيرة لونها أبيض مصفر، وقرون إستشعارها طويلة نسبيا، وحوريات هذا النوع تشبه الحشرات اليوافع ولو أن حجمها أصغر وهي أكثر شبها بالإناث غير المجنحة .

والإناث المجنحة من هذا المن لها شكل مختلف تماما، فلونها أخضر مصفر لامع ، وينتشر على رأسها وجسمها علامات سوداء كثيرة (٤٤)



(شكل ٤٤) من الفراولة يفتدى على ساق ورقة فراولة

## دورة الحياة

تحت ظروف البيئة المصرية، يتكاثر من الفراولة طوال العام وتبلغ أعداده أعلى نسبتها فى شهر مارس ثم تتناقص أعداده إلى مستوى منخفض فى نهاية الربيع وفى خلال الصيف، فيما عدا فى المناطق الساحلية فإن تواجده يستمر طوال العام .

وفى فصل الخريف تبدأ أعداد من الفراولة فى التزايد من جديد.

ولكن قدوم البرد يحد من تكاثره إلى درجة كبيرة .

وتصل أعداد أفراد المن المجنحة إلى ذروتها في شهر مارس حيث يتحول ٤٠٪ من أفراد العشيرة إلى أفراد مجنحة ، ثم يتناقص أعداد الأفراد المجنحة سريعا في شهر مايو وتصل إلى أدنى حد لها في الصيف، ثم يرتفع عددها من جديد إلى درجة متوسطة في شهر أكتوبر ثم يتناقص كثيرا في نوفمبر ولا يوجد إلا أفراد مجنحة قليلة العدد في فصل الشتاء.

### أضرار المن : -

يصيب من الفراولة أوراق وسوق نباتات الفراولة وتمتص منها العصارة فتضعف النباتات، وتفرز الحشرات السائل السكري (الندرة العسلية) على الأجزاء المصابة فينمو عليها الفطريات وتتجمع الأتربة التي تسد ثغور الأوراق . وهذه الأضرار كلها محتملة، ولكن الخطر الأكبر لهذا المن هو نقله للعديد من الأمراض الفيروسية لنباتات الفراولة، والتي قد تقضى علي مزارع بأكملها إذا كانت الإصابة شديدة، ويكفى وجود أفراد قليلة من المن لنقل الأمراض الفيروسية وتدمير المحصول .

### التأعداد الحيوية للمن

يوجد للمن أعداء حيوية عديدة تحد من كثافته العددية وتقلل من أخطاره، ومنها حشرات أوى العيد، وذباب السرفس ويرقات أسد المن وهذه كلها مفترسات، وفوق ذلك توجد عدة زنابير متطفلة على المن تحد من أعداده، خصوصا عند إرتفاع نسبة الرطوبة وبعد سقوط الأمطار وهذه تسبب أمراضا فطرية تقضى على الكثير من عشيرة المن .

وقد أتضح أن سبب تناقص أعداد المن في فصل الصيف يرجع إلى حدوث تغيرات فسيولوجية لنباتات الفراولة يجعلها غير مقبولة بالنسبة للمن .

### طرق مكافحة من الفراولة

يمكن لنباتات الفراولة تحمل عدد كبير من حشرات المن بون ضرر، كبير ومن ناحية أخرى

فإن طيران حشرة واحدة مجنحة من المن فوق حقل من نباتات الفراولة، يمكنها أن تنقل عنوى الأمراض الفيروسية إلى عدد كبير من النباتات السليمة .

ولنحذر من أضرار المن المغتذى على عصارة النباتات ودرء خطر الندوة العسلية . (الإفراز السكرى للمن) فإنه من الضروري أن نبدأ بالمكافحة الكيميائية عند وصول عدد ٣ حشرات من المن إلى ١٠ - ٢٠ حشرة على الورقة، وقبل أخذ القرار بالمكافحة الكيميائية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الكثافة العديدة للآفة قد تتناقص في المستقبل القريب بسبب قدوم الطقس الحار أو نشاط الأعداء الحيوية .

ولدفع خطر إنتشار الأمراض الفيروسية بين نباتات الفراولة، يجب الحرص على بقاء أعداد حشرات المن في أدنى مستوى أى حشرة واحدة لكل نبات .

وحيث أن الأفراد المجنحة من المن هي التي تقوم بنقل الأمراض الفيروسية، فإنه من الضروري إجراء عملية مكافحة الكيميائية في الوقت التي تتزايد فيه أعداد هذه الأفراد وتصل إلى ذروتها (في نهاية مارس وفي شهر أكتوبر) .

ومن الأمور الهامة لمنع إنتشار الأمراض الفيروسية هو إختيار الشتلات الخالية من الأمراض وزراعتها في المشتل وبذلك نقضى على مصدر عنوى الأمراض الفيروسية ومن معوقات استخدام المبيدات الكيميائية في مكافحة من الفراولة هو إستمرار موسم الجمع لفترة طويلة وقصر المدة التي تجمع فيها الفراولة (٣ - ٧ أيام) وبذلك يتعذر إستخدام المبيدات حتى لا تتلوث الثمار .

ويمكن مكافحة من الفراولة باستخدام أي مبيد مستخدم لمكافحة أنواع المن الأخرى، وحيث أن هذا المن يختبئ بين طبقات الوريقات، فإن المبيد الذي يستخدم في مكافحة لأبد أن يكون على التطاير حتي يصل إليه وله أثر باق طويل الأمد ، وقد أثبتت المبيدات الجهازية فاعلية في المكافحة .

## د - من جذور الفراولة *Aphis forbesi* weed

يهاجم هذا المن عنق الأوراق والبراعم الورقية الصغيرة، ويمكن تفريقه عن من الفراولة من بيضته القصيرة فى مظهرها ذات اللون الأخضر المزرق .

وفى المناطق المعتدلة الطقس شتاء، يستمر هذا النوع من المن فى التوالد بكريا طوال فصل الشتاء، وله أجيال كثيرة فى السنة، ومعظم الإناث اليوافع غير مجنحة، ولكن تتكون أفراد مجنحة منه خلال الصيف والخريف، وفى المناطق الأكثر برودة تتكون أفراد جنسية مؤنثة وأخرى مذكرة فى فصل الخريف، تتلاقح هذه الأفراد وتضع بيضا يدخل فترة السكون أثناء الشتاء .

## الآضرار والمكافحة

تتكاثر أعداد من جنور الفراولة حول تيحان النباتات حيث تتغذى على حوامل الأوراق والبراعم الورقية الصغيرة الفضة (شكل ٤٥) فيضعف النبات ويجف، وفى أماكن عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية يهاجم هذا المن جنور نباتات الفراولة فيحدث خسائر كبيرة قد تقتل النباتات وفى هذه الحالة يمكن مكافحة هذا المن فى مهاد النباتات قبل إثمارها .



(شكل ٤٥) من جنور الفراولة فوق عنق ورقة فراولة

وفى مصر يكافح المن ونطاطات الأوراق والذبابة البضاء بعلاج مشترك يستعمل فيه مبيد أكتك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر للفدان يضاف إليه ٤٠٠ لتر ماء .

## ٢ - الذباب الأبيض

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الذباب الأبيض Fam. Aleyrodidae

يهاجم الفراولة نوعان من الذباب الأبيض هما :

أ - ذبابة الفراولة البيضاء *Trialeurodes packardi* M.

ب - ذبابة الأيرس البيضاء *Aleurodes spiroepides* Q-

والأنتان تصيبان نبات الفراولة وتنزلان بها خسائر تعادل الخسائر التي يسببها المن . وهما يمتصان عصارة النبات ويفرازان كميات كبيرة من الندوة العسلية ينمو عليها الفطريات ولكنهما على الأرجح ينقلان للنبات أمراضا فيروسية، ويفضل الذباب الأبيض الطقس ذو الحرارة المرتفعة ولذلك يكثر وجوده في المناطق الدافئة .

### وصف ذباب الفراولة الأبيض

الحشرة اليافعة صغيرة الحجم (طولها ٩.٠مم) لون الجسم أصفر والأجنحة مغطاة بطبقة شمعية بيضاء ، ويمكن رؤيته وهو يطير حول النباتات إذا ما أزعج،

وذبابة الأيرس اليافعة يوجد على أجنحتها الأمامية زوج من البقع السوداء الباهتة، وتعيش الأطوار غير اليافعة لهذه الذبابة على السطح السفلى للأوراق وتشبه الحشرات القشرية بسبب شكل جسمها البيضاوي، ولونها أصفر فاتح أو أبيض شفاف، أما الأطوار غير اليافعة لذبابة الفراولة البيضاء فيمكن تمييزها عن أطوار ذبابة الأيرس بوجود أهداب شمعية بيضاء مستديمة لا توجد في حوريات ذبابة الأيرس .

### دورة الحياة :

تقضى الأطوار غير اليافعة لذبابة الفراولة البيضاء الشتاء بين أوراق الفراولة، تتحول إلى

الطور اليافع في الربيع الباكر حيث تبأ فوراً في وضع البيض فوق الأسطح السفلى للأوراق، ويستمر وضع البيض ونضج الحوريات خلال أشهر السنة الدافئة، وتستغرق فترة النمو من البيضة حتى الحشرة اليافعة (الجيل) من ٤ - ٥ أسابيع، وللحشرة عدة أجيال متداخلة في السنة .

### الأضرار التي تسببها وطرق المكافحة

يوجد الذباب الأبيض باستمرار في مزارع الفراولة، ولكن نادراً ما يتكاثر بأعداد كبيرة ينشأ عنها ضرر بالغ، فالمفترسات والمتطفلات تعمل دائماً على خفض مقداره، كما أن تطويع النباتات في الربيع له أثره في التخلص من أعداد كبيرة من الأفراد التي كانت مختبئة خلال فصل الشتاء، لذلك فالمكافحة الكيماوية تعد غير ضرورية في هذه الحالة، ولا تتسبب هذه الآفة في حدوث أضرار كبيرة إلا عند حواف الحقل حيث تكون أعدادها زائدة .

ولكن عندما تصبح كميات الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات كبيرة (وترى على السطح السفلى للأوراق) فإنه ينصح بالمكافحة، ولكن المكافحة بالكيماويات صعبة وتكاد تكون مستحيلة، ولكن مجرد رش النباتات يزداد متواصل من الماء كاف لغسل الأوراق وإزالة الأطوار غير اليافعة للحشرة من عليها، ويمكن تكرار هذه المعالجة إذا لزم الأمر، وفي جميع الأحوال فإن استعمال المبيدات الكيماوية لا ينصح به أبداً حتى لا تترك أثراً باقياً على الثمار.



(شكل ٤٦) ذبابة الفراولة البيضاء على السطح السفلى للورقة

### ٣ - صانعة أنفاق أوراق الفراولة

الاسم العلمي للحشرة *Tischeria Sp*


رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة ليونتييدي Fam. Lyonetiidae

تتواجد هذه الحشرة طوال العام وتصنع يرقاتها أنفاقا في أوراق الفراولتو، وعندما تزداد أعدادها تصنع أنفاقا كثيرة في الورقة تسبب لها ضررا ملحوظا.

#### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة عبارة عن فراشة اسطوانية الشكل صغيرة الحجم ذات لون رمادي معدني، ويبلغ طولها نحو ٣مم، واليرقة يمكن رؤيتها داخل النفق وهي مفلطحة، خضراء اللون، حلقات جسمها واضحة ولون الرأس بني قاتم (شكل ٤٧)، وتقضي اليرقة فصل الشتاء داخل النفق وتتحول إلى عذراء في الربيع ثم تخرج منها الفراشة، وبعد التزاوج مباشرة تبدأ الأنثى في وضع البيض فوق الأوراق الكبيرة وهي مناسبة أكثر من الصغيرة لوضع البيض بسبب سمكها الأكبر، وللحشرة عدة أجيال في السنة.



(شكل ٤٧) - صانعة أنفاق أوراق الفراولة

اليرقة مستخرجة من أحد الأنفاق إلى اليمين أوراق فراولة بها أنفاق إلى اليسار



## الضرر والمكافحة

تحفر يرقة هذه الآفة بين سطحى الورقة وتلتف الأنسجة الداخلية لها وكلما زاد نمو اليرقة فإنها تدمر مساحة أكبر فأكبر حتى يصبح النفق أشبه ما يكون ببقعة متسعة، والأعداد القليلة من الأنفاق لا تسبب ضررا ملحوظا، ولكن الكثير منها يضر بالورقة ضررا كبيرا ويحد من قدرتها على القيام بوظائفها .

وتكافح هذه الحشرة طبيعيا بواسطة زنبور متطفل يضع بيضه فى داخل أنفاق اليرقات، ويقضى على أعداد كبيرة منها، ولا ينصح أبدا بإستعمال المبيدات الكيماوية فى المكافحة نظرا لطبيعة الفراولة، ولكن تطويع النباتات فى الربيع وإحراق الأجزاء المطوشة يقضى على أعداد كبيرة من اليرقات التى قضت فصل الشتاء داخل الأنفاق فى هذه الأوراق ويعطى فاعلية كبيرة فى المكافحة .

## ثانيا الآفات التى تصيب الأزهار والثمار

يوجد الكثير من الآفات الحشرية التى تسبب التلف أوراق الفراولة أو طيها، وللكثير منها عادات متشابهة فى لف أوراق الفراولة والأغذاء على المجموع الخضرى .

وعند إنزعاج يرقات هذه الآفات فإنها تتلوى إلى الخلف بسرعة فائقة، واغتذاء هذه الآفات على الأوراق أقل ضررا من إغذائها بعد ذلك على الثمار، فهذه اليرقات تحفر داخل الثمار وتستقر بها حتى تدخل الثمار فى عمليات التعليب أو التجميد نون أن تلاحظ، وعند فتح العلب أو إستعمال الثمار المجمدة تظهر هذه اليرقات وتعتبر عيبا كبيرا فى التصنيع .

ونذكر هنا ثلاثة من هذه الآفات كلها تتبع رتبة حرشفية الأجنحة وفصيلة تورتريسيى

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيى Fam. Tortricidae

## ١- فراشة ثمار الحديقة


*Ptycholoma peritana* (Clem)

وهى من أشهر الحشرات الالفة لأوراق الفراولة، وبالرغم من أن الفراشة يمكن رؤيتها وهى تطير فى المساء أو عند إنزعاجها، فإنه من الصعب ملاحظة وجود اليرقة بسبب عاداتها الخاصة فى التخفى .

### وصف الحشرة

يبلغ طول الفراشة ٧ مم ولونها بنى مصفر وأجنحتها عندما تنطبق منبسطة فوق الجسم تشبه الجرس وكل من الجناحين الأماميين عليه شريط متعرج ونقطة بنية غامقة على حافته .

واليرقة أسطوانية الشكل طولها ١٢, ٥ مم عندما تكون تامة النضج ، ولون الجسم رمادى مخضر ولون الرأس بنى فاتح، وعلى كل جانب من جانبي الرأس توجد بقعة واضحة لونها بنى غامق (شكل ٤٨).



(شكل ٤٨) فراشة ثمار الحديقة

## دورة حياة

تقضى هذه الحشرة فصل الشتاء فى صورة يرقات وعذارى تتواجد فى الركام حول قاعدة النباتات، ويمكن رؤية بضع يرقات منها فى أيام الشتاء الدافئة، ولكنها ترى بكثرة فى شهر مارس أو فى أوائل شهر إبريل، ويوضع البيض على أسطح الأوراق المسنة فى مجموعات مكونة من ١٨ بيضة للمجموعة وكتلة البيض شفافة تشبه القشرة، وبعد الفقس تخرج اليرقات وبدلا من أن تغتذى على الأوراق فإنها تتجه إلى الركام الموجود حول تاج النباتات وتغتنى على الأوراق الجافة الميتة والمتحللة، تضمها إلى بعضها، وللحشرة أربعة أجيال فى السنة، ولكن دائما ما توجد جميع الأطوار معا ولذلك من الصعب تحديد بداية ونهاية كل جيل .

## الضرر

تغتنى اليرقات معظم الوقت على الأوراق والثمار المتحللة ولا تسبب عندئذ أى أضرار، ولكن سرعان ما تتزايد أعداد اليرقات وتغتنى على كل الركام والثمار المتحللة الموجودة التى ما تلبث أن تنتهى، عندئذ تهاجم اليرقات الأوراق الغضة والثمار، وفى هذه الحالة تموت الأوراق الصغيرة تماما، ثم تحفر اليرقات فى الثمار أنفاقا ضحلة تحيطها بكمية كبيرة من الغزل الحريري وهذا يقلل من القيمة التجارية للثمار ويسمح للفطر بدخول الثمرة فيدمرها تدميرا .

ويتتابع الضرر أثناء الجنى وتجهيز الثمار وذلك لوجود نسبة من اليرقات بالثمار تستمر فى نسج الخيوط الحريرية أثناء الجمع والتجهيز وتظهر أثارها فى المنتج النهائى، وعلى أى فإن الضرر يكون محدودا إذا كانت الكثافة العددية لا تسبب للمنتج مشاكل فى غاية الخطورة .

## طرق المكافحة

يوجد فى الطبيعة بعض الزنابير المتطفلة التى تقوم بجهد كبير فى الحد من أعداد يرقات هذه الآفة وبالتالي لا ترى إلا أعداد صغيرة من فراشاتها الطائرة، ولذلك ما دامت هذه المتطفلات نشطة فمن المستحسن عدم إتخاذ قرار بالمكافحة الكيماوية، علما بأن مكافحتها كيماويا أمر يصعب تحقيقه بسبب وجود اليرقات فى المخلفات والركام ولكن من المفيد كنس الركام وإزالته من حول النباتات ما أمكن ذلك .

## ٢- آفة أوراق الفراولة


*Ancylus comptana fragariae* (Wond R.)

توجد هذه الآفة في أقطار كثيرة من الأقطار التي تزرع الفراولة، ويزداد خطرها في الأماكن الدافئة وتسبب خسائر كبيرة للمحصول .

### وصف الحشرة

تنشط فراشات هذه الحشرة نهاراً، ولكنها تكون غير ملحوظة لإختبائها خلف الأوراق، وهي تطير من نبات إلى آخر عند الإنزعاج تشرع في الإختباء بين الأوراق، ولكن يمكن ملاحظة طيرانها من نبات إلى آخر عند إنزعاجها، وحجم هذه الفراشة صغير إذا يبلغ طولها ٦,٥ مم وعند طي أجنحتها يبدو شكل الجسم إسطوانى، ولون الجسم بنى محمر، ولكن يوجد على ظهرها خطوط متموجة بيضاء .

وتوجد اليرقات داخل طيات الأوراق المطوية والميتة جزئياً والتي يمكن ملاحظتها على النباتات، واليرقة إسطوانية الشكل خضراء اللون طولها نحو ١٢ مم عند تمام نموها ورأس اليرقة بنية اللون وعند قمة الطرف الأقصى للبطن يوجد علامات بنية قاتمة مميزة ليرقة هذه الآفات عن غيرها من الآفات الالفة للأوراق (شكل ٤٩) .



(شكل ٤٩) آفة أوراق الفراولة أ - الفراشة ، ب - اليرقة

## دورة الحياة

تعتبر دورة حياة هذه الحشرة مماثلة لدورة حياة الكثير من الحشرات الالفة للأوراق، فهي تقضى البيات الشتوى فى صورة يرقات أو عذارى توجد بين طيات الأوراق، وفى الربيع الباكر - فى نهاية فبراير أو أوائل مارس - تخرج الفراشات وتتزاوج وتضع بيضا مفلطحا شفافا على السطح السفلى للأوراق المسنة، وبعد الفقس مباشرة تتغذى اليرقة لفترة قصيرة على الأوراق العادية ثم تبدأ فى لف الأوراق، ويتم التعذير داخل طيات الأوراق الملفوفة، والحشرة أربعة أجيال فى السنة .

## مظهر الضرر

هذه الآفة - بخلاف غيرها من الآفات الالفة للأوراق والتي تصيب العديد من المحاصيل - متخصصة فى إصابة الفراولة بأنواعها المختلفة، وبعد طى اليرقة للورقة تأخذ فى الإغذاء على العرق الوسطى حتى تصل إلى منتصف الورقة فيموت نصف الورقة وهذه علامة مميزة لمظهر ضرر هذه الحشرة دون غيرها .

وعندما تتزايد أعداد هذه الآفة تصبح خطره على الفراولة، ولكن إذا كانت الإصابة خفيفة أو متوسطة فإن الخطر يكون غير ملحوظ .

## طرق المكافحة


يعتبر تطويعش النبات وإزالة الأوراق الجافة فى بداية الربيع من الطرق الفعالة فى مكافحة هذه الآفة، كذلك يوجد فى الطبيعة بعض المتطفلات التى تنشط فى الربيع وتحد من خطورة الآفة، وعليه فإن المكافحة الكيميائية لا يمكن التوصية بها حتى لا تتلوث بها الثمار ولا سيما أن اليرقة توجد بين طيات الأوراق ومن الصعب توصيل المبيدات إليها .

## ٣ - طاوية الاوراق الكانسة (*Cnephasia longamna* (Haw.)

هذه الآفة من الآفات الخطيرة التى تصيب نباتات الفراولة، وسبب خطورتها هو ميلها للحفر فى الثمار، وهذه الآفة لا تقاس خطورتها بكثافتها العددية كسابقاتها، ولكن بمجرد الإصابة بها ولو على مستوى خفيف ينزل أضرار بالمحصول لأنه يعوق إدخال الثمار المصابة فى عمليات التصنيع .

## وصف الحشرة

تطير الفراشات ليلا وتظهر في شهر مايو، ويمكن رؤيتها تطير عند إنزاعاجها نهارا، وضررها لا يمكن ملاحظته لأن أعدادها قليلة نسبيا، ولكن عند فرز الثمار تستبعد المصابة منها بالآفة لعدم قابليتها للتصنيع ومن هنا تأتي الخسارة ، ويبلغ طول الفراشة نحو ١١ مم، ولون الأجنحة بني فاتح أو رمادي، ويمكن تمييز الفراشة الأنثى عن الذكر وذلك لأن أجنحة الأنثى أكثر تبرقشا من أجنحة الذكر، (شكل ٥٠) ويبلغ طول اليرقة التامة النمو ١٢,٥ مم ويمكن تمييزها عن غيرها من أنواع اليرقات الطاوية للأوراق بمظهرها الغليظ، واليرقات الصغيرة لونها أبيض ورأسها أسود لامع، بينما اليرقات الكبيرة (قرب تمام نضجها) يكون جسمها مخططا بثلاثة خطوط رمادية خفيفة . توجد هذه الخطوط على الظهر (شكل ٥١) ولون رأسها بني فاتح ومبقعة ببقع قاتمة على كل من جانبيها .




(شكل ٥٠) فراشة طاوية الأوراق الكانسة (الذكر على اليمين والأنثى على الشمال)

## دورة الحياة

لهذه الحشرة جيل واحد في السنة، وتطير الفراشات في شهر مايو ويونيه وتضع بيضها فوق قلف الأشجار وغيره من الأسطح الخشنة مثل الأسبجة الخشبية وأعمدة التليفون، يفقس البيض بعد وقت قصير وتخرج منه اليرقات التي تقوم في الحال بغزل شرنقة من الحرير تظل بداخلها دون نشاط طول الصيف والشتاء، وفي خلال شهرى فبراير ومارس، تقوم اليرقات

الصغيرة بغزل خيوط حريرية تتدلى منها حيث تحملها الرياح إلى المحاصيل المجاورة، وعندئذ تقوم اليرقات بحفر أنفاق في الأوراق لعدة أسابيع وتستمر في وضع خيوط الغزل بين الأوراق، وفي هذا الوقت تظهر خطورتها لقيامها بمهاجمة أزهار وثمار الفراولة تعذر اليرقات بين الأوراق التي نسجت عليها غزلها، وينحسر خطر هذه الحشرة في شهر مايو ويونيه حتي السنة التالية.



(شكل ٥١) يرقات طاوية الأوراق الكانسة

### مظهر الضرر

لا يقاس الضرر الذي يصيب الأوراق بذلك الذي يصيب البراعم الزهرية والثمار الخضراء وتنتج اليرقة فوق ذلك كمية كبيرة من خيوط الغزل، وعند نضج الثمار تقوم اليرقة بالحفر داخل الثمرة، وتظل اليرقة داخل الثمرة ولا تظهر إلا عند تقطيع الثمار وتجهيزها للعمليات الصناعية والتعليب .

### طرق المكافحة

من الصعب مكافحة هذه الافة أو السيطرة على مناطق انتشارها لأنها كما سبق ذكرنا تنتشر من مكان إلى آخر بواسطة الرياح، ولا يمكن مكافحة اليرقة كيماويا وذلك بسبب إختبائها داخل خيوط الغزل أو داخل الأنفاق التي تصنعها في الثمار، ولكن يمكن تعفير النباتات بمبيد فعال في شهر إبريل قبل بدء التزهير، وفي هذا الوقت تكون اليرقات صغيرة وتبدأ في التحول من الحفر إلى غزل الخيوط بين الأوراق.


## ٧- إبر العجوز

فصيلة الحشرات جلدية الأجنحة Order Dermaptera

فصيلة لابديوريدي Fam. Labiduridae

إبر العجوز حشرات ليلية تختبئ بالنهار فى الشقوق وتحت فلق الأشجار وهى حشرات رمية ولكنها تكون أحيانا نباتية وتقضى إبر العجوز الشتاء على هيئة بيض يفقس فى الربيع، ويوضع البيض فى شقوق التربة وتحرسه الأنثى حتى يفقس، والبيض فاتح اللون بيضاوى الشكل وسطحه الخارجى أملس وتضع الأنثى الواحدة نحو ٢٠ - ٨٠ بيضة، وتنسلخ الحورية ٤ إنسلخات ويوجد لهذه الحشرات جيل واحد فى السنة ويتبع هذه الفصيلة :

١ - إبرة العجوز الكبيرة *Labidura riparia* Pall (شكل ٥٢)



(شكل ٥٢) إبرة العجوز الكبيرة



وتوجد فصيلة أخرى من إبر العجوز في العالم العربي هي فصيلة *Labiidae* ويتبعها :


ب - إبرة العجوز الصغيرة (شكل ٥٣) *Labia minor* L.

وهي تشبه الأولى في الصفات والعادات وأماكن التواجد وينتج هذه الفصيلة نوع آخر موجود في بلاد البحر الأبيض المتوسط وهي :

ج - إبرة العجوز الأوربية (شكل ٥٤) *Forficula auricularia* Lin

### مظهر الإصابة والضرر

لا تسبب إبر العجوز ضررا كبيرا لنباتات الفراولة، ولكنها تهاجم الثمار، ومن آثار إغتها وجود حفر عميقة في الثمار، ويمكن تمييز هذه الإصابة من تلك التي تحدثها البزاقات وذلك بعدم وجود مادة غروية لزجة تلوث حفر الإصابة وتلك هي التي تحدثها البزاقات.



(شكل ٥٣) إبرة العجوز الصغيرة

## المكافحة

ولمكافحة إبر العجوز يجب إزالة المخلفات والركام الموجود بالقرب من حقول الفراولة، ويمكن إستعمال مبيد فعال فى رش أو تعفير الأماكن المحيطة بحقول الفراولة للحد من أعدادها ولمكافحة إبر العجوز داخل حقول الفراولة، فإنه من الممكن وضع مصائد لها فوق البتون والأماكن المرتفعة من الأحواض، وهذه المصائد تطعم بزيت السمك والنخالة وفلوسيليكيات الصوديوم، ويكرر وضع المصائد للحصول على مكافحة فعالة.



(شكل ٥٤) إبرة العجوز الأوربية

## ٨ - الديدان القارضة

وهذه الديدان كما سبق أن ذكرنا تابعة لرتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera وفصيلة الفراشات الليلية Fam.Noctuidae وتنتشر فى أقطار العالم العربى أنواع عديدة من هذه

الديدان سبق لنا ذكر أغلبها فى مواضع أخرى من هذا الكتاب، ونوجز هنا وصفا لفراشات الديدان القارضة: -

فراشات كبيرة الحجم عادة ما يكون لونها بنيا أو رمادى أو أسود حسب النوع، ويبلغ طولها نحو من ٣,٥ - ٤ سم، وهى فراشات ليلية يطلق عليها أحيانا المغبرات millers وهى تنجذب إلى الضوء (شكل ٥٥)



(شكل ٥٥) فراشة الودة القارضة

ويرقاتها بدينة براقة ويصل طول اليرقة التامة النمو نحو ٤ سم وهى أما بنية اللون مرقطة أو رمادية، وتغذى اليرقات أثناء الليل ويمكن أن تجدها مختبئة أسفل النباتات أثناء النهار .

وتشاهد فراشات الديدان القارضة فى مصر والعالم العربى فى الشتاء وأوائل الربيع وتختفى عندما تشتد درجات الحرارة صيفا، والحشرة أكثر من جيل فى السنة .

وتغذى الديدان القارضة عادة على الحشائش والمحاصيل المختلفة، وتهاجم هذه اليرقات ثمار الفراولة فى أواخر الشتاء وفى الربيع .

## الأضرار التي تسببها

تحدث الديدان القارضة ثقوبا مميزة في ثمار الفراولة، وليس بها خيوط حريرية أو مواد مخاطية مثل تلك التي تحدثها الحشرات اللافة للأوراق أو البزاقات (القواقع)، وحيث أن البودة القارضة تغتذى على عدد من الثمار في نبات واحد أو عدد من النباتات، فإن الثمار المصابة تكون مركزة في منطقة معينة وهذا يميزها عن الإصابة التي تحدثها الديدان المستنقعات الملحية salt march caterpillars التي تنتشر في مساحات واسعة عندما تكون ناضجة.

## طرق المكافحة

تكافح البودة القارضة والحفار معا عند إصابتهما للفراولة بالأطعمة السامة كما سبق أن ذكرنا في مكافحتها على محصول البطاطس .

## ٩- ديدان ورق القطن

تهاجم ديدان ورق القطن العادية والخضراء حقول الفراولة في شهر إبريل ومايو، أو تهاجر من حقول البرسيم بعد حشه وإزالته بأعداد كبيرة إلى حقول الفراولة المجاورة، وانتقال اليرقات الجماعى هذا معروف في كل أنحاء العالم، ولذلك تسمى هذه الآفات The army worms أى اليرقات الجياشة لأنها تتحرك بأعداد كبيرة مثل الجيوش، وتتغذى ديدان ورق القطن على أوراق الفراولة ثم تصيب الثمار وتحدث بها ثقوبا، وغالبا ما يستمر وجود اليرقة داخل الحفرة التي تصنعها في الثمرة وتأخذ طريقها وتظهر في معلبات الفراولة المجمدة، وطول الصيف تكون الفراولة معرضة لفتك هذه الديدان إذ تضع الفراشات بيضها على أوراق الفراولة ويفقس البيض وتخرج منه اليرقات التي تهاجم الأوراق والثمار .

## طرق المكافحة

يمكن منع هذه الديدان من الانتقال من المحاصيل المجاورة لحقول الفراولة وذلك بأحاطة حقل الفراولة ببتون عالية يليها مروي مائى في وينثر فوق سطح البتون جير حى فتموت الديدان عند عبورها لهذه الحواجز، وقد يوضع مبيد مناسب تعفر به هذه البتون، ولكن من الصعب مكافحة ديدان القطن إذا إنتشرت في حقل للفراولة باستخدام المبيدات الكيماوية حتى لا تترك أثرها على الثمار.

## ثالثا الآفات الحشرية التي تهاجم التاج والجذور .

### ١٠ - فراشة تاج الفراولة

الاسم العلمي للحشرة . *Ramosia biblonipennis* (Bolvl)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الفراشات الليلية Fam. Noctuidae

تهاجم هذه الآفة نباتات الفراولة وتعد من الآفات الخطيرة في الكثير من الأقطار وتسبب اليرقة كل الأضرار حيث تفرغ Hollow out تاج النبات .

فيموت النبات كله أو يموت جزء منه، وعادة ما تهاجم هذه الآفات بضع نباتات متفرقة في الحقل ، ولكن أحيانا تزداد الكثافة العددية لهذه الحشرة بحيث تصيب كل نباتات الفراولة في الحقل تقريبا .

### وصف الحشرة

تظهر الفراشات في يومية وترى أما مستقرة على نباتات الفراولة أو طائرة بطريقة عشوائية بالقرب من نباتات الفراولة ولونها السائد أسود مع وجود أشرطة صفراء واضحة فوق الجسم والأرجل، ويبلغ طول الفراشة ٧,٥ مم وتشبه هذه الفراشة الدبور ذو السترة الصفراء ( أو الدبور الأصفر) بسبب أجنحتها الرائقة وشكل الجسم العام ويختلط الأمر على البعض بينهما أحيانا

ويبلغ طول اليرقة ٢,٥ سم حينما تكون تامة النمو، ولون رأسها بني ولون الجسم مائل للبياض أو قرنفل، وهي اسطوانية الشكل وحلقات الجسم واضحة، ويمكن التمييز بينها وبين يرقات السوس من جسمها الطويل وأرجلها الصغيرة الواضحة .



(شكل ٥٦) - فراشة الفراولة .

ب - منظر جانبي لليرقة ترى فيها الأرجل القصيرة ولكنها واضحة

### دورة الحياة

تخرج الفراشات من تيجان الفراولة في شهر يونيو ويوليو وتبدأ في وضع البيض بعد ذلك بفترة وجيزة ولعدة أسابيع، والبيضة بنية اللون مفلطحة، ويوضع البيض فرديا فوق السطح السفلي للأوراق أو فوق أجزاء النبات الأخرى القريبة من التاج، يفسد البيض بعد نحو ١٠ أيام حيث تزحف اليرقات فوراً نحو التاج وتحفر في منطقة الخشب، وبعد أن تصنع اليرقة نفقا كبيرا تصنع لنفسها شرنقة حريرية تقضى فصل الشتاء داخلها، وفي الربيع تستأنف اليرقة الإغذاء وتستمر في ذلك حتى تتحول إلى عذراء في شهر مايو ويونيه وتعذر اليرقة داخل تاج النبات بعد أن تغزل شرنقة ثانية ولهذه الحشرة جيل واحد في السنة .

### الأضرار التي تسببها

تتغذى اليرقة طول حياتها على ما بداخل تاج النبات، فهي تصنع نفقا في الخشب منتجة كمية كبيرة من الفضلات وأخيراً تتمكن من نفريغ منطقة التاج تفريغا تاما (شكل ٥٧)، فتقتل بذلك الجزء العلوى من النبات، ويمكن ملاحظة هذا الضرر في الخريف أو الربيع ويتوقف

ذلك على الوقت الذي أنفقته اليرقة في تفريغ التاج وحيث أن اليرقة تركز منطقة إغذائها على تاج واحد أو عدة تيجان في النبات فإن جزءا من النبات فقط قد يقتل لأن البيض يوضع فرديا فإن عدة نباتات متفرقة في الحقل هي التي تصاب، وتفتدى اليرقة على عدة تيجان في النبات الواحد ولذا فهي لا تنتقل من نبات لآخر وليس مثل ما تصنع الآفات الساكنة في التربة ولذا ترى النباتات المصابة مبعثرة في الحقل بين النباتات السليمة، وهذه الآفة تصبح أكثر خطورة عندما تزيد المساحات المزروعة بالفراولة في منطقة ما وتسطيع نباتات الفراولة الجيدة النمو والمعتنى بتسميدها يريها أن تتحمل الإصابة بهذه الآفة أفضل من النباتات الضعيفة غير المعتنى بها أو الموجودة في المناطق الجافة، ولكن عندما يزداد تعداد الحشرة في منطقة ما فإن كل النباتات تكون عرضة للإصابة بها .

### طرق المكافحة

يمكن الحد من خطورة هذه الآفة وتقليل كثافتها العددية بإنتزاع النباتات المصابة من الحقل وإحراقها، وحيث أن النباتات المصابة تكون متفرقة في الحقل، فيمكن زراعة نباتات أخرى مكاتها وتجرى عملية إزالة النباتات المصابة قبل شهر يونية وهو الشهر الذي تخرج فيه الفراشات .

### المكافحة الكيميائية

أما المكافحة الكيميائية فممتعة للغاية ولا يمكن الوصول إليها بالمبيدات حتى المبيدات الجهازية القوية .

ولكن يفيد البعض بأن التبخير بمركب بروميد الميثايل والذي يجرى عادة من أجل مكافحة حلم الفراولة، ينفع أيضا في مكافحة هذه الآفة، ولذلك يجب إجراء معالجة مشتركة للأفتين وتبخيرهما معا ويقتضى الأمر تأخير مكافحة الحلم حتى شهرى يونية ويوليو وهو ميعاد تواجد الفراشات الطائرة لهذه الحشرة .



(شكل ٥٧) تاج نبات الفراولة مفرغا جزئيا بفعل يرقة فراشة تاج الفراولة

## ١١ - خنفساء الموبليا

الاسم العلمي للحشرة *Hoplia oregona* LeC

رتبة غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة الجعال Fam. Scarabaeidae


تسبب هذه الحشرة خسائر فادحة لنباتات الفراولة في بعض المناطق، وتغتنى اليرقة على جنور الفراولة وغالبا ما تضر بمساحات كبيرة من حقل الفراولة، والإصابة لا تسبب قتل النبات فوراً، ولكن تتركه في حالة شديدة من الضعف يصعب معها أن يسترد قوته، وهذه



الآفة تعد مألوفة في كثير من مناطق إنتاج الفراولة، والبرقات تغتذى كذلك على الحشائش البرية، وعندما نزرع الفراولة في الأراضي الرملية المستصلحة أو الصفراء فإن الحشرة تنتقل إليها وتصيبها، ولكنها لا توجد في الأراضي السوداء الثقيلة .

### وصف الحشرة

خنفساء الهوبليا اليافعة خنفساء غليظة يصل طولها من ٨ - ١٢ مم، ونشاهد وهي تطير أو تزحف في حقول الفراولة في أيام شهر مايو المشمسة، وهذه الحشرة ضعيفة الطيران - بعكس الخنافس التي تمت إليها بالقرابة التي تصيب محصول العنب، وجسم الحشرة مغطى بالقشور ويختلف لونه من البني الفاتح إلى البني القاتم مع وجود جزء من البطن لونه فضي (شكل ٥٨) .



(شكل ٥٨) - خنفساء الهوبليا أ - الحشرة اليافعة ب - اليرقة

وتأخذ اليرقة شكل حرف c تماما ويصل طولها إلى نحو ١٢,٥ مم وتوجد على جنور نباتات الفراولة، ولون اليرقة أبيض ذات رأس بني اللون وأرجلها طويلة واضحة، والجزء الخلفي من جسم اليرقة يبدو متضخما ويوجد على جانبيه أشواك خطافية (شكل ٥٨) .

## دورة الحياة

تخرج خنافس الهوليا في شهر مايو وتمارس نشاطها أسبوعين، فتتزاوج فوراً وتبدأ في وضع البيض في التربة لمدة أسبوع بعد خروجها .

يفقس البيض بعد أسبوعين وتبدأ اليرقات في الأغتذاء على الجذور، وتستمر في الأغتذاء حتى قنوم الشتاء حينئذ تظل ساكنة في التربة حيث تصنع لنفسها خلية طينية تسكن فيها .

وتبدأ اليرقات في النشاط والأغتذاء في الموسم التالي (في السنة التالية) وتدخل البيات الشتوي الثاني في صورة يرقة كبيرة، وبعد أ تغتذى في الربيع تعذر هذه اليرقة في شهر أبريل وتتحوّل إلى حشرة يافعة في شهر مايو، أي مدة الجيل الواحد تستغرق سنتين، ولا يكون ضررها ملحوظا إلا في السنة الثانية .

## مظهر الضرر

يقتصر ضرر خنافس الهوليا على إغتذاء اليرقات على الجنور، فهي تزيل الشعيرات الجذرية وتكشف القلف والقشرة من الجنور الكبيرة، ويعكس السوس لا تستطيع يرقات هذه الحشرة أن تنفذ داخل التاج، ولكن تسبب ضررا بطيئا وتدرجيا لكل الجهاز الجذري، وفي خلال العام الأول وعندما تكون اليرقات صغيرة فإن ضرر إغتذائها على الجنور لا يكون ملحوظا، ولكن في السنة الثانية وعندما تكبر اليرقات في الربيع فإن النباتات المصابة تبدأ تنوي، وبدلا من أن تذبل النباتات المصابة وتهلك كلياً فإنها تظل حية ولكن في ضعف شديد، وعندما تخرج الخنافس اليافعة، فإنه من الصعب أن تجد أي يرقة ولكن النباتات التي كانت مصابة لا تسترد قوتها بسبب الضرر الكبير الذي حل بالجنور الكبيرة، وتوجد النباتات المصابة في حدود منطقة معينة من الحقل نون المناطق الأخرى وذلك لأن الإناث اليافعات ضعيفة الطيران لدرجة كبيرة .

ومن المهم أن نعرف أن الخنافس اليافعة لهذه الآفة لا تغتذى إلا قليلا أو لا تغتذى بالمرّة .

## طرق مكافحة

يمكن مكافحة يرقات الهوليا بخلط مبيد فعال بالتربة قبل الزراعة، ويمكن لأي من المبيدات الفعالة التي تستخدم عادة في معالجة التربة أن تؤدي عملها في مكافحة هذه الآفة فيما عدا مبيد ددت، ومكافحة الخنافس اليافعة غير مجدية بسبب عدم تناولها لأي غذاء وبسبب تواجدها فوق التربة لمدة زمنية وجيزة .

### ١٢- الجعل ذو الظهر الجامد *Pentadon bispinosus kust*

ينتمي هذا الجعل لنفس الرتبة والفصيلة التي تنتمي إليها خنفساء الهوليا، ويوجد في مصر وجميع الأقطار العربية، وقد سبق لنا ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب .

وتغتنى يرقات هذا الجعل على جنور عوائل كثيرة منها نباتات الفراولة وتقضى الحشرة بياتها الشتوى على هيئة حشرة يافعة وتخرج من البيات في الربيع، وتضع الإناث بيضها في التربة ويفقس البيض عن يرقات مقوسة وتعذر اليرقات في شرنقة من الطين في التربة، وتخرج الحشرات اليافعة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وتدخل بياتها الشتى بعد ذلك ولهذا الجعل جيل واحد في العام .

## طرق مكافحة

- ١ - جمع اليرقات والجعل الموجودة حول جنور النباتات وإعدامها .
- ٢ - رش أو تعفير التربة بمبيد فعال وذلك قبل الزراعة.

### ١٣- سوس العنب الأسود

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة السوس Fam. Curculunidae

وينتمي لهذه الفصيلة ثلاث أنواع من آفات نباتات الزينة، ولكنها تهاجم الفراولة أيضا خصوصا تلك المزروعة في حقول مجاورة لأسيجة نباتات الزينة أو مشاتلها، وهذه الآفات

الثقلاء تتبع كلها جنس *Brachyrhinus* وهي

أ - *Brachyrhinus. sulcatus* (Fabricius)

ب - *B. meridionalis* (Gyll.)

ج - *B. cribricollis* (Gyll.)


ولهذه الأنواع عادات متشابهة ودورة الحياة متطابقة وتسبب نفس الأضرار، ولكنها كما ذكرنا تصيب نباتات الزينة بصفة رئيسية وتنتقل منها إلى الفراولة ولكن يوجد في بعض الأقطار نوع منها متخصص لإصابة الفراولة وهو *B. ovatus* (Linn)

### وصف سوس العنب الأسود

تغتنى الخنافس اليافعة ليلاً، ولكن يمكن أن تجدهم متجمعين ومختبئين حول تاج النباتات نهاراً، ويتراوح طول هذه الخنافس بين ٦ مم إلى ١١ مم، ويتراوح لونها من البني الفاتح إلى الأسود، وجسمها لامع وخالي من القشور إلا سوسة العنب الأسود التي ينتشر على جسمها بقع من القشور الصفراء، وكل هذه الأنواع ينتشر على غلاف أجنتها بؤر واضحة مرتبة في صفوف، واليرقة مقوسة لون جسمها أبيض أو قرمزي ويبلغ طول اليرقة التامة النضج نحو ١١ مم، ولليرقة رأس بنية اللون ولكنها عديمة الأرجل (شكل ٥٩).

### دورة الحياة

تظهر الأطوار اليافعة (السوس) لهذه الآفات في شهر مايو وربما ظهرت في الأيام الأخيرة من شهر إبريل، ولو أن يافعات *B. Cribricollis* لا تظهر إلا متأخرة في شهر يونية، وتظهر معظم اليافعات (تقريباً كل الإناث) في زمن قصير وتغتنى على المجموع الخضري للنباتات لمدة شهر ثم تضع بعدئذ بيضها في التربة حول تيجان النباتات، وتظل الإناث نشطة لعدة أشهر، وربما تستطيع القلائل منهن المعيشة في فصل الشتاء، ويفقس البيض بعد ١٠ أيام وتخرج منه اليرقات التي تتحرك إلى أسفل في اتجاه الجذور وتستمر في الإغذاء حتى يصبح الطقس بارداً، ومعظم اليرقات تقضى فصل الشتاء داخل شرنقة طينية، وفي الربيع يعاودن الإغذاء ويحدثن خسائر جسيمة للنباتات قبل دخولهن طور العذراء في شهر إبريل. ولهذه الحشرات جيل واحد في السنة.



(شكل ٥٩) سوسة العنب الأسود *B. cribricollis* أ - الحشرة البالغة ب - اليرقة

### مظهر الضرر

تفتدى يرقات هذه الآفات بقرض جنور نباتات الفراولة، فهي تدمر الجنور الصغيرة تماما وتكشط قلف وقشرة الجنور الرئيسية، وعادة ما توجد اليرقات وهي تفتدى على خشب تيجان النبات .

ومن مظاهر الإصابة بها عادة هو التدهور السريع للنباتات فى شهرى مارس وإبريل وذلك قبل أن تعذر اليرقات، وحيث أن الحشرات اليافعة لا يمكنها الطيران فإن المساحات المصابة بها تتزايد عاما بعد عام .

وتغتذى الحشرات اليافعة بقرض الأوراق وذلك تبدو حواف الأوراق متعرجة (شكل ٦٠) ولكن من النادر أن تدمر جزءاً كبيراً من سطح الورقة بدرجة تؤثر تأثيراً خطيراً على النبات .



(شكل ٦٠) نموذج لإغذاء يرقات العنب على حواف ورقة فراولة

### طرق المكافحة

يمكن مكافحة سوس العنب باستخدام مبيد فعال للتربة وذلك قبل الزراعة، وبعد نمو النباتات يجب أن تتجه المكافحة إلى السوس اليافع، وحيث أن السوس اليافع يظهر كله تقريباً فى وقت واحد ولا يضع بيضاً قبل مرور شهر من خروجها فإنها تعطى فرصة للمكافحة فى هذا الوقت حيث يمكن تعفيرها أو رشها بمبيد مناسب قبل أن تبدأ فى وضع البيض، ويجب إستعمال مبيد من نوع سريع التحلل ولا يترك أثراً بعد استعماله لأن موسم مكافحة هذه الآفة يوافق بداية موسم جمع الثمار .

## ١٤- الديدان السلكية

الديدان السلكية هي الأطوار غير اليافعة لخنافس (فرقع لوز) التي سبق أن تناولناها بالتفصيل في هذا الجزء من الكتاب، وتصيب الديدان السلكية الكثير من المحاصيل وأحيانا تصيب نباتات الفراولة، وتأخذ اليرقة سنة كاملة حتى تتحول إلى الطور اليافع وتتغذى أثناء ذلك على الجذور وتقلل بذلك من قوة نمو النباتات .

والديدان السلكية صفراء اللون أو صفراء بنية ذات أجسام لامعة ناعمة وجسمها الأسطوانى الرفيع (الطول طوله ٢٥مم) وهو المغطى بجلد صلب قد أعطاها الاسم الشائع وهو الديدان السلكية، والجزء الأخير من جسم اليرقة مفلطح وعادة ما يتجه إلى أعلى فيعطىها مظهر ثقب المفتاح Key hole appearance

### طرق المكافحة

تكافح الديدان السلكية بمزج التربة بمبيد فعال قبل الزراعة، وتؤدى المبيدات المستخدمة ضد النيماتودا أيضا إلى قتل الديدان السلكية، ولكن بعد زراعة الفراولة فإنه لا يمكن إستخدام المكافحة الكيماوية ضد هذه الآفات .

## آفات الخضر الأخرى

توجد بعض الخضر غير تلك التي ذكرناها تزرع فى مساحات قليلة مثل الخرشوف والرجلة، وبعضها خضر ورقية مثل الملوخية وهذه لا يوجد عليها آفات حشرية متخصصة ولكن تصيبها الآفات الحشرية العامة التي تصيب المحاصيل فى البيئة المزروعة فيها، ونظرا للتداول السريع لهذه الخضر والإستعمال المباشر لها فإننا لا ننصح باستخدام المبيدات الكيماوية فى مكافحة هذه الآفات .

وقد يلجأ بعض المزارعين إلى إستخدام المبيدات خلصة ضد بعض الآفات التي تصيب هذه الخضر مثل ديدان ورق القطن مثلا، وهذه تنزل بالمستهلك أ فـدح الأضرار الصحية، وكثيراً ما تصل إلى المستشفيات فى مصر مثلاً حالات تسمم لا يعرف سببها ولكن بالبحث والتدقيق يتبين أن المريض هو من مستهلكى الملوخية أو البامية المعاملة بالمبيدات وغالبا ما تزرع هذه الخضر فى مساحات صغيرة، ولذلك من الممكن إستخدام النقاوه اليدوية للطع وبودة ورق القطن مثلاً من الملوخية أو جمع الديدان القارضة فى الصباح الباكر من حول جذور النباتات، والبعد تماما عن استعمال المبيدات الحشرية .

**القسم الثانى**  
**الآفات الحشرية التى تصيب**  
**أشجار الفاكهة والغابات**  
**ونباتات الزينة**



# **الآفات الحشرية التي تصيب الحمضيات (الموالح) وطرق السيطرة عليها**

## الآفات الحشرية التي تصيب الحمضيات (الموالح) وطرق السيطرة عليهما

تنتشر زراعة الحمضيات في معظم أقطار العالم وخصوصا تلك الواقعة على شواطئ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتصدر الدول العربية الحمضيات إلى الأسواق العالمية، وتعتبر من مصادر العملات الأجنبية في مصر والمغرب وتونس، والحمضيات من الفواكه الشعبية الرخيصة الثمن في مصر والأقطار العربية الأخرى ويستمر وجودها معظم فصول السنة، هذا فضلا عن قيام صناعة ناجحة على ثمار البرتقال والنارج التي يعلب عصيرها وتصنع المربى من قشورها، ويستخرج من قشورها كذلك زيت السترونل الغالي الثمن والذي يدخل في صناعة الروائح العطرية ومركبات التجميل .

وتصاب أشجار الحمضيات بالكثير من الآفات الحشرية التي إذا لم تكافح بطريقة فعالة أنزلت خسائر كبيرة بالمحصول، وفيما يلي نورد كافة الآفات الحشرية الضارة بالحمضيات والطرق المتبعة في مكافحتها .

ومن المعلوم أن المبيدات المستعملة في مكافحة الآفات الحشرية تترك أثارا باقية على الثمار تضر بالمستهلك وتعوق عملية التصدير، لذلك سوف نراعى عرض موازين للمكافحة تتجنب عملية تلويث الثمار أو الإضرار بالمستهلك وترتبط موازين المكافحة إرتباطا وثيقا ببعض العمليات الأخرى التي تجرى على أشجار الموالح ولا يمكن الفصل بينها مثل التدريب للمزارعين على خدمة بساتين الحمضيات أو الموالح وإجراء العمليات الزراعية بها، واللجوء إلى بيانات الأرصاد الجوية في المنطقة والربط بينها وبين تكاثر الآفات وفوراتها والإستفادة منها ما أمكن من المكافحة البيولوجية، الأعداء الحيوية وتشجيعها على النشاط والتكاثر .

وللموالح أنواعا عديدة منها البرتقال بأصنافه (مثل البرتقال البذرة والبرتقال عديم البذرة (أبو سرّة) والبرتقال الشتوى والبرتقال الصيفى (الفالانشيا)، والليمون Lime والليم أو الليمون الإيطالى Spanish Lemon والليمون الحلو Sweet والليمون الهندي Grape fruit والنارنج Sour orang واليوسفى mandarin.

وتصاب الموالح بالكثير من الآفات الحشرية التى تصيب المجموع الخضرى والثمار والأفرع والسوق والجذور، ونذكر هنا هذه الآفات وطرق السيطرة عليها .

## ١ - من الموالح الأسود

الاسم العلمى للحشرة *Toxoptera aurantii* Boyer

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الهمن Fam. Aphididae

ينتشر هذا المن فى حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا، ويسبب خسائر كبيرة لأشجار الليمون والبن فى اليمن، ويصيب هذا المن فى مصر الموالح فقط، وهو كبير الحجم نوعا إذا يبلغ طوله نحو ٢ مم وعرضه ١,٢ مم، ولونه بنى غامق أو أخضر غامق يقرب من الأسود، ويصيب فى مصر النموات الحديثة الحديثة من أشجار الموالح عند أوائل الربيع فى شهرى مارس وإبريل ويفرز عليها إفرازات عسلية غريزة، وعند إشتداد الإصابة تصاب معظم الأوراق والأفرع الخضراء شكل (٦١) والأزهار والثمار حديثة العقد، وينشأ عن ذلك تساقط الأزهار والثمار .

وتخف الإصابة كثيراً بارتفاع حرارة الجو فى يونيو ويوليو، ومع هذا تشاهد إناث تلد بكرى ولكنها قليلة العدد فى تلك الأشهر الحارة، والتكاثر فى هذا النوع من المن يكون بكرى إذ أن الذكور نادرة الوجود وتظهر فى أوائل الصيف تلد الأنثى الواحد نحو ٦٠ حورية عند درجات حرارة ٢٠ - ٢٥ م، وتعيش الأنثى البالغة نحو ٣ - ٤ أسابيع وتكمل دورة الحياة من

ولادة الحورية حتى ظهور الحشرة الياقعة نحو ٦ أيام على درجة حرارة ٢٠م، ٢٠ يوما على حرارة ٥م، ولا تتم دورة الحياة إذا زادت درجة الحرارة عن ٢٠م.



(شكل ٦١) فرع مصاب بمن الموالح الاسود

## المكافحة

عند الإصابة الشديدة يكافح هذا المن بالملاثيون (٧٥٪) بتركيز ٢٥ ، ٠٪.

## الحشرات القشرية

### رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة

### فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية (أو المدرعة)

القشرة في أفراد هذه الفصيلة تكون منفصلة عن جسم الحشرة، وتبقى الإناث تحت الغطاء القشري حتى تصبح حشرة ياقعة وتضع بيضها أو تلد تحت هذه القشرة وتنمو الذكور كإناث إلا أن عمر الحورية الأخير الذي يسبق طور الحشرة الياقعة يكون ساكنا ويسمى بالعذراء والذي تنمو الأجنحة فيه خارجيا. ويصيب الموالح من حشرات هذه الفصيلة ما يلي :

## ٢- الحشرة القشرية السوداء

*Chysomphalus ficus* Riley

وهي أشد آفات الموالح خطورة في مصر وقد بدأ ظهورها في مصر في أواخر القرن التاسع عشر أي منذ حوالي ٩٠ سنة وكان دخولها عن طريق رسالة برتقال مستوردة من سوريا . وتفضل هذه الحشرة الجو الحار الرطب ولذلك فهي تكثر في الوجه البحرى عنه في الوجه القبلى . وتنتشر في جميع مناطق زراعة الموالح في العالم .

وتصيب هذه الحشرة الأوراق والثمار وتمتص عصارتها فيتشوه شكل الثمار وتقل أحجامها وتتساقط الأوراق والثمار الشديدة الإصابة وتضعف الأشجار وربما يقل الأثمار بنسبة ١٠٪ من محصول الحديقة بسبب الإصابة . وفي نفس الحديقة تختلف الإصابة من شجرة إلى شجرة أخرى حسب الضوء واتجاه الريح والتسميد والرى وغير ذلك من العمليات الزراعية ويقاوم الليمون البلدى الإصابة بهذه الحشرة، وأضعف منه في المقاومة البرتقال السكرى وأبوسرة ويليها البرتقال البلدى واليوسفى والليمون الأضاليا وأشدّها إصابة البرتقال أبو دمه أو الخليلي.

وتصيب هذه الحشرة في جمهورية مصر العربية غير الموالح نحو ١٠٠ نوع من النباتات تقع تحت ٤ عائلات نباتية مختلفة وأهمها المانجو والبرقوق والخوخ والزيتون والكمثرى والتفاح والعنب والتين والموز والنخيل والسنت والياسمين والبيجونيا وحبل المساكين والفيكس نندا والكافور والتفلة والحوار واللاتانيا والدورانتا والورد و *Vitis Sp* . وقد دخلت إلى المملكة العربية السعودية أخيرا وسجلت في تربة والطائف والجوف (أيوب ١٩٦٠) .

### دورة الحياة :

(شكل ٦٢) : تضع الأنثى الملقحة البيض تحت قشرتها، وتضع الأنثى الواحدة نحو ١٢٠-١٨٠ بيضة وذلك بمعدل ٤ - ٦ بيضات في اليوم، ويزداد عدد البيض الذى تضعه الأنثى الموجودة على الأوراق . ويفقس بعد ٢ - ٣ يوم في الصيف، ٧ - ١٠ أيام في الشتاء . بعد فقس البيض تخرج الحوريات الصغيرة الإناث من تحت قشرة الام ( ويكون لها ٣ أزواج من


الارجل وقرنا إستشعار وأجزاء فم ثاقبة ماصة) وتتجول لمدة بضع ساعات بدون تغذية ثم تبدأ فى غرس أجزاء فمها فى نسج الورقة أو الثمرة ثم تبدأ فى إفراز غطاء أبيض من الشمع، وتنسلخ الحورية المذكورة بعد ٥ - ١٥ يوما وتدخل فى عمرها الثانى ( التى يمكن فيه تلقيحها) حيث تفقد الأرجل وقرنى الاستشعار ويضاف جلد الانسلخ الأول حول الافراز الشمعى الأبيض السابق مكونا حلقة حمراء حوله، وبعد ٦ - ٦٠ يوما تنسلخ الحورية للمرة الثانية ويضاف جلد الانسلخ الثانى مكونا حلقة أخرى حمراء حول القشرة، وعند إنسلاخها للمرة الثالثة تكون أنثى بالغة جسمها عبارة عن كتلة صفراء موجودة تحت القشرة لا يتميز فيها إلا بعض الحلقات وفى مقدمتها توجد أجزاء الفم الثاقبة الماصة .

أما فى الذكر فان حورية العمر الاول يكون لها ٣ أزواج من الأرجل وقرنى الإستشعار، ثم تفقد هذه الأرجل وقرنى الاستشعار بعد الانسلخ الأول وتعود الأرجل وقرن الاستشعار للظهور بعد الانسلخ الثالث وتسمى الحورية عندئذ بالعذراء، وبعد الانسلخ الرابع تصبح حشرة يافعة تخرج من تحت القشرة، والذكر البالغ له ٣ أزواج من الأرجل وزوج طويل من قرون الاستشعار وزوج واحد من الأجنحة، وينمو الزوج الخلفى إلى زائدتين خطافيتين صغيرتين وتوجد آلة السفاد الطويلة بنهاية البطن لتلقيح الاناث من تحت قشرتها . وتتكون القشرة فى حالة الذكر من إفراز الحورية فى أعمارها : الأول والثانى والثالث كما فى الأنثى . وعلى العموم فعمر الذكر أقصر من عمر الأنثى .

وقشرة الأنثى بعد إكمال تكوينها تكون مستديرة وتبلغ نحو ١.٢ - ٢.٣ مم فى القطر وسرتها مركزية تقريبا، أما قشرة الذكر فهى بيضاوية حيث تبلغ نحو ٠.٨، ٠.٠ مم فى ١.٢، مم فى الطول وسرتها موجودة جهة الطرف المدبب، وأصغر من قشرة الأنثى، ولونها ما عدا منطقتها الخلفية رمادى .

ولهذه الحشرة بجمهورية مصر العربية ٤ - ٥ أجيال متداخلة فى السنة، وتبدأ إصابة الجيل الأول (وهو أضعف الأجيال) فى مارس وينتهى فى يوليو، والجيل الثانى (أوجيل الصيف الأول) يبدأ فى مايو وينتهى فى أغسطس، والثالث (أوجيل الصيف الثانى) ويبدأ فى أغسطس وينتهى فى أكتوبر، والرابع (أوجيل الخريف) وهو أشد الأجيال خطورة ويبدأ فى

أكتوبر وينتهى فى مارس، وقد تعطى إناث الجيل الرابع جيلا خامسا إذا ما ساعد جو الخريف على ذلك أو تقضى الشتاء بدون إعطاء جيل خامس . هذا وتستمر إناث الجيل الرابع والجيل الخامس ( إن وجد ) فى وضع البيض حتى ديسمبر ولكن إذا فقس هذا البيض خلال ديسمبر تموت جميع الحوريات الناتجة نظرا لبرودة الجو .



(شكل ٦٢) أ. الحشرة القشرية السوداء

١ - ذكر يلقح أنثى من تحت قشرتها ٢ - قشرة ذكر ٢ - قشرة أنثى ٤ - أنثى

## المكافحة :

أولا : المكافحة الزراعية :


- ١ - عدم زراعة عوائل الحشرات بالقرب من أشجار الفاكهة المنزرعة .
- ٢ - ترك مسافات كافية بين أشجار الفاكهة وعدم زيادة تسميدها إذ أن زيادة النمو الخضري يزيد من إصابته .

٣ - نظافة الأرض من الأوراق المتساقطة والحشائش لان وجودها يزيد من درجة الرطوبة وبالتالي يزيد من شدة الإصابة .

٤ - تقليم الافرع المصابة وحرقتها .

ثانيا : مكافحة الحيوية :

١ - يفترس الحشرة القشرية السوداء عدد من أنواع أبى العيد هي *Chilocorus bipustulatus* (شكل ٦٣)، *Scymnus includens*, *Phaenoscymnus varius*، كما يفترسها كذلك يرقات أسد المن وأنواع من التريس المفترس وأنواع من الحلم المفترس التابعة لفصيلة *Phytosseeidae*.



(شكل ٦٣) أبو العيد *Chilocorus bipustulatus*

١ - يرقة ٢ - عذراء ٣ - حشرة يافعة


١ - يتطفل عليها كذلك الطفيل *Aphytus chrysomphali* Mercet (شكل ٦٤) التابع لفصيلة *Chalcididae* من رتبة غشائية الأجنحة ويكثر بالحقول في أكتوبر ونوفمبر .

المكافحة الكيماوية :

ترش الأشجار قبل تلوين الثمار ( في منتصف سبتمبر) بأحد مركبات الديمثويت ٤٠٪ بعد ٧٥ سم<sup>٣</sup> لكل لتر ماء، أو ملاثيون ٥٧٪، في الألف أو أكتك بنسبة ٧٥ في الألف العالي حتى يصل محلول الرش لجميع أجزاء الشجرة ويحتاج الفدان إلى نحو (٦ - ٨) لتر من المبيد -



وتجرى رشة ثانية وبعد الرشة الأولى بثلاثة أسابيع بمخلوط أحد مركبات الديمثويت ٤٠٪ وزيت معدنى بعدل ٧٥سم<sup>٣</sup> من الأول، ٢ لتر من الثانى لكل ١٠٠ لتر ماء.



(شكل ٦٤) الطفيل Aphytus chrysomophali

### ٣ - الحشرة القشرية الحمراء

*Aonidiella aurantii* Mask.

توجد هذه الحشرة فى نفس المناطق التى توجد بها الحشرة القشرية السوداء ولكنها أقل منها ضررا. وشوهة هذه الحشرة فى مصر لأول مرة عام ١٩٣٠ ويشتد الآن ضررها فى المناطق الشمالية من الوجه البحرى وفى الحدائق الكبيرة السن أو المهمة . وأهم عوائل هذه الحشرة فى مصر هى أشجار الموالح والمانجو والزيتون والبرقوق والعنب والتين وأشجار النخيل والفيكس نتدا والصفصاف والياسمين والخروع وشجيرات الورد والدورانتا وحبل المساكين . وتصاب الثمار والأوراق بكثرة، أما السيقان والأغصان فتصاب بقلّة. وتوجد هذه الحشرة فى المناطق الساحلية فى السعودية . قشرة الأنثى مستديرة وتبلغ نحو ١.٦ - ٢.٢ مم فى القطر ولو أن عرضها أكبر قليلا من طولها ولا ترتفع المنطقة الوسطية منها إلا قليلا عن السطح الموجودة عليه، ولون القشرة أصفر باهت يميل إلى الرمادى وشفاف نوعا بحيث

يمكن رؤية الأنثى الموجودة تحته، والسرة وسطية ولونها أحمر . أما قشرة الذكر فهي أصغر من قشرة الأنثى وبيضاوية مطاولة إذ تبلغ نحو ٩, ٠ - ٣, ٠ مم في العرض وتضيق قليلا من الخلف والسرة موجودة قرب الطرف الأمامي ولونها مثل لون قشرة الأنثى .

## دورة الحياة


(شكل ٦٥): تلد الأنثى عددا من الحوريات يتراوح بين ٣٤ - ١٥٠ حورية (بمعدل ٢ - حوريات في اليوم) حسب فصول السنة كما وأن التغذية على الثمار تزيد من عدد الحوريات المولودة . وتبلغ الحورية طور الحشرة اليافعة بعد نحو ٤٠ - ٥٠ يوما . وتصبح الأنثى اليافعة قادرة على الولادة بعد نحو ١٠ - ٢٠ يوما أخرى وتعيش لمدة شهر أو شهرين . تميز الإصابة بظهور بقع باهته حول موضع الإمتصاص وقد تذبل الأوراق المصابة وتصفّر ثم تسقط طول حياة الأنثى الملقحة من يوم ولادتها حتى موتها نحو ٤ - ٥ شهور (علما بأن طول حياة الأنثى الملقحة نحو ٦ شهور) . ويبلغ الذكر بعد نحو ٦٠ يوما من ولادته ويموت بعد نحو ٥ أيام من بلوغه . تختلف نسبة الذكور . للإناث باختلاف فصول السنة، ففي أوائل الربيع تبلغ نسبة الذكور نحو ٧٠٪ في الربيع والشتاء نحو ٢٤٪ وفي الصيف نحو ٥٠٪ ولهذه الحشرة ٤ أجيال إبتداء من مارس حتى نهاية أكتوبر كما في الحشرة القشرية السوداء، وأشد الأجيال خطورة هما الجيلان الثالث والرابع، ويوجد جيل خامس في نوفمبر إذا كان الجو دافئا .

## المكافحة :


### ١ - المكافحة الزراعية والكيميائية

كما في الحشرة القشرية السوداء .

٢ - يفترس الحشرة الحمراء حشرة أبو العيد *Chilorius bipustulatus* في الخريف والربيع والحشرة *Gonwentside psociformis* من رتبة شبكية الأجنحة والحلم المسمى *Pediculoides ventricosus* (شكل ٦٦) .



(شكل ٦٥) الحلم *Pediculoides ventricosus*



(شكل ٦٦) الحشرة القشرية الحمراء

### ٣ - الحشرة القشرية البرسوناتس

*Mycetaspis personata* (Gomstock) (*Chrysomphalus personatu* Comstock)

تصيب هذه الحشرة سطحى الأوراق فى الموالح والخوخ والمانجو والجوافة والياسمين و تقتصر الإصابة على المناطق الساحلية . القشرة مخروطية سوداء ذات سرة مركزية بنية اللون (شكل ٦٧)، وإذا ما أذيلت القشرة من ورقة العائل تشاهد مكانها طبقة رقيقة لونها أبيض .

#### المكافحة

تكافح هذه الحشرة كيماويا كما تكافح الحشرة القشرية السوداء .



شكل ٦٧ الحشرة القشرية برسوناتس

### ٥ - حشرة الموالح المحارية

*Lebidosaphes beckii* (Newm)

هذه الحشرة تلى الحشرة القشرية السوداء فى أهميتها من حيث الضرر الذى تحدثه للموالم بجمهورية مصر العربية، ولكنها وتوجد فى المناطق الساحلية بينما توجد الحشرة

القشرية السوداء منتشرة في الداخل . وأعراض الإصابة كما في باقي الحشرات القشرية ظهور بقع صفراء حول مواضع الإصابة على الأوراق وفي النهاية تذبل تلك الأوراق وتتساقط، وتكثر الإصابة في الأوراق على السطح العلوي وتقل على السطح السفلي، وعند إصابة الفروع الطرفية قد تجف وتموت، أما في الثمار فإن المواضع المصابة على الثمرة تبقى خضراء بالرغم من تحول باقي الثمرة إلى اللون البرتقالي . ويصاب البرتقال البلدي بشدة بهذه الحشرة يليه من البرتقال السكرى ثم الليمون الهندي ثم الليمون البلدي وأقلها إصابة الليمون الأضاليا . والإصابة في قلب الشجرة تكون أكثر منها على حوافها نظرا لأن شدة الضوء والرياح تقلل من إنتشار هذه الآفة ، ويزيد من شدة الإصابة التسميد والرى الغزير، وكذلك نقص المعادن في الشجرة المصابة . قشرة هذه الحشرة (شكل ٦٨) بيضاوية ومدببة من أحد الطرفين حيث توجد السرة، وتبلغ القشرة نحو ٣ - ٣,٥ مم في الطول، ٠,٩ - ١,٢ مم في العرض، ولونها بني يميل إلى الرمادي ، وعليها خطوط عديدة عرضية دائرية .


### دورة الحياة :

التكاثر الطبيعي لهذه الحشرة هو التكاثر الجنسي إذ تبلغ نسبة الذكور ٢٠ - ٦٠٪ ولكن التكاثر البكرى أيضا كثير الحدوث، كما يمكن تلقيح الأنثى عندما تكون في عمرها الثاني من طور الحورية . بعد التلقيح تمكث الأنثى نحو ٥٠ - ١١٠ أيام (حسب درجة حرارة ورطوبة الجو) ثم تبدأ في وضع البيض لمدة عدة أسابيع (٩ - ١٠ أسابيع) بمعدل ٣ - ٤ بيضات في اليوم، وتضع الأنثى الواحدة نحو ١٢٠ - ١٧٠ بيضة على الأوراق، ٢٥٠ - ٣٥٠ بيضة على الثمار . ولهذه الحشرة ٣ - ٥ أجيال في السنة (تبعاً لظروف الجو)، ويبدأ الجيل الأول في إبريل والثاني في أواخر يونيو والثالث في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر . (وهو أشد الأجيال خطراً) والرابع في نوفمبر ويستمر حتى يناير . وتبلغ مدة الجيل نحو ٥٠ يوما في الصيف (٤٤ يوما للذكور)، ١١٠ أيام في الشتاء .

### المكافحة :

١ - مكافحة الزراعة والكيمائية كما في الحشرة القشرة السوداء .

٢ - يفترس هذه الحشرة القشرية حشرة أبي العيد *Chilocorus bipustulatus* والحلمان، *Tetranychus californicus*, *Henisarcoptes milus* ويرقات أسد المن . كما يتطفل عليها *Acitrinus citrinus* *Aspidiotiphagus launsburyi* وهما من فصيلة Chalcididae التابعة لرتبة غشائية الاجنحة.



(شكل ٦٨) حشرة الموالح المحارية

- أ - ورقة برتقال عليها قشور الحشرة . ب - قشرة الأنثى  
ج - قشرة الذكر - ثمرة برتقال عليها قشور الحشرة


## ٦- حشرة الموالح الشمعية

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة - Ceroplastes floridensis Com. Order Homoptera  
moptera

فصيلة القشرية الرخوة Fam. Coccidae

توجد هذه الحشرة فى بلدان البحر الابيض المتوسط وفى جمهورية مصر العربية تصيب أفرع أشجار الموالح خاصة أشجار الليمون المالح فى المناطق الساحلية من الوجه البحرى كما تصيب أيضا الكمثرى والتفاح والجوافة والمانجو والبشملة والبلارجونيم والهيديرا والياسمين وأشجار الفيكس، ونباتات الزينة وتفرز مادة عسلية بشدة على الأوراق والثمار والأفرع المصابة فينمو عليها العفن الأسود بشدة. وتصيب هذه الحشرة أشجار الموالح فى الطائف فى المملكة العربية السعودية .

شكل الغلاف الشمعى للأنثى (شكل ٦٩) مخروطى مثنى القاعدة ولونه رمادى فاتح، يوضع البيض داخل الغلاف الشمعى المذكور، وبعد فقسه وخروج الحوريات يصبح الغلاف فارغا .



(شكل ٦٩) حشرة الموالح الشمعية

ولهذه الحشرة ثلاثة أجيال فى السنة، الجيل الأول ويبدأ من شهر مايو وينتهى فى نهاية يوليو، والجيل الثانى ويبدأ فى النصف الأول من أغسطس وينتهى فى النصف الأول من سبتمبر، والجيل الثالث ويبدأ من نهاية سبتمبر وينتهى فى نهاية ديسمبر .

### طرق المكافحة

كما فى الحشرة السوداء .

## ٦- بق الموالح الدقيقي

الاسم العلمي للحشرة *Pseudococcus citri* Risso

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptea

فصيلة البق الدقيقي Fam. Pseudococcidae

تصيب هذه الحشرة أشجار الموالح والمانجو والعنب والجوافة والرمان وعراجين النخيل والصفصاف وبعض أنواع الفيكس وكثير من نباتات الزينة ودرنات القلقاس ودرنات البطاطس وجذور الطماطم والبطيخ والفل السوداني وبعض النباتات النجيلية حيث تمتص عصارة هذه النباتات وتضعف نموها وربما تتسبب في موتها، وينمو العفن على الأجزاء المصابة نتيجة إفرازاتها العسلية، وأحيانا تشاهد على الخشب الجاف كأعمدة التلفونات وغيرها وعلى صنابير التبيئة .

### وصف الحشرة اليافعة


شكل الأنثى اليافعة بيضاوي ويبلغ طولها نحو ٢,٥ - ٥ مم وعرضها ٢ - ٣ مم وهي مغطاة بمادة شمعية دقيقة (شكل ٧٠) ويحيط بجسم الأنثى ١٧ زوجا من الزوائد الشمعية القصيرة المتساوية في الطول والزوج الذنبى منها قد يطول ويبلغ ١٠ أمثال طول الزوائد الأخرى، وقرن الاستشعار مكون من ٨ حلقات ، لون القشرة وردي خفيف أو سمى . كيس البيض مكون من خيوط شمعية متماسكة ويوجد بمؤخرة الحشرة . أما الذكر فلونه أصفر غامق أو بني فاتح، وزوج الأجنحة الأمامية لونها أزرق خفيف، أما زوج الأجنحة الخلفية فهو محور إلى شوكتين صغيرتين، وقرن الاستشعار مكون من ١٠ عقل وبنهاية البطن شعرتان طويلتان سمكيتان .

### دورة الحياة :

تضع الأنثى بيضها في مجموعة واحدة مكونة من حوالي ١٢ - ٦٠٠ بيضة داخل كيس مكون من ألياف متماسكة تشبه ألياف الصوف، وتستمر الأنثى في وضع البيض لمدة ٣ -



١١ يوما في الصيف والربيع، ٢٠ - ٣٠ يوما في الشتاء والخريف، وتوضع أكياس البيض في شقوق القلف أو تحته أو على الجنور وقت الشتاء . والبيضة بيضاوية طويلة لونها أصفر فاتح وتبلغ نحو ٣،٠ - ٠،٢٥ مم في الطول تنسلخ الحورية ٢ اتسلاخات في مدة تتراوح بين ٦ - ١٢ يوما صيفا، ٢٠ يوما شتاء لتصل إلى طور الحشرة اليافعة وتختبئ الحوريات التي تفقس والحشرات اليافعة مدة الشتاء في الشقوق والجروح وعلى الأوراق والجنور، وعند بدء النمو الخضري في الربيع تزحف تلك الحوريات والحشرات اليافعة نحو النموات الخضرية الجديدة وتستقر على أنصال الأوراق وأعناقها وعلى الأفرع الصغيرة، ويمكن لحشرة بق الموالح الدقيقى التوالد بكريا بجانب توالدها جنسيا وينتج عن التوالد البكرى ذكور وإناث ولهذه الحشرة ٨ أجيال في السنة، وتبلغ مدة الجيل الواحد من ٣٠ - ٩٥ يوما حسب درجة الحرارة والرطوبة .



(شكل ٧٠) بق الموالح الدقيقى

## المكافحة :

١ - يفترس هذه الحشرة يرقات أسد المن وحشرات أبى العيد والفداليا وأنواع من الخلم والتربس والهاموش، كما يتطفل عليها حشرات من رتبة غشائية الأجنحة .

## ٢ - المكافحة الكيماوية

كما فى الحشرة القشرية السوداء .

## ٧ - ذبابة الموالح البيضاء

*Alerurotrachilus citri* Prisner & Hosny

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera


فصيلة الذباب الأبيض Fam. Aleyrodidae

تشاهد حوريات وعذارى هذه الحشرة بكثرة (شكل ٧١) ملتصقة بالاسطح السفلى لأوراق الموالح (الليمون البلدى والاضاليا واليارنج والبرتقال البلدى واليوسفى) فى أشهر الخريف والشتاء، كما توجد أيضا على الاسطح الطويلة للأوراق، ومن عوائلها أيضا الرمان والنبق والجوافة والبشملة .

ولون العذراء أسود لامع، وسطحها العلوى محدب لأعلى قليلا، ويظهر بوضوح تخطيط حلقات البطن، وحول جسم العذراء شريط ضيق شمعى أبيض اللون . أما الأنثى البالغة فلون الرأس والصدر فيها بني غامق، والبطن أصفر فاتح مع وجود بقع رمادية على الثلاث حلقات الأولى منها . والذكر بلون الأنثى ولكنه أصغر فى الحجم قليلا منها .

## المكافحة :

تكافح كيماويا كما فى ذبابة القطن البيضاء وتفيد فى مكافحتها المبيدات المستعملة فى مكافحة الحشرات القشرية .



(شكل ٧١) ذبابة الموالح البيضاء

١ - عذراء ملتصقة بورقة موالح ٢ - منظر سفلى لعذراء ٣ - جناح حشرة يافعة

## ٩- فراشة أزهار الموالح أو دودة أزهار الليمون

الاسم العلمي للحشرة رتبة حرشفية الأجنحة *Prays citri* (Mill)

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الفراشات الدقيقة Fam. Hypnozetidae

تنتشر هذه الحشرات في كثير من الأقطار التي تزرع الموالح في أوروبا وأفريقية وآسيا

والولايات المتحدة، وتهاجم يرقات هذه الحشرة أزهار الموالح خاصة الليمون، فتقرب الكأس والتبيلات وتتلغ المبيض، وتتغذى على محتويات الزهرة فلا تعقد الثمار، ونادرا ما تصيب العقد الصغير بمجرد تكونه ولا تصيب الثمار أبدا إذا وصل حجمها حجم حبة الحمص . وقد سببت هذه الحشرة خسارة كبيرة في محصول الليمون في محافظات الدلتا في مصر في السنوات الأخيرة .

وتصيب هذه الآفة الليمون الأضاليا Lemon الليمون البلدى Lime والليمون الحلو والجريب فروت والبرتقال واليوسفى وغيرها .

### دورة الحياة

تضع الفراشة الأنثى بيضا بعد ٧ - ١٠ أيام من خروجها، يفقس البيض بعد ٥ - ١٠ أيام حسب فصل السنة وتخرج منه اليرقات التي تثقب الأزهار المقفلة حتي تصل إلى الأعضاء الداخلية وتتغذى على مبيض الزهرة، ومدة طور اليرقى تتراوح بين ٦ - ١٠ أيام صيفا إلى ١٧ - ٦٠ يوما في الشتاء، فتتحول اليرقات التامة النمو إلى عذارى على سطوح الأوراق أو على تكتلات الأزهار المصابة، ومدة طور العذراء من ٤ - ٦ أيام في الصيف إلى ٩ - ١٤ يوما في الشتاء وتخرج الفراشات التي تعيد دورة حياة الحشرة، ولهذه الحشرة ستة أجيال في السنة، وفصل الخريف هو أفضل شهور السنة ملائمة لنشاط هذه الحشرة إذا تضع الفراشة فيه أكبر عدد من البيض (من ٢٠٠ - ٣٠٠ بيضة)، وفصل الشتاء أقل ملائمة لنشاط الحشرة ووضع البيض (تضع في الشتاء من ٥٠ إلى ٨٠ بيضة) .

### مظهر الإصابة

من مظاهر الإصابة على أشجار الليمون ظهور مناطق جافة على الأوراق نتيجة لإغذاء اليرقات حديثة الفقس عليها، وجفاف القمم النامية في النموات الحديثة، وظهور ثقب في كأس وبيض الأمار حيث تدخل اليرقات لتغذى على أعضاء التذكير والتأنيث في الزهرة فلا يتم عقد الثمار، وتفرز اليرقة خيوطا حريرية تربط الأزهار المصابة ببعضها لتكون كتلا من الأزهار والبتلات الجافة .

## المكافحة

تكافح يرقات هذه الحشرة كيميائياً علي أزهار الموالح في وقت التزهير (أوائل إبريل) وذلك برش الأزهار والعقد الصغير حتى حجم حبة الحمص بمركب براثيون أو ميثايل براثيون بنسبة ١,٥ - ٢ في الألف أو الرش بأحدى مركبات دايمثويت ٤٠٪ بنسبة ٢,٥ في الألف على أن يكون الرش بالموتور تحت ضغط ١٨٠ رطلا على البوصة المربعة مع فتح البشپورى على شكل الشمسية حتى يتجنب سقوط الأزهار .

### رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

#### فصيلة ذباب الفاكهة : Fam. Tephritidae (Trypetidae)

تضم هذه الفصيلة نحو ١٢٠٠ نوع معروف . وأفردها ذباب صغير الحجم، وأجنحتها مبقعة أو مخططة في نظام لافيت للأنظار . ويفضل الذباب السير على السطح الذي يقف عليه . ويفضل زيارة السطح السفلى للأوراق لبعده عن أشعة الشمس . وبعض الأنواع لديها عادة تحريك أجنحتها إلى أعلى وإلى أسفل وقت وقوفها فوق النبات لذلك يطلق عليها ذباب الطاووس . وكثيراً ما يشاهد الذباب فوق أزهار الخضراوات والفاكهة .

وتتغذى معظم اليرقات على النباتات وأصبح بعضها آفة خطيرة على الفواكه الهامة إذ أنها تحفر في ثمارها وتعرضها للتعفن . وهناك بعض الأنواع التي تسبب يرقاتها أوراما في الجنور أو السوق أو الأهار وهذه الأورام مستديرة غليظة الجدار ويوجد في وسط كل منها يرقة واحدة .

ويتبع هذه الفصيلة بجمهورية مصر العربية ذبابة ثمار حوض البحر الأبيض المتوسط وذبابة ثمار الزيتون وذبابة ثمار القرعيات وذبابة ثمار النبق وذبابة أزهار الكرانتيم .

## ١٠ - ذبابة حوض البحر الأبيض المتوسط

### *Ceratitis capitata* wies

تصيب هذه الحشرة عددا كبيرا من ثمار الفاكهة وخصوصا الحلويات كالخوخ والمشمش والتفاح والكمثرى والبرقوق والسفرجل والجوافة والسفرجل والموالح ما عدا الليمون المالح .

ويبدأ الضرر بمجرد ثقب الأنثى لجدار الثمرة بواسطة آلة وضع البيض الواخزة وذلك لكي تضع بيضها . وتتلون المنطقة المحيطة بمكان الوخز بألوان خاصة، ففي البرتقال يكون هذا اللون ضاربا إلى الحمرة أو أصفر مخضرا، وفي الخوخ توجد نقطة صمغية مكان الثقب، وفي اليوسفى يسود مكان الوخز وبعد فقس اليرقات تحفر وتتحول داخل اللب مما يسهل دخول جراثيم الفطر والبكتريا إلى داخل الثمرة وتعفننها، وتسبب الإصابة المبكرة تساقط نسبة كبيرة من ثمار الخوخ . وهذه الحشرة توجد في المملكة العربية السعودية وهي نادرة في المناطق الساحلية وبدرجة في متوسط نجد وخفيفة في المناطق المرتفعة .


### الحشرة اليافعة :

ذبابة صغيرة الحجم، تبلغ نحو ٥ مم في الطول، وعلى بطنها وأجنحتها بقع وأشرطة سوداء وذهبية، ومؤخر بطن الأنثى تبرز من آلة وضع البيض عند إستعمالها .

### دورة الحياة

(شكل ٧٢) : يتزاوج الذباب البالغ بعد خروجه من العذارى بعدة أيام، وبعد التزاوج تبقى الأنثى بضعة أسابيع حتى تبدأ في وضع البيض . وتضع الأنثى بيضها في ثقب تضعه في قشرة الثمرة، ويوضع بهذا الثقب بيضة واحدة أو أكثر (١ - ٢٠ بيضة أو حتى ٢٠٠ بيضة في المكان الواحد) وتضع الأنثى الواحدة نحو ١٠٠ - ٥٠٠ بيضة، يفقس البيض بعد نحو ٢ - ٣ أيام في الصيف، ١٠ - ١٥ يوما في الخريف، ولا يوجد بيض في الشتاء إذ تمتنع الأنثى عن وضع البيض إذا قلت درجة الحرارة عن ١٦ م (أبو النصر والنحال ١٩٦٥) .

والبيضة مطاولة الشكل كالسيجارة بيضاء اللون بعد الفقس تحفر اليرقات الصغيرة إلى داخل لب الثمرة، وتبلغ مدة طور اليرقة نحو ١٠ - ١٤ يوما في الصيف، ٢ - ٣ أسابيع في الخريف . واليرقة التامة النمو تبلغ نحو ٨ مم في الطول لونها أبيض، عند التعزير تخرج اليرقة من الثمرة وتسقط على الأرض وتعذر داخل التربة علي عمق نحو ٥ - ١٥ سم، والعذراء برميلية الشكل لونها مصفر، وتبلغ مدة طور العذراء نحو ٨ أيام في الصيف ١٥ - ٢٠ يوما في الربيع والخريف، ٢٠ يوما في الشتاء . وتعيش الحشرة اليافعة نحو ١,٥ - ٥ أشهر على شرط وجود الغذاء المناسب للذباب، أما عند عدم توافر الغذاء تموت بعد ٥ أيام قبل أن تضع أي بيض ولهذه الحشرة ٨ - ١٠ أجيال في السنة .



(شكل ٧٢) ذبابة ثمار حوض البحر الأبيض المتوسط

## طرق المكافحة

### أولا المكافحة الزراعية

- ١ - إتباع طريقة الزراعة الموحدة بمعنى أن تقتصر الزراعة على نوع واحد من الفاكهة لإمكان تحديد موعد الإصابة ومكافحة هذه الآفة في الوقت الملائم .
- ٢ - عدم زراعة أشجار حلويات داخل نطاق مزرعة موالح أو بالقرب منها إذا أن ثمار الحلويات مفضلة لهذه الحشرة عن غيرها وخاصة ثمار الخوخ .
- ٣ - جمع الثمار المصابة سواء الموجود منها على الأشجار أو المتساقط على الأرض وإعدام هذه الثمار للتخلص من يرقات الحشرة الموجودة بداخلها .
- ٤ - زراعة أصناف الفواكه التي لها القدرة على مقاومة الإصابة بهذه الآفة.

### ثانيا المكافحة الكيميائية

- ١ - إستعمال مصائد بها طعوم جاذبة للحشرة الياقة وتحتوى المصائد على مواد سامة تقتل

الحشرات التي تدخل إليها .

٢ - إستعمال أحد مركبات الدايمثويت ٤٠٪ بمعدل ٧٥سم<sup>٣</sup> لكل ١٠٠ لتر ماء، على أن ترش أشجار مرتين، الأولى قبل تلون الثمار (حوالي نصف سبتمبر) والثانية بعد ٣ أسابيع من الرش الأولى .

### ثالثا تعقيم الذكور

تجرى الأبحاث لتعقيم الذكور بالكويالت المشع ثم يعاد إطلاقها في المناطق الشديدة الإصابة، وتقوم الذكور المعقمة بتلقيح الإناث التي تضع بدورها بيضا غير مخصب، ويتوالى إستخدام هذا النظام يعتقد بأن أعداء هذه الحشرة سوف تقل عاما بعد عام حتى تصبح نون مستوى الخطورة، ويوجد مشروع بحثي في مصر يسير على هذا الإجراء.





## الآفات الحشرية التي تصيب أشجار الحلويات



## الآفات الحشرية التي تصيب أشجار الحلويات

الحلويات إصطلاح ينضوى تحته العديد من أنواع الفواكه التي تعمم أقطار العالم العربى وهى المشمش والخوخ والبرقوق والتفاح والكمثرى والسدر (النبق) وتصاب هذه الفواكه بآفات حشرية كثيرة، إذا لم تتخذ المقاييس المناسبة لمكافحتها فى الوقت المناسب فإنها تهدد المحصول بدرجة كبيرة .

ونورد هنا شرح مستفيض لهذه الآفات التي تصيب كل محصول منها والطرق المناسبة للسيطرة عليها .

### أولاً : الآفات الحشرية التي تصيب الفواكه ذات النواة

#### الحجرية (المشمش والخوخ والبرقوق)

##### ١- إبر العجوز Earwigs

سبق شرح كل ما يتعلق بوصف هذه الحشرة ودورة حياتها ، وهى تابعة لرتبة جلدية الأجنحة *Dermaptera* ومنها فى مصر والعالم العربى إبرة العجوز الكبره *Lepidura riparia* من فصيلة *Labiburdae* وإبرة العجوز الصغير *Labia minor L* وإبر العجوز الأوربية *Forficula auricularia (L.)* وهما تابعتان لفصيلة *Labiidae*.


#### أضرارها

تصيب حشرات إبر العجوز أوراق ثمار المشمش، وبالرغم من أنها كائنات لا أنها تغتذى بصفة أساسية على الأنسجة النباتية وتهاجم هذه الحشرات أوراق بادرات أشجار المشمش

وقمم براعمها مما يؤثر على نموها (شكل ٧٣)، وتميز إصابة الثمار بها بوجود حفر ضحلة على منظمة على سطح الثمرة لنتيجة لإغذاء الحشرة (شكل ٧٤)، وفي حالات كثيرة تغتذى إبرة العجوز على لحم الثمرة القريب من عنق حامل الثمرة وتحدث في هذه المنطقة ثغرة عميقة، وتستطيع إبر العجوز الاستفادة من الجروح التي تحدثها كائنات أخرى في جلد ثمرة المشمش مثل يرقات الحشرات والطيور وتبدأ هجومها على الثمرة من هذا الجرح ومن عادة هذه الحشرات أن تسعى لغذائها ليلا وتصيب ثمار المشمش، لذلك قد يبقى الضرر الذي تحدثه غير ملحوظ حتى ميعاد الحصاد .



(شكل ٧٣) مظهر إغذاء إبر العجوز على أوراق المشمش



(شكل ٧٤) مظهر إغذاء إبر العجوز على ثمار المشمش

### طرق المكافحة

يكافح زراع المشمش هذه الحشرات بتعفير جذوع شجر المشمش بأى مبيد فعال له أثر باق، وتتم هذه العملية قبل موسم الجمع بعدة أسابيع .

## ٢ - حشرات المن

وهذه الحشرات كما أسلفنا تتبع رتبة متشابهة الأجنحة Homoptera وفصيلة المن Aphididae ، ويصيب الحلويات منها أنواع عديدة منها : -

### من البرقوق الدقيقى *Homopterus arundinis* Fadr.

هذا المن صغير الحجم، ولونه أخضر فاتح، ويوجد على جسمه إفرازات دقيقة شمعية بيضاء، ويصيب الأوراق ونهايات الفروع الغضة لأشجار البرقوق والمشمش والخوخ أحيانا والتفاح بمجرد ظهورها فى مبدأ الربيع فى مارس وإبريل، وتكون نتيجة تغذية الحشرات التواء الأوراق وموت القمم النامية، وتستمر الإصابة لحين ظهور الثمار فى يونيو ويوليو فتصيبها الحشرات وتسبب تشقق أطرافها وتغطيتها بالإفرازات العسلية. ويمكن التعرف بسهولة على إصابة الأشجار بهذا النوع من أنواع المن برؤية الأوراق والأفرع الطرفية الحديثة المصابة وهى بيضاء اللون نتيجة للإفرازات الدقيقة الشمعية التى تغطى أفراد المن.

ويذكر أبو النصر والنحال (١٩٦٤) أن لهذا المن دورة تكاثر لا جنسية وأخرى جنسية فى دول أوروبا التى إنتقل منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقية بلاد العالم ومنها جمهورية مصر العربية. ففي مبدأ الربيع تظهر أفراد غير مجنحة على أشجار الحلويات تتكاثر بطريقة التوالد البكرى (لا جنسى) بأن تضع الأفراد اليافعة (وهى كلها عندئذ إناث) حوريات تصل إلى طورها البالغ فى خلال عدة أيام ثم حوريات الجيل الثانى وهكذا. وعند إشتداد حرارة الجو فى الصيف ( يوليو وأغسطس) تظهر أفراد مجنحة تطير تاركة أشجار الحلويات إلى نباتات الحلفا وذيل القط الموجودة على حواف المجارى المائية القريبة وتبقى عليها حتى نهاية الصيف فترجع ثانية إلى أشجار الحلويات حيث يبدأ ظهور أفراد جنسية مكونة من ذكور وإناث تتزاوج وتضع الإناث الملقحة بيضها الذى يبقى بدون فقس طول مدة الشتاء ويفقس فى مبدأ الربيع عن حوريات تعطى إناثا فقط غير مجنحة تتوالد بكريا كما سبق القول.

أما فى جمهورية مصر العربية فنظرا لإشتداد إصابة أشجار الحلويات بمن البرقوق الدقيقى فى أوائل الصيف وإختفاء هذا المن فجأة ليعود ثانية فى أوائل الخريف إلى أشجار الحلويات فمن المحتمل وجود عوائل أخرى يقصد إليها المن أثناء غيابه عن أشجار الحلويات، وقد تكون هذه العوائل الأخرى هى الحلفا والبوص والحجنة وذيل القط وغيرها. كذلك لم يثبت بعد وجود ظاهرة التوالد فى الأفراد التى تتكاثر على أشجار الحلويات.

## المكافحة:

١ - التخلص من العوائل البرية المحتمل لجوء المن إليها وقت الصيف مثل البوص واللفا وذيل القط .

٢ - تقوية أشجار الحلويات بالتقليم الجيد والتسميد والرى المنتظمين.

٣ - يفترس من البرقوق حشرات كثيرة مثل حشرات أبى العيد ويرقات أسد المن وذباب السرفس، كما يتطفل عليه زنابير من أجناس Aphelinus, Aphidius, Encarsia

### ب - من الخوخ الأخضر: *Myzus persicae* Sulz

يعتبر هذا المن من أهم أنواع المن الواسعة الإنتشار، وهو يمتص عصارة ثمار وأفرع عوائل كثيرة كالخوخ والمشمش والبرقوق والليمون البلدى والجريب فروت والبرتقال بأصنافه ونباتات الخضر التابعة للعائلات الباذنجانية والبقولية والصايبية والقرعية والمركبة والخبازية وغيرها والكريزانثيم والأنترهينم وكثير من الحشائش مثل كيس الراعى والخردل، وكما ذكر سابقا ينقل مرض الإصفرارى فى البطاطس وكلها أمراض فيروسية خطيرة .

وتمتاز الحشرة اليافعة فى هذا النوع من أنواع المن بلونها الأخضر، ويأن طول الجزء الطرفى من العقلة النهائية من عقل قرن الاستشعار يعادل ٥ أمثال طول باقى نفس العقلة، كما يوجد على العقلة الطرفية للخرطوم شعرتان طويلتان عند نصفها القاعدى وثلاث أزواج من الشعيرات عند قاعدتها وتوجد أيضا شعرتان على العقلة القاعدية من عقل رسغ الرجل الخلفية .

### دورة الحياة :

لم تدرس بعد حياة هذا المن بجمهورية مصر العربية ولكن فى الولايات المتحدة الأمريكية وجد أنه يقضى بياته الشتوى على هيئة بيض أسود لامع موضوع على قلف أشجار الفاكهة، ويفقس هذا البيض وقت الإزهار فى أوائل الربيع عن حوريات يكتمل نموها لنصبح إناثا يافعة تتكاثر لا جنسيا لمدة ٢ - ٣ أجيال فى نهايتها تصبح معظم الإناث اليافعة مجنحة فتهاجر إلى نباتات أخرى، وعند قرب موعد الشتاء تطير هذه الإناث راجعة إلى أشجار الفاكهة حيث تلد حوريات ينتج عنها عند بلوغها ذكور وإناث تتزاوج وتضع الإناث الملقحة بيضها على قلف الأشجار وهكذا تتكرر دورة الحياة .



## المكافحة :

١ - بجانب المفترسات المعروفة التي ذكرت في من البرقوق الدقيقى يصيب هذا المن المرضى الفطرى *Entmophthora aphidis* الذى يقضى على أعداد كبيرة منه .

## ٢ - المكافحة الكيماوية

كما فى باقى أنواع المن.

## جـ - من القلف : *Pterochlorus persica* Chol

وهو من أكبر أنواع المن حجما، ولونه عسلى غامق لامع، وأرجله طويلة وأفتح لونا من الجسم .

تصيب هذه الحشرة أشجار الحلويات مثل البرقوق والخوخ والمشمش، وفى حالة الإصابة الشديدة تشاهد جنوع وفروع الأشجار مغطاه بأجسام هذه الحشرات المتراسة بجوار بعضها البعض وهى مثبتة فى أماكنها بأجزاء فمها الثاقبة الماصة لتمتص غذائها من خلال القلف السميك وتفرز الحشرات مادة عسلية تغطى جذوع وفروع الأشجار، وتتساقط بعض الافرازات العسلية على التربة تحت جذوع الأشجار المصابة فينمو عليها الفطر الأسود أيضا وتسبب الإصابة الشديدة ضعف الاشجار وتشقق قلف الساق والأفرع ويقل المحصول وقد تجف الشجرة تماما .

## المكافحة :

١ - فى حالة قلة عدد الأشجار تزال الحشرات من على الجزع والأفرع بدعكها جيدا بخزقة .

٢ - فى حالة المزارع الكبيرة ترش الأشجار المصابة بالملاثيون (٥٧٪ مستحلب زيتى) بتركيز ٠,٧٥٪ .

## ٣ - الحشرات القشرية

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية Fam. Diaspididae


القشرة فى أفراد هذه الفصيلة منفصلة عن جسم الحشرة، وتبقى الإناث تحت الغطاء القشرى حتى تصبح حشرة يافعة وتضع بيضها أو تلد تحت هذه القشرة، وتنمو الذكور

كالإناث إلا أن عمر الحورية الأخير الذي يسبق طور الحشرة اليافعة يكون ساكنا ويسمى بالعذراء، وتنمو أجنحته خارجيا . ومن هذه الفصيلة يصيب الحلويات الآفات التالية .

#### أ - حشرة الحلويات المحارية : *Lepidosaphes ulmi* L.

تصيب هذه الحشرة أفرع أشجار الحلويات والعنب والتفاح والكمثرى والحوار والصفصاف والسيستان والبلارجونيم ونبات *Vitis vini fera* وتسبب الإصابة جفاف الأفرع المصابة وموتها وضعف الشجرة وقلة محصولها .

وقشرة هذه الحشرات مثلثة الشكل مطاوله وعليها خطوط دائرية مستعرضة، لونها بني يميل إلى الرمادي، والسرة موجودة جهة الطرف المدب من القشرة . وتوجد في السعودية على العنب وسجلت في اليمن على أشجار الحلويات والعنب وتشاهد بكثرة على الفروع (شكل ٧٥) .



(شكل ٧٥) حشرة الحلويات المحارية

**ب - حشرة البرقوق القشرية : *Parlatoria oleae* (Colvee)**

لهذه الحشرة عوائل كثيرة جداً تقترب من المائتين أهمها البرقوق والمشمش واللوز والزيتون والخوخ والتفاح والكمثرى والبشملة والعنب والرمان والنخيل والياسمين والتفلة ونبات *Melia* *azederach* وقد وجدت أحياناً على سيقان وفروع أشجار الموالح .

وتصيب هذه الحشرة الثمار والأوراق والأفرع خاصة الطرفية الغضة منها، ولا يكون الضرر محسوساً في حالة الشجرة ولكن إصابة الثمار تسبب تشوهاً ويقلل من قيمتها التجارية، وفي حالة ثمار الزيتون تقل نسبة الزيت فيها .

القشرة (شكل ٧٥) بيضاوي الشكل في الأنثى ومستطيلة في الذكر ولونها رمادي وسرتها جانبية .



(شكل ٧٦) حشرة البرقوق القشرية

**دورة الحياة :**

تمضي هذه الحشرة بياتها الشتوي على حالة أنثى ملقحة على سيقان وأفرع الأشجار . وفي الربيع الثاني تبدأ هذه الإناث في وضع البيض تحت قشرتها . وتضع الأنثى الواحدة نحو ٣ - ٥ بيضات . ويفقس البيض بعد نحو ٢ - ٣ أسابيع، وتخرج الحوريات الحديثة الفقس (Crawlers) من تحت القشرة، وتتجول قليلاً ثم تثبت نفسها بأجزاء فمها الثاقبة الماصة متصلة بالأفرع الحديثة، ثم تبدأ هذه الحوريات في إفراز قشرة صغيرة فوق جسمها . ويعرف مظهر الإصابة الحديثة بظهور بقع بنفسجية اللون حول مكان قشور الحوريات الحديثة .

وتصل حوريات الجيل الأول لحشرة البرقوق القشرية إلى الطور البالغ في يونيو لتبدأ وضع بيض الجيل الثاني الذي يفقس وتصل حورياته إلى الطور البالغ في أوائل أغسطس لتبدأ في وضع بيض الجيل الثالث الذي يفقس وتظهر حشرات البالغة في أوائل نوفمبر لتضع بيض الجيل الرابع الذي يفقس وتصل حورياته إلى طورها البالغ في أوائل يناير، وإنث هذا الجيل الرابع هي التي تدخل بعد تلقيحها في بيئاتها الشتوي حتى الربيع التالي، وهكذا تتكرر دورة الحياة . ولا توجد ظاهرة التوالد المبكر في هذه الحشرة، ونسبة الإناث إلى الذكور هي ١ - ٢، ولها ٢ - ٤ أجيال في السنة، وطول مدة الجيل تتراوح بين ٢٦ - ٣٦ يوما حسب درجات الحرارة والرطوبة .

### المكافحة :

تكافح كيماويا كما في الحشرة القشرية السوداء .

## ٤ - آفة أوراق أشجار الفاكهة

الاسم العلمي للحشرة *Archips argyrospila* (Walker)

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera


فصيلة تورتريسيدي Fam. Tortricidae

تعد هذه الحشرة من أشهر الآفات التي تصيب أوراق أشجار الفواكه ذات النواة الحجرية في العالم، وطبقا لما ذكره Newcomer (1950) فإنها تعتبر أكثر شيوعا على أشجار التفاح والكمثرى ولو أنها وجدت أيضا تصيب أشجار الموالح والجوز وبعض أنواع الفواكه الأخرى، خاصة المشمش في كافة الأقطار .

### وصف الحشرة

تعتبر هذه الحشرة إحدى الأنواع التابعة لفصيلة تورتريسيدي، وتشبه أجنحة الحشرة عند إنطباقها على الجسم في وقت الراحة شكل الجرس المعروف به حشرات هذه الفصيلة، ويبلغ

طول الفراشة نحو ١٢,٥ مم ولون أجنحتها بني قاتم يتخللها مساحات ملونة باللون الأبيض والذهبي، واليرقات تماثل يرقات الأنواع الالفة للأوراق النموذجية والتي تتذبذب بسرعة للخلف عند إنزعاجها، ولون جسم اليرقة أخضر غامق ورأسها سوداء كذلك الصدر الأمامي فلونه أسود، ويتغير لون اليرقة من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الغامق تبعا لعمرها اليرقي حيث تأخذ الأعمار الأخيرة لونا أفتح، وبيض هذه الحشرة مميز جدا، حيث تضع الإناث البيض علي قلف الأشجار في هيئة كتل تغطيها بإفراز رمادي اللون (شكل ٧٧) .




(شكل ٧٧) كتل بيض فراشة لافة أوراق الفواكه على جذع شجرة مشمش - البيض سوف يدخل البيات الشتوي.

## دورة الحياة :


تقضى هذه الحشرة بياتها الشتوى فى طور البيضة، ويفقس البيض فى أوائل الربيع، وتوجد اليرقات غالبا فى نهاية شهر مارس، أسفل قاعدة حامل البراعم الزهرية، وتغذى اليرقات الصغيرة على الأوراق بمجرد وتفتح البراعم، ويمكن لليرقة أن تربط بضع وريقات إلى بعضها، أو تطوق حافة ورقة منفردة، وتصل اليرقات إلى تمام نموها فى شهر مايو وأوائل يونية وتعذر داخل العش اليرقى، وتخرج اليرقات فى مايو وأوائل يونية حيث تضع البيض الذى يدخل البيات الشتوى إذا حل فصل الشتاء، وللحشرة جيل واحد فى العام .

## مظهر الإصابة والضرر

تعتبر هذه الآفة من الآفات الرئيسية التى تغذى أساسا على الأوراق، ويمكن أن تحدث ضررا كبيرا بالأوراق إذا كانت كثافتها العددية كبيرة، ولكن الضرر الأكثر أهمية ينشأ من إغذاء يرقاتها على الثمار الصغيرة وتترك على الثمار ندبا كبيرة عميقة تلتئم عند حلول موسم الجمع (شكل ٧٨) ويمكن لليرقة أن تطوى ورقة وتلصقها بثمرتها وتتخذ منها غطاء وتنشط أسفل منه وتغذى على الثمرة (شكل ٧٩)، وفى هذه الحالة فإن الثمرة لا يمكن إستعمالها، وحيث أن هذه الآفة تظهر مبكرا فى أوائل الموسم فإن وجودها قد لا يلفت الأنظار حتى تحدث أضراراها .



(شكل ٧٨) ثمار مشمش مصابة بيرقات لآفة أوراق الفواكه



(شكل ٧٩) ورقة مشمش الصقتها اليرقة بخيوط حريرية إلى الثمرة لتتخذها ملجأ لها

### المكافحة

يمكن مكافحة هذه الآفة إذا ما تم رش البستان بمبيد فعال مستخدم في مكافحة الآفات الأخرى مثل حفار ساق الخوخ، وتجرى هذه العملية مبكراً في أوائل الموسم وعند تكون البراعم، وطبعاً فإنه لا يمكن ملاحظة وجود هذه الآفة في البستان أثناء الشتاء، لأن كتل البيض تكون موجودة على الثلث الطرفي من الشجرة، ولكن وجود أوراق محاطة بخيوط حريرية بعد فترة وجيزة من تفتح البراعم هي من العلامات المؤكدة على الإصابة.

## ٥- الديدان القياسة

تعتبر يرقات الديدان القياسة من الآفات الهامة التي تصيب الفواكه ذات النواة الحجرية - ويصيب المشمش منها ثنتين هما : -

أ - بودة المشمش القياسة الخريفية . (*Alsophila pomotarsia* (Itarris)

ب - دودة المشمش القياسية الربيعية (*Paleacri vernata* (Peck)

والآفتان تابعتان لرتبة حرشفية الأجنحة Lepidoptera وفصيلة الديدان القياسية Geometridae  
**وصف الحشرة**

اليرقة هي الطور الضار للحشرة في كلتا الحشرتين، وهي نموذج مطابق لكافة الديدان التابعة لفصيلة الديدان القياسية، وتتشابه يرقتي الحشرتين في اللون والمظهر، وعندما تصل اليرقة إلى تمام نموها يبلغ طولها ٥, ٢سم ويكون لونها أخضرًا مع وجود شريط من لون فاتح يمتد على كلا جانبيها أسفل الفتحات التنفسية، ويمكن التمييز بين نوعي الحشرة بوجود زوج ثالث من الأرجل الكاذبة على الحلقة البطنية الخامسة لدودة المشمش القياسية الخريفية، أما تلك الربيعية فينقصها وجود أرجل كاذبة على الحلقة الخامسة .

**دورة الحياة**

يتواجد نوعي الحشرة على أشجار المشمش في نفس الوقت بالرغم من إختلاف دورة حياتهما، وتمضي دودة المشمش الربيعية البيات الشتوي في طور العذراء في التربة وتخرج الفراشات الياقة في الربيع الباكر، وتضع بيضها على الأغصان والأفرع، ويعد الفقس تغذى اليرقات على المجموع الخضري والثمار، وعند تمام نمو اليرقة تنزل إلى التربة وتتحول إلى عذراء داخلها، أما دودة المشمش الخريفية فتدخل في البيات الشتوي وهي في طور البيضة، ويفقس بيض هذه الحشرة في نفس الوقت الذي يفقس فيه بيض سالفاتها، وتنزل اليرقات التامة النمو إلى التربة وتعذر داخلها، وتخرج فراشاتها في الخريف حيث تتزاوج وتضع البيض الذي يدخل فترة البيات الشتوي .


**مظهر الإصابة والضرر**

هاتان الحشرتان من الآفات التي تغتذى على الأوراق ولكنهما يهاجمان الثمار أحياناً، وتحدثان بها بها ثقوباً عميقة تلتئم قبل جمع الثمار (شكل ٨٠)، وثمار المشمش المصابة تكون خشنة الملمس على سطحها ندبا كبيرة خشنة مما يقلل من قيمة الثمار عند تسويقها .



## طرق مكافحة

تفيد المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الأخرى على أشجار المشمش والخوخ في الربيع الباكر في مكافحة هاتين الآفتين .



(شكل ٨٠) ثمار مشمش صغيرة مصابة بالديدان القياسة

## ٦- التريس Thrips

رتبة هديبة الأجنحة Thysanoptera

فصيلة تريبيدي Fam. Thripidae

توجد عدة أنواع من التريس تهاجم المشمش، ولكنها ليست آفات رئيسية، ولكن يوجد

نوعان منها ينتميان إلى الجنس *Franklinella* ويوجدان على المشمش وهما .

أ - *Franklinella. occidentalis* (Perg).

ب - *F. minula* Moulton

ويطلق على هذين النوعين تريبس الأزهار، وهما مسئولان عن الأضرار التي تصيب أزهار عدد من فواكه الحلويات وتوجد أنواع أخرى من التريبس على ثمار المشمش وتسبب مشاكل خاصة عند تغليب الثمار لوجود بقايا على الثمار المصاب، وقد ذكر Bailey سنة ١٩٩٠ أن أنواع التريبس الآتية توجد على المشمش : -

*Alothrips fusiatus* (L.) *Aelothrips kuwani* (Moulton) *Leptothrips mali* (Fitch)

وحيث أن تريبس الأزهار هو أهم هذه الأنواع فإننا سوف نناقش ما يتعلق بهما بالتفصيل فيما يلي .

## وصف الحشرتين

يصعب التفريق بين نوعي التريبس المنتميان إلى جنس *Franklinella* المذكورين أعلاه، في الحقل، ولكن *F. occidentalis* هو أكبرهما حجما ولونه ليموني إلى بني مصفر والنوع *F. minula* الأصغر حجما ولونه بني قاتم .

## دورة الحياة

لتريبس الأزهار العديد من الأجيال في السنة، ويستمر التكاثر طول الشتاء ما دامت درجة حرارة الطقس لم تصل إلى درجة التجمد، فإذا انخفضت درجة الحرارة دون درجة التجمد فإن التريبس يدخل بيئات شتوية وهو في الطور اليافع، ويوجد الكثير من عوائل تريبس الأزهار وتغذي الحشرات اليافعة والحوريات على الأزهار والأوراق والثمار، وتضع الإناث بيضها داخل أنسجة النبات بآلة وضع البيض الواخزة، وعندما يكتمل نمو اليرقة تنزل إلى التربة وتعذر بها، وتبلغ الكثافة العددية لتريبس الأزهار مداها في الربيع، ويساعد على هجرة التريبس من المحاصيل الأخرى إلى أشجار الحلويات جفاف العوائل الأخرى مثل الحشائش وبعض المحاصيل الأخرى .

## الأضرار

يهاجم التريبس أشجار المشمش والطلويات ذات النواة الحجرية في الربيع الباكر، وإذا كانت أعدادها كبيرة فإنه يسبب ذبول البراعم الورقية وسقوط الأزهار .

## المكافحة

من النادر مكافحة التريبس على المشمش باستخدام المبيدات الكيماوية، ولكن المبيدات المستخدمة في مكافحة آفات الطلويات الأخرى في الربيع المبكر تفيد في مكافحته ولكن يجب منع استخدام المبيدات متى بدأ موسم التزهير .

## ٧- حفار ساق الخوخ

الاسم العلمي للحشرة (zell) *Anarsia lineatella*

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة كوسيدي Fam. Cossidae

تنتشر هذه الحشرة في أقطار كثيرة وتصيب كافة أنواع الفواكه ذات النواة الحجرية، وتعد من الآفات الرئيسية للخوخ واللوز وتصيب أيضا المشمش والبرقوق والكمثرى .


## وصف الحشرة

لون اليرقة الحديثة الفقس بني بلون الشيكولاته مع وجود أشرطة فاتحة اللون حول كل حلقة من حلقات البطن ووجود هذه الأغشية البين حلقيه الفاتحة اللون والتي تتضاد مع لون الجسم البني القاتم تفيد في تمييز يرقة هذه الآفة والتفريق بينها وبين يرقات الأنواع الأخرى من حرشفيات الأجنحة التي تتواجد على أشجار المشمش والخوخ، ولون الفراشة رمادي قاتم مع وجود بقع وأشرطة فاتحة اللون على الجسم، وعند الراحة تنطبق الأجنحة مثل الجمالون

فوق سطح الجسم، ومن الصعب تمييز الفراشات أثناء وجودها على قلف الأشجار نهاراً، فالكوانها التمويهية تجعل من الصعب ملاحظتها، ومن مظاهر إصابة هذه الحشرة للأشجار في فصل الربيع وجود أغصان ذابلة في مناطق النمو الطرفية للشجرة، وتحفر يرقات الجيل الذي يظهر في شهر مايو في الأغصان النامية فتذبل تلك وتموت .

## دورة الحياة

تدخل يرقات حفار ساق الخوخ البياض الشتوى داخل ملجأ تبنيه في قلف أشجار الخوخ أو المشمش (شكل ٨١ - أ) وتكون اليرقة حينئذ في عمرها الأول، ويمكن التعرف على هذا الملجأ من الفتحة التي تخرج منها الغرث Frass (براز اليرقة) والتي توجد غالباً عند نقطة تفرع غصن من أغصان الشجرة، وتخرج اليرقة في الربيع الباكر وعادة في وقت التزهير وتهاجم البراعم المتفتحة والنموات الحديثة، وبعد بلوغ اليرقة تمام نموها تهاجر إلى فرع آخر أكبر سناً أو إلى الجزع وتتعدى بين الشقوق، أو تحت القلف السائب أو ندب القلف، وتخرج فراشات الجيل الأول في شهر مايو وبعد تزواجها تضع بيضها على القلف أو الأوراق أو الثمار .



(شكل ٨١) يرقة حفار ساق الخوخ في ملجأ بنته في قلف أشجار الخوخ لتقضى البياض الشتوى

وتهاجم يرقات جيل مايو الأفرع النامية فتذبل تلك الأفرع وهي من العلامات المميزة في الحقل للإصابة بهذه الآفة، وقد تهاجم اليرقات الثمار أيضا في خلال هذه الفترة، ويظهر الجيل الثاني لهذه الآفة ويبلغ ذروته في شهر يولية عندما تكون قد تم جمع معظم ثمار المشمش حينئذ تغتذى يرقات هذا الجيل على الأغصان والقلف، وقد تكف عن الإغذاء وتدخل القلف حيث تبقى حتى الموسم التالي، ويمكن لهذه الحشرة أن تصيب عوائل أخرى بعد منتصف شهر يولية ويتمكن من تكملة جيل ثالث وجزء من الجيل الرابع .

### الأضرار التي تسببها

تهاجم يرقات هذه الآفة الأفرع والنموات الحديثة، ولا تهاجم اليرقة الثمار الخضراء ولكنها تهاجم الثمار التي أوشكت على النضج وعند مهاجمتها للثمرة تصنع فيها نقرا كثيرة يحيط بها كميات من الغرث، والثمار المصابة هكذا تقل قيمتها التسويقية (شكل ٨١- ب) .



(شكل ٨١- ب) ثمرة مشمش مصابة بيرقات حفار ساق الخوخ، وتري مخلفاتها البرازية عند أماكن الإصابة

## المكافحة

تكافح هذه الآفة برش أشجار الخوخ أو المشمش بأحد المبيدات الفعالة ولكن قبل التزهير، ويستحسن أن يخلط المبيد الحشرى مع المبيد الفطرى المستخدم لمكافحة فطريات الحلويات .

### ٨ - حفار ساق الحلويات رائق الأجنحة

*Synanthedon myopiformis* Borkm

رتبة الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الغراشات رانقة الأجنحة Fam. Aegriidae

تصيب يرقات هذه الحشرة التفاح والكمثرى والبرقوق والخوخ والمشمش .

#### الحشرة اليافعة :

(شكل ٨٢) تبلغ نحو ١,٣ سم فى الطول، ٢ سم فى العرض بعد فرد الجناحين الأماميين منبسطين على الجانبين، ولون الجسم أزرق مائل إلى الأسود مع وجود منطقة عرضية فى منتصف البطن لونها برتقالي، وتحمل نهاية البطن خصلة من الحراشيف مروحية الشكل، ويحاط كل من الأجنحة الأربعة بحراشيف لونها بنى مائل إلى السواد ويبقى الجزء الباقى من الجناح شفافا خاليا من الحراشيف .



(شكل ٨٢) فراشة حفار ساق الحلويات رائق الأجنح

## دورة الحياة :

تظهر فراشات هذه الحشرة في إبريل ومايو، ويعرف خروجها بأغلفة العذارى التي تظهر من ثقب الخرج كما في حفار ساق التفاح، وتضع الإناث البيض فرديا أو مجاميع صغيرة على سوق الأشجار. بعد فقس البيض تحفر اليرقات الصغيرة في الساق تحت القلف بالقرب من سطح الأرض، وقد توجد الإصابة في أماكن مرتفعة عن سطح الأرض وذلك عند زوايا التفرع . ومن علامات الإصابة إفراز العصارة النباتية من أماكن دخول اليرقات ووجود نشارة من الخشب أسفل الشجرة المصابة، ويتضخم الساق في منطقة الإصابة، ويتشقق القلف، كما يوجد عند فتحات الثقوب الموجودة عند زوايا التفرع كتلا من نشارة الخشب المتلاصقة .

## المكافحة

يستعمل لمكافحة هذه الآفة المبيد سيديال ٥٠٪ ٣٠٠ سم<sup>3</sup> / ١٠٠ لتر ماء أو بازدين ٦٠٪ تركيز ٣ في الألف، وتعالج الأشجار برشها أو بدهان أماكن الإصابة بأحد هذين المبيدين على أن يبدأ الرش في التفاح قبل بداية الأسبوع الثالث من شهر إبريل، ويمكن رش الأشجار (التفاح) ثلاثة مرات بين الرش والآخرى ٤ أسابيع، ويلاحظ عدم الرش قبل جمع المحصول بمدة لا تقل عن شهر، ويركز الرش على السوق والأفرع الرئيسية .

## ٩ - دودة ثمار التفاح Codling moth

الاسم العلمي للحشرة *Laspeyresia (Carpocapa)pomenella* (Lim)

رتبة حرشفية الأجنحة O. Lepidoptera

فصيلة الديدان ضارة الثمار Fam. Olethreutidae

ما لا شك فيه أن هذه الحشرة قد جذبت إنتباه الحشربين في كل مكان لفترة طويلة أكثر من أى حشرة أخرى وهي من الآفات الرئيسية للتفاح والكرى ولكنها أيضا من آفات الفواكه ذات النواة الحجرية، والجوز.

## وصف الحشرة

الفراشة يبلغ طولها ١٢,٥ مم وعند فرد أجنحتها تصل إلى ١٢,٥ - ١٩ مم، وعند الراحة تطوى الأجنحة فوق الجسم (شكل ٨٣)، والجناحان الأماميان مزرقشان بالألوان الرمادية والبنية، وهذا التلوين يتناسق مع لون قلف الأشجار، ومن علاماتها المميزة وجود نقطة بلون النحاس فوق الزاوية الداخلية لقمة كل جناح من الأجنحة الأمامية، والبيضة مبططة بيضاوية الشكل ورائقة اللون فور وضعها ونمو اليرقة داخل البيضة يظهر في مبدأ الأمر كحلقة حمراء وقبيل الفقس تظهر اليرقة الصغيرة داخل البيضة، واليرقة الحديثة الفقس بيضاء اللون أما الرأس والصدر فلونهما أسود، أما اليرقة التامة النمو فيكون لونها قرمزي عادة ورأسها بنى مبرقش، واليرقة التي تدخل البيات الشتوى لا يكون لونها قرمزيا، ويبلغ طول اليرقة التامة النمو من ١٢ - ١٩ مم، وتعذر اليرقة داخل شرنقة حريرية تغزلها اليرقة عادة تحت قشور القلف السائبة، وعند خروج الفراشة، يظل الجلد العذرى ملتصقا بالقلف .



(شكل ٨٣) فراشة نودة ثمار التفاح



## دورة الحياة


يتوقف عدد الأجيال في السنة على أنواع العوائل التي تصيبها الحشرة، وذكر البعض أن للحشرة جيلان على الجوز، وثلاثة أجيال على الكمثرى، وجيل واحد على المشمش وغيره من الفواكه ذات النواة الحجرية (Mad and Berns 1959) وذكر (Petty, 1949) في جنوب إفريقيا أن لهذه الحشرة جيل سنوي واحد إذا ما ربيت على المشمش، وبين (Bauey, 1949) في فرنسا أن لها جيلان، وفي مصر ذكر حماد ولطفى (١٩٨٥) أن لها جيلان في السنة ويفحص أشجار المشمش خلال فصل الشتاء والربيع تبين أن بودة ثمار التفاح تقضى بياتها الشتوي وهي في طور البيضة ويوجد البيض أسفل قشور قلف أشجار المشمش، وهذا يدل أن العدوى بهذه الآفة على المشمش موجودة ولا تنتقل إليه بطيرانها من عوائل أخرى، وقد تكون حداثق المشمش بعيدة عن مزارع التفاح والكمثرى والجوز بعدة أميال ومع هذا يصاب المشمش بها، ويتوقف ميعاد ظهور الجيل الأول على درجة حرارة الجو في الربيع، وقد تظهر الأفواج الأولى من فراشات هذا الجيل في إبريل أو مايو، وتبلغ أعداد فراشات هذا الجيل مداها في منتصف شهر مايو، ومما يذكر أن المشمش يتم جمعه مبكراً في مايو ويونيه، لذلك لا مجال لوجود جيل ثان على المشمش بل الأرجح أن يتربى الجيل الثاني على عوائل أخرى، وقد تنزل الحشرة خسائر كبيرة بثمار المشمش تتراوح بين ٣٠ - ٥٠٪، هذا ولو أن المشمش ليس هو العائل المفضل لهذه الحشرة .

## مظهر الإصابة


تهاجم يرقات هذه الآفة ثمار المشمش مباشرة، حيث يرى بالثمرة ثقب دخول اليرقة مسدوداً ببرازها وهذا من العلامات المميزة للإصابة (شكل ٨٤)، وتحفر اليرقة بدءاً من هذا الثقب وتتعمق بحفرها داخل لحم الثمرة في هذه المنطقة (شكل ٨٥)، وتدخل الفطريات من مكان دخول اليرقة وتصيب قلب الثمر بالتعفن الجزئي .

## طرق المكافحة


رش أشجار المشمش والخوخ بمحلول السيفين ٨٥٪ القابل للبلل ٤ ، ٠٪ أو بالدبتركس ٦٥٪ القابل للبلل ٩، ٣٪، وقد يحتاج الأمر إلى تكرار الرش ٣-٤ مرات بين الرش والآخرى من ١٥ - ٢٠ يوماً - على أن يتم العلاج في الربيع الباكر وقبل عقد الثمار .



(شكل ٨٤) مظهر الإصابة ببودة ثمار التفاح على ثمرة مشمش



(شكل ٨٥) ١ - يرقة ثمار التفاح تهاجم ثمرة مشمش



(شكل ٨٥) ب- إصابة نمونوجية لثمرة مشمش بنودة ثمار التفاح.

## ١٠- خنفساء الخيار المنقطة

الاسم العلمى للحشرة *Diabrotica undecimpunctata* Mann

رتبة حشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة خنافس أبى العيد Fam. Coccinellidae

تعد هذه الآفة من الآفات التى تصيب أنواعا عديدة من المحاصيل منها محاصيل خضر وفاكهة هذا ولو أنها من آفات محاصيل الخضر الرئيسية. وتحت ظروف خاصة تستطيع هذه الحشرة إحابة الحلويات ويقع معظم الضرر على الثمار التى فى دور النضج .

### وصف الحشرة

الخنافس اليافعة هى الطور الضار بالمشمش والخوخ، ويبلغ طول هذه الخنفساء نحو

٦م، والأجنحة الغمدية خضراء اللون ومبقعة بأحد عشر بقعة سوداء، ولون الرأس والصدر الأمامي والدرع والطرف الخلفى أسود .

### دورة الحياة

يوجد الطور اليرقى وطور العذراء فى التربة ، وتضع الأنثى البيض بالقرب من قواعد الأعشاب العائلة لها، وتغتنى اليرقة على الجذور وتبنى لنفسها خلية من الطين فى التربة وتتعدى داخلها، وعند خروج الخنافس اليافعة، فإنها تطير وتصيب محاصيل عدة، وللحشرة ثلاثة أجيال متداخلة فى العام، وتقضى الحشرة البيات الشتوى وهى فى الطور اليافع (الخنافس)، وتطير الخنافس فى فصل الصيف فوق أشجار المشمش والخوخ والبرقوق وغيرها من المحاصيل ويكون ذلك مصحوبا بجفاف الحشائش التى تأويها .

### مظهر الإصابة والضرر

تحدث الخنافس التى تصيب المشمش أو الخوخ ثقوبا فى الثمرة تتراوح من ثقب صغيرة إلى كبيرة (شكل ٨٦) ويحدث ضرر آخر إذا ما قامت الحشرة بالإغذاء على ثمار المشمش أو الخوخ من مكان الإصابة الذى تكون قد أحدثته آفة أخرى، ويشبه مظهر إصابة هذه الحشرة للثمار ذلك الذى تحدثه حشرات إبر العجوز، ومن مضاعفات الخسارة أن هذه الحشرة تصيب الثمار الناضجة أو التى على وشك النضج، وتغتنى الخنافس أيضا على الأوراق ولكن خسائرها فى هذا الجانب طفيفة .

### طرق المكافحة

ترتبط الكثافة العددية لهذه الآفة فى الطبيعة بسقوط الأمطار فى فصل الربيع فإذا سقطت الأمطار فى هذا الفصل يزيد نمو الحشائش وبذلك تجد الحشرة غذائها متوافرا وتتكاثر وتزيد أعدادها، وعندما تجف الأعشاب، تهجر الخنافس منها وتصيب بساتين المشمش والخوخ، وحيث أن الحشرة تصيب الثمار الناضجة فإن إستعمال المبيدات فى مكافحتها فى ذلك الوقت يعتبر أمرا مستحيلا، لذلك يجب مكافحتها على الحشائش والمحاصيل غير الغذائية باستعمال أى مبيد فعال .



(شكل ٨٦) مظهر الإصابة بخنفساء الخيار المنقطة لثمرة مشمش

## ١١- حفار ساق البرقوق

الاسم العلمي للحشرة *Ptosima undecim maculata* Herbst

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة ناخرات الأخشاب البراققة Fam . Buprestidae

تصيب هذه الحشرة أشجار البرقوق والمشمش، وتظهر الحشرة اليافعة من فبراير إلى إبريل، وتضع الإناث بيضها داخل شقوق قلف الأشجار، وبعد الفقس تحفر اليرقات أنفاقا تحت القلف ثم تتجه بالحفر داخل الساق أو الفرع وتكون الأنفاق حينئذ متعرجة ومتشعبة وممتلئة بتراب الخشب الناعم المختلط ببراز اليرقات، وينشأ عن كثرة وجود الأنفاق ضعف الأشجار ثم موتها، وعند خروج الحشرة اليافعة تنقب ثقباً مستديراً في القلف لتخرج منه .

### وصف الحشرة

يبلغ طول الحشرة اليافعة نحو ٢, ١ سم، وهي سوداء اللون ويوجد على كل من غمديها

أربعة أشرطة عريضة صفراء بترتالية وعلى الصدر الأمامي شريطان طويلان من نفس اللون (شكل ٨٧)، واليرقة عديمة الأرجل وحلقات صدرها مفلطحة قليلا وقليلة السمك وحلقات البطن ضيقة ومائلة للإستدارة وتستدق كلما قاربت المؤخرة .



(شكل ٨٧) حفار ساق البرقوق

### المكافحة

- ١ - العناية بالأشجار منذ زراعتها وتقويتها .
- ٢ - يدهن الجزء السفلى من جنوع الأشجار بالجير الأبيض .
- ٣ - تكافح كيماويا كما فى حفار ساق الحلويات رائق الأجنحة .

## ١٢ - حشرة المشمش القشرية البنية

الاسم العلمى للحشرة *Lecanium corni* Bonche

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

تنتشر هذه الحشرة إنتشارا واسعا فى العالم وتصيب أشجار الحلويات والجوز، وهى من الآفات المألوفة التى تصيب المشمش والخوخ أينما وجد ودائما ما تكون هذه الآفة مرتبطة بإصابة هذه الأشجار بالحشرة القشرية السوداء .

## وصف الحشرة

الحشرة القشرية اليافعة ذات شكل نصف مستدير ولونها بني لامع، وقطرها يتراوح ما بين ٣ - ٥ مم، وتتباين هذه الحشرة في الحجم واللون تبعاً لحالة الغصن أو الفرع الذي تصيبه، (شكل ٨٨)، ويوضع البيض أسفل قشرة الأنثى وهو بيضاوي الشكل ولونه قرمزي أو صدأى، والزاحفات (طور الحورية) بيضاوية الشكل مفلطحة ويختلف لونها من الأصفر إلى البني .



(شكل ٨٨) الحشرة القشرية البنية اليافعة

## دورة الحياة

تمضى الحشرة البيات على هيئة حشرة قشرية غير يافعة فوق أعضاء وأفرع الشجرة (شكل ٨٩)، وهذا الطور هو العمر الثاني من أعمار الحشرة التطورية، وفي شهر مارس تبدأ الأطوار غير اليافعة في النمو حتى تصل إلى دور النضج التام في شهر إبريل أو أوائل مايو، ويبدأ البيض في الفقس في أواخر مايو وأوائل يونية، وتتحرك حوريات العمر الأول أو الزاحفات نحو الأوراق حيث تستقر على كلا سطحي الورقة، والأفراد التي تعيش في فصل الصيف تتحرك ثانياً إلى الأفرع قبيل سقوط الأوراق في أكتوبر ونوفمبر وللحشرة جيل واحد في السنة، ودورة الحياة المذكورة كانت على أشجار المشمش .



(شكل ٨٩) الحشرة القشرية البنية غير اليافعة في حالة بيات شتوى على جذع شجرة

## مظهر الضرر

بالرغم من أن إغذاء الحشرات على عصارة الشجرة قد تسبب لها الضعف، إلا أن ما تفرزه من الندوة العسلية هو الذي يسبب الخسارة السريعة، فالحشرات التي تنمو في فصل الربيع تفرز كميات كبيرة من الندوة العسلية التي تسيل وتلوث المجموع الخضرى والثمار،



كذلك فإن الزاحفات فوق الأوراق تنتج إفرازًا دقيقًا من الندوة العسلية فتستقر أيضا فوق الأغصان والثمار والأوراق، وعند نمو الفطر الأسود على الندوة العسلية فإنه يعطى الثمار مظهرا سيئا يعوق تسويقها، وربما تتشعخع الشجرة كلها بالسواد إذا ما كانت الإصابة شديدة ويصبح مجموعها الخضرى لزجا .

### طرق المكافحة

تقوم المتطفلات عادة بدفع معدلات الكثافة العددية لهذه الآفة تحت المستوى الإقتصادي، وإذا كان لابد من إجراء المكافحة الكيميائية فيجب إجراؤها برش الأشجار بمبيد فعال أثناء فصل الشتاء للقضاء علي الحشرات التي دخلت البيات الشتوى، ونستعمل هنا الكيماويات المستعملة لمكافحة الحشرة القشرية السوداء على الموالح .

## ١٣ - حشرة الزيتون القشرية السوداء

الاسم العلمى للحشرة (Bernard) *Saissetia oleae*

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية Fam. Diaspididae

هذه الآفة واسعة الإنتشار وتصيب العديد من محاصيل الفاكهة ونباتات الزينة وشجيراتنا، وتعد هذه الآفة من الآفات الرئيسية التي تصيب الفواكه ذات النواة الحجرية والزيتون . وتوجد على المشمش والخوخ مختلطة مع الحشرات القشرية الأخرى .

### وصف الحشرة :-

الحشرة القشرية اليافعة نصف كروية يصل قطرها من ٣ - ٥ مم ولونها أسود دائما، ولكن علامتها المميزة هي وجود خطان على ظهرها متوازيان وخط مستعرض يربطهما من الوسط مشكلا للحرف H، ودائما ما تكون الذكور نادرة حتى حينما تكون كثافتها العددية كبيرة، ويوضع البيض تحت قشور الأنثى وهو أبيض لؤلؤى مستديرا، وزاحفات هذه الحشرة

تشبه زاحفات الحشرة السابقة، فشكلها بيضاوى ولونها بنى، ويبدأ تكون العلامة المميزة للحشرة على الظهر فى فترة العمر الثانى (شكل ٩٠).



(شكل ٩٠) الأطوار غير اليافعة لحشرة الزيتون القشرية السوداء على فرع شجرة مشمش

### دورة حياة الحشرة

لهذه الحشرة جيل واحد فى العام ولكن فى بعض المناطق الدافئة يكون لها جيلان، وتقضى بياتها الشتوى فى صورة حشرة ناضجة جزئيا إذ تكون قد أكملت إنسلاخين وهى فى طريقها للنضج ولكن حجمها صغير، وفى الربيع يبدأ نمو الأشجار فيتموجج الحشرة حتى تصل إلى مرحلة النضج التام فى شهر إبريل ومايو، ويوضع البيض تحت قشرة الأنثى

وتخرج منه الزاحفات في شهر يونية ويولية، وهذه تزحف إلى الأوراق وتنمو ببطء خلال فصل الصيف، وفي الخريف تتحرك الحشرات راجعة إلى الأغصان والفروع حيث تظل موجودة بصفة مستديمة.

### مظهر الضرر

يسبب إمتصاص هذه الحشرة لعصارة النبات ضعف الأشجار، وبإفرازها للنواة العسلية يدعو قطر العفن الأسود إلى النمو على هذه النواة العسلية ويلوث الأوراق والثمار باللون الأسود، وهذه الثمار غير قابلة للتسويق، وأحيانا في حالة الإصابة الشديدة يعوق قيام الأوراق بعملية التخليق الضوئي .

### طرق المكافحة

يوجد الكثير من المتطفلات التي تصيب هذه الآفة وتقلل من خطورتها، وفي حالة المكافحة الكيماوية تكافح مع الحشرات القشرية الأخرى بنفس الكيماويات والمعاملات .

## ١٤- الجعال

رتبة غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة الجعال Fam. Scarabaeidae


تضم هذه الفصيلة عددا من الأنواع التي تصيب الحلويات ذات النواة الحجرية وتعتبر حاليا من أخطر هذه الآفات ونذكر منها ما يلي :

أ - جعال الخوخ *Pachnoda fasciata* F.

تتغذى الحشرات اليافعة على ثمار الخوخ قرب نضجها وتتغذى كذلك على أزهار الورد والحناء وتضع الإناث بيضا في التربة على المواد العضوية التالفة حيث تعيش اليرقات.

## الحشرة اليافعة :

(شكل ٩١). تبلغ نحو ٢ سم فى الطول، سوداء اللون، ويوجد شريط أصفر على جوانب  
ترجة الحلقة الصدرية الأولى والغمدين، ويتصل اللون الأصفر من الجانبين بشريط عرضى  
أصفر عند منتصف الغمدين .



(شكل ٩١) جعل الخوخ

### ب - جعل الورد الزهردى *Potosia cuprea Spp. ignicollis Gory*

تعيش يرقات هذا الجعل على المواد العضوية المتحللة والأخشاب التى سبق إصابتها  
بالحفارات الأخرى، أما الحشرات اليافعة فتتغذى على أزهار الورد وتلف براعمه الزهرية،  
وهذا الجعل أصبح يصيب فى مصر أزهار المشمش والخرنوب والتفاح وينزل بها خسائر  
ملموسة .

### ج - جعل الورد الزغبى *Tropinata squalida Scop.*

تظهر الحشرات اليافعة لهذه الآفة فى شهر نوفمبر وتستمر حتى إبريل، وتتغذى على  
رحيق الأزهار وبساتها وخصوصا أزهار الورد فتسبب تلفها، وتفضل إصابة الأزهار البيضاء  
اللون، وتوجد أيضا على أزهار الفول والبسلة والخرنوب والتفاح والمشمش والخرنوب .

ولكن فى السنوات الأخيرة أصبح هذا الجعل من أخطر الآفات التى تصيب المشمش فى مصر، ويكاد أن يقضى على المحصول بالكامل فى بعض السنين، فهو يهاجم أزهار المشمش والخوخ والتفاح ويقتذى عليها بشراهة ويعتبر المسئول الأول حاليا عن نقص محصول المشمش فى مصر، وفى أراضى سيناء التى أستصلحت وانتشرت فيها مزارع الخوخ والتفاح يعتبر هذا الجعل الآفة الرئيسية لهذه المحاصيل، ولم تجر أى دراسات يعد عن سبب تحول هذه الآفة من آفة ثانوية إلى آفة رئيسية شديدة الخطورة .

### وصف الحشرة اليافعة

يبلغ طول هذا الجعل نحو ١,٥ سم ولونه أسود لامع، وجسمه مغطى بزغب أصفر مخضر، ويوجد علي غمدية تضاريز طويلة .

### دورة الحياة

تضع الإناث البيض على عمق بضعة سنتيمترات تحت سطح التربة، وعند خروج اليرقات تغتذى على المواد العضوية التالفة ثم تتحول إلى عذراء علي عمق أبعد قليلا وتبقى فى موضعها حتى الشتاء التالى .

### طرق المكافحة

توصى وزارة الزراعة المصرية باتباع نظام المكافحة الكيمائية التالى :

أ - فى حالة مكافحة الجعال اليافعة توصى الوزارة باستخدام مبيد هوستاثيون ٤٠٪ بمعدل ١ لتر للفدان أو لانيت ٩٠٪ بمعدل ٣٠٠ مم للفدان يضاف إلى أى منهما ٤٠٠ لتر ماء .

ويرش محلول أى من المبيدين على سطح التربة فى الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس ويراعى ألا يصل الرش إلى الأزهار وذلك فى حالة الإصابة الشديدة، وتوصى كذلك بجمع الحشرات وإعدامها مرتين يوميا .

ب - فى حالة مكافحة اليرقات فى الحقل أو فى الأسمدة العضوية يستخدم مبيد الفيوريدان ١٠٪ بمعدل ٨٠ - ١٠٠ مم للحشرة الواحدة، وتعمل حلقة فى التربة حول كل شجرة

نصف قطرها نحو ٧٥ سم ويعمق ١٠ - ٢٠ سم ثم يصيب منها المبيد بالجرعة الموصى بها وتردم الحفرة وتروى الأرض ريا غزيرا .

ج - ولكافحة اليرقات فى السماد العضوى يضاف الجير المطفى إلى هذا السماد بنسبة ٨٪ ويقلب جيدا، ويراعى تقليب السماد كل يومين ولدة ١٥ يوما قبل إستخدامه فى تسميد أرض البستان .

## ١٥- سوسة قلف أشجار الخوخ المصرية

الاسم العلمى للحشرة *Eccoptogaster (Scolytus) aegyptiacus* Pic

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة خنافس القلف Fam.Scolytidae

لهذه الحشرة عوائل متعددة أهمها الخوخ والمشمش والبرقوق واللوز والتفاح والكمثرى والزيتون. وأهم مظهر هو وجود ثقوب مستديرة صغيرة بأعداد كبيرة على قلف الأشجار المصابة وقطر كل من هذه الثقوب يبلغ نحو ١ مم، وقد تجف البراعم والأوراق الحديثة نتيجة لحفر الحشرات اليافعة تحت قواعد البراعم فى فصل الصيف . ويمكن نزع قلف الأشجار المصابة بسهولة لموت طبقة الكميوم وعندئذ يسهل ملاحظة الأنفاق الأولية والثانوية فى كل من القلف والخشب، وتتسبب الإصابة الشديدة فى ضعف الأشجار وموتها .


### الحشرة اليافعة

(شكل ٩١): تبلغ نحو ٢ - ٢,٥ مم فى الطول، ولونها بنى قاتم .

### دورة الحياة :

تظهر الحشرات اليافعة فى ابتداء الصيف وتنشط الإناث فى حفر ثقوب صغيرة مستديرة على السطح الخارجى لقلب الأشجار السليمة أو المقطوعة أو فى الجنوع الميتة الضعيفة ثم

تنفذ الأنثى تحت القلف حيث تحفر نفقا مستقيما يسمى النفق الأولى وعلى جانب هذا النفق تحفر الأنثى جيوبا صغيرة تضع في كل منها عددا من البيض . وبعد الفقس تخرج اليرقات تحفر أنفاقا ثانوية متعامدة مع النفق الأول، وتكون هذه الأنفاق ضيقة في مبدأ حياة اليرقة ثم تزيد تدريجيا في الطول والاتساع كلما نمت اليرقة. وبعد تمام نمو اليرقة تحفر حجرة مستديرة تتحول فيها إلى عذراء ثم إلى حشرة يافعة وهي تقضى بياتها الشتوى على هذه الحالة ويبدء خروج الحشرات اليافعة كلها تقريبا عند بداية الصيف - كما سبق القول من خلال ثقب الخرج المستديرة . ولهذه الحشرة جيلان في السنة .



(شكل ٩) منظر علوى وآخر جانبي لسوسة قلف أشجار الخوخ

### مكافحة خنافس القلف :

١ - ينصح متكالف وفلنت (١٩٦٢) برش الأشجار القائمة والمقطوعة المصابة بمحلول مادة أرثودا يكلوروينزين Orthodichlorbenzene أو بمادة برومور الاثيلين.

٢ - وجد أن أحسن ميعاد لمكافحة خنافس القلف في مصر هو شهرا أغسطس وسبتمبر حيث تكون أعداد الحشرات اليافعة كبيرة جدا وفي نفس الوقت تكون أعداد الخنافس المفترسة المفيدة (مثل خنافس أبى العيد) قليلة جدا، وترش الأشجار بالجوزائين بنسبة

بنسبة ٠,١ أو بالسيفين بنسبة ٤,٠٪ أو بالدبتر كس بنسبة ٣,٠٪ أو غيرها في الشهرين المذكورين، ويكرر الرش ٣ - ٤ مرات بحيث تكون بين الرش والآخرى نحو ١٥ يوما .

## ١٦- سوسة قلف أشجار الخوخ الأوروبية

الاسم العلمى للحشرة *Scolytus regulosus* (Ratz)

وتتبع نفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة .

وتصيب هذه الحشرة الخوخ وباقى أشجار الحلويات فى كثير من بقاع العالم، ولكنها تعتبر آفة هامة على الفواكه ذات النواة الحجرية أكثر منها على التفاحيات، ويرتبط وجودها بضعف أشجار المزرعة أو إهمالها لمدة طويلة .

### وصف الحشرة ومظهر الإصابة بها :

يمكن الإستدلال على الإصابة بهذه الآفة من وجود عدد كبير من الأفرع بها ثقوب مستديرة ووجود براعم عليها إفرازات صمغية، ويرقة هذه الآفة عديمة الأرجل ومقوسة قليلا ولون جسمها أبيض، ورأسها بنية، واليرقة التامة النمو يصل طولها إلى ٢.٥ مم، ويمتد الجزء الأمامى من الجسم حيث تسحب الرأس داخل هذا الجزء، وهذه الخنفساء إسطوانية الجسم يصل طولها إلى ٢.٥ مم، ولون رأس جسم الخنفساء ورأسها بنى قاتم إلى أسود، ولون قرون الإستشعار والأرجل وأطراف غمدى الأجنحة أحمر بلون القرفة أو بنى فاتح، ويغطى الجسم والرأس وغمدى الأجنحة شعر قصير .

### دورة الحياة

تقضى يرقات هذه الحشرة البياض الشتوى تحت قلف الأشجار وتتحول إلى عذارى فى بداية الربيع، وتخرج الحشرات الياقة للجيل الأول ما بين شهر مارس ومايو، ويستغرق جيل الربيع نحو شهرين ليتم دورة حياته، وعلى أى حال فإنه من الممكن أن يكون لهذه الحشرة ثلاثة أجيال فى السنة وجزء من جيل رابع .

ولكن تضع الأنثى بيضها فإنها تصنع نفقا قصيرا فى الساق الرئيسى، وتضع فيه البيض، ويوضع البيض على طول جانبى النفق ويغطى بسرائح الخشب، ويسمى هذا نفق البيض .



يفقس البيض في خلال أيام قليلة وتخرج منه اليرقات التي تشرع في صناعة أنفاق تسمى أنفاق التغذية تميل بزاوية قائمة على نفق البيض .


### مظهر الإصابة والضرر

إن إغذاء كل من الحشرات اليافعة لهذه الآفة ويرقاتها على الأشجار يسبب ضعف هذه الأشجار، وتحفر اليرقة في الخشب الجديد عند قاعدة البرعم، ويمكن للحشرات اليافعة واليرقات أن تدمر ساق ومعظم أفرع الشجرة، وتهاجم الحشرة اليافعة جنوع الأشجار الضعيفة أو المجروحة، ومنها تستطيع أن تدخل وتؤسس مستعمرة بكل سهولة، ولكنها في نفس الوقت تحاول أن تهاجم أشجارا قوية ويبدأ هجوم الحشرة من أسفل قواعد البراعم، وحيث أن الشجرة القوية تستطيع أن تدافع عن نفسها بإفرازها للصمغ الذي يصد هجوم الحشرة فإنه من الضروري أن يصيب الشجرة الضعف حتى تكون سهلة المزال أمام هذه الآفة، وينشأ الضرر الذي يحيق بالشجرة من حفر كل من الحشرة اليافعة واليرقة في القلف الداخلي وطبقة الكامبيوم (شكل ٩٢) وتحفر الخنافس دائما أنفاقا مستقيمة إما إلى أعلى أو إلى أسفل ومن النادر أن تفرع النفق، ولكن اليرقات تحفر أنفاقا تتعاند بزوايا منفرجة على نفق البيض ومن خلال الثقوب التي تصنعها الحشرة تدخل العديد من الفطريات.

### المكافحة

١ - تتعرض الأشجار التي تعاني من العطش وتصاب بالضعف من جراء ذلك إلى الإصابة بهذه الآفة حيث تهاجم الحشرة قواعد البراعم في الأشجار التي عمرها عام، ولذلك كانت أفضل طريقة للمكافحة هي تقوية الأشجار وتعهدا بالرى والتسميد كذلك يجب إزالة الأشجار أو أجزاء الأشجار الميتة أو الضعيفة في فصل الخريف وإحراقها لإعدام اليرقات بداخلها ومن الأفضل التخلص من الأفرع والأخشاب التي تخزن كوقود قبل إنتهاء شهر فبراير إن أمكن.

٢ - تكافح هذه الحشرة كيميائيا بالرش بمبيد سيديال ٥٠٪ بمعدل ٧٠٠ سم<sup>٣</sup>/ ١٠٠ لتر ماء وذلك في أواخر شهر أكتوبر وإذا ظهرت الإصابة مرة أخرى في فصل الربيع من العام التالي يكرر العلاج من أواخر مارس ويكرر ثلاث مرات بين الواحدة والأخرى أسبوعين ما عدا أشجار المشمش .



(شكل ٩٢) فرع شجرة خوخ تبدو فيه الثقوب التي صنعتها ثاقبة قلف أشجار الخوخ الأوربية

## ١٧ - ذبابة ثمار حوض البحر الأبيض المتوسط

### (ذبابة الفاكهة)

*Ceratitis capitata wiew*

سبق شرح كل ما يتعلق بهذه الآفة بالتفصيل عند ذكر آفات الحمضيات، ومن المعروف أن هذه الآفة تصيب ثمار أشجار الطويات بشدة مثل الخوخ والمشمش والتفاح والكمثرى والبرقوق والسفرجل والموالح ما عدا الليمون البلدي، ويبدأ الضرر بمجرد ثقب الأنثى لجدار الثمرة بواسطة آلة وضع البيض الواخزة، وذلك لكي تضع بيضها وتتلون المنطقة المحيطة بمكان الوخز باللون خاصة، ففي البرتقال يكون هذا اللون ضارياً إلى الحمرة أو أصفر مخضراً، وفي الخوخ توجد نقطة صمغية مكان الثقب، وفي اليوسفى يسود مكان الوخز، وبعد فقس اليرقات تحفر داخل اللب وتتجول فيه ويتبع ذلك دخول الفطر والبكتريا وتعفن الثمرة.

### طرق المكافحة

تعالج ذبابة الفاكهة كيميائياً على الخوخ والبرقوق والمشمش بالرش بمبيد أنثيو ٣٣٪ بمعدل ١٠٠ سم ٣ يضاف إليها ١٠٠ لتر ماء أو مبيد جاريونا ٥٠٪ ٣٠٠ مم يضاف إليها ١٠٠ لتر ماء، وذلك حسب حجم وعدد الأشجار بما لا يتجاوز ٤٠٠٠ لتر ماء للفدان، ويعالج الخوخ ابتداء من الأسبوع الأول من شهر يونية مرة كل ثلاثة أسابيع ضد ذبابة الفاكهة بأحد المبيدات المذكورة، على أن تكون آخر رشة قبل جنى المحصول بأسبوعين على الأقل، ويعتبر هذا العلاج علاجاً لذبابة الفاكهة والمن معاً كعلاج مشترك .

## ١٨ - دودة ثمار النبق

الاسم العلمي للحشرة *Carpomyia incompleta* Beck

رتبة زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة ذباب الفاكهة fam. Tephritidae (Trypetidae)

تصيب هذه الحشرة ثمار النبق في أماكن زراعته وتسبب خسارة كبيرة في المحصول قد تصل إلى ٧٠٪ .

## وصف الحشرة اليافعة

ذبابة صغيرة طولها ٤مم ولون الجسم أصفر فاتح وعلى الجناح ثلاث خطوط عرضية غامقة، وعلى الصدر ثلاث خطوط طولية أدكن من لونا من بقية أجزائه ويظهر على البطن أشرطة بنية متبادلة مع أخرى صفراء، شعر الصدر طويل أسود وشعر البطن قصير أصفر، يوجد في مؤخر البطن شعر يماثل ذلك الموجود على الصدر.

## مظهر الإصابة والضرر

تنقب الأنثى قشرة ثمرة النبق قبيل النضج لتضع بيضا فرديا، ويبدو مكان الوخز كبقعة صفراء صغيرة، تتجول اليرقة داخل لب الثمرة وتتغذى على أنسجتها فتتحول المنطقة المصابة إلى نسيج إسفنجي قد يهبط عن مستوى سطح بقية الثمرة ويصبح لونه داكنا، وإذا وجدت أكثر من يرقة في الثمرة الواحدة فقد تجف وتسقط .

## طرق مكافحة

يتطفل على يرقات هذه الآفة طفيل من الحشرات غشائية الأجنحة هو *Opius cencoler*

هذا ولا يتبع في مصر الآن أى نظام لمكافحة هذه الحشرة كيميائيا لعدم أهمية النبق إقتصاديا من جهة ولأن الثمار تؤكل رغم إصابتها .

ولكن إذا كان لهذا المحصول أهمية إقتصادية في مناطق أخرى من العالم العربى فإنه يمكن إجراء المكافحة الكيميائية برش الأشجار رشاً وقائياً بمبيد دايثوثيت أو مبيد جاردونا فى شهرى فبراير ومارس أى قبل نضج ثمار المحصول الرئيسى بنحو شهر - ويمكن تكرار الرش مرتين بين الرشاة والأخرى ثلاثة أسابيع .

## ثانيا : الآفات الحشرية التي تصيب التفاحيات

تعتبر التفاحيات من أهم الفواكه التي تزرع في العالم العربي، وهي التفاح والكمثرى والسفرجل، وتصاب هذه الفواكه بالكثير من الآفات الحشرية نستوفيها فيما هنا وفقا للترتيب التالي : -

### ١ - الآفات الحشرية التي تصيب التفاح

يصاب التفاح في جميع مناطق زراعته بالكثير من الآفات الحشرية والتي يبرز في مقدمتها دودة ثمار التفاح ، وعلى أى حال فإن للتفاح طبيعة خاصة حيث يقوم نحل العسل بمعظم عمليات تلقيح أزهاره، ولذلك كان إستعمال المبيدات لمكافحة آفات التفاح أمرا يجب أخذه بكل حذر، لأن إبادة هذه المبيدات لنحل العسل مع غيره من هذه الملقحات يعنى نقصا خطيرا في المحصول، ولا يجب بالمرّة إستعمال أى مبيد حشرى في موسم الإزهار، لأن ذلك يسبب سقوط نسبة عالية من الأزهار من جهة ويقضى على نحل العسل الزائر لأزهار التفاح من جهة أخرى، لذلك تبنى برامج السيطرة على آفات التفاح بكل دقة وبعد دراسات مستفيضة حتى لا تنقلب الفائدة من إستعمالها إلى ضرر محقق .

ومن الجدير بالذكر أن الحشرات التي تصيب التفاح ضخمة العدد، فقد ذكر البعض أن أكثر من ٥٠٠ حشرة تصيب بساتين التفاح في جميع مناطق زراعته، ولهذا فإن بساتين التفاح تعتبر نظاما بيئيا مستديما ومسكنا مستمر لمفصليات الأرجل ذات الغذاء النباتي ولكن ذكر Datman (١٩٦٤) أن أكثر من ٧٦٠ من مفصليات الأرجل توجد في بساتين التفاح، وصنف

الكثير منها كمهاجرات أو أعداء طبيعية، ووجد ٤٢ من بينها فقط ذات أهمية إقتصادية، وأقل من عشرة منها كانت آفات خطيرة. وإذا لم يتم تشتيتها بواسطة مبيدات الآفات أو ممارسات مكافحة التي تقلل من أعدائها، فإن بعض مكونات النظام البيئي المحيط بشجرة التفاح سوف تبقى ثابتة تقريبا، كما ستظل بعض الآفات دون المستويات الخطرة بسبب تعرضها للأمراض والمفترسات والطفيليات، ولكن مع هذا توجد بعض الآفات الحشرية مثل دودة ثمار التفاح وخنفساء الفاكهة دون أعداء طبيعية فعالة، ويمكن لهذه الآفات أن تدمر محصول التفاح إذا تركت دون مكافحة فعالة. تعتبر التفاحيات من المحاصيل العالمية القيمة التي يطلبها قطاع كبير من المستهلكين، وينبغي أن تكون خالية من التلف الناشئ عن الآفات، ويتطلب الأمر استخدام المبيدات الوقائية لها من الإصابة في معظم مناطق زراعة الفاكهة في العالم – ونذكر هنا أهم الآفات التي تصيب التفاح وطرق السيطرة عليها.

## ١ - فراشة ثمار التفاح أو دودة ثمار التفاح

### أو حفار ثمار التفاح Codling moth

لاسم العلمي للحشرة *Cydia (Carpocapsa) pomonella* (linn)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة أو لثريتيدى fam. Oithreutidae (Eucosmidae).

تعتبر هذه الحشرة من أخطر آفات التفاح في العالم ولا تخلو منها زراعة تفاح في قطر من الأقطار سوى اليابان وبعض مناطق آسيا، ومع ذلك فيمكن السيطرة عليها إذا ما أتبع نظام دقيق للرش، وتهاجم هذه الآفة أيضا الكمثرى والسفرجل والمشمش والخوخ والبرقوق والكرز وقد سبق أن تناولناها بالتفصيل عند ذكر آفات المشمش ومع ذلك نذكر عنها الآتي : -

### مظهر الفراشة

عادة ما تشاهد هذه الفراشة في بستان التفاح، فهي تستقر فوق قلف الأشجار في وضع الراحة أثناء النهار وتنشط فقط ليلا، والتعرف عليها مفيد حيث أنه يمكن بسهولة إقتناصها في

مصبدة مطعمة، وهذه هي الطريقة المفضلة لتتبع نشاطها، ويبلغ طولها والأجنحة مطوية ١٢,٥ - ٢١,٥ مم، والأجنحة الأمامية بنية اللون يخترقها أشرطة رمادية اللون متموجة، وعند قمة كل جناح أمامي يوجد شريط نحاسي اللون قاتم وهذا يميز هذه الفراشة عن غيرها من الفراشات الأخرى التي توجد في بستان التفاح. وتضع الأنثى بيضا مفلطحا يشبه الطبق - على الأوراق والثمار، ولونه يكون أبيض عند وضعه ثم يظهر فيه دائرة حمراء بعد ٢ - ٤ أيام على درجة حرارة ٧٠ ف. وبعد ستة أيام تظهر رأس اليرقة السوداء من خلال غلاف البيضة، ويفقس البيضة بعد ٧ - ٨ أيام إذا كانت درجة الحرارة ٧٠ ف، واليرقات الحديثة الفقس بيضاء اللون ذات رأس أسود .

### مظهر الإصابة والضرر

يحدث الضرر بواسطة اليرقات، عندما تدخل هذه اليرقات إلى الثمار، وربما تجولت اليرقة بعد الفقس على الأوراق بحثاً عن الثمار، وعندما تجد الثمرة تدخلها من عند نقطة إتصالها بحامل الثمرة أو من جانبها، ويمكن الإستدلال على دخول اليرقات إلى الثمرة من البراز الذي يوجد حول ثقب الدخول، (شكل ٩٢) وبعد ذلك تمعن اليرقة في الحفر داخل لحم الثمرة، وإذا ما ماتت اليرقة بعد مسافة قصيرة من الثقب التي أحدثته فيمكن معرفة ذلك من حيث ينخفض مكان دخولها ويسمى عندئذ (اللسعة) ، وفي كثير من الإصابات تشق اليرقة طريقها حتى تصل إلى قلب الثمرة وتفتدى على البذور، وعندما تقترب من تمام نضجها فإن اليرقة تأخذ طريقها إلى السطح وتدفع أمامها البراز في الحفر لتسد به مدخل النفق، وعندما تنضج تترك الثمرة من فتحة الخروج في جانب الثمرة، والنفق المفتوح هو من العلامات المؤكدة على ترك اليرقة للثمرة، وتسقط الكثير من الثمار المصابة وهذه لابد أن تؤخذ في الحسبان عند حساب الخسارة التي تسببها هذه الآفات علماً بأن الحشرة تكمل دورة حياتها في الثمار المتساقطة.

### دورة الحياة

تقضى أفة ثمار التفاح البيات الشتوي وهي في طور اليرقة التامة النمو في شرنقة خشنة من الحرير تحت قلف الأشجار السائب سواء أكان القلف في الجذع أو الأفرع، وقد تصنع شرنقتها هذه في التربة أسفل الأشجار، وقد تظل بعض اليرقات داخل الثمار حيث تحمل إلى أماكن التعبئة وتصنع بعد ذلك شرنقتها داخل صناديق التعبئة، أو في أي مكان آخره، وفي

هذه الحالة تصبح أماكن التعبئة مكانا خطيرا تنبعث منه الإصابة إلى البساتين المجاورة.

وفي منتصف الربيع، تتحول اليرقات التي خرجت من البيات الشتوى إلى عذارى بنية اللون وتخرج أفواج الفراشات الأولى في إبريل أو مايو، حسب المنطقة، وفراشات هذا الجيل قد تستمر في الخروج ووضع البيض لمدة ٨ - ٩ أسابيع، ويقرر الكثيرون أنه يبدأ خروج فراشات هذا الجيل عندما تتساقط بتلات أزهار التفاح أو بعد ذلك بقليل ولكن هذا يختلف من مكان إلى آخر، وأفضل طريقة لتحديد بداية خروج فراشات الربيع هو باستخدام المصائد المطعمة .

وتنشط الفراشات كثيرا في الأمسيات الدافئة، ولكن التلقيح ووضع البيض يأخذ مجراه عند الغسق، وقد يبدأ وضع البيض بعد التزاوج بيوم أو يومين، ولكن يقل نشاط الفراشات وتضع بيضا قليلا إذا إنخفضت درجة الحرارة عن ٦٠ °ف. ويوضع البيض بكميات أكبر في النصف العلوى من الشجرة عنه في النصف السفلى، ويوضع البيض فرديا فوق السطح العلوى للأوراق وعلى الثمار، ويفقس البيض بعد ٧ - ١٢ يوما حسب درجة حرارة الطقس، تتجول اليرقات بعد فقسها لمسافة قصيرة بحثا عن مكان مناسب تقتحم منه الثمرة، وإذا حدث الفقس على الأوراق فإن اليرقة تغتذى قليلا على السطح السفلى للورقة، ثم تدخل بعد ذلك إلى الثمرة، من مكان إتصال حامل الثمرة بالثمرة، ويستغرق نمو اليرقة ونضجها من ٣ - ٤ أسابيع ثم تترك الثمرة لتعذر في مكان محمى على الشجرة . وعذارى الجيل الأول هذه التي تنتج الجيل الثانى للحشرة، وفراشات هذا الجيل تنشط من يونيو إلى أغسطس تبعاً للموسم والمنطقة ومعظم يرقات الجيل الثانى تدخل الثمرة من جانبها وتحفر قلب الثمرة، وعند تمام نموها تخرج يرقات الجيل الثانى من الثمار وتدخل في شرانق حريرية في مكان آمن (كما سبق وصفه) حيث تدخل البيات الشتوى، وقد يكون لهذه الحشرة جيل ثالث في بعض المناطق في شهرى أغسطس وسبتمبر، وتفضل هذه الحشرة الجو الدافئ .

## طرق المكافحة

يمكن مكافحة هذه الآفة بنجاح عند إختيار الوقت المناسب للمكافحة والمبيدات المناسبة، وقد تلعب الأعداء الطبيعية من مفترسات وطفيليات دورا في المكافحة، ولكن دورها هذا لا يغنى عن



المكافحة الكيميائية . ومكافحة الجيل الأول للحشرة هو مقياس نجاح المكافحة، فإذا ما كوفح هذا الجيل بنجاح فإن مكافحة الجيل الثاني تكون أيسر، وكذلك فإن إصابة التفاح بديدان الجيل الثاني تكون متأخرة وغير مؤثرة .

ويجب إجراء المكافحة عند سقوط بتلات الأزهار، كذلك يجب وضع عدة مصائد مفخخة في البستان حتى نعرف منها بداية ظهور أضرار الجيل الأول والوقت المناسب للمكافحة، وعليه فإن بداية المكافحة يجب أن تبدأ بعد ٧ - ١٠ أيام من سقوط البتلات وهو أكثر أوقات المكافحة نجاحاً .

وعند تشغيل المصائد، يمكن تركيب الطعم الذي سوف يوضع داخلها من ٣ أجزاء من المولاس إلى ٩ أجزاء من الماء أو جزء واحد من دايمولت إلى ١٩ جزء من الماء يضاف إليها في كل حالة قليل من الخميرة حتى تسرع عملية التخمر، ويوضع هذا الطعم في مصائد من الصفيح المطلي من الداخل بالورنيش أو الإنامل ويكون عمق المصيدة ٣ - ٤ بوصات وسعتها نحو لتر، وتعلق المصيدة بحبل في الثلث العلوي من الشجرة ويكفى إستعمال ٤ - ٥ مصائد إذا ما وزعت بنجاح في أرجاء البستان، بحيث لا تكون متجاورة، ويجب تزويد المصائد بالماء كل مدة لتعويض الفاقد منه بالتبخر، كما يجب تغيير الطعم كل ٧ - ١٠ أيام، ويجب فحص المصائد كل يوم أو يومين لمعرفة عدد ما بها من فراشات، ومن المستحسن وضع هذه المصائد في البستان في موسم التزهير التام .

ويجب إجراء الرشوة الأولى بعد ١٠ أيام من إصطياد الفراشة الأولى بعد إنتهاء موسم التزهير، أما الرشوة الثانية فتترك لظروف الإصابة، ويجب إستعمال مصائد الفراشات لتحديدها أيضاً إذا ثبت وجود فراشات من فراشات الجيل الثاني بها، وهذا قد يحدث خلال شهر يونية ويولية تبعاً للمنطقة .

وربما يحتاج الأمر إلى رشوة ثالثة إذا ظهرت فراشات الجيل الثالث وتكون هذه في نهاية يولية وأغسطس وتوجد الكثير من المبيدات الفعالة ضد فراشات ويرقات هذه الحشرة، ومكافحة الفراشات تعد من أفضل وسائل المكافحة، ولكن يجب أن يكون للمبيد المستعمل في مكافحة الفراشات أثر باق يقتل اليرقات عند ظهورها .

ويرجع الفشل في مكافحة هذه الآفة إلى عاملين مهمين هما : -

أ - المكافحة الغير موفقة لحشرات الجيل الأول فقد يكون ذلك راجعاً إلى أن الرش قد تم

فى وقت مبكرا جدا أو فى وقت متأخر وهذا يؤدى بدوره إلى خطورة الجيل الأول وما يتبعه من خطورة الجيل الثانى .

ب - ظهور سلالات مقاومة لفعل المبيدات، لهذا يجب تغيير المبيدات المستخدمة من وقت إلى آخر .



(شكل ٩٣) كرات البراز حول فتحات الأنفاق التى صنعتها ديدان ثمار التفاح

## ٢- آفة أوراق البرتقال

الاسم العلمى للحشرة *Argyrtania citrana* (Fernald)


رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيدي Fam. Tortricidae


كانت هذه الحشرة تصنف فى الماضى كأفة من آفات الحلويات ذات النواة الحجرية، ولكنها ظهرت كأفة من آفات التفاح خصوصا فى المناطق الساحلية من العالم، وظهرت خطورة هذه الآفة بعد الإسراف فى استخدام المبيدات وتغيير التوازن البيئى فى الطبيعة، وتهاجم هذه الحشرة أيضا المشمش والكمثرى والبرقوق هذا فضلا عن الموالح .

## وصف الحشرة

يبلغ طول هذه الحشرة نحو ١٢,٥ مم ولون الأجنحة الامامية صدأى إلى بنى غامق، وعندما تنطوى الأجنحة فوق الجسم عند الراحة يأخذ الجسم مظهر الجرس (شكل ٩٣)، وأيضا عند طى الأجنحة يظهر عليها خط أسود يشبه حرف ٧، وأسفل ذراعى حرف ٧ تظهر منطقة قائمة مثلثة الشكل قرب الحواف الخارجية للأجنحة، وتضع الأنثى بيضا بيضاوى الشكل مفلطح، ويوضع فى كتل مكونة من ١٠ - ٤٠ بيضة بشكل تتراكم فيه البيضات وتغطى بعضها بعضا (شكل ٩٤)، البيض قشدي اللون يتحول إلى أصفر قرب النضج، ويصل طول اليرقة الناضجة إلى نحو ١٢,٥ مم ولونها لون القش أو أخضر فاتح ورأسها لونه بنى فاتح كذلك لون الصدر، وهذه اليرقات نشطة الحركة، تتحرك متموجة للخلف عند إنزعاجها وتسقط على الأرض مستخدمة خيط من الحرير تفرزه وتنزل عليه إلى الأرض، ويبلغ طول العذراء أقل من ١٢ مم ولونها بنى فاتح إلى غامق، ويعثر عليها دائما بين الأوراق المطوية.



(شكل ٩٤) فراشة لافة أوراق البرتقال



(شكل ٩٤) كتلة بيض وضعتها فراشة لآفة البرتقال - لاحظ تراكم البيض وتغطيته لبعضه البعض

### مظهر الإصابة والضرر


يرقة هذه الآفة يرقة لآفة للأوراق وصانعة للعش، واليرقات إنفرادية وتوجد في الأوراق الخضراء الملتفة، أو بين كتل غير منتظمة من الأوراق الجافة ملتصقة بالأوراق الخضراء، وينشأ ضررها من إغتنائها على الأوراق، ولكن الضرر الأكبر يحدث من الإغتناء على الثمار السليمة، وتغتنى اليرقة على سطح الثمرة محدثة به نقره ضحلة سرعان ما تدخل منها إلى قلب الثمرة عليها وأحيانا تدخل مخروط الثمرة في الأصناف ذات الكأس المفتوح، وعادة ما يبدأ هجوم اليرقة من منطقة إتصال الثمرة بحاملها، وصنف التفاح الأصفر المسمى Yellow Newton هو أكثرها تعرضا للإصابة بهذه الآفة بسبب قصر حامل الثمرة (شكل ٩٥).

## دورة الحياة

تتداخل أجيال هذه الحشرة ويمكن العثور على جميع أطوارها في أى وقت من السنة، وتقضى هذه الحشرة البيات الشتوى في طور اليرقة، وتوجد اليرقات في فصل الشتاء في أعشاشها المكونة من الأوراق الجافة تلصقها اليرقة ببعضها بخيوط من الغزل الذي تفرزه وتثبتها في قلف الأشجار، وإذا ما خلقت بعض الثمار على الأشجار أثناء فصل الشتاء، فإن يرقة هذه الآفة توجد عادة تغتذى عليها، ولهذه الحشرة جيلان إلى أربعة في السنة تبعاً للمنطقة التي توجد بها وتتداخل الأجيال وتزداد الكثافة العددية لهذه الآفة كلما تقدم الموسم، وتحدث اليرقات خسائر جسيمة بالثمار خلال شهرى يولية وأغسطس وتوجد كتل البيض إما على القلف الناعم أو في الأوراق أو أحياناً على الثمار، وتنزل بالبساتين المصابة خسائر جسيمة ابتداء من سقوط البتلات في شهر مايو .

## طرق المكافحة

تفيد مكافحة بودة ثمار التفاح في مكافحة هذه الآفة، ويجرى علاجهما معا بنفس المبيدات وفي نفس الوقت .



(شكل ٩٥) فراشة لآفة أوراق البرتقال

### ٣ - لآفة أوراق أشجار الفاكهة

الاسم العلمى للحشرة *Archips argyrospila* (Walker)

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيدي Fam. Tortricidae

لآفة أوراق الفواكه آفة من آفات الحلويات، وقد سبق شرح كل ما يتعلق بها عند ذكر آفات الشمش، وبجانب أشجار الحلويات تهاجم هذه الحشرة عددا كبيرا من نباتات الزينة وأشجار الغابات والشجيرات وأشجار الموالح، ويفيد فى مكافحة هذه الآفة نفس المبيدات والأجرات المنبذة فى مكافحة دودة ثمار التفاح يعتبر علاج هذه علاجا مشتركا لآفة أوراق الفواكه .

#### وصف الحشرة

سبق وصفها بالتفصيل فى وضع سابق من هذا الكتاب ومع هذا نوجز وصفها فيما يلى :

يبلغ طول الفراشة اليافعة نحو ١٢,٥ مم ويبدو مظهرها كالنافوس عند طى أجنحتها، والأجنحة الامامية مبرقشة بظلال من الألوان البنية والأبيض المصفر ويوجد عليها زوج من البقع القشدية اللون على الزاوية الخارجية (شكل ٩٧) ويوضع البيض على هيئة كتل تغطيها الفراشة بطبقة من الأسمنت الرمادى، ويوضع البيض على الأفرع والأغصان الصغيرة، وتصبح الطبقة الأسمنتية مثقبة عند خروج ٥٠ يرقة أو أكثر من تحتها عند الفقس، واليرقات الحديثة الفقس يكون لونها أخضر تفاحى ذات رأس أسود وكذلك درع الصدر لونه أسود .


وعندما تصل اليرقة إلى منتصف نموها يتحول لون الرأس إلى اللون البنى ودرع الصدر إلى الأخضر الزيتونى، مع وجود شريط غامق اللون على حافته، وعند إنزعاج اليرقة تتحرك للخلف فى حركة نموذجية ثم تسقط متدلية من خيط حريرى تفرزه بسرعة، وتوجد العذارى عادة بين الأوراق الملتفة .



(شكل ٩٧) فراشة لافة أوراق الفاكهة والصورة الفوتوغرافية لهذه الفراشة مكبرة ٦ مرات قدر الحجم الطبيعي

### مظهر الإصابة والضرر

تقوم اليرقة بلف الأوراق الصغيرة، وتغتنى عليها من داخل اللقافة محدثة هلهلة في نموات الأوراق الصغيرة الطرفية، فهي تطوى الأوراق وأجزاء من البراعم بعضها إلى بعض وتدمر البراعم والثمار الصغيرة بإغتنائها على حوامل الثمار والثمار الصغيرة الحديثة التكوين، وتتجول اليرقات بعمق داخل الثمار الصغار مما يؤدي إلى سقوط هذه الثمار على الأرض، والثمار التي تكون إصابتها أقل جسامة تبقى فوق الأشجار ولكن عند الحصاد فإنها تحمل ندبا برونزية اللون وهذه من مظاهر الإصابة بهذه الحشرة والمميزة لها، والثمار المصابة تكون أيضا خشنة السطح، وهذه الثمار ذات الندب العميقة تكون عديمة القيمة الاقتصادية (شكل ٩٨).



(شكل ٩٨) يبين مدى الضرر الذى تحدثه يرقة لآفة أوراق الفاكهة بثمار التفاح

## دورة الحياة

سبق شرحها فيما سبق، ولهذه الحشرة جيل واحد فى العام، وتدخل البيات الشتوى وهى فى طور البيضة (كتل البيض)، ويحدث الفقس عند الطرف الأخضر للبرعم الثمرى فى طوره القرمزى اللون، وتبلغ اليرقة تمام نموها فى غصون شهر، وتتغذى داخل طبقات الأوراق، وتخرج الفراشات فى شهر مايو ويونى، وعادة ما تقتنص هذه الفراشات بواسطة المصايد المعدة لإقتناص فراشة بودة ثمار التفاح، وتضع الفراشات الإناث البيض خلال شهر يونى ولا يفقس هذا البيض إلا فى الربيع التالى :

## طرق المكافحة

إن الوسائل الكيماوية لمكافحة فراشة ثمار التفاح تفيد أيضا فى مكافحة هذه الآفة فى نفس الوقت، ويجب معالجة الأشجار الخشبية المحيطة بالمزرعة فى الربيع الباكر حتى لا تخرج



منها الفراشات وتصيب حقول التفاح – وإذا ما لوحظ زيادة عدد الفراشات في الربيع الباكر، فيجب معالجة البستان كيماويا بعد سقوط البتلات وقبل أن تتمكن الحشرة من إصابة الثمار .

## ٤- فراشة البراعم ذات البقعة العينية

الاسم العلمى للحشرة *Spilonota ocellana* (D&S)

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيدى Fam. Tortricidae

تعتبر هذه الآفة من الآفات الرئيسية التى تصيب البرقوق والخوخ والكرين، ولكنها تعتبر أيضا من الآفات الهامة التى تصيب التفاح .

### وصف الحشرة

الفراشة اليافعة يبلغ طولها ١٢,٥ مم عند فرد أجنحتها ولونها رمادى ويوجد شريط أبيض اللون عريض يستعرض أجنحتها الأمامية، ويوضع البيض على السطح السفلى للأوراق وهو شفاف مفلطح صغير الحجم، وتغذى اليرقة دائما وهى محمية بغطاء الغزل تمدده إلى أماكن التى تغذى عليها كلما توسعت فى الإغذاء .

واليرقة التامة النمو يصل طولها إلى ١٢,٥ مم ولونها بنى ذات رأس أسود لامع كذلك لون درع الرأس والدرع الدبرى .

### مظهر الإصابة والضرر

تبيت الحشرة بياتها الشتوى وهى فى طور اليرقة، وفى الربيع الباكر تستيقظ اليرقات من بياتها وتهاجم البراعم الثمرية الصغيرة للتفاح وتغذى عليها، وبعد ذلك تغزل اليرقة غزلا حريريا وتضم به الأوراق إلى بعضها وتغذى عليها وعلى البراعم الزهرية والثمار الصغيرة،

ونتيجة لإغتنائها على الأوراق تظهر بالأوراق مناطق بنية اللون جافة، وفي الصيف تبدأ اليرقات التي خرجت حديثاً من نفس البيض في الإغتناء على سطحى الورقة وهي تحت غطاء من الغزل وما يتبع من ذلك من جفاف أجزاء من الورقة وتحولها إلى اللون البنى، وغالباً ما تسحب هذه الأوراق إلى الثمرة وتلتصق بها بفعل الغزل الذى تفرزه اليرقة (شكل ٩٩) وهذا يؤثر على التلون الطبيعى للثمرة، وتقوم اليرقة عندئذ عند إغتنائها بعمل عدة ثقوب صغيرة مستديرة فى جلد الثمرة، ويؤدى هذا إلى الإضرار بعدد كبير من الثمار عند إشتداد الإصابة.



(شكل ٩٩) يرقة فراشة ذات البقعة العينية وهي تغتذى على السطح السفلى للورقة، أحيانا تقوم بلصق الورقة بالثمرة. إلى اليمين مظهر إصابة الثمرة بعد إزالة الورقة

## دورة الحياة

تقضى اليرقات البيات الشتوى داخل شرانق صغيرة بين البراعم وعلى الأغصان، وتبدأ فى الإغتناء على قمم البراعم الخضراء بعد إستيقاظها من البيات، ونوالى إغتنائها بعد ذلك على الأوراق والبراعم الزهرية والثمار فى شهر مايو وأوائل يونية، وتخرج الفراشات فى يولية

وتضع بيضها اللبنى اللون الشبيه بالأقراص على السطح السفلى للأوراق، يفسس البيض بعد حوالى أسبوع وتفتدى اليرقة على سطح الورقة السفلى، وتلتصق هذه الأوراق بالثمار بواسطة الغزل الذى تفرزه، وتستمر فى إتلاف الثمار من يولية حتى سبتمبر ويعددها تدخل البساتين الشتوى .

### طرق مكافحة

يمكن مكافحة الحشرة بمعاملتها بالمبيدات شتاء للقضاء على اليرقات فى بيئاتها الشتوى، ولكن الشائع أن تكافح عندما يتحول لوبراعم إلى اللون القرمزى أو عند الإصابة الشديدة فى قمم البراعم الخضراء، ويرقات الجيل الثانى قد تحدث أضراراً بالثمار فى الصيف ولذلك يتطلب الأمر معالجتها فى شهر يولية، عند اشتداد الإصابة، ويعرف ذلك بوجود عدد كبير من الأوراق ملتصقة بالثمار .

## ٥- حفار ساق التفاح

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة كوسيديى Fam.Cossidae


حفار التفاح *Zeuzera pyrina L.*

تصيب هذه الحشرة أشجار التفاح والكمثرى والسفرجل والرمان والزيتون والبرقوق واللوز والبلكان والجوافة والكانورينا والصفصاف وكثير من أشجار الظل ويستدل على الإصابة بهذه الحشرة بوجود نشارة خشب مختلطة مع براز اليرقات موجوداً حول فتحات دخول اليرقات وكذلك مع العصارة النباتية الغزيرة التى يفرزها النبات، ويعقب شدة الإصابة جفاف الأفرع وسهولة كسرهما بتأثير الرياح أو بتأثير حملها الثقيل من الثمار .

### الحشرة اليافعة :

(شكل ١٠٠) : تبلغ فى الطول نحو ٢,٧ سم فى الأنثى، ٢ سم فى الذكر، ولون الجسم

والمسافة بين طرفي الجناحين منبسطين تبلغ نحو ٦ سم في الأنثى، ٥ سم في الذكر، ولون الجسم أبيض وعلى الصدر نقط رصاصية قاتمة وعلى البطن أشرطة سوداء أيضا، كما أن لون الأجنحة الأمامية والخلفية أبيض مرقط بنقط لونها رصاصي قاتم .



(شكل ١٠٠) حفار ساق التفاح

### دورة الحياة :

تقضى هذه الحشرة بياتها الشتوى على هيئة يرقات، وفي أوائل الصيف تتحول اليرقات إلى عذارى تخرج منها الحشرات الياقة من نهاية مايو حتى نهاية أكتوبر، وأقصى عدد للفراشات يظهر من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس بعد التزاوج تضع الأنثى الواحدة نحو ٣٠٠ - ١٢٢٠ بيضة، ويوضع البيض فرديا أو فى سلاسل أو فى مجموعات (٣ - ٤) بيضات فى المجموعة الواحدة) وذلك فى الشقوق الموجودة على قلف الأشجار أو فتحات خروج الفراشات ويلصق البيض ببعض البعض وكذلك بالسطح الموضوع عليه بمادة لاصقة يفقس البيض بعد نحو ٨ - ١٠ أيام .

والبيضة بيضاوية الشكل ولونها أصفر برتقالى وعلى سطحها من الخارج تضاريز شبكية. هذا وتبلغ مدة ما قبل وضع البيض ووضع البيض وما بعد وضع البيض نحو صفر - ٢، ٢ - ٧، ١ - ٣ أيام على التوالي .

بعد الفقس تدخل اليرقات الأفرع الصغيرة مباشرة أو أعناق الثمار أو الثمار نفسها أو أعناق الأوراق أو العروق الوسطية أو الثانوية للأوراق، وقد تتجول اليرقات قليلاً قبل الدخول . وأثناء نمو اليرقات تترك الأفرع الصغيرة وتتدلى على خيوط حريرية لتهاجم أفرع أكبر حجماً وهكذا أو قد تنتقل إلى الأفرع الأكبر من الداخل بدون الخروج خارج أنفاقها . ولليرقة ٧ أعمار، وتبلغ اليرقة التامة النمو (شكل ٨٤) نحو ٦,٥ سم في الطول ولونها أصفر فاتح مع وجود بقع سمراء على كل الجسم، وتوجد درقة غامقة على كل من ترجة الحلقة الصدرية الأمامية والحلقة البطنية الثامنة .

وتبلغ مدة طور اليرقة نحو ١٠ - ١١ شهراً .

وعند التعذير تعمل الورقة ثقب الخروج بالأفرع الكبيرة وتعذر بالقرب منه داخل شرنقة من الحرير وذلك من منتصف مايو حتى سبتمبر. وتبلغ العذراء المكبلة نحو ٢,٨ - ٣,٨ سم في الطول ولونها بني فاتح وتبلغ مدة طور العذراء نحو ١٨ - ٢٦ يوماً، وتعيش الحشرة اليافعة من ٣ - ١٣ يوماً، والنسبة الجنسية ٢ إناث إلى ٣ ذكور.

## طرق المكافحة

### المكافحة الزراعية

- ١ - تقليم الأفرع المصابة وحرقتها .
- ٢ - قتل اليرقات وهي في أنفاقها بإدخال سلك دقيق الطرف يصل إلى نهاية النفق.
- ٣ - جمع العذارى وقتلها ابتداء من منتصف مايو حتى نهاية أغسطس إذ تكون عند الفتحات الخارجية للأنفاق.
- ٤ - العناية بالأشجار وتقويتها حتى تكثر عصاريتها وتغرق اليرقات بعد الفقس.

### المكافحة الكيماوية:

يستعمل لمكافحة هذه الآفة مبيد سيديال ٥٠٪ بنسبة ٣ في الألف حسب حجم الأشجار أو مبيد بازودين ٦٠٪ بنسبة ٣ في الألف أيضاً، ويبدأ الرش بعد خروج الفراشات خلال المدة من

أوائل مايو حتى نهاية سبتمبر، ويستدل على خروجها بوجود جلود العذارى بارزة من الثقوب التي تحدثها اليرقات في الساق والأفرع، ولتقليل نسبة الإصابة وحماية الأشجار من هذه الحشرة ومن خنافس القلف أيضا ترش الأشجار مرة كل ٣ أسابيع بأحد المبيدين، على أن يبدأ الرش قبل نهاية الأسبوع الثاني من يونيو، ويجب أن يكون الرش كغسيل للقلف بحيث يتخلل الشقوق تماما، وعلى أن يكون الرش قبل جنى الثمار بمدة لا تقل عن شهر، ويستأنف بعد تمام الجمع في نهاية سبتمبر، ويحتاج الأمر إلى ٥ رشات (من توصيات وزارة الزراعة المصرية).

## المن على أشجار التفاح

تصاب أشجار التفاح بالعديد من أنواع المن Aphids رتبة متشابهة الأجنحة فصيلة المن Aphididae نذكر منها فيما يلي الأنواع الآتية:


### ٦- من التفاح الصوفى

الاسم العلمى للحشرة *Eriosoma lanigera* (Hausman)

تعتبر هذه الآفة من أهم الآفات الرئيسية التي تصيب التفاح في جميع أنحاء العالم، وتهاجم الجنور والجنوع والسوق والأفرع والأغصان، والشتلات كما تهاجم ثمار بعض أصناف التفاح، ويصيب هذا المن كذلك أشجار الكمثرى والسفرجل وبعض الأشجار الخشبية كالحور.

ومن أهم المتطفلات التي تتطفل على هذا المن دبور صغير يعمل هو مع بعض الحشرات النافعة الأخرى على الحد من أعداد هذا المن إلى درجة كبيرة، ولكن المبيدات المستعملة ضد آفات التفاح في الربيع والصيف قد قللت من فاعلية هذه الحشرات النافعة إلى درجة كبيرة، لذلك يستدعى الأمر الاعتماد على إستعمال المبيدات الكيماوية لمكافحة من التفاح الصوفى للحد من خطورته، وتنتعش الحشرات النافعة في فصل الخريف بعد الكف عن إستعمال المبيدات وتكثر أعدادها لتنظف البساتين من من التفاح الصوفى إلى حد كبير، وهذا الأمر

يستدعى عند وضع برامج مكافحة الكيماوية لآفات التفاح أن يتفادى القائمون بها إلحاق الضرر بالحشرات النافعة من متطفلات ومفترسات.



(شكل ١٠٠) من التفاح الصوفى  
أ - حشرة يافعة ب - حورية

### وصف الحشرة

لون جسم الحشرة التي تغتذى على القلف أحمر أو قرمزي مغطى تماما بكتل من مادة شمعية تشبه الصوف حيث توجد كرات من الندوة العسلية التي يفرزها هذا المن باستمرار، وتوجد مستعمرات هوائية من هذا المن مغطاه بكتل بيضاء فوق الأغصان والأفرع والجنوع (شكل ١٠١، ب)، وتبدأ الإصابة على النموات الحديثة عادة عند حوامل الأوراق، فتتورم الأغصان المصابة وتظهر بها التآكل في المواقع التي يتغذى فيها المن الصوفى (شكل ١٠٢)، وتوجد الإصابة أيضا على الأفرع والجنوع وتتكون عليها الأورام، وينشر هذا المن بعض الأمراض لجنوع أشجار التفاح وفروعها (Canker disease).



أ- (شكل ١٠١) مستعمرة من من التفاح الصوفى فوق غصن.



(شكل ١٠١) ب- الأورام التي سببها من التفاح الصوفى فوق جذع شجرة تفاح.



والمستعمرات التي توجد على جذور التفاح تسبب موت الجذور وتحللها في حالة الإصابة الشديدة حيث تنتفخ الجذور وتصاب بالأورام التي تجعل الجذور لافائدة منها (شكل ١٠٢) وتزيد إصابة الجذور في الأراضي الطينية، الثقيلة بينما تكون خفيفة في الأراضي الرملية والخفيفة.



(شكل ١٠٢) أورام من التفاح الصوفى على جذر شجرة تفاح.

### مظهر الإصابة والضرر

تهاجم هذه الحشرة كل أجزاء الشجرة وتسبب تأخر نموها لدرجة خطيرة وربما قتلت الأشجار الصغيرة، وتفرز الحشرة الندوة العسلية التي تتساقط فوق الأوراق والثمار وينمو عليها الفطر الأسود مما يقلل من القيمة التسويقية للثمار، وعند الإصابة الشديدة قد يفقد النبات أوراقه، ومن أسباب تأخر نمو الأشجار الصغيرة المصابة تكون الأورام على جنوعها وجذورها، هذا وتصاب ثمار بعض أصناف التفاح بشدة مثل الصنف الأصفر-Yellow New towri بينما الصنف الأحمر Red Delicious هو أقل تعرضا للإصابة.

### دورة الحياة

يوجد هذا المن في مستعمرات على الأجزاء الهوائية من الأشجار وعلى الجذور خلال

فصل الشتاء، ولا تنتج المستعمرات الهوائية إلا أقل كمية من الصوف في هذا الوقت ولذلك تكون غير ملحوظة، وينتج كل من المستعمرات الهوائية والجذرية كمية كبيرة من الحوريات إبتداء من الصيف المبكر وتستمر خلال الخريف، وتهاجر هذه الحوريات إلى أجزاء الشجرة الأخرى، ويحدث فيض من الحوريات الصاعدة إلى أعلى أو الهابطة إلى أسفل الجذع في الصيف والخريف، وتتحرك الحوريات التي تنتجها المستعمرات الجذرية إلى أعلى وتصيب الجذع والأفرع بينما تتجه الأفراد التي تنتجها المستعمرات الهوائية إلى أسفل وتصيب الجذور والفترة التي تتحرك فيها أعداد كبيرة من الحوريات إلى أعلى وإلى أسفل الجذع تقع ما بين يونيو إلى منتصف سبتمبر، ويمكن أن تنتقل الحوريات في التربة وبواسطة الهواء من شجرة إلى شجرة.

### طرق المكافحة

إن مكافحة المستعمرات الهوائية لهذه المن أمر معقد للغاية بسبب صعود أفراد المن من الجذر وخصوصاً أثناء الصيف، وحتى لو أزيلت كل المستعمرات الهوائية فإن مستعمرات كبيرة غيرها سوف تتكون في خلال ٣٠ يوما، ولذلك فإن إستعمال المبيدات ذات الأثر الباقي على الجذع مفيد جدا لقتل الأفراد الصاعدة من الجذور متسلقة للجذع إن مشكلة إصابة قلب الثمرة أمر يرتبط بعاملين مهمين هما .

أ - وجود كثافة عديدة غزيرة من المن الصوفى.

ب - الظروف التي تساعد على تكون النهايات المفتوحة لكأس الثمرة .

وحيث أن هذا المن نادرا ما يوجد في قلب الثمرة إذ كانت الكثافة العددية له منخفضة، فإن هذا ما يدعو إلى القول بأن إصابة قلب الثمرة يكون بطريق المصادفة ولا يحدث إلا عند زيادة الكثافة العددية لعشيرة المن الصوفى زيادة كبيرة، هذا مما سبق يتضح أن الفترة المناسبة لمعالجة هذا المن برش المبيدات تكون في أشهر يولية وأغسطس، وأول معالجة كيماوية يجب أن تبدأ في الأول من شهر يولية والمعاملة الثانية تكون بعد ذلك بشهر، ويجب يبلل سائل الرش جميع الجذع، ويمكن لبعض المعاملات التي أن تجرى لمكافحة آفات أخرى على التفاح أن تفيد في تقليل أعداد من التفاح الصوفى لدرجة كبيرة ونعنى بذلك المستعمرات الهوائية منه ولكن المعاملات الصيفية للمن لا غنى عنها لمنع إعادة الإصابة الوافدة من الجذور .

وفى إنجلترا تم إنتاج عدة أصناف من التفاح ذات الجنور المقاومة للإصابة بالمن الصوفى، ولكن المعلومات منها ليست كاملة حتى الآن .

وفى مصر يعالج من التفاح الصوفى كيميائيا بالرش بمخلوط من أحد الزيوت المعدنية بنسبة ٢٪ + ملاثيون بنسبة ٠.٢٪ قبل إنتقال الحشرات إلى منطقة الجنور فى أواخر الخريف، ويعتبر هذا علاجا ضد المن والحشرات القشرية .

هذا وقد إستوردت مصر منذ زمن بعيد الطفيل *Aphelinus mali* من رتبة غشائية الأجنحة وكان له أثر كبير فى الحد من إنتشار من التفاح الصوفى فى مصر.

## ٧ - من التفاح الوردى

الاسم العلمى للحشرة *Anuraphis roseus* Baker

ويعتبر هذا المن من أكثر أنواع المن ضررا على أشجار التفاح، وتختلف شدة الإصابة به من سنة لأخرى وقد يسبب فى بعض السنين نقصا خطيرا فى محصول التفاح، وقبل إستعمال المبيدات الحديثة كانت خسائر التفاح من جراء الإصابة بهذا المن كبيرة جدا، وإذا لم يعتنى بمكافحة المن الوردى دوريا بصفة مستمرة فإن المزارعين قد يخسرون محصولهم إذا جاءت الإصابة فى فترة سقوط البتلات .

### مظهر الحشرة

يبلغ طول البيض الذى يدخل البيات الشتوى نحو  $\frac{2}{3}$  مم والبيضة ذات شكل بيضاوى، والبيضة يكون لونها أخضر فاتح بعد وضعها ولكن يصبح لونها أخضر قاتم جدا بعد ذلك أو أسود، والبيض لامع جدا ويوجد ملتصقا بقلف الأغصان والأفرع فى كل أجزاء الشجرة، ويمكن أن يكون مستترا فى سقفوف القلف أو طيات البراعم .

وتتواجد أفراد المن الوردى بعد فقس البيض عنها على الثمرات الصغيرة فى الربيع الباكر، ولونها أخضر قاتم.

وتكون الأفراد اليافعة من هذا المن تجمعات فى طيات الأوراق أو فوق الثمار الصغيرة فى فصل الربيع ويكون لونها وردي يميل إلى اللون البنى وتكون مغطاه بطبقة شمعية دقيقة، وتتكون الأفراد المجنحة من المن الوردي فوق أشجار التفاح فى نهاية فصل الربيع ويكون لونها بنى مخضر، أما على العوائل البديلة أو الحشائش فإن أفرادها يكون لونها أخضر مصفر فى خلال فصل الصيف .

### مظهر الإصابة والضرر

يكون المن الوردي تجمعات فوق أوراق حامل الثمرة مما يسبب تجعدها بشرة، وينتج هذا المن أيضا كميات كبيرة من الندوة العسلية التى تتساقط فوق الأوراق والثمار فينمو عليها الفطر الأسود ويسبب تشويه الثمار، ولكن الضرر الأكبر أو الرئيسى هو الذى يصيب الثمار الصغيرة أنفسها، ففي حالة الإصابة الشديدة تفشل الثمرة فى النمو وتبقى هذه الثمار الصغيرة فى شكل تجمعات على الأشجار حتى موسم الجنى وتسمى عندئذ تفاحات المن aphid apples ومثل هذه الثمار الصغيرة المشوهة توجد فى الأجزاء الداخلية من الأشجار عند الجمع (شكل ١٠٣)، وعلى هذا فإن من التفاح الوردي يوجد غالبا فى الأجزاء السفلى والداخلية من الشجرة، ويمكن أن ينتشر على كل أرجاء الشجرة إذا كانت الظروف مناسبة، وفى هذه الحالة تكون الخسارة فى المحصول جسيمة.

### دورة الحياة

يفقس البيض المشتى فى الربيع بمجرد إنتفاخ البراعم وتكونها والفترة التالية القصيرة بعد ذلك، ويمكن العثور على أفراد المن الحديثة الفقس خارج إنتفاخات البراعم وفوق النموات الخضراء الجديدة، وهذه الأفراد تكون كلها إناثا يتولد عنها أجيالا عديدة من المن غير المجنح، وسرعان ما تحتشد أفراد هذا المن فوق حوامل الثمار الصغيرة والأوراق المجاورة لها.

وتلتف الأوراق المصابة بشدة وتصبح المكافحة عندئذ صعبة، وعند حدوث نموات ورقية جديدة، فإنه سرعان ما تتجمع فوقها أفرادا كثيرة من هذا المن حيث تتجدد النموات الحديثة .

ولحسن الحظ فإن من التnfاح الوردي لا يستمر فى الإغذاء على التفاح طوال فصل الصيف، ففي شهر يونية تظهر فيه أفراد مجنحة وهذه تهاجر إلى زراعات أخرى، وفى

الخريف تطير الأفراد المجنحة راجعة إلى أشجار التفاح حيث تظهر منها أفراد مؤنثة وأخرى مذكرة تتزاوج ونضع الإناث بيضها على قلف أشجار التفاح حيث تدخل البيات الشتوى على هذه الحالة .



(شكل ١٠٣) أوراق تفاح يلتف بشدة وثمار شوهتها الإصابة بمن التفاح الوردى

### طرق المكافحة

يمكن مكافحة من التفاح الوردى باستعمال أى مبيد كيمائى للبيض ovicide يرش فى شهر يناير أثناء وجود البيض فى فترة السكون، وحيث أنه يوجد الكثير من البيض فى شقوق القلف فى جميع أجزاء الشجرة، فإن الرش يجب أن يبلل الشجرة بغزارة حتى يدخل إلى البيض فى الفجوات والشقوق .

ويمكن معاودة الرش بالمبيدات الفعالة بعد التزهير مباشرة وقبل حدوث الإصابة الشديدة لحوامل الثمار الصغيرة، ولا يمكن لكل مبيدات المن أن تدخل فى تلافيف الأوراق لذلك يجب

البحث عن المبيدات الموصى بها لهذا الغرض، والمكافحة الكيماوية للبيض أثناء البيات الشتوى لها فاعليتها وتفضل عن إستخدام المبيدات على الأوراق بعد فصل الشتاء .

## ٨ - من التفاح

الاسم العلمى للحشرة *Aphis pomi* De Geer

ويسمى هذا المن أحيانا من التفاح الأخضر، وهو من الآفات الشائعة على التفاح فى مناطق كثيرة، ويمكن له كذلك أن يصيب الكمثرى والسفرجل، وهذا المن شائع الوجود كافة للتفاح أكثر من من التفاح الوردى ومن التفاح الصوفى، وتتذبذب كثافته العددية من وقت لآخر، وهو يصيب النموات الطرفية بصفة رئيسية ويمكن كذلك أن يصيب الثمار بشدة .

### مظهر الحشرة

يشبه بيض هذا المن الذى يدخل البيات الشتوى بيض من التفاح الوردى، ويوجد غالبا على أغصان الموسم السابق أو على مهاميز الثمار أو البراعم الورقية، وأفراده الحديثة الخروج من البيضة، يكون لونها أخضر قاتم ويمكن تمييزه عن من التفاح الوردى بعزق قرون استشعاره القصيرة الإسطوانية، ولا يمكن التفريق بين الاثنين فى هذا العمر المبكر إلا بذلك، فعزق قرون إستشعار من التفاح الوردى الحديث الخروج من البيض تكون طويلة مميزة، وعندما يصبح من التفاح يافعا فى الربيع والصيف ويكون موجود حينئذ على الأوراق - يصبح لونه أخضرا مصفرا، فيما عدا عزق قرون الإستشعار والأرجل وقمة قرون الإستشعار فتكون جميعا سوداء اللون، والأفراد المجنحة التى تنشر العدوى إلى الأشجار الأخرى لها رأس وصدر أسودين، ويطن خضراء مصفرة مع وجود بقع خضراء قاتمة على جانبيه، وفى أواخر الخريف تتكون أفراد مذكرة صغيرة الحجم صفراء صغيرة وغير مجنحة، كذلك تظهر أفراد مؤنثة غير مجنحة لونها بنى مصفر، بعد التزاوج تضع الإناث بيضا دقيقا بيضاوى الشكل يدخل البيات الشتوى فى الأماكن التى وصفت من قبل، ويكون لون البيض أصفرا أو أخضرا عند الوضع ثم يتحول إلى أسود لامع (شكل ١٠٤) .



(شكل ١٠٤) من التفاح الداخل في البياض الشتوي، وهو أسود اللون لامع

### مظهر الإصابة والضرر

إذا كانت الظروف مناسبة، يتكاثر من التفاح بسرعة كبيرة ويكون عشائر ضخمة فوق أشجار التفاح وتكون أكثر ما تكون على النموات الحديثة في الأشجار الصغيرة والتي تنمو بسرعة، وفي مشاتل التفاح وفي أشجاره الصغيرة، قد تتسبب الإصابة الشديدة بهذا المن في تأخير نموها الطبيعي وينشأ عن ذلك نمو فروع مشوهة تعطي الشجرة الصغيرة مظهرا غير طبيعي . وعندما تصاب الأوراق والثمار بكميات كبيرة من الندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن الأسود فتتغطى الأوراق عن القيام بوظائفها الحيوية ويسود لون الثمار ويصبح غير مجدية إقتصاديا، (شكل ١٠٥)، وإذا امتدت الإصابة إلى الثمار الصغيرة يبطئ نمو هذه الثمار وتتحول في النهاية إلى ثمار صغيرة الحجم خشنة الملمس بها نقر كثيرة .

### دورة الحياة

يفقس البيض المشتى عند إنبثاق البراعم، وتخرج منه إناث، ينشأ من الجيل الأول ١٠ أو أكثر من الأجيال في السنة، ويبقى هذا على التفاح طوال الموسم، ولكن أعدادا كبيرا منه

تنشأ لها أجنحة وتطير إلى أشجار التفاح الأخرى أو عوائل مختلفة وإلى حد ما تظل الإصابة مرتبطة بالنموات الحديثة في أشجار التفاح والأشجار الصغيرة، ولكن عند زيادة الإصابة يتحرك المن إلى أسفل ويصيب الفروع السفلى والأوراق المسنة، وعندما تشتد الإصابة بهذه الدرجة تصبح كمية الندوة العسلية كبيرة، وفي المناطق الساحلية يظل هذا المن موجودا كافة على أشجار التفاح طوال فصل الصيف، وتصبح أعداده غزيرة في يونية ويولية ويمكن أن تنخفض في منتصف أغسطس، ودرجات الحرارة الأعلى من ٩٥. ف، هي المحددة لكثافة هذه الآفة .



(شكل ١٠٥) بالإضافة إلى الأضرار بالنموات الحديثة، فإن من التفاح ينتج كميات كبيرة من الندوة العسلية ينمو عليها الفطر الأسود وتلوث الثمار .



## طرق المكافحة

تزيد أعداد هذه الآفة في الصيف زيادة كبيرة يستدعي الأمر معها معاملته بالمبيدات، وأفضل ميعاد للمعالجة الكيماوية هو أوائل يولية ومنتصف أغسطس ومن المخاطرة إستعمال المبيدات الجهازية لتأثيرها على الثمار وعلى المستهلك، ويجب أن يمر شهر بين المعاملة الأولى والثانية .

## الحشرات القشرية التي تصيب قلف أشجار التفاح

تتبع الحشرات القشرية رتبة متشابهة الأجنحة، ويصيب التفاح منها عدد من الأنواع منها ما يلي :

### ٩- الحشرة القشرية سان جوزيه


الاسم العلمى للحشرة *Quadrupidiotus perniciosus* (Comstock)

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

قل خطر هذه الحشرة الآن على التفاح بعد تداول إستعمال المبيدات الحديثة، ومع هذا يمكن أن تشتد الإصابة على الأشجار فتقتل الأفرع وتصيب الثمار ، ولهذه الحشرة عوائل كثيرة جداً منها بصفة خاصة جميع أشجار فاكهة الطليات وعدد كبير من نباتات الزينة .

### الضرر ومظهر الإصابة

تصيب هذه الحشرة القشرية المعروفة قلف أشجار التفاح وأوراقه وثماره، وإذا تركت الإصابة دون مكافحة فقد تقتل الفروع الصغيرة والأغصان، ومظهر الإصابة النموذجى بهذه الحشرة وهو وجود صبغة حمراء تحت مكان إصابة القلف بهذه الحشرة وحيث تكون الحشرة ملتصقة به، وخاصة فى النموات الحديثة، وعند إصابة الثمرة يلاحظ وجود نقطة حمراء على الثمرة حول كل قشرة (شكل ١٠٦) والإصابة بهذه الحشرة فى بساتين الفاكهة تكون محلية تماماً وربما كانت على شجرة واحدة، ولكن الحشرة قد تنتشر فى كل البستان ما لم تتخذ المقاييس الصحيحة للمكافحة .



(شكل ١٠٦) ثمرة تفاح مصابة بالحشرة القشرية سان جوزيه

### طرق المكافحة

إن إجراءات المكافحة المتبعة في مكافحة بودة ثمار التفاح وغيرها تكفي لمكافحة هذه الآفة دون اللجوء إلى مكافحة خاصة .

## ١٠ - حشرة الزيتون القشرية

*Parlatoria oleae* (Col)

لهذه الحشرة عوائل نباتية كثيرة قد تزيد عن ٢٠٠ عائل منها التفاح، والخوخ والكمثرى والمشمش ، وقد سبق لنا وصف هذه الحشرة بالتفصيل وتبدأ هذه الحشرة في وضع البيض في شهر مايو، وتتجول الزاحفات قبل أن تثبت نفسها على الأغصان والفروع والثمار، وللحشرة جيل ثان في شهر يوليو، والمعالجة الكيميائية لهذه الحشرة في فترة وجود الزاحفات هي الطريقة المثلى لمكافحتها، وهذه الحشرة تتبع فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية (المدرة)

.Fam. Diaspididae

## ١١ - حشرة الحلويات المحارية

*Lepisosaphes ulmi* (Linn)

سبق شرح هذه الحشرة بالتفصيل سابقا، وهي تصيب السوق بدرجة كبيرة وهذا يقلل من إنتاج الشجرة وإذا إشتدت الإصابة ربما قتلت الأفرع والشجرة كلها، وغطاء هذه الحشرة (القشرة) بني اللون فاتح أو قاتم، وتوجد تحته في فصل الشتاء بيض الحشرة اللؤلؤي الأبيض وهو الطور الذي يدخل البيات الشتوي، ويبدأ الفقس في شهر يونية ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تخرج زاحفات الحشرة من تحت القشرة .

وهذه الحشرة تتبع فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية أو المدرعة Fam. Diaspididae.

## حفارات جذع أشجار التفاح وفروعها الرئيسية

يصيب جذع أشجار التفاح وفروعها الرئيسية عدد من الحفارات التي تصيب أيضا أشجار الحلويات الأخرى وقد سبق الكلام عنها فيما سبق، ونذكر هنا أهم هذه الآفات وهي تابعة كلها لرتبة غمدية الأجنحة Coleoptera ومنها :

## ١٢ - حفار أشجار التفاح ذو الرأس المبسط

الاسم العلمي للحشرة *Chrysobotris mali* Horn

فصيلة ببرستدي Fam. Buprestidae

تصيب هذه الحشرة أساسا الأشجار الصغيرة سواء أكانت في المشتل أو البستان المستديم، وتتخذ الإجراءات الوقائية ضدها هام جدا خلال الثلاث السنوات الأولى من إنشاء بستان التفاح أو إعادة زراعة الأشجار (عملية الإحلال) .

وهذه الحشرة الشائعة تهاجم أيضا الكثير من أشجار الفاكهة الأخرى فضلا عن نباتات الزينة وأشجار الغابات والشجيرات .

### وصف الحشرة

يبلغ طول الحشرة اليافعة (الخنفساء) نحو ٧ - ١٢,٥ مم، وإرجلها الأمامية مسننة وقوية، ويوجد على غمدى الجناحين بقع نحاسية اللون ولون الجسم العام أحمر برونزي، واليرقة التامة النضج لونها أصفر فاتح وطولها ١٢مم والجسم مفلطح لدرجة كبيرة خلف الرأس .

### مظهر الإصابة والضرر

تفتتدى اليرقة أسفل القلف وقرب منطقة الكامبيوم، صانعة لأنفاق ضحلة، وإذا كانت الإصابة شديدة فإن الشجرة تبدو منزوعة القلف كليا أو جزئيا، وربما مات عدد كبير من الأشجار الصغيرة نتيجة للإصابة الشديدة .

### دورة الحياة

تخرج الخنفساء اليافعة وتنشط من إبريل حتى أغسطس، وتنجذب الخنافس إلى الأشجار الضعيفة حيث تضع بيضا في شقوق القلف المواجه للشمس خصوصا في الأجزاء التي تصاب بما يسمى لفحة الشمس Sunburned أو أجزاء أخرى من القلف، مصابة بأى ضرر، وتنخر اليرقة داخل القلف وتستمر في الحفر وعمل الأنفاق حتى حلول الشتاء، حيث تدخل البيات الشتوى في طور اليرقة أو عذراء داخل خلية في الخشب الصلب، وتتغذى اليرقات خلال فصل الربيع .

### المكافحة

تتعرض الأشجار الصغيرة أكثر من غيرها للإصابة بهذه الخنفساء، لذلك يجب حماية جزوعها من الإصابة بهذه الآفة أو من لفحة الشمس بدهان الجزوع بطلاء أبيض أو بلفة بالقماش أو الورق الواقى، ويجب الإستمرار فى حماية ساق الأشجار الصغيرة حتى يتعدى

عمرها السنوات الثلاث، ويمكن إستعمال المبيدات الكيميائية في حماية الساق سواء أكانت سوائل أو مساحيق للتعفير ولكن ذلك لن يحمى الجزع من لفحة الشمس .

### ١٣ - سوسة قلف أشجار الخوخ المصرية

*Ectoptogaster (scolytus) aegypticaus* Pic

### ١٤ - سوسة القلف الأوروبية

*Scolytus regulosus* (Ratz)

فصيلة سكوليتيدي Fam. Scolytidae


سبق ذكر هاتين الحشرتين في آفات الطلويات ذات النواة الحجرية، وتورد هنا ما يخصهما على أشجار التفاح. تهاجم هذه الخنافس الأشجار الضعيفة والميتة، خصوصا تلك التي لا تأخذ حقها من مياه الري، ولكن الأشجار القوية السليمة تقاوم الإصابة بهما - وهاتين الآفتين من الآفات الرئيسية للفواكه ذات النواة الحجرية.

### مظهر الإصابة والضرر

تفتدى هذه الخنافس عند قواعد البراعم وتحاول دخول الأغصان والفروع لتصنع أنفاق البيض، وتقاوم الأشجار السليمة تلك المحاولات فأفرازها للصمغ بغزارة وتنجح الخنافس في الحفر في الأشجار الضعيفة وتضع بيضها في أنفاق قصيرة تحفرها في الكامبيوم، وبعد الفقس تقوم اليرقات بحفر أنفاق تضع مع نفق البيض زوايا قائمة، وتؤدي الإصابة الشديدة إلى سقوط القلف في حلقات حول الشجرة (شكل ١٠٧) وتقتل الأغصان والفروع الرئيسية، أما الإصابة الضعيفة فتؤدي إلى ضعف الشجرة وتعرضها للإصابة الشديدة بالأجيال التالية من الحشرة، وتتعرض الثمار للإصابة أيضا نتيجة لهجرة الخنافس وطيرانها من الأخشاب والأشجار الضعيفة المصابة في أماكن قريبة (شكل ١٠٧) .



(شكل ١٠٧) أ - جزع شجرة تفاح مصاب بخنافس القلف وويرى سقوط جزء من القلف على شكل حلقة حول الجنوع ووجود الثقوب الدالة على الإصابة.



(شكل ١٠٧) ب - ثمرة تفاح مصابة بخنافس القلف

## طرق مكافحة :

أفضل طرق المكافحة هو الإعتناء بتقوية الأشجار وريها في الوقت المناسب .  
كذلك يجب إزالة الأجزاء المصابة من الأشجار أو إزالة الأشجار المصابة كلها وحرقها  
خلال فصل الشتاء لأنها سوف تكون مصدرا للإصابة في فصل الربيع .  
ويمكن إستخدام المبيدات الفعالة في رش جنوع وأفرع الأشجار في نهاية شهر إبريل  
وأوائل شهر مايو، والمبيدات المستعملة في مكافحة بودة ثمار التفاح تفيد أيضا في مكافحة  
هذه الآفات .

## ناخرات التفاح أو فالقات القمم

من هذه الآفات ما يلي : -

### ١٥ - تربس المدرونة

#### Madrone Thrips

والمدرونة كما جاء في المعجم العلمي «نبات دائم الخضرة من الفصيلة الخلنجية»

الاسم العلمي للحشرة *Thrips madroni* Moulton

رتبة هديبة الأجنحة Order Thysanoptera

فصيلة ثريبيدى Fam. Thripidae

يحدث تربس المدرونة نقرا عميقة في ثمار التفاح من السلالات Red De- ، Golden Delicious ،  
licious خصوصا في المناطق الساحلية، ولهذا التربس عدد كبير من العوائل منها : -


Madrone, manzantia, willow, ceanothus, tyon وغيرها من النباتات .

## وصف الحشرة

حشرة هذا التريس اليافعة ذات لون بني غامق مع وجود شريط فاتح يستعرض الجناحين الاماميين .

يأتى الضرر من هذا التريس من عاداته فى غرز آلة وضع بيض الانثى فى جلد الثمار الصغيرة ووضع البيض تحت هذا الجلد، ونتيجة لهذا تتكون فى مكان الوخز بثرة مرتفعة يحيط بها مساحة دائرية منخفضة ( كما يحدث فى ثمار التفاح Red delicious والتفاح Golden، وينمو الثمرة تفشل هذه المنطقة فى النمو وعند الجمع يلاحظ فى هذه الثمار نقرة عميقة جدا فى مكان وخز آلة وضع البيض .

ونحو ١٠٪ من المحصول قد يصيبه هذا الضرر (شكل ١٠٨) .



(شكل ١٠٨) التلف الذى أحدثه تريس المدرونة بثمرة تفاح Red delicious

## دورة الحياة

يمكن أن توجد حشرات تريس المدرونة اليافعة داخل البراعم المتفتحة فى وقت مبكر من الموسم عند ظهور الطور القرمزى، ويتزايد عددها تدريجيا طوال فترة التزهير بأكملها، وخلال



الفترة التي يطلق عليها الفترة القرمزية إلى تفتح البراعم، تضع أنثى هذا التريس بيضها على أجزاء الزهرة، ولا يحدث عندئذ ضرر يذكر، ولكن الضرر يبدأ في الظهور أثناء الفترة الأخيرة من التزهير، وعندما تطوى البتلات إلى الخلف وتلامس سطح الثميرات يجد التريس ملجأ تحتها ويغرز آلة وضع البيض في الثمار ويضع بيضه، وتستمر الإصابة حتى تسقط البتلات وعندئذ يغادر التريس شجرة التفاح .

### المكافحة

أفضل توقيت لإجراء مكافحة هو وقت تكون القواعد القرمزية للبراعم، وتستعمل لذلك المبيدات ذات الأثر الباقي وبذلك تقل الكثافة العددية لهذه الحشرات قبل أن يأخذ الضرر مجراه خلال الفترة الأخيرة من التزهير

ويمكن إجراء المعالجة الكيميائية بالرش أيضا عندما يكتمل التزهير، ولكن ذلك يضر بنحل العسل الذي يعتبر من الملقحات الهامة للتفاح، ويجب إختيار المبيدات التي لا تضر بنحل العسل، كذلك يجب توقيت الرش في وقت خمول نحل العسل في الصباح أنياكر أو في المساء، وأي معالجة تجرى بعد سقوط البتلات تكون غير مجدية .

## ١٥ - نطاط الأشجار الجاموسة

### Buffalo Treehopper

الاسم العلمي للحشرة *Stictocephala bupalus* (Fab)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة نطاطات الأوراق Fam. cicadellidae (classidae)

في المناطق الزراعية القديمة نادرا ما يشكل هذا النطاط خطورة ما على التفاح، ولكن في المزارع التي تنشأ في الأراضي الجديدة خصوصا ما كان منها مجاورا للأشجار الخشبية والحشائش، تتزايد أعداد هذه الحشرة وتتضرر الأشجار الصغيرة كثيرا من عاداتها في وضع

مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

<https://scholar.google.com/citations?>

[user=t1aAacgAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=t1aAacgAAAAJ&hl=en)

[salamalhelali@yahoo.com](mailto:salamalhelali@yahoo.com)

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.facebook.com/groups/  
/Biothesis](https://www.facebook.com/groups/Biothesis)

[https://www.researchgate.net/profile/  
/Salam\\_Ewaid](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Ewaid)

07807137614



البيض حيث يوضع البيض فى الخشب الصغير لأشجار أنواع كثيرة من الفاكهة ذات النواة الحجرية هذا فضلا عن أشجار الغابات .

### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة لهذا النطاق ذات لون أخضر فاتح ويصل إلى طول ٨ مم ويأخذ الجسم مظهر المثلث فى جزئه العلوى، وتمتد القصعة للخلف لتغطى معظم أجزاء الجسم، ويخرج من الجبهة زوج من القرون الغليظة الحادة وتمتد على الجانبين، ويوضع البيض فى قلف أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية عمر ٢ - ٣ سنوات ويوضع هذا البيض أسفل صفيين مزدوجين من الشقوق الطولية المنحنية، والبيض أبيض اللون إسطوانى الشكل، مستدير من طرفيه ومدبب من الطرف الآخر، والحوريات خضراء اللون يوجد على ظهرها أشواك وتعيش على الحشائش والأعشاب ومحاصيل الحقل .

### دورة الحياة

يببى هذا النطاق البيات الشتوى وهو فى طور البيضة التى توضع على أغصان العديد من عوائله الشجرية، يفقس البيض فى الربيع وتخرج منه الحوريات وهذه تسقط على الأرض وتغتنى على الحشائش والأعشاب وغيرها من محاصيل الحقل تبلغ الحورية مرحلة النضج فى نهاية الخريف، وتصيب أشجار التفاح الصغيرة فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وتضع بيضها فى القلف .

### طرق المكافحة

لم تدخل هذه الآفة برامج المكافحة الكيميائية، ولكن يجب تنظيف بساتين التفاح وما حولها من الحشائش .

## ب - الآفات الحشرية التي تصيب الكمثرى

يصيب الكمثرى عدد كبير من الآفات، ولتبسيط هذا الموضوع على القارئ نحاول هنا أن نرتب هذه الآفات كما يلي : -

### ١ - الآفات التي تهاجم الثمار

#### ١ - دودة ثمار التفاح أو الكمثرى Codling moth

وأسمها العلمي *Cydia (Carpocapsa) pomonella*

وكما سبق أن ذكرنا في آفات التفاح فإن هذه الآفة أخطر آفات الكمثرى والتفاح في العالم، ولو أن إستعمال المبيدات الحديثة قد قلل من خطورتها .

#### مظهر الإصابة الضرر


ينحصر الضرر الذي تسببه هذه الحشرة في الثمرة، فاليرقات تحفر في جلد الثمار ثم تخترقه وتتجول داخل الثمرة حتى تصل إلى منطقة القلب، وتستهلك البنور والأنسجة الأخرى الموجودة في هذه المنطقة، ورؤية ثقب أو ثقبين في الثمرة تغطي فتحها براز اليرقة هو من علامات الإصابة بها .

وقد تدخل اليرقة من جوانب الثمرة أو من منطقة إتصالها بحامل الثمرة أو من الكأس أو من نهاية الثمرة (شكل ١٠٩)، ودخول الثمرة من منطقة الكأس يجعل من الصعب ملاحظة

الإصابة وأحيانا تشخص الحالة على أنها إصابة ببيرقات مجهولة، وفي بعض الأحيان تحفر اليرقة لمسافة قصيرة داخل الثمرة ثم تموت بفعل المبيدات أو الأسباب الطبيعية، وتفرز الثمار المصابة بهذه الآفة كتمار تالفة لأنه من الصعب تسويقها أو تعليبها . وهذا يعنى خسارة كبيرة بالنسبة للمزارع .

### دورة الحياة

سبق شرحه بالتفصيل عند ذكر الحشرة ضمن آفات التفاح .



(شكل ١٠٩) أ - ثمرة كمثرى مفتوحة يرى فيها يرقة ثمار التفاح والكمثرى .

ب - ثمرة كمثرى يظهر فيها مكان دخول يرقة ثمار التفاح

### طرق المكافحة

كما سبق أن ذكرنا فإنه يجرى الإستعانة بمصائد الفراشات لتحديد الوقت المناسب لإجراء عمليات المكافحة الكيميائية، والرشة الأولى تحدد أثناء سقوط بتلات الأزهار في شهر إبريل،

والرشة الثانية بعد الأولى بنحو ٢٥ - ٢٠ يوم، وفي معظم الأحوال تكفى هاتان الرشتان في الحصول على نتائج مكافحة جيدة، ويضبط ميعاد الرش بحيث يواكب وقت نشاط اليرقات وإستمرار الأثر الباقي للمبيد على الأشجار لفترة طويلة يساعد على إضعاف الجيل الأول للحشرة وبذلك يأتى الجيل الثانى ضعيفا وقد لا تحتاج إلى معالجة كيميائية أحيانا .

## ٢ - البقة الناقرة كريهة الرائحة

وأسمها العلمى للحشرة *Euschistus conspersus* Uhler

رتبة نصفية الأجنحة Order Hemiptera

فصيلة البق كريه الرائحة Fam. Pentatomidae

يصيب هذا البق الكثير من العوائل، ولكنه الآن أصبح من الآفات التى تصيب الكمثرى خصوصا فى الاراضى المستزرعة حديثا والمعشبة، وهذه البقة تصيب أيضا محاصيل الحقل، وعندما تكون الأرض المزروع فيها الكمثرى نظيفة محاطة بأراض جيدة مزروعة فإن إصابة الكمثرى بها تكون طفيفة .

### وصف الحشرة

البقة اليافعة تشبه الدرع ويبلغ طولها ١٢,٥ مم ولونها رمادى يميل إلى البنى، وأرجلها وقرون إستشعارها صفراء اللون ومغطاة بنقط صغيرة سوداء، ويتراوح لون جانبي الجسم من أخضر إلى رمادى، (شكل ١١٠) وطور الحورية يختلف فى لونه من أسود وأبيض فى أعمارها الأولى إلى مزيج من الأصفر والبنى فى أعمارها الأخيرة .

والبيض برميلي الشكل ويوضع فى كتل مكونه من ٧ - ٢٠ بيضة .

وفور وضع البيض يكون لؤلؤى مع وجود حلقة من الأشواك السمرء فى القمة ثم يتحول لونه إلى قرمزي قبيل الفقس .



(شكل ١١٠) الطور البالغ للبقة كريمة الرائحة

### مظهر الإصابة والضرر

يؤدي إغتناء هذا البق على ثمار الكمثرى النامية إلى تكون طبقات فليينية بيضاء تحت جلد الثمرة، وعند تقشير الثمرة تتحول هذه الطبقات إلى اللون البني عند تعرضها للهواء، ونقر التغذية هذه تكون عميقة لدرجة أنه لا يمكن إزالتها عند التقشير، وإذا نقرت البقعة الثمرة بعد نضجها فلا يكون هناك أثر لمهاجمة الثمرة إلا بقع صغيرة على قشرة الثمرة، أما إذا كانت الإصابة مبكرة فإنه يظهر بسطح الثمرة نقرا عميقة ومناطق غائرة، وتفتدى البقعة على الثمرة بالقرب من اتصال الثمرة بحاملها وعليه فإن معظم المناطق الفليينية في الثمرة تمتد من وسط الثمرة حتى حاملها (شكل ١١٠)، وتتحرك البقعة الواحدة من شجرة لأخرى ومن ثمرة لأخرى وتنقر عددا كبيرا من الثمار .

وإذا كانت أسراب هذا البق مهاجرا من بساتين أخرى إلى بستان الكمثرى، فإن معظم الضرر يحيق بالصفوف الخارجية من الأشجار أكثر من غيرها، ويمكن أن تكون الإصابة شديدة فإن البقعة في غاية الخطورة، وإذا كانت الإصابة شديدة فإن المحصول كله يمكن أن يفقد سواء في تسويق الثمار أو تعليبها .



(شكل ١١١) ثمرة كمثرى مقشرة وترى داخلها المناطق العلينية  
التي نشأت عن إغذاء البقة الناقرة كريهة الرائحة

## دورة الحياة

تقضى البقة الناقرة البيات الشتوى وهى فى طور اليافع، وتبيت بين الأوراق والركام الموجود على أرض بساتين الفواكه أو فى ملاجئ أمنة قرب البساتين، وتظل البق فى حالة سكون طوال فصل الشتاء، ولكنها قد تنشط وتطير فى الأيام الدافئة، وفى بداية الربيع (مارس وإبريل) ينشط البق ويستيقظ من بياته الشتوى ويقوم بالإغذاء على الحشائش عريضة الأوراق الموجودة فى البستان وتتحرك مقتربة من الحقول المفتوحة حيث توجد العوائل النباتية المناسبة، ويفضل عوائله من بعض الحشائش مثل المسطردة (الكبر) والحمأص (dock) ولسان الحمل plantain وأذن الذئب mullein، ويوضع البيض فى كتل أسفل أوراق هذه الحشائش أو أسفل أوراق الكمثرى، يفقس البيض بعد أسبوعين أو ثلاث تبعاً لدرجة الحرارة، وتخرج منه الحوريات التى تغتذى على الحشائش ذات الأوراق العريضة، وينضج الجيل الأول من البق اليافع فى شهر يونية وفى نفس الوقت تكون الحشائش فى الأراضى غير المنزرعة قد بدأت تجف، فتتحرك يافعات الجيل إلى البساتين التى ما تزال هذه الحشائش بها خضراء بسبب رى هذه البساتين، وهذا هو الجيل الذى تهاجم حشراته ثمار محاصيل الحقل ويظهر فى البساتين فى يولية وأغسطس وتدخل يافعات هذا الجيل البيات الشتوى فى البساتين أو بالقرب منها .



ويوجد تداخل بين الجيل الأول والثاني خلال الفترة من يونية حتى يولية وقد تعيش بعض يافعات الجيل الأول خلال فصل الشتاء .

### برنامج مكافحة

يشمل برنامج مكافحة هذا البق الجمع بين إزالة الأعشاب والمعالجة الكيماوية، والاثنان يجب تنفيذاً معاً بكل شكل متكامل دقيق، وحيث أن البق يتربى على الحشائش وهى من عوائله الرئيسية، فإن المعالجة الكيماوية لا تكون فعالة قبل التخلص من هذه الحشائش، ونظافة بستان الكمثرى هام أيضاً، كذلك يجب إبادة الحشائش فى الأماكن المجاورة للبستان.

وحيث أن هذا البق يبيت شتوياً تحت الأوراق الجافة والمخلفات النباتية الموجودة على الأرض والموجودة فى البستان أو بالقرب منه، فإن مكافحة الكيماوية يجب أن تشمل معالجة الأرض التى توجد بها هذه المخلفات فى الربيع الباكر عندما يبدأ البق فى الإستيقاظ من بياته الشتوى وينشط، ومن الأهمية بمكان أن تكافح الحشائش فى الأماكن القريبة من البستان لأنه عند جفاف هذه الحشائش فى منتصف الصيف فإن البق يتركها مهاجراً إلى بساتين الكمثرى. والمعاملات الكيماوية التى تتم على الآفات الأخرى فى الربيع الباكر والتى تستخدم فيها مبيدات فعالة، تكفى لمكافحة هذه الآفة أو جعلها تهرب إلى المناطق غير المزروعة.

## ب - الآفات الحشرية التى تصيب المجموع الخضرى لأشجار

### الكمثرى

### ٣ - تربس البقول

الاسم العلمى للحشرة *Hercothrips fasiatus*

رتبة الحشرات هدية الأجنحة Order Thysanoptera

فصيلة ثريبيدى Fam Thripidae

أحيانا تصاب الكمثرى بهذا النوع من التربس، وتفيد المكافحة الكيماوية للآفات الأخرى فى الحد من خطورة هذا التربس على الكمثرى ونادراً مايشمله برنامج للمكافحة الكيماوية.

## وصف الحشرة

يبلغ طول الفرد اليافع من هذا التريس نحو ١ مم ولون الجسم بني قاتم أو أسود، ويوجد على الأجنحة الأمامية بقعتان لونهما أبيض تظهر وكأنها شريط مستعرض للأجنحة ويوجد على قرون الإستشعار والأرجل حلقات فاتحة اللون، والبيض صغير الحجم جدا ولونه أبيض، ويوضع البيض داخل أنسجة الأوراق، ويختلف لون الحورية من الأصفر إلى القرمزي، ولكن غالبا مايميل لونها إلى اللون القرمزي مختلفة بذلك عن حوريات أنواع التريس الأخرى.

## الضرر

يعتبر التريس عموما من آفات الأوراق، ولكنه أحيانا يصيب الثمار، ونتيجة لإغذاء التريس تظهر على الورقة أو الثمرة بقعة فضية اللون في مكان الإغذاء هذا مع وجود بقع سوداء صغيرة من إخراج هذه الحشرة، وقد تسبب الإصابة الشديدة في جفاف الأوراق وتحول لونها إلى البني أو الأحمر، وإذا ماحدث مثل هذه الحالة فإن نمو الثمار يتأثر تأثرا غير مباشر وتفشل في الوصول إلى الحجم الطبيعي لها عند النضج.

## دورة الحياة

يبعث هذا التريس شتويا كحشرات يافعة في الأماكن التي يستطيع الإختباء بها ويبدأ نشاطه بمجرد تحول الجو إلى الدفء، وقد ينشط في الشتاء في الأيام المشمسة الدافئة، ولا تتكون عشيرة غزيرة العدد من هذه الحشرة إلا في فصل الربيع، تضع الإناث بيضها داخل أنسجة أوراق النباتات العوائل، وعادة ما يظهر لهذه الحشرة جيلان أو أكثر على الحشائش العائلة لها في الربيع وتنقل منها إلى بساتين الكمثرى أحيانا، ولكن خلال الصيف الباكر يطير التريس إلى بساتين الكمثرى ويضع بيضه داخل أنسجة الأوراق، ويتكون جيلان أو ثلاثة على نبات الكمثرى خلال فصل الصيف، فهذه الحشرة ستة أجيال متداخلة في السنة، وهذا يتوقف على درجة حرارة الجو في فصل الصيف.

## برنامج المكافحة

في العادة تفيد المكافحة الكيميائية للآفات الأخرى على الكمثرى في مكافحة هذا التريس،

ويمكن مكافحة هذه الحشرة أيضا بالطرق الزراعية عن طريق إزالة الحشائش من البستان والأراضي المجاورة وعدم زراعة نوع خس بروكلى فى البستان أو الأرض المجاورة لأن هذا الخس يعتبر من العوائل المفضلة لتربس البقول، وحيث هذه الحشرات ضعيفة الطيران فإنه من المستبعد أن تنتقل إلى بستان الكمثرى من الحشائش الموجودة فى أماكن بعيدة عن البستان.

## ٤ - قمل الكمثرى القافز

الاسم العلمى للحشرة *Psylla pyricola* Forest

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة قمل النبات القافز Fam Psyllidae


يعتبر قمل الكمثرى القافز أو بزلا الكمثرى *Pear Psylla* من الآفات الرئيسية على نبات الكمثرى فى كثير من المناطق، حيث إن الكمثرى هى عائلة الأوحى ولو أنه يفضل بعض أصناف الكمثرى أكثر من البعض الآخر، فمثلا يروى له الصنف بارتلت Bartlett والصنف D'Anjou وأحيانا يهاجم السفرجل.

### وصف الحشرة

تشبه الحشرات اليافعة لهذه الآفة حشرات السيكاذا الدقيقة ويبلغ طولها ٢,٥ مم، ويتراوح لونها من الأسود إلى البنى المحمر. مع وجود علامات حمراء أو خضراء، والأجنحة شفافة وتغطى الجسم (شكل ١١١).

والحوريات الصغيرة دقيقة الحجم جدا وصفراء اللون، وكلما نضجت كلما صارت مفلطحة وعريضة بينما يكون لونها بين الأخضر المصفر والبنى المحمر، والأعين حمراء اللون براق، وكل حورية تكون منغمرة فى قطيرة من الندوة العسلية، وتسمى العمر الأخير من الحورية نو اندرقة الصلبة "hard shell"، وهذا الطور أسمر اللون تظهر به قواعد الأجنحة ولا يعيش داخل

قطيرة من الندوة العسلية والبيض كمثرى الشكل ولونه أصفر برتقالى، ويوجد البيض على الأغصان والبراعم فى الربيع الباكر، كما يوجد فى الصيف بالقرب من عرق الورقة الوسطى.




(شكل ١١١) حشرة يافعة من قمل الكمثرى القافز

### مظهر الإصابة والضرر:

ينخذ الضرر الذى تحدثه هذه الآفة بالكمثرى مظهرين عامين، المظهر الأول ينشأ من كثرة إفراز هذه الحشرات للندوة العسلية التى تتساقط فوق الأوراق والثمار، والمظهر الثانى هو حالة اللزوجة التى تتبع ذلك (شكل ١١٢)، وهذه الثمار لا يمكن تسويقها بهذه الحالة، وفضلا عن ذلك فإن إغذاء الحوريات على الأوراق يسبب حالة تسمم يجعل لونها يتحول إلى اللون الأصفر، وإذا لم يتدارك الأمر وتجرى المكافحة فإن الإصابة قد تجرد الأشجار تماما من أوراقها وتؤثر على حجم الثمار، والضرر الرئيسى فى أغلب الأحوال ينشأ من تلوث الثمار بالندوة العسلية بكميات كبيرة إذا كانت الكثافة العددية لهذه الحشرة متوسطة.

وبالرغم من أن الثمار لاتصاب مباشرة إلا أن الإصابة الشديدة للأوراق قد تعوق قيامها بوظائفها الحيوية وما يترتب عليه من تأثر الثمار.



(شكل ١١٢) حشرة يافعة من قمل الكمثرى القافز

## دورة الحياة

يبعث قمل النبات بيئاته الشتوية في الطور اليافع في الأماكن الآمنة مثل قلف الأشجار أو تحت المخلفات النباتية الموجودة على الأرض، وفي الربيع الباكر وبمجرد تكون براعم النبات، يخرج قمل النبات من بيئاته الشتوية وينشط في وضع البيض على الأغصان، ويوضع معظم البيض فوق أو بالقرب من حوامل الثمار، ويأخذ الفقس مجراه بمجرد ظهور اليرقات الأولى للكمثرى، وعند خروج الحوريات من البيض تأخذ في الإغذاء على الأوراق، وكما سبق أن ذكر فإن كل حورية تكون مغمورة في قطيرة من الندوة العسلية وتستمر موجودة في القطيرة حتى عمرها الأخير "نو الدرقه الصلبة" الذي مايلبث أن يتحول إلى الطور اليافع الذي تنشط أفرادها ويتحرك متجولة فوق سطح الورقة أو تتجه نحو الأغصان.

واليوافع الصغيرة يكون لونها فاتحا جدا ولكن مايلبث أن يتحول إلى البني القاتم، والحشرات اليافعة حشرات نشطة جدا تطير من شجرة إلى أخرى، ولهذا السبب تنتشر هذه الحشرة بسرعة بين البساتين، وكل جيل من أجيالها يستغرق شهر والحشرة ثلاثة إلى خمسة أجيال في السنة. وتمر الحورية خلال ٥ أعمار حتى تصل إلى الطور اليافع، وتوجد اليوافع التي تدخل البيات الشتوي في فصل الخريف وتميل إلى الطيران لمسافات بعيدة، ولهذا السبب تتحول الإصابة الخفيفة بهذه الحشرة إلى إصابة شديدة جدا في خلال فترة قصيرة .

## برنامج مكافحة

يعتمد برنامج مكافحة هذه الآفة على استعمال المبيدات الكيماوية ولم تفلح أى من المتطاولات أو المفترسات فى الحد من خطورتها وليس لها أى دور فى خفض كثافتها العددية، وتوقيت إستخدام المبيدات شىء فى غاية الأهمية لأن طور الدرقة الصلبة والطور اليافع يصعب مكافحتها، ولأسيما وأن الطور اليافع سريع الطيران.

ولكن المكافحة الكيماوية التى تجرى فى الشتاء أثناء وجود الحشرة فى البيات الشتوى تعطى أفضل النتائج فى تخفيض كثافتها العددية، ويجب أن تتم هذه العملية فى نهاية فبراير أما مدد المعاملة فى شهر يناير فتكون مبكرة جدا، حيث أن الحشرات تكون خاملة ومختبئة فى هذا الوقت ولكنها فى نهاية فبراير تبدأ فى النشاط والخروج من المخابىء.


ووجود أشجار الغابات أو كثرة من بساتين الفاكة تلعب دورا هاما فى مكافحة هذه الآفة، فإذا لم تعالج هذه الأشجار فإنها تكون مصدرا للعدوى تنتقل منها الآفة لتصيب البساتين الثمارية، وانتشار الحقائق المنزلية بالقرب من بساتين الكمثرى أصبحت فى الأخرى مصدرا من مصادر العدوى حيث أن الأشجار فى هذه الحقائق لاتعامل كيماويا عادة.

## ٥- المن Aphids

يعتبر المن من آفات الكمثرى المعتادة، ويوجد عدة أنواع من المن التى تصيب الكمثرى حيث يهاجم أوراق الشتلات الصغيرة وأشجار الكمثرى، وأنواع المن التى تصيب الكمثرى تنحصر غالبا فى من الخوخ الأخضر *Myzus persica* (culz) ومن القطن أو البطيخ *Aphis gossypii* (Aleveh) ومن الفول *Aphis fabae* Scop حيث يصيب الثلاثة الكمثرى وتسبب لها نفس الضرر، وتوجد مختلطة ببعضها. ومن الخوخ الأخضر لونه أخضر فاتح، ومن القطن نولون أخضر قاتم ومن الفول أسود اللون. ويفضل من الفول إصابة النموات الحديثة فى قلب الشجرة، ولكن النوعان الآخران يهاجمان النموات الحديثة فى جميع أجزاء الشجرة.

## مظهر الإصابة والضرر

يؤدى إغتناء المن على الأوراق إلى إلتوائها وتوقف النموات الحديثة عن النمو، ولكن هذا النوع من الضرر هو الضرر الأدنى، ولكن الضرر الأعظم يأتى من إفراز هذه الحشرات للنودة العسلية التى تتساقط فوق الثمار ومايتبعه من نمو الفطريات وتحول لون الثمار إلى اللون الأسود (شكل ١١٣) ويمكن أن يكون التعفن فى أماكن محدودة من الثمرة أو يعم سطح الثمرة بأكمله، وتصبح الثمرة لزجة وشكلها قبيحا .



(شكل ١١٣) أ - ثمرة كمثرى يبدو التلوث بالنودة العسلية فى أماكن محددة منها

ب - ثمرة أخرى أصبح التلوث بالنودة العسلية عاما على سطحها علما بأن الفطر الأسود ينمو على النودة العسلية فى كلتا الحالتين.

## الدورة الموسمية للمن:

لأنواع المن دائرة واسعة من العوائل النباتية من كافة المحاصيل والحشائش، ولا يقضى المن البيات الشتوى على الأشجار، ولكنه مغرم بالحشائش يقضى عليها ببياته الشتوى، وفى فصل الربيع عندما تبدأ الأشجار فى تكوين البراعم وتأخذ فى النمو يظهر المن ليصيب الأوراق والثمار الحديثة، وهنا يبدأ المن فى تكوين مستعمراته ويكون العديد من الأجيال مادام الجو

معتدلا، وعندما ترتفع درجة حرارة الجو في الصيف يترك المن أشجار الكمثرى إلى غيرها من العوائل، وعندما يعتدل الجو في الخريف لا يعود المن ثانياً إلى أشجار الكمثرى، وفي معظم الأحوال لا يتواجد على الكمثرى إلا لمدة شهر فقط في بداية الموسم، ولكن إذا ظل الجو معتدلاً لفترة طويلة، فقد يستمر وجود المن على أشجار الكمثرى حتى منتصف الصيف.

### برنامج مكافحة

لا يوجد ما يقلل من تعداد حشرات المن سوى اللجوء إلى المبيدات الكيماوية، وحيث أن المن يفضل إصابة الأعشاب والحشائش فإن مكافحة الأعشاب والحشائش ونظافة بستان الكمثرى منها يعد من طرق المكافحة الناجحة، وفي الربيع الباكر عندما يهاجر المن من العوائل الأخرى إلى بساتين الكمثرى لا يكون في مقدور المفترسات والمتطفلات أن تلعب إلا دوراً ضئيلاً في المكافحة الحيوية للمن، ولكن إذا هناك إصابة بالمن، وتوقعنا قدوم فترة من الطقس الدافئ، لا يكون هناك ضرورة للمكافحة الكيماوية، ففي معظم الأحيان ينخفض تعداد المن سريعاً بعد فترات من الجو الحار.

## ٦ - صانعة أنفاق أوراق الكمثرى الخيمية

الاسم العلمي للحشرة *Lithocolletis sp.*

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Oroler Lepidoptera


فصيلة ليزوكوليتيد Fam. *Lithocolletidae*

تعد هذه من الآفات المعروفة على أشجار الكمثرى في الكثير من بقاع العالم، والمعلومات عنها توجد متفرقة هنا وهناك، ولذلك وجدت صعوبة كبيرة في جمع ما يتعلق بها هنا إذ أن وجودها لم يلفت أنظار الكثيرين، ولو أنها قد تشكل خطراً ملموساً على أشجار الكمثرى عند حدوث فورات منها.



## مظهر الحشرة

الفراشة اليافعة صغيرة جدا إذ تبلغ نحو ٣,٥ مم طولاً، وأجنحتها الأمامية ذهبية اللون تميل إلى اللون البنّي (بنى مذهب) مع وجود خطوط فضية محفوفة باللون الأسود، والأجنحة الخلفية رمادية اللون ويوجد على حوافها شعيرات طويلة، وعند الراحة، تأخذ الأجنحة شكل السقف فوق الجسم (شكل ١١٤)



(شكل ١١٤) الفراشة اليافعة لحشرة صانعة الأنفاق الخيمية

والبيض الحديث الوضع لونه أبيض ثم يصفر في النهاية ثم يصبح شفافاً عند نضجه، ولهذا يمكن رؤية اليرقة النامية داخله، واليرقة في أعمارها الثلاث الأولى تكون مبطنّة ورأسها وتدبة الشكل، وهي عديمة الأرجل، ولون جسم اليرقة أبيض ورأسها بنية اللون، وفي العمرين الرابع والخامس لليرقة يصبح الجسم مستديراً، ويظهر لليرقة أرجل حقيقية وأرجل كاذبة، ويتغير لون الجسم من الأبيض إلى الأصفر، ولون العذراء بنى قاتم، إسطوانية دقيقة وتوجد داخل شرنقة حريرية بيضاء.

## مظهر الإصابة والضرر

ينحصر ضرر هذه الآفة الصانعة للأنفاق في الأوراق، وعندما تكون الإصابة شديدة ويصاب ٦٠ ٪ من نسيج الورقة يؤدي ذلك إلى تدمير الورقة، وتفتدى اليرقة بدون إنتظام على الخلايا الموجودة تحت البشرة العليا للورقة وتلتهم كل الأنسجة الموجودة بين بشرتي الورقة العليا والسفلى، ولا يتبقى إلا طبقة رقيقة من بشرة الورقة السفلى وطبقة من بشرة الورقة العليا وتظهر بينها بقعة كبيرة، وبالرغم من أن الشجرة لاتسقط أوراقها إلا أن إصابة الأوراق الشديدة تؤثر في حجم ثمار الكمثرى، وإذا توالى الإصابة في مواسم عديدة متعاقبة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الشجرة، ومن الممكن ألا تكون الإصابة بهذه الآفة وحدها خطيرة ولكن إقتران الإصابة بها مع الإصابة في نفس الوقت بالإصابة بالحلم يضاعف من الضرر.

## الدورة الموسمية

تبيت صانعة أنفاق ورق الكمثرى بياتا شتويا وهي في طور العذراء التي توجد بين أنسجة الأوراق المتساقطة على الأرض، تخرج الفراشات الياقة مبكرة في أوائل الربيع، خلال شهر فبراير وتخلد هذه الفراشات للراحة فوق جنوع الأشجار ومحاصيل الحقل منتظرة حتى تظهر الأوراق الأولى في براعم أشجار الكمثرى، تضع الإناث بيضها على السطح السفلى للأوراق بمجرد أن تبسط الأوراق، وبعد الفقس تحفر اليرقة - تحت موقع البيضة مباشرة - في أنسجة الورقة، وينشأ عن ذلك نفق خيطى متعرج أولا وينمو اليرقة يتسع النفق حتى يصبح بقعة (شكل ١١٥) وكلما نمت اليرقة تأخذ في وصل جانبي النفق بخيوط حريرية حيث يصبح النفق في النهاية على هيئة خيمة أو خيمي المظهر، تعذر اليرقة في النفق، وعندما تخرج الفراشة من الطور اليرقى تترك الجلد العذرى متدليا من النفق، وللحشرة أربعة أجيال في السنة والجيل الأخير يتداخل مع الجيل السابق له في نهاية فصل الصيف، وعموما فإن الجيل الأول يظهر في الفترة من مارس حتى مايو، والثاني من مايو حتى يولية، والثالث من يولية حتى سبتمبر، والرابع يدخل البيات الشتوى من سبتمبر حتى سقوط الأوراق.



(شكل ١١٥) أوراق الكمثرى التي أصابها الضرر من يرقات صانعة أنفاق أوراق الكمثرى

### برنامج مكافحة

حيث أن لهذه الحشرة أربعة أجيال متداخلة في العام، فإن المكافحة الكيماوية تكون صعبة إذا ماتأخرت هذه المكافحة حتى ظهور الأطوار المتقدمة من الأجيال المتداخلة، وأفضل وقت لإجراء المكافحة الكيماوية هو وقت سقوط البتلات أي عند ظهور يرقات الجيل الأول، وقبل أن تخرج فراشات الجيل الثاني.

ومن الممكن أيضا إجراء المكافحة الكيماوية في الربيع ضد العذارى الموجودة في الأوراق المتساقطة على الأرض، وبرش هذه الأوراق بمبيد ذى أثر باق فإن الفراشات سوف تقتل فور خروجها من الطور العذرى.

وتلعب المفترسات دورا في تخفيض أعداد هذه الآفة، فيوجد على الأقل ثلاثة أنواع من

المفترسات التي تهاجم اليرقات ولكنها لاتصبح فعالة إلا في فصل الصيف، ومن الأفضل ألا تستخدم الكيماويات في مكافحة هذه الآفة في أواخر الموسم وترك المكافحة لعناصر العوامل الطبيعية لكي تؤدي دورها وتقلل من خطورتها في الموسم القادم.

وتلعب المكافحة الزراعية دورا آخر إذا ماتم جمع الأوراق المتساقطة خلال فصل الشتاء وحرقها وذلك حتما سوف يقضى على أعداد كبيرة من الأطوار التي تدخل البيات الشتوى.

## جـ- الآفات التي تصيب المجموع الخضرى وثمار الكمثرى

### ٧- بق العنب الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة (*Pseudococcus maritimus* Ehr)

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة البق الدقيق *Fam. Pseudococcidae*

هذا ويوجد في مصر نوع آخر من بق العنب الدقيقى هو (*Phenococcus vitis* (Niediei)

ويسمى بق العنب الدقيقى أيضا (بق بيكر الدقيق Baker) وينتشر هذا البق في جميع المناطق التي تزرع الكمثرى في العالم، والإصابة بالبق الدقيقى إصابة خطيرة حيث أنه يهاجم ثمار الكمثرى ويلتها، ومن ناحية أخرى فإن هذه الآفة تفضل الإختباء في أماكن لا يمكن أن تصل إليها مبيدات الرش في هذه الأماكن، وحدة الإصابة بهذه الآفة تختلف من موسم إلى آخر، فقد تكون شديدة في أحد المواسم وخفيفة في موسم آخر.

### مظهر الحشرة

يبلغ طول حشرة البق الدقيقى هذا نحو ٦,٥ مم ولونها قرمزى غامق وجسمها مغطى بمسحوق شمعى أبيض، ويتدلى من جوانب الجسم خيوط من الشمع وكذلك من الطرف

الخلفى للحشرة، والخيوط الخلفية أطول من تلك التى توجد على الجوانب وربما إمتدت للخلف بما يوازى نصف طول الجسم، ولون البيض أصفر إلى برتقالى ويوضع البيض داخل كيس قطنى المظهر، وزاحفات هذه الحشرة لونها أصفر إلى بنى وهى دائبة النشاط.

### مظهر الإصابة والضرر

معظم الضرر الذى ينشأ من الإصابة بهذه الآفة يكمن فى الندوة العسلية التى تفرزها وتتساقط على الأوراق والثمار والأغصان، وينمو على الندوة العسلية فطر العفن الأسود الذى يعطى الأوراق والثمار مظهرا غير مقبول وإغتناء هذه الحشرات أسفل نهاية رأس الثمرة بسبب إنهايارا لهذه الأنسجة، (شكل ١١٦)، ويتحول نهاية الثمرة ليصبح رخوا عندما تبدأ الثمرة فى النضج، وبالإضافة إلى ذلك فإنه من غير الممكن إزالة مستعمرة البق الدقيقى من نهاية الثمرة بوسائل الفسيل المعروفة، ويبقى البق الدقيقى على الثمرة بعد الجمع، والإصابة الشديدة بالبق الدقيقى يجعل تسويق الثمار أمرا صعبا بسبب المظهر الرخو للثمرة ويخلق مشاكل عديدة عند تعليبها.

### الدورة الموسمية

يقضى بق العنب الدقيقى فصل الشتاء وهو فى طور البيضة أو الزاحفات داخل كيس البيض الأبيض القطنى. هذا مع العلم بأن غالبية الأفراد تبنت بياتها الشتوى وهى فى طور الزاحفات، وتوجد أكياس البيض دائما داخل شقوق القلف أو تحت قشور القلف السائبة وفى الربيع تتحرك حوريات البق الدقيقى الزاحفة إلى الجزء القاعدى من النموات الحديثة أو أى نموات أخرى رهيقة وتبدأ فى الإغتناء، وتبلغ هذه الحوريات الطور اليافع فى أوائل شهر يونية، وعندئذ تزحف الإناث ثانيا إلى الأفرع والجزع لتضع بيضها، وفى حالة الكمثرى تدخل الزاحفات أيضا إلى نهاية كأس الثمرة وتكون مستعمرات فى هذا الجزء الحصين وتفتدى على أنسجة الثمرة، والحشرات اليافعة لهذا الجيل تكرر راجعة إلى القلف فى نهاية فصل الصيف - عادة من أغسطس إلى سبتمبر - وتضع بيضها فى الأماكن المحمية على الأفرع والجنوع، ويمكن لها فى هذه الحالة أن تبنت شتويا فى طور البيضة الذى يفسس وتخرج منه الحوريات الزاحفة التى تكمن فى كيس البيض وتبيت فيه بياتها الشتوى.



(شكل ١١٦) ثمرة كمثرى يوجد في نهاية كأسها مسعمة من بق العنب الدقيقى

### برنامج المكافحة

تلعب المتطفلات والمفترسات دورا هاما في الحد من خطورة هذه الآفة وإنقاص حجم عشائرها، ولكن تحدث لهذه الحشرة فورات مفاجئة من جراء الإستخدام غير الرشيد للمبيدات الكيماوية التى تقضى على أعدائها الحيوية فى البيئة، ويصعب مكافحة حشرات البق كيميائيا وذلك بسبب وجود الشمع فوق أجسامها ويسبب عاداتها فى الإختباء داخل الأماكن الحصينة التى لاتصل إليها مبيدات الرش، لذلك يجب عند إستعمال سوائل الرش للمكافحة أن تغسل الأفرع والجنور بهذه السوائل، وهذا وبالرغم من أنه من السهل إبادة البيض والحوريات الزاحفة بالمبيدات الكيماوية، إلا أن إحتماء هذه الأطوار فى شقوق القلف يجعل من الصعب الوصول إليها، ويجب معاملة الأشجار كيماويا بالمبيدات أثناء فصل الشتاء حتى نقتل من خطورة الجيل الذى يظهر فى فصل الربيع. واستخدام المبيدات فى فصل الربيع والصيف يجب أن يرتبط بظهور الحوريات الزاحفة، ومع هذا فإن المعاملة فى هذين الفصلين لاتؤدى المرجو منها.

## ٨- آفة أوراق أشجار الفاكهة

الاسم العلمى للحشرة (*Archips argyrospilus* (Walker)

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيدي Fam. Tortriciidae

سبق ذكر هذه الآفة بالتفصيل ضمن الآفات التى تصيب أشجار التفاح، وبالرغم من أن هذه الآفة تعتبر من الآفات الرئيسية لأشجار الحلويات، إلا أنها من النادر ماتعتبر من الآفات الخطيرة على أشجار الكمثرى، ومعاملات مكافحة الكيمائية التى تجرى على الآفات الأخرى لها أثرها فى مكافحة هذه الآفة مثل المبيدات المستعملة فى مكافحة دودة ثمار التفاح.

### مظهر الحشرة

سبق شرحه سابقا عند ذكر الحشرة على أشجار التفاح.

### مظهر الإصابة والضرر

تعتبر هذه الحشرة أساسا من آفات أوراق الأشجار، ولكن تهاجم الثمار أيضا، فاليرقة تقضم جلد الثمرة محدثة به نقرة عميقة، وحيث أن هذه اليرقات تبدأ نشاطها فى وقت مبكر من الموسم، فإن الجروح التى تحدثها فى سطح الثمرة تلتئم بمرور الوقت، والثمار التى تصيبها اليرقات تتميز بوجود جروح عميقة غير منتظمة بها مع وجود نسيج خشن أو ندبا تغطى هذه الجروح، والثمار الصغيرة التى تصاب بشدة تبدو عند الجمع صغيرة الحجم، وإذا كانت الإصابة سيئة، يمكن أن تضر الأوراق ضررا بليغا، ولكن فى غالب الأحيان فإن الضرر الذى يحق بالأوراق يعتبر هينا إذا ماقيس بالضرر الذى ينزل بالثمار (شكل ١١٧).

### الورة الموسمية

تبيت آفة أواق الفاكهة فى طور البيضة، حيث تتواجد كتل البيض المتراكبة على الأغصان

والأفرع الرئيسية، يفقس البيض في أوائل الربيع أثناء فترة تكون البراعم، تغتذى اليرقات الصغيرة على الأوراق بعد أن تطويها إلى بعضها مستخدمة في ذلك خيوطا حريرية تفرزها، وقد تطوى حافة ورقة على باقى سطح الورقة بنفس الطريقة وتعذر اليرقات داخل طبقات الأوراق وتخرج الفراشات اليافعة في شهرى مايو ويونيه، وتطير الفراشات ليلا ولكنها تبقى ساكنة فوق الجنوع والأوراق نهارا، والحشرة جيل واحد فى السنة، ويوضع البيض الذى يدخل البيات الشتوى فى شهر يونيه.



(شكل ١١٧) ورقة كمثرى مصابة ببقعة لافة أوراق الفاكهة



## برنامج مكافحة

كما سبق أن ذكرنا فإن برنامج استخدام المبيدات الكيميائية في مكافحة بودة ثمار التفاح على الكمثرى يكفى لمكافحة هذه الآفة في نفس الوقت دون اللجوء إلى الدخول في برنامج خاص لمكافحتها.

### ٩- آفة أوراق البرتقال

الاسم العلمي للحشرة (*Argyrotaenia citrana* (Fernald)

رتبة الحشرات مرشقية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيدي Fam. Tortricidae

سبق ذكر هذه الآفة تفصيلاً ضمن آفات التفاح، وهي آفة مزبوجة على كل من أشجار البرتقال وأشجار الحلويات وتتراوح خطورتها من منطقة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى وهي تتأثر بالمبيدات المستعملة في مكافحة بودة ثمار التفاح.

### مظهر الإصابة والضرر

تعد هذه الآفة من المغتذيات على الأوراق ولكنها تصيب الثمار أيضاً، ويعتبر الضرر الذي يصيب الأوراق منها ثانوياً إذا قورن بالأضرار التي تصيب الثمار وتغذى اليرقة على سطح الثمار ونادراً ما تتعمق داخل الثمرة، وتغذى في خط غير منتظم وينشأ عن ذلك خط ثعبانى متعرج على سطح الثمرة، وعلامة الإغذاء هذه توجد دائماً في منطقة الكأس أو على جانبي الثمرة، والثمار المصابة يصعب تسويقها أو تلييحها.

## الدورة الموسمية

تقضى هذه الحشرة البيات الشتوى فى أطوار مختلفة، ولكن الطور اليرقى هو الطور الغالب فى هذه الحالة، حيث تمضى اليرقات الشتاء فى ملاجئ من الأوراق الجافة والأغصان، وتغتنى على القلف بدرجة محدودة، وقد تختبئ فى ملاجئ تصنعها اليرقة من الخيوط الحريرية على الثمار التى تركت نون جمع وتغتنى بعض الشئ على تلك الثمار، ومن الممكن أن يعثر على عذارى ويوافع خلال فصل الشتاء، ولكن معظم الأفراد تكون فى الطور اليرقى، وحيث أن هذه الحشرة لاتبيت شتوياً فى طور موحد، فإن الأجيال التى تظهر منها فى الربيع والخريف تتداخل فى بعضها، ويمكن القول بأن لهذه الحشرة جيلان إلى أربعة أجيال فى الموسم، وكل أطوارها يمكن أن تتواجد فى أى وقت.

تضع الفراشات المؤنثة بيضها على سطح قلف الأشجار الناعم (على الأفرع والجنوع)، وتحرك اليرقات الصغيرة إلى المجموع الخضرى بعد الفقس مباشرة، وتربط اليرقات الأوراق إلى بعضها بغزل حريرى وتصنع لنفسها ملجأ تغتنى من داخله، وقد تربط أيضاً ورقة بالثمرة أو تعيش فى نهاية كأس الثمرة داخل شبكة من الغزل، وكثيراً ما توجد اليرقات بين ثمرتين متلامستين أو مجموعة من الثمار. وتعذر اليرقة داخل الملاجئ التى تصنعها فى الأوراق أو الثمار.

## برنامج المكافحة

تلعب المفترسات دوراً هاماً فى مكافحة هذه الآفة، وحيث أن هذه الحشرة تعيش داخل ملاجئ فإنه لا يمكن مكافحتها بالآفات المستخدمة فى مكافحة بودة ثمار التفاح إلا إذا استخدمت الآفات المناسبة، وقد وجد فيما بعد أن ميعاد مكافحة بودة ثمار التفاح هو نفس الميعاد الذى يصلح لمكافحة لآفة أوراق البرتقال نون ما حاجة إلى استخدام برنامج مستقل لمكافحتها شريطة أن يستخدم مبيد جيد الفعالية، ومن ناحية أخرى فإن إزالة الثمار المتبقية على الأشجار بعد إنتهاء عملية الجمع تعد من الطرق المتبعة فى مكافحتها ولكن الحشرة تقضى الشتاء فى أماكن أخرى غير الثمار المتبقية ولذلك قد لاتكون هذه الطريقة طريقة إقتصادية.

## ١٠ - ديدان الربيع والخريف الآكولة

الاسم العلمى للحشرة

أ - دودة الربيع الآكولة (*Paleacrita vernata* (Peck)

ب - دودة الخريف الآكولة (*Alsophila pametaria* (Harris)

رتبة حرشفية الأجنحة Oroler Lepidoptera

فصيلة الديدان القياسة Fam. Geometridae

سوف نناقش هاتين الحشرتين معا لأن إصابتهما للكمثرى متشابهة، وتختلف الحشرتان فى دورة حياتهما، ولكن يرقاتهما توجدان على الأشجار فى نفس الوقت من السنة، ولقد كانت هاتان الحشرتان من الآفات الرئيسية للكمثرى فى الماضى، ولكن المكافحة الكيماوية لدودة ثمار التفاح قللت من خطورتها، ويكفى برنامج مكافحة دودة ثمار التفاح فى كبح جماحهما.

### مظهر الحشرة

يتشابه الطور اليافع للحشرتين مع بعضهما إلى درجة كبيرة، فالإناث غير مجنحة لونها رمادى طولها نحو ٧ مم، والذكر مجنح لونه رمادى، يبلغ عرضه ١٢,٥ مم عند فرد الجناحين.

ويرقة النوعين تتطابق تماما مع يرقات فصيلة الديدان القياسية، وعند تمام النضج يبلغ طسول اليرقة ١٢,٥ مم ولونها أخضر إلى أخضر زيتونى، مع وجود أشرطة ذات ظلال مختلفة من اللون الأخضر على الجانبين أسفل الثغور التنفسية، والإختلاف الرئيسى بين النوعين هو وجود زوج ثالث من الأرجل الكاذبة على الحلقة البطنية الخامسة لدودة الخريف، أما دودة الربيع فلها زوج من الأرجل الكاذبة وينقصها الزوج الثالث.

## مظهر الضرر

تعتبر اليرقة أساساً من المغتذيات على الأوراق وتعمل على تفرن الأوراق Skeletonize، والإصابة الشديدة قد تسبب في تجرد الأشجار من أوراقها، وعلاوة على ذلك تهاجم اليرقات الثمار الصغيرة وتغتذى عليها محدثة بها ثقوباً عميقة، وحيث أن مهاجمة الثمار يحدث في بداية الربيع، فإن هذه الثقوب تندمل عند الجمع، ولكن يظهر على الثمرة المصابة ندبة مكان الإغذاء محاطة بمنطقة غائرة، وهذا الضرر يشبه ذاك التي تحدثه لآفة أوراق الفاكهة ولكن الديدان الآكلة تحدث أضراراً أفدح مما تحدثه لآفة الأوراق.

## الدورة الموسمية

تدخل الديدان الآكلة البيات الشتوى وهي في طور البيضة على الأغصان والفروع الصغيرة، ويوضع البيض في صفوف منتظمة ويكون واضح تماماً، يفقس البيض في الربيع وتغتذى اليرقات على الأوراق، وعندما يكتمل نمو اليرقات، تسقط على الأرض حيث تتعذر في التربة، تخرج الفراشات في الخريف وتتزاوج وتضع البيض الذي يدخل البيات الشتوى.

أما الودة الآكلة الربيعية فتدخل البيات الشتوى وهي في طور العذراء في التربة، وتخرج الفراشات في الربيع الباكر، حيث تتزاوج وتضع بيضها على هيئة كتل فوق الأغصان والأفرع، ويفقس البيض في نفس الوقت الذي يفقس فيه بيض الودة الخريفية ولهذا فإن يرقات النوعين تنشطان في وقت واحد، وعندما تصل يرقات الربيعية إلى تمام نموها تسقط إلى الأرض وتدخل في التربة وتتعذر، ولكل من النوعين جيل واحد في السنة.

## د- الآفات التي تصيب الأزهار والثمار

### ١١- تريبس الكمثرى

الاسم العلمى للحشرة (Uzel) *Teniothrips inconseuans*

رتبة الحشرات هدية الأجنحة Order. Thysanoptera

فصيلة ثريبيدى Fam. Thripidae

يبلغ طول الحشرة البالغة ١ مم ولونها بني قاتم إلى أسود، والأجنحة أفتح لونا خصوصاً عند قواعدها، ولون العين أحمر قاتم، اليرقات بيضاء، ويوجد حول نهايتها الخلفية من السطح

السفلى حلقة من الأشواك القاتمة، والبيض ميكروسكوبى، وتغرزه الأنثى بآلة وضع البيض تحت بشرة الأوراق وداخل أنسجة البزاعم.

### مظهر الضرر والإصابة

ينقسم الضرر الذى يحدثه تربس الكمثرى فى مظهره إلى قسمين: - فالحشرات اليافعة تغتذى على البزاعم الثمرية المفتوحة، مما يسبب جفافها ولا ينبثق عنها أزهارا، وبمجرد أن تصاب البزاعم تغرز صمغا وفى مثل هذه الحالة يقال عنها "البزاعم النازفة" وحالة النزيف هذه من السمات المميزة للإصابة بتربس الكمثرى. وتغتذى اليرقة أو التربس الأبيض على الثمار النامية، وهذا النوع من الإغذاء يؤدي إلى "جرب سطح الثمار" "Scabbing of fruit surface" ويصبح سطح الثمرة قليلى وتخرج الثمرة عن نطاق التسويق، وهناك مظهر من مظاهر الضرر أقل أهمية، ويتسبب عن غرز آلة وضع البيض فى عنق البرعم الزهرى، وهذه الثقوب التى تحدثها آلة وضع البيض قد تتسبب فى سقوط الثمار. ولا يكون هذا المظهر من مظاهر الضرر ذو أهمية إذا كانت درجة الإصابة عالية.

### الدورة الموسمية

يبعث تربس الكمثرى ببياته الشتوى وهو فى طور العذراء داخل خلايا يبنيتها فى التربة، تخرج الحشرات اليافعة للتربس فى مارس أو إبريل بمجرد أن تدفأ التربة، وتغتذى اليوافع جزئيا على البزاعم وتضع بيضها فى أجزاء الزهرة، يفقس البيض بعد ٧ أيام أو أكثر حسب درجة الحرارة، ويعرف الطور اليرقى بعد الفقس باسم "التربس الأبيض"، يغتذى أفراد هذا الطور على الثمار النامية التى تسقط على الأرض عند نضجها، تدخل اليرقة فى التربة وتبنى بها خلايا تدخل فيها وتظل ساكنة حتى تتعذر فى شهر سبتمبر أو أكتوبر.

### برنامج المكافحة

إن المبيدات المستعملة فى مكافحة بودة ثمار التفاح تفيد أيضا فى القضاء على يرقات التربس قبل دخولها فى التربة، وبذلك تخف شدة الإصابة بالتربس فى الموسم التالى.

ويوجد في الصيف عدة عوامل تعمل على الحد من كثافة تعداد التريبس، مثل إرتفاع درجة حرارة التربة أثناء فترة الطور اليرقى، كما أن سقوط الأمطار الغزيرة في الربيع قبيل خروج الحشرات اليافعة من التربة يهلك الكثير منها.

## هـ- الآفات الحشرية التي تصيب الأغصان والأفرع

### ١١- حشرة أشجار الفاكهة القشرية الأوروبية

الاسم العلمى للحشرة *Lecanium corni* Bouche

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

معظم الحشرات القشرية التي تصيب الكمثرى - مثل هذه الحشرة - لا ترتبط بعائل واحد، ولكنها تهاجم عددا كبيرا من أشجار الحلويات وتعرف الحشرة القشرية الأوروبية هذه أيضا باسم "حشرة المشمس القشرية البنية" وهي أكثر شيوعا على الفاكهة ذات النواة الحجرية ولكن وجودها على الكمثرى لا يكون بأعداد كبيرة.

#### مظهر الحشرة

الحشرة اليافعة ذات شكل نصف دائرى وطولها أكثر من عرضها، ولونها بنى لامع، ويبلغ طولها من ٣,٥ مم إلى ٩ مم، وشكل الحشرة اليافعة يختلف من حين لآخر، فربما كانت مدورة أو مطاوله، أو مفلطحة وذلك تبعا لحجم وشكل الفصن الذى تصيبه، ويختلف اللون أيضا من بنى مصفر إلى بنى قاتم جدا، والأطوار غير اليافعة بيضاوية الشكل بيضاء لأولوية وتوضع تحت قشرة الحشرة اليافعة.

## مظهر الإصابة والضرر

إن إغذاء الحشرات القشرية على الأجزاء الشجرية يسبب لها ضعفا عاما، ولكن هذا الضرر لا يكون ملحوظا، ولكن ضررها الأعظم هو إنتاجها لكميات كبيرة من الندوة العسلية التي تنساب فطيراتها ساقطة على الأوراق والثمار، يتبعها نمو الفطر الأسود الذي يطلع المجموع الخضري والثمار باللون الأسود، وتنتج الحشرة الندوة العسلية بكثرة في الربيع الباكر وهذا ما ينشأ عنه الضرر، في هذا الوقت، وتنتج الحوريات الزاحفة رذاذا دقيقا دقيق من الندوة العسلية في الصيف التي تغطي الثمار والأوراق بغشاء رقيق لزج وفي بعض المواسم تكون الإصابة بهذه الحشرة ضعيفة لدرجة لا ينتج عنها ضرر ملحوظ في بداية الموسم، ولكن الزاحفات التي تنشأ في نهاية الربيع تتكون بدرجة من الكثافة تمكنها من انتاج الندوة العسلية بكميات تكفي لتغطية الثمار بغشاء لزج.

## الدورة الموسمية

تبيت الحشرة بياتها الشتوي وهي في طور غير اليافع الموجود فوق الأغصان (شكل ١١٨)، وفي بداية الربيع تبدأ هذه الأطوار في الزيادة في الحجم وإنتاج الندوة العسلية، وفي مارس وإبريل تقترب الأطوار غير اليافعة من تمام النضج حتى تصل إلى مرحلة النضج التام في إبريل ومايو، ويوضع البيض بكميات كبيرة تحت قشرة الحشرة اليافعة، ويفقس البيض في يونية ويولية وتحرك الحوريات الزاحفة إلى الأوراق حيث تستقر وتبدأ في الإغذاء، وفي أكتوبر ونوفمبر وقبل سقوط الأوراق، تتحرك الزاحفات راجعة إلى الأغصان حيث تدخل في البيات الشتوي. وللحشرة جيل واحد في السنة، وتوجد نسبة عالية من وفيات الزاحفات على الأوراق في خلال أشهر الصيف، وتبقى منها نسبة ضئيلة على قيد الحياة، وتنتج الحشرات اليافعة كميات كبيرة جدا من البيض الذي تخرج منه الزاحفات ولكن فإن هذه النسبة العالية من الوفيات لا تؤثر في مجرى الإصابة، فالباقي على قيد الحياة منها كاف لتشكيل عدد لا بأس به من الحشرات القشرية.



(شكل ١١٨) الأطوار غير اليافعة (على اليمين) والأطوار اليافعة لحشرة أشجار الفواكه القشرية الأوروبية (على اليسار)

### برنامج المكافحة.

تتأثر الأطوار التي دخلت البيات الشتوى من هذه الحشرة تأثراً كبيراً بالمعاملة بالمبيدات الحشرية خلال فترة سكونها، ولذلك لا يجب تأخير المكافحة الكيماوية إلى ما بعد انتهاء فترة السكون، وذلك لأن الزاحفات متى بدأت فى النشاط والنمو فى بداية الربيع وعند إنبثاق الأوراق البرعمية. فإنها تكون فى غاية المقاومة لمعظم المبيدات، وعندما تصل الحشرات إلى هذا الطور، وحتى تتكون القشور وتبدأ فى إنتاج الزاحفات من جديد، فإنه لن يكون هناك سبيل إلى مكافحتها، وفى الصيف تكون الحشرات اليافعة وزاحفاتها أكثر حساسية للرش بالمبيدات، ولكن مبيقات هذا الرش يكون فى غاية الأهمية، فمن الضرورى أن ننتظر حتى يتم خروج الزاحفات جميعاً من البيض وتبدأ المعاملة، لأن معاملتها قبل ذلك وهى تحت قشرة الأم لاجدوى منه، وتلعب المتطفلات دوراً كبيراً فى تقليل أعداد هذه الآفة ويمكن معرفة الحشرة



القشرية المتطفل عليها، حيث أن لونها يتحول دائما إلى اللون الأسود، وفي أحيان كثيرة يكون في مقدور الطفيليات أن تخفض من تعداد هذه الحشرة إلى درجة لا تكون معها خطيرة، وحينئذ لا يكون هناك مجال لاستعمال المبيدات لأن استعمالها سوف يقضى على هذه الأعداء الطبيعية المفيدة.

## ١٢- الحشرة القشرية المرقطة Calico Scale

الاسم العلمي للحشرة *Lecanium cerasorum* Cockerell

رتبة الحشرات متشعبة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

بالرغم من أن هذه الحشرة أكثر شيوعا على الطلويات ذات النواة الحجرية، والجوز، إلا أنها عادة ماتتواجد على الكمثرى، ولكنها لا تكون من الكثرة بحيث تتطلب برنامجا خاصا للمكافحة، ولون هذه الحشرة وحجمها يجعلها مميزة جدا، فإنها وإن وجدت بأعداد قليلة فإنه يمكن ملاحظتها.

### مظهر الحشرة

الحشرة اليافعة لهذه الآفة كروية الشكل، قطرها نحو ٩ مم، ولونها بني قاتم يتخلله بقع بيضاء غير منتظمة على منطقة الظهر، وهذا المظهر البني المرقط بالأبيض اللامع يجعل هذه الحشرة مميزة للغاية (شكل ١١٩)، وأطوارها اليافعة بيضاوية الشكل مفلطحة لونها بني فاتح أوقاتم ويوجد عليها غطاء شمعي.

### مظهر الإصابة والضرر

إن الضرر الذي تسببه هذه الحشرة يشبه الضرر الذي تسببه الحشرة القشرية الأوروبية وإذا كان عدد الحشرات على الأغصان كبيرا، فإن ذلك سوف يؤدي إلى ضعف الشجرة،

ويتضاعف الضرر بإفراز الحشرة لرداذ من الندوة العسلية التي تتساقط على الأوراق والثمار وينمو عليها الفطر الأسود فيصبح لون الأوراق والثمار أسودا عفنا، وكما هو الحال في الحشرة الأوروبية، فإن الندوة العسلية تنتجها الطور اليافع لهذه الحشرة في فصل الربيع، والطور غير اليافع في فصل الصيف.



(شكل ١١٩) الحشرة القشرية المرقطة فوق فرع من شجرة الكمثرى

### الدورة الموسمية

تبيت الحشرة القشرية المرقطة بيئاتها الشتوى كحشرة قشرية ناضجة جزئيا فوق الأغصان، وفي الربيع الباكر، قبيل تكون البراعم تنمو الحشرة وتصل إلى مرحلة النضج في

شهر إبريل ومايو، ويوضع البيض بكميات كبيرة تحت قشرة الأنثى، ويفقس البيض عن حوريات زاحفة في نهاية شهر مايو، أو أوائل يونية، تتحرك الزاحفات نحو الأوراق حيث تستقر وتفتدى، وفي الخريف تتحرك الحشرات غير اليافعة راجعة إلى الأغصان لتقضى فصل الشتاء، ولهذه الحشرة جيل واحد في العام.

### برنامج المكافحة

تقضى الحشرة الشتاء وهي في طور غير اليافع الذي يتأثر أكثر من غيره بالمبيدات، فإذا أخرجت المعالجة حتى يستيقظ الحشرة من بياتها، فإن الحشرة سوف تبدأ في النمو قبل المعاملة وبعد أن يبدأ نموها في فصل الربيع فإنها تكون في غاية المقاومة لكافة المبيدات، ومعالجة الحشرة في فصل الصيف بعد أن يكون البيض كله قد تم فقسه هي طريقة فعالة أيضا، وفي جميع الأحوال فإن المتطفلات تستطيع أن تقلل من كثافة أعداد هذه الحشرة إلى ما هو دون المستوى الإقتصادي وتكون المعالجة الكيميائية عندئذ لافائدة منها، وعلى أي فإن برنامج استعمال المبيدات الكيميائية، أو المبيدات التي تتسرب من المناطق المجاورة أثناء الرش تؤدي إلى هلاك الأعداء الحيوية للحشرة وبذلك تحدث فورات خطيرة منها.

## ١٣ - الحشرة القشرية سان جوزية

الاسم العلمي للحشرة (*Aspidiotus (Quadruspidiotus) perniciosus* (Com,))

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية أو المدرعة Fam. Diaspididae

تصاب الكمثرى مثل غيرها من أشجار الطويات بهذه الحشرة ويمكن أن تكون هذه الحشرة خطيرة لأن إصابتها لا تقتصر على الأغصان والأفرع بل تمتد إلى الثمار، وتنتشر هذه الحشرة في جميع المناطق التي تزرع الكمثرى كما أن لها عدد كبير من العوائل الأخرى مثل أشجار وشجيرات الزينة، فضلا عن أشجار الفاكهة

## وصف الحشرة

الحشرة القشرية اليافعة دائرية الشكل وقطرها يصل إلى ١,٥ مم محدبة بعض الشكل، ولونها رمادي، ويوجد في مركز الغطاء القشري الصلب للحشرة جلد إنسلاخ لونه أصفر، والحشرة التي توجد تحت القشرة صفراء فاتحة اللون، ولها زوج من الفصوص، ويفيد لون الجسم الأصفر هذا في التمييز بين هذه الحشرة وحشرة الكمثرى القشرية الإيطالية ذات لون الجسم القرمزي، وغطاء الأطوار اليافعة لحشرة سان جوزيه أسود اللون، وذلك يشار إليها دائما على أنها الأطوار ذات القلنسوة السوداء.

## مظهر الإصابة والضرر

يؤدي غزارة الإصابة فوق الأغصان والفروع - وما يتبع ذلك من إغذاء هذه الحشرات على العصارة النباتية - إلى موت هذه الأغصان والفروع، ومن عادة هذه الحشرة أن تحتشد حول البراعم الخضرية للأغصان وتكون تجمعاتها عندئذ كبيرة جدا لدرجة أنها تغطي هذه الأماكن بالكامل، ومن العلامات المميزة للإصابة بحشرة سان جوزيه هو أحمرار الأنسجة النباتية حول أماكن الإصابة.

وفي الثمرة المصابة تحمر الأنسجة المحيطة بموضع الإصابة أيضا في شكل دائرة، وإذا كانت الإصابة شديدة على الثمرة فإن الثمرة تضمر وتصيب غير ذات قيمة، وفي الثمار الخضراء، مثل ثمار الكمثرى فإن هذه البقع الحمراء تكون واضحة جدا وتصنف الثمرة عند التسويق على أنها من السواقط، وعلى عكس الحشرات القشرية غير المدرعة، فإن هذه الحشرة لا تنتج ندوة عسلية، وتعد هذه الحشرة من آفات الأشجار الصغيرة ولا تلتفت إليها الإنظار عادة، ولهذا قد تتكاثر هذه الحشرة بدرجة تهدد الأشجار الصغيرة وربما قتلتها.

## الدورة الموسمية

تبيت هذه الحشرة شتويا على الأفرع والأغصان في أطوار متعددة، ولكن في الغالب يدخل البساتين الشتوى العمر الأول من الحورية ذات القلنسوة السوداء، وتظل هذه الحوريات في حالة خمول حتى نهاية شهر يناير أو بداية فبراير، وفي هذا الوقت تبدأ الحوريات في النمو وتحول

إلى العمر الثاني، وفي هذا العمر تفقد لونها الأسود ويصبح اللون رمادياً وفي خلال مارس وإبريل تنمو الحوريات حتى تصل إلى إناث وذكور يافعة، التي تنتج بعد التزاوج حوريات زاحفات إبتداء من شهر مايو ويستمر إنتاجها للحوريات حتى نهاية الخريف على عكس الأنواع الأخرى من الحشرات القشرية، وتلد إناث سان جوزية الحوريات، وتتداخل أجيال الصيف والخريف، ولذلك فإنه في فصل الشتاء تكون معظم أفراد الحشرة في حالة الأطوار غير اليافعة، وتتجول الزاحفات فوق الأغصان والفروع، قبل أن تثبت نفسها وحيث أن إنتاج الأفراد يستمر خلال فصلي الصيف والخريف فإنه يمكن انتشارها بوسائل عديدة مثل الهواء والطيور.



(شكل ١٢٠) الحشرة القشرية سان جوزية فوق أغصان الكمثرى

### برنامج المكافحة

حيث أن أجيال هذه الحشرة تتداخل في الربيع والصيف والخريف فإن نظم المكافحة تكون صعبة وغير فعالة جزئياً، لذلك كانت المعاملة بالمبيدات في الشتاء هي أفضل طرق المكافحة حيث تكون الحوريات في حالة خمول وتتأثر بالمبيدات بسرعة، وبعض الأطوار غير اليافعة.

خصوصاً تلك التي توجد فوق الأوراق والأغصان النامية النشطة تهلك قبل أن تصل إلى طور الياقة، وتهاجم المتطفلات الحوريات والياقات وتعمل على الحد من خطورتها، ولكن يحدث بين حين وآخر فورات خطيرة من هذه الآفة ذلك بسبب فشل مكافحة البيولوجية الطبيعية لأسباب غير معروفة

## ١٤ - حشرة الكمثرى القشرية الإيطالية

الاسم العلمي للحشرة (*Epidiaspis, pericola*) (Deiguer)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنح Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية (المدرعة) Fam. Diaspididae

بالرغم من إنتشار هذه الحشرة في جميع المناطق التي تزرع الكمثرى، إلا أنها لا تعتبر من آفات الكمثرى الرئيسية، وترتبط هذه الحشرة بالطحالب أو الأشنة Moss or lichens التي تختبئ تحت طيات القلف، ولاتلاحظ غالباً قبل أن يستشري ضررها، وأحياناً يفيد برنامج مكافحة الكيماوية للحشرات القشرية الأخرى في مكافحة هذه الحشرة.

### مظهر الحشرة

هذه الحشرة القشرية تظهر بكشل دائري (طور الأنثى الياقة) ذات لون رمادي فاتح إلى غامق، وفي مركز القشرة يوجد جلد إنسلاخ رمادي قاتم، وتحت القشرة يوجد جسم الحشرة ولونه أحمر قرمزي وهذا ما يميزها عن الحشرة سان جوزية، وقشرة الذكر اسطوانية الشكل بيضاء اللون وفي مركز القشرة يوجد جلد إنسلاخ أصفر اللون والقشرة التي تغطي الأطوار غير الياقة رمادية اللون ولكن لونها أفتح من لون قشرة الحشرات الياقة، وتوجد هذه

الحشرة غالباً مختبئة تحت الطحالب والأشنة ولا ترى إلا عند كشط هذه الطحالب أو الأشنة.

### مظهر الإصابة والضرر

لا يمكن تحديد الضرر الذي تسببه الإصابة بهذه الحشرة لأنها نادراً ما تتواجد بأعداد كبيرة، وإذا كانت أعدادها كبيرة فإنها تؤدي إلى ضعف الشجرة وضالة حجم الثمار، ولوحظ أن الأعداد الكبيرة من الحشرة المتواجدة في مكان واحد على الأفرع تسبب وجود حفرة في مكان تواجدتها على الفصن الصغير، وتتخصص هذه الحشرة في إصابة خشب الأشجار ولاتهاجم الثمار.

### الدورة الموسمية

لم تدرس بيولوجية هذه الحشرة دراسة كافية، وتبيت شتوياً وهي في طور اليافع، ولكن أحياناً يلاحظ وجود الأطوار غير اليافعة في الشتاء، وتوجد الحوريات الزاحفات في فصل الربيع وأوائل الصيف وقد يكون للحشرة أكثر من جيل واحد في العام، وعلى أي فإن الملاحظات تدل على وجود الحشرات اليافعة والحوريات معاً في فصل الصيف.

### برنامج المكافحة

إن استعمال المكافحة الكيماوية شتاء ضد الحشرات القشرية الأخرى وهي في طور السكون يكون كافياً لمكافحة هذه الآفة، ويساعد على إنتشارها تزامم الأشجار في البستان ونمو الطحالب والأشنة عليها، ولذلك فإن إستعمال المبيدات في فصل الشتاء سوف يؤدي إلى تدمير الطحالب والأشنة والوصول إلى الحشرات التي توجد أسفل منها.

ولا يعرف تأثير المفترسات والمتطفلات على هذه الحشرة، ولكن يعتقد أن هناك بعض العوامل الطبيعية تعمل على الحد من أعداد هذه الحشرة وجعلها دون مستوى الضرر الإقتصادي.

## ١٥ - نطاط الأشجار الجاموسة Buffalo tree hopper

الاسم العلمى للحشرة *Stictocephala bubleus* (Fab)

رتبة متشابحة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة نطاطات الأوراق Fam cicadellidae (Jassidae)

سبق شرح مايتعلق بهذه الحشرة ضمن آفات التفاح، ويصيب هذا النطاط أشجار الكمثرى المزروعة فى أماكن مجاورة للغابات والأحراش وتصيب حوريات هذه الحشرة الشجيرات والعديد من النباتات التى تنمو فى المناطق البرية، وإذا ماعمرت هذه المناطق وزرعت بالبساتين فإن ضرر هذه الآفة يختفى.

هذا وقد سبق ذكر نورة حيار الحشرة ومظهر الإصابة والضرر وبرنامج مكافحتها ضمن آفات التفاح.

## ١٦ - حفار البرقوق الأمريكى

الاسم العلمى للحشرة *Euzophera semifuneralis* (Walker)

رتبة حرشغية الأجنحة

فصيلة بيراليدى Fam. Pyralidae

تتواجد هذه الآفة على أشجار الكمثرى، ولو أن لها عوائل أخرى، ولايعرف عن بيولوجية هذه الحشرة إلا القليل .

### مظهر الحشرة

يبلغ عرض الحشرة عند فرد أجنحتها نحو ١٢ مم، ولون الأجنحة الأمامية رمادى وبها علامات بنية وسوداء، وتشبه اليرقات التامة النموي رقات دودة ثمار التفاح حيث أن لونه يتراوح من الأبيض إلى القرمزى والرأس أسود.



## مظهر الإصابة والضرر

تهاجم هذه الحشرة مناطق مختلفة في شجرة الكمثرى مسببة لها الضعف العام. وهذه الحشرة ليست من الآفات الرئيسية إلا أنها في حالة مهاجمتها لوحداث التطعيم، تكون خطيرة حيث تقوم بمهاجمة أنسجة الكالوس Callous tissue وتغتنى اليرقة على الجزء الداخلى من القلف وتستطيع أن تتلف مقداراً كبيراً من الأنسجة، ولا تعرف العوامل التي تجذب هذا الحفار لمهاجمة أشجار الكمثرى، ولا تهاجم هذه الحشرة إلا الجنوع والأفرع الرئيسية لأشجار الكمثرى، وأحياناً توجد أعداد كبيرة منها تغتنى على أنسجة الأوراق النباتية وهذا النوع لا يضر بالشجرة وفقاً لما نعرفه عن هذه الآفة.

## الدورة الموسمية

يمكن العثور على اليرقات في معظم شهور السنة، مما يدل على أنها لها عدة أجيال متداخلة أو لها جيل واحد فيكون على مدى فترة زمنية طويلة، وتوجد اليرقات فقط في الجروح وأنسجة الأورام، وطعوم الكمثرى والأفرع الرئيسية، ولا توجد اليرقات أبداً داخل الأنسجة السليمة.

## برنامج

إذا ما حوفظ على أشجار الكمثرى في حالة صحية جيدة، وغطيت وحدات طعم الكمثرى حتى يتم إلتئامها، فإنه لن يكون هناك ما يشتكيه الزراع من هذه الآفة، ويجب حفظ جروح الطعوم من الإصابة بتعفير أماكن الجروح بمبيد مناسب.

## ١٧ - سوسة قلف أشجار الحلويات

الاسم العلمى (*Scolytus rugulosus* (Ratz)

رتبة غمدية الأجن order Coleoptera

فصيلة خنافس القلف Fam. Scolytidae

ويوجد منها في مصر نوع آخر هو *Ectoplegaster (Scolytus) aegyptiacus* ويسمى سوسة قلف أشجار الخوخ، وهذه الحشرة تصيب أشجار الحلويات عموماً ومنها الكمثرى، وتنتشر انتشاراً كبيراً في جميع مناطق زراعة الكمثرى في العالم، وقد سبق لنا تناول هذا

الموضوع في جزء سابق من هذا الكتاب، وتصيب هذه الحشرات أشجار الفواكه ذات النواه الحجرية أكثر من إصابتها الأشجار الكمثرى، وكذلك تصيب الأشجار غير المعتنى بها والضعيفة.

## وصف الحشرة

سبق في موضع سابق وصف هذه الحشرة ونوجزه فيما يلي:-

الخنافس اليافعة اسطوانية الشكل سوداء اللون لونها بني قاتم يصل طولها إلى ٢,٥ مم والأرجل لونها بني خفيف، واليرقات التامة النمو بيضاء اللون ذات رعوس صغيرة بنية اللون، واليرقات عديمة الأرجل وجسمها مقوس.

## مظهر الضرر والإصابة

ينشأ ضرر هذه الحشرة من إغذاء كل من الخنافس اليافعة ويرقاتها، فالخنافس تهاجم عادة قواعد البراعم حيث تحفر ثقوبا غير عميقة، وترد عليها الأشجار القوية بإفرازها لسيل من الصمغ توقف إعتدائها، وتحاول الخنافس أيضا أن تقتحم الأغصان والأفرع الرئيسية، وكما ذكرنا، إذا كانت الأشجار سليمة وقوية سوف تدافع عن نفسها بإفراز الصمغ وتمنع الخنافس من تكوين مستعمرات لها، ولكن الهجوم المستمر للخنافس على الأشجار يؤدي في النهاية إلى ضعف هذه الأشجار وفي الأشجار الضعيفة، تستطيع الخنافس أن تحفر حتى تصل إلى منطقة الكامبيوم وتبنى أنفاقها، وتصنع اليرقات أنفاقا تتفرع من النفق الرئيسي وتميل عليه بزوايا قائمة وتستطيع أن تقتل الغصن أو الفرع الرئيسي المصاب، وحتى ولو لم يقتل الفرع فوراً فإنه يصاب بالضعف ويصبح عرضة لإصابات متكررة ويموت في النهاية.

## الدورة الموسمية

سبق شرحها

## برنامج المكافحة

حيث أن هذه الحشرة تستطيع أن تصيب الأشجار الضعيفة بينما تقاوم الأشجار

القوية الإصابة، فإن من المنطق أن يعمل المزارع على تقوية الأشجار بالعناية بالرى والتسميد، وإزالة الفروع الضعيفة والميتة وحرقتها، وخصوصاً في فصل الشتاء.

هذا وقد سبق ذكر المكافحة لخنافس القلف في موضع سابق

## و- الآفات الحشرية التي تهاجم جذور أشجار الكمثرى

### ١٨ - من الكمثرى الصوفى

الاسم العلمى للحشرة *Eriosoma pyricola* Baker

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة المن Fam. Aphididae

تنتشر هذه الحشرة فى بساتين الكمثرى فى شتى مناطق زراعتها، ومع هذا فلا يعرف إلا القليل عن بيولوجيتها أو مدى الأضرار التى تسببها للخلط بينها وبين من التفاح الصوفى، وقد وجد أن هذه الآفة تهاجم الأشجار الصغيرة السن والحدائق الحديثة الإنشاء المزروعة فى كافة أنواع التربة وتحت أجواء مختلفة.

#### مظهر الحشرة

لون هذا المن أصفر مغبر أو أزرق والجسم مغطى بالشمع الأبيض ويوجد هذا المن على جنور الأشجار سواء الرئيسية منها أم الفرعية

#### مظهر الإصابة والضرر

لم يحدد بعد مدى الضرر الذى يسببه من الكمثرى الصوفى للأشجار، ففى البساتين الحديثة الإنشاء تسبب الإصابة ضعف الأشجار وبطء نموها وقلة إنتاجها، وربما يضاعف من هذه الأعراض التعرض لعوامل أخرى مثل إنشاء البساتين فى أراضى ضعيفة مثلاً، وفى

بعض المناطق لم تبدى الأشجار المصابة الجنور بهذه الآفة نقصا في النمو وكانت بنفس قوة الأشجار السليمة، ولكن توجد بعض التقارير العملية تفيد بأن الإصابة الشديدة بمن جنور الكمثرى الصوفى يمكن أن يصيب الأشجار بضعف شديد وقد يؤدي إلى موتها، وعلى أى حال فإن إصابة أشجار الكمثرى الحديثة العمر بمن الجنور الصوفى لا يكون عنيفا بدرجة تقتل الأشجار ولكنه ربما قلل من سرعة نموها.

وقد لوحظ أنه خلال فصل الصيف توجد حوريات ويوافع هذه الحشرة معا مما يدل على أن التكاثر يتم خلال هذه الفترة.

### برنامج المكافحة

حيث أن هذه الحشرة توجد تحت الأرض، فإن تدخين التربة بالمبيدات أو إستعمال المبيدات الجهازية التى تنتقل خلال الحزم الوعائية للأشجار حتى تصل إلى منطقة الجنور هى الطريقة الفعالة لمكافحة هذه الآفة، ولكافحة هذا المن على شتلات الكمثرى فى المشتل، يجب غمر جذور الشتلة فى محلول لمبيد فعال قبل زراعتها، ومن الملاحظ أن من الجنور الصوفى هذا يكون أقل ضررا بالأشجار إذا ما ظلت التربة رطبة، وإذا ماتلت الأشجار عناية لائقة فإنها سوف تقاوم الإصابة بهذه الآفة وتكافح هذه الحشرة كيميائيا كما فى من التفاح الصوفى.

## الآفات الحشرية التي تصيب اللوزيات

## الآفات الحشرية التي تصيب اللوزيات

### أولا الآفات الحشرية التي تصيب اللوز

يزرع اللوز في أقطار عربية عديدة منها سوريا ولبنان والعراق وسيناء مصر وساحل إفريقيا الشمالي، ويصاب اللوز بأكثر من ثلاثين نوعا من الآفات الحشرية والحلم، وهذه الآفات ليست قاصرة على اللوز بل من الممكن أن تهاجم أشجار الفاكهة الأخرى وخصوصا الكمثرى، وعلى أى فإن اللوز من العوائل الأكثر تفضيلا للعديد من الحشرات خاصة حفار ساق الخوخ، واستعمال المبيدات الكيماوية في مكافحة هذه الآفات والذي يبدو آمنا إذا ما استعمل على أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية، يجب أن يتبع كل الحذر في استعمالها لمكافحة آفات اللوز وذلك لطبيعته الخاصة ويمكن تقسيم الآفات الحشرية التي تصيب اللوز إلى أربعة مجموعات هي: الفراشات وبق النباتات، والحشرات القشرية، والخنافس الناحرة في الأشجار، وتعد مجموعة الفراشات من أخطر هذه المجموعات جميعا بالنسبة لمزارعي اللوز. ونبدأ بها هنا

### ١- الآفات الحشرية التابعة لرتبة حرشفية الاجنحة التي

تصيب اللوز order Lepidoptera

#### ١- حفار ساق الخوخ

الاسم العلمي للحشرة (*Anarsia lineatella* (Zell)

فصيلة كوسيدي Fam.Cossidae

مظهر الإصابة والضرر ووصف موجز للحشرة:

تعد هذه الآفة من أخطر الآفات التي تصيب أشجار اللوز، وفي كاليفورنيا في الولايات

المتحدة الأمريكية قدر أن الأضرار التي تحيق بأشجار اللوز من جراء الإصابة بهذه الحشرة تقدر بنحو ٨,٥ ٪ من مجموع الإنتاج.

وتصيب اليرقة أنسجة القشرة الخارجية للثمرة ونادرا ماتهاجم لحم ثمرة في الأصناف ذات القشرة (أو الصدفة) الصلبة، وفي حالة الإصابة الشديدة تدخل بعض اليرقات إلى داخل الثمرة وتدمر لحم الثمرة في الأصناف ذات الصدفة اللينة، وسطح اللب (أو اللحم الناضج) في الثمرة المصابة يكون مليئا بالحفر أو الأنفاق الضحلة وفي العادة تقضم اليرقة اللب في الطرفين الحادين من الثمرة محدثة به نقرا، ولم يعثر على اليرقة أو البودة النشطة في ثمار اللوز الجاف الموجود على الشجرة أو الثمار أو اللب المخزن.

ويمكن التعرف على يرقة حفار أغصان الخوخ من لون جسمها ومن عاداتها في الحفر في الأغصان، ويصل طول اليرقة الناضجة نحو ١٢,٥ مم ولها رأس أسود ولون جسمها بني محمر أو بلون الشيكولاتة، والغشاء اللين الذي يربط حلقات الجسم ببعضها (الغشاء البين حلقي) لونه بني شاحب، ولذلك يبدو الجسم وكأن به مناطق داكنة تتعاقب مع مناطق فاتحة اللون (شكل ١٢١) والطور اليافع من هذه الحشرة عبارة عن فراشة صغيرة الحجم، وفي أثناء النهار تستريح هذه الفراشة فوق جنوع الأشجار الظليلة وأفرعها الرئيسية، ومن الصعب تمييز هذه الفراشات في حالة الراحة لتناسق ألوانها مع ألوان قلف الأشجار وشقوقه.

### عادات الحشرة

تغذى يرقة هذه الآفة أساسا على الأغصان الغضة لأشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية وأشجار اللوز، وبعد خروج اليرقة من البيضة تبدأ في الحفر في سويقة وريقة في نور النمو قرب البرعم الطرفي، ثم تتحرك بعدئذ لأسفل لمسافة ٥ أو ٧ سم داخل قلب البرعم، وبعد ما تموت الأغصان التي تم الحفر فيها (شكل ١٢٢) ويمكن معرفة عدد حفارات الساق بعد القمم النامية بعد أن تكون اليرقة قد أتمت نموها.

واليرقات الصغيرة تبيت شتويا تحت قلف الأشجار الصغيرة، ومعظم هذه اليرقات تكون قد خرجت من البيض الذي وضعت إناث الفراشات في الأيام الأخيرة من موسم النمو، وهذه

وهذه اليرقات تنخر مباشرة فى القلف اللين للأغصان الصغيرة وتبنى فيها أنفاقا تسمى أنفاق التشيتية، وتصبح هذه اليرقات هلالية الشكل وتقضى الشتاء كيرقات صغيرة غير مكتملة النمو، ولهذا فإن من إستراتيجيات مكافحة الناجحة رش الأشجار بالمبيدات شتاء للقضاء على اليرقات وهى فى بيئاتها الشتوى .


وتخرج اليرقات من بيئاتها الشتوى فى أثناء موسم التزهير، والقليل منها يخرج مبكرا فى أواخر شهر يناير، ويبلغ خروج اليرقات من البيات ذروته فى خلال النصف الأول من شهر مارس ثم تتناقص أعدادها بعد ذلك، ولذلك فإن الجيل الأول لهذه الآفة والذي يهاجم أشجار اللوز هو من الأفراد التى نشأت فى الموسم السابق .

وفى ذروة موسم الإصابة وبعد إصابة المجموع الخضرى بشدة تنتقل اليرقات إلى مهاجمة البراعم الثمرية التى لم يتم تفتحها وبعد ذلك تقوم بالنخر فى الأفرع الأكبر سنا، ومن المفيد جدا أن نقوم برش الأشجار بالمبيدات لإبادة يرقات هذا الجيل وذلك أثناء تكون البراعم القرنفلية اللون أو مباشرة بعد سقوط البتلات، ولا ينبغى إستعمال المبيدات فى مكافحة أثناء فترة التزهير لأنها حينئذ تضر بالملقحات الحشرية اللوز .

وتنضج يرقات الجيل الذى سبق دخوله البيات الشتوى وتتحرك من المجموع الخضرى للأشجار فى خلال شهر إبريل، وهذه التحركات تنتهى فى أوائل مايو، وفى خلال شهرى إبريل ومايو تقوم اليرقات بغزل شرانقها الحريرية فوق جنوع الأشجار وتحول داخلها إلى عذارى تتحول إلى فراشات بعد ذلك، ويبدأ البيض الذى وضعت هذه الفراشات فى الفقس فيما بين ١٠ مايو، ٢٠ مايو ويرقات هذا الجيل الجديد تنخر الأغصان فى نهاية مايو وطوال شهر يونية، وإستعمال الرش فى هذه الفترة يعطى نتائج هائلة، ولكن يجب منع الرش فى هذه الفترة حتى لا يحدث تلوث بالمبيدات لصدقات الثمار والجيل الثالث للحشرة يبدأ الظهور فى أوائل يوليو، ويرقات هذا الجيل الثالث وربما الجيل الرابع تظهر بصفة مستمرة خلال فترة نضج الثمار والبعض منها يفتدى على ثمار اللوز الناضجة - ومكافحة هذه الأجيال الأخيرة عملية غاية فى الصعوبة ولا يمكن إجرائها .



- وأوصت وزارة الزراعة المصرية (١٩٩٢) بمكافحة هذه الآفة على أشجار اللوز كالآتى : -
- تعالج الأشجار ضد حشرة ثاقبة براعم اللوز (أو حفار ساق الخوخ) برشها مرتين بمبيد لبياسيد ٥٠٪ تركيز واحد فى الألف (الكمية المستعملة حسب حجم وعدد الأشجار) .
- المرّة الأولى عند بدء إنتفاخ البراعم (فى أول مارس) .
- والثانية بعد ٤ أسابيع من الأولى بنفس المبيد وبنفس التركيز .



(شكل ١٢١) غصن شجرة لوز مفتوح ويرى فيه نفق حفر يرقة حفار ساق الخوخ واليرقة موجودة بداخله.



(شكل ١٢٢) برعم طرفى فى شجرة لوز قتلتة يرقة حفار ساق الخوخ

## ٢- دودة البرتقال أبو سرّة Naval orange

الاسم العلمى للحشرة *Paramyelois transitella* (Wak)

فصيلة هليودينيدي Fam. Heliodinidae


تنتشر هذه الآفة فى مناطق زراعة اللوز فى كثير من الأقطار، وتوجد آفة مشابهة لهذه الآفة تنتمى لنفس الفصيلة فى مصر هى دودة الثمار *Stathmopoda auriferella* (walker) والأخيرة تغتذى فى مصر على البلح والنبق وأزهار المانجو ولكن لم ترد تقارير بإصابتها لثمار اللوز فى مصر وذلك لأن اللوز لا يزرع فى مصر إلا فى منطقة محدودة فى شبه جزيرة سيناء حفظها الله .

أما الحشرة الأولى فقد وجدت تهاجم ثمار اللوز والجوز فى الكثير من مناطق زراعته فى العالم.


## وصف الحشرة

فراشة ثمار البرتقال أبو سرّة فراشة صغيرة الحجم (عرضها عند فرد أجنحتها ١٥ مم) ولونها رمادي شاحب يتخلله علامات بنية وسوداء، (شكل ١٢٤) .

واليرقة التامة النمو يبلغ طولها نحو ١٩ مم ولونها قشدي، أو لحمي أو قرنفلي فاتح، إلا رأسها فلونه بني غامق، ويوجد على كل جانب من جانبي الحلقة الثانية من الجسم خلف الرأس شكل هلالى دقيق أو حدوة فرس على جدار الجسم لونها أسمر، وهذه الحدوة تحيط جزئياً بزوج من الشعيرات الدقيقة التى لا يمكن رؤيتها إلا بالعدسة المكبرة، وتوجد اليرقات فى ثمار اللوز (شكل ١٢٥) حيث تمتلأ الأنفاق التى تصنعها بكرات البراز وفتات من أجزاء الثمرة التى قامت بالنخر فيها .



(شكل ١٢٤) فراشة نودة ثمار البرتقال أبو سرّة



(شكل ١٢٥) بودة ثمار البرتقال أبو سرة داخل ثمرة لوز

## الدروة الموسمية

لا يعرف الكثير عن عادات الفراشات اليافعة لهذه الآفة، ولكن من المؤكد أنها لا تعيش في فصل الشتاء، ويوضع البيض قرب نهاية موسم الثمار، وتبيت اليرقات شتوياً داخل الثمار المصابة أو تلك التي لم يتم جمعها، ويمكن أن يعثر على اليرقات والعذارى معا داخل هذه الثمار (شكل ١٢٦) .

وهذه الحشرة لا تدخل في بيات شتوى حقيقي، ولكن درجة الحرارة المنخفضة تبطئ نموها، ولذلك فإن كثافتها العددية ترتبط بكمية الثمار التي تركت على الأشجار دون جمع أو الساقطة، وتضع الفراشات الإناث البيض في الربيع على ثمار اللوز، وتكاثر الحشرة مستمر طوال العام ولا يعرف عدد أجيالها في السنة .

## مظهر الإصابة والضرر

لا تستطيع يرقة هذه الآفة الحفر في قشرة ثمار اللوز الجافة، ولذلك فهي تصيب ثمار المحصول قبيل موسم الجمع عندما تبدأ قشرة الثمرة في الإنشقاق، والقليل من اليرقات ينضج

ويتحول إلى عذارى ففراشات قبيل الجمع، ولكن غالبيتها يستمر متواجدا في الثمار حتى جمعها حيث تحمل مع الثمار إلى أماكن التخزين .

وتتم اليرقات إغذائها ونموها داخل المخزون طوال فترة التخزين، وبذلك تستمر اليرقات في تدمير الثمرة بعد جمعها لفترة طويلة، وهذه اليرقات قذرة في معيشتها حيث تملأ الأنفاق التي تصنعها في لب الثمرة بفتحات الحفر والمواد البرازية وغزل حريري تفرزه (شكل ١٢٧) وعند تمام نضج اليرقة تترك الثمرة وتبحث عم مكان آمن تنسج فيه شرنقتها، وفي أثناء تجولها تفرز خيوطا حريرية تلتصق ثمار اللوز بعضها أو بالفرائر التي توجد بها الثمار.



(شكل ١٢٦) عذراء نودة ثمار البرتقال أبو سرّة داخل ثمرة لوز - لاحظ إستهلاك لب الثمرة بالكامل

## طرق المكافحة

أفضل طريقة لمكافحة هذه الآفة هي تدخين ثمار اللوز فور تخزينها أو وصولها إلى أماكن الاستهلاك، وهذه الطريقة تقضى على اليرقات الموجودة داخل الثمار، وتوقف إتلافها للثمار .

ومع هذا توجد بعض الإجراءات التي تحد من خطورة هذه الآفة وهي :

- ١ - جمع الثمار بمجرد إنشقاق الصدفة .
- ٢ - أن يكون الجمع شاملا ولا تترك ثمار نون جمع فوق الأشجار .
- ٣ - جمع الثمار الساقطة وإحراقها .
- ٤ - تدخين الثمار التي تشحن بالسفن داخل مخازن السفن لوقف تدهور الثمار .



(شكل ١٢٧) ثمار لوز دمرتها بودة البرتقال أبوسرة الثمار تم جمعها في منتصف إبريل

### ٣- لافة أوراق الفاكهة *Archips argyrospilus* (walk)

وهي تابعة لفصيلة تورتريسيدي، وسبق شرحها بالتفصيل عند ذكر آفات الكمثرى وفي

مواضع أخرى من هذا الكتاب ،وتصيب هذه الحشرة اللوز في نهاية فترة تكوين الغطاء Jacket period الثمرى ، ولهذه الحشرة عدد كبير من العوائل، وهى معروفة بأنها آفة المشمش الربيعية، وتضع الفراشة الأنثى البيض فى مجموعات تشبه الزراير، ويبدأ البيض الفقس فى شهر مارس أو إبريل، وتقوم اليرقات بقرض الأوراق ولغها فى لفات تدعمها بخيوط من الغزل، وتدخل اليرقات أيضا إلى داخل ثمار اللوز الصغيرة وتنخر فيها، وتنتهى الإصابة بهذه الآفة فى نهاية شهر مايو .

### ومن مظاهر الإصابة بهذه الآفة

وجود ثمار لوز جافة ضامرة، حجمها ثلث حجم الثمار الطبيعية ، ويوجد بها ثقب قذرة المظهر فى غرفة اللب ولكنها لا تنفذ إلى اللب نفسه، وعادة ما يوجد آثار من الخيوط الحريرية ودائرة من البراز تحيط بالثقب والإصابة بهذه الآفة خطيرة ولا تعد آفة رئيسية على اللوز، ورش المبيدات الذى يتم بعد سقوط البتلات يفيد فى مكافحتها .

## ٤ - حفار ساق البرقوق (أو ساق الكمثرى) الأمريكى

*Euzophera semifuneralis* (Walk)

وهى تابع لفصيلة بيراليدى، وقد سبق ذكره فى آفات الكمثرى، وتوجد يرقات هذه الآفة أحيانا داخل أنسجة الكالوس الصمغية فى الأورام الموجودة بالتاج، وأحيانا تسبب هذه الحشرة بعض المتاعب للشتلات والطعوم الجديدة، فالأنسجة التى تتكون حول جروح الطعم تجذب هذه الحشرة فتعمل على مهاجمة هذه الأنسجة وإفصال الطعم، ويدل على الإصابة بها وجود الإفراز الصمغى وكذلك وجود الخيوط الحريرية وبرازها البنى اللون، وللوقاية منها يجب إستعمال الشمع بوفرة لتغطية مكان الطعم وتعفير الشتلات المطعومة ببعض المبيدات الكيماوية الفعالة .

## ٦ - دودة ثمار التفاح *Cydia (Carpocapsa) pomonella* (linn)

وهى تتبع فصيلة الفراشات راتقة الأجنحة Fam. Aegeriidae وسبق شرحها بالتفصيل فى

مواضع شتى من هذا الجزء، وهى آفة رئيسية من آفات التفاح الكمثرى والجوز وأحيانا تصيب اللوز، ولكن ضررها محدود .

## ٦- دودة الدقيق الهندية

الاسم العلمى للحشرة *Plodia interpunctella* (Hbn)

وتتبع فصيلة فيسيتيدي، Fam. Phycitidec وهى آفة معروفة من آفات اللوز فى المخزن، وبالرغم من مهاجمتها لثمار اللوز وهى على الشجر، فإنها ليست ذات أهمية إلا عندما تهمل عندما يتم تخزين اللوز فى المستوعبات لمدة طويلة .

## ٧- بق النباتات

يصيب اللوز عدد من أنواع بق النباتات منها : -

بقة البيلسان *Leptocoris trivittatus* (sey)

التابعة لفصيلة ليجيدي Fam. lygaeidae

ورتبة نصفية الأجنحة Order . Hemiptera

وتصيب هذه البقة بساتين اللوز القريبة من غابات أشجار البلوط والبيلسان.

### وصف الحشرة

يصل طول الحشرة اليافعة نحو ١٢,٥ مم وهى إسطوانية رمادية اللون إلى سوداء، ولون الجسم تحت الأجنحة برتقالى محمر ويلاحظ هذا اللون عند طيران البقة، وتبيت هذه الحشرة شتويا وهى فى طورها اليافع، وتهاجم بساتين اللوز مباشرة فور إنبثاق البراعم، والهجرة



الكثيفة لهذه الآفة إلى بساتين اللوز تؤدي إلى تدمير المحصول، وتستطيع هذه الحشرة أن تتكاثر في بساتين اللوز وتضع بيضها وهو من العلامات التي تمكن من التعرف عليها، ويوضع البيض على سطح الأوراق أو الثمار، وتضعه الأنثى فرديا أو في مجموعات مكونة من بيضتين أو ثلاث، وتوضع بيضة أو ثنتين عادة في الإنخفاض الضحل الموجود قرب النهايات المدببة للثمرة.

وحوريات هذه البقعة لونها برتقالي محمر ويستمر هذا اللون كذلك حتى منتصف فترة نموها، وتستمر الإصابة على أشجار اللوز حتى أول يونية (شكل ١٢٨) .



(شكل ١٢٨) بق البيلسان فوق ثمار اللوز في شهر مايو

### الأضرار التي تسببها الحشرة

تلخص مظاهر الضرر الذي تسببه هذه البقعة لثمار اللوز في أمرين .

- ١ - تجف الثمار التي خرجت لفورها من الغلاف الجاف وأصابتها الحشرة ثم تسقط .
- ٢ - الثمار الأكبر قد تحمل بضع لساعات من هذا البق بدون أن تجف وتسقط، ولكنها تعاني بعد ذلك من الإفرازات الصمغية الداخلية .

أما لسعات البقعة التي تخترق الثمرة وتصل إلى اللب فإنها تسبب تفاعلات موضوعية حيث تكون اللب الحساس بقعة شفافة دائرية حول مكان السع، تجف هذه البقعة بعد ذلك ويتحول مكانها إلى مكان غائر قاتم اللون، وهذه المظاهر لا تظهر إلا عند فتح الثمرة لفحصها، ولا يظهر على الثمار المصابة أى رد فعل للإصابة أو علامة على وجود التلف، ولكن فى شهر إبريل تبدأ بعض هذه الثمار فى إفران الصمغ بطولها على هيئة خيوط ملتوية، ويصل الضرر بالمحصول إلى مداه فى هذا الوقت (شكل ١٢٩) والمرحلة الحرجة للإصابة بهذه الآفة تمتد بعد عشرة أيام من سقوط البتلات حتى نهاية شهر إبريل . والمكافحة ترش أشجار اللوز فى وقت الإصابة بنى مبيد فعال ويكرر ذلك إذا لزم الأمر .



(شكل ١٢٩) ثمار لوز مصابة ببق البيلسان، ويبدو على الثمار جهة الشمال البقع السوداء فى اللب، وعلى اليمين يبدو الضرر أكثر وضوحا .

## ٨ - الحشرات القشرية التي تصيب اللوز

كقاعدة عامة، لا يتعرض اللوز للإصابة بالحشرات القشرية التي تصيب الفاكهة ذات النواة الحجرية، والتفاحيات، ولكن عند حدوث فورات شديدة من هذه الحشرات، قد يصاب اللوز ببعضها، وإذا حدث الإصابة، تصيب هذه الآفات النموات الحديثة في أشجار اللوز وتبطئ من نمو الأشجار وتؤثر على كمية المحصول. والأفرع الرئيسية التي تصاب بشدة تفرز الصمغ وتصاب بلفحة الشمس وتقتلها في النهاية، والحشرات القشرية التي يمكن أن تصيب اللوز هي «الحشرة القشرية سان جوزيه، وحشرة الزيتون القشرية والحشرة القشرية الأوروبية، وكلها سبق لنا شرح كل ما يتعلق بها في هذا الجزء من الكتاب .

## ٩ - الخنافس التي تصيب اللوز

أشجار اللوز القوية المعتنى بها لاتصاب إلا نادرا بالخنافس الناخرة ولكن خنافس القلف تصيب أشجار اللوز التي أصابها الضعف من جراء إصابة جنورها بالآفات أو من سوء الري (عدم كفايته) أو عند إصابة الأشجار بالحلم .

## ثانيا : الآفات الحشرية التي تصيب الجوز

يزرع الجوز (عين الجمل) في أماكن قليلة في العالم العربي منها سوريا ولبنان وجبال أطلس وفي بلاد الجزائر والمغرب، والمعروف من هذه الفاكهة في العالم الجوز الإنجليزي English walnut والجوز الفارسي Persian walnut، وتصيب أشجار هذه الفاكهة الكثير من الآفات الحشرية التي ربما قضى بعضها على المحصول، ونحاول هنا تعريف أغلب هذه الآفات وبيان أضرارها وطرق التغلب عليها، وكثرة هذه الآفات وتنوعها سوف تتبع هنا طريقة تسهل التعرف على هذه الآفات وفق تنظيم صمم على أساس تجميع كل الآفات التي تنتمي لرتبة حشرية واحدة مع بعضها وذلك لسهولة الشرح والتوضيح وفيما يلي نورد ذلك:-

أ- الآفات الحشرية التابعة لرتبة حرشفية الأضحة Order. Lepidoptera

### أ- دودة ثمار التفاح والكمثرى *Cydia pomonella* linn

سبق ذكر هذه الآفة تفصيليا في آفات التفاح والكمثرى، وتعد هذه الحشرة كذلك من أخطر الآفات التي تصيب الجوز، وتزيد الإصابة بها في حالة مجاورة بساتين الجوز لبساتين الكمثرى .

#### وصف الحشرة

سبق هذا الوصف فيما سبق في آفات التفاح والكمثرى .

#### مظهر الإصابة والضرر

تهاجم هذه الحشرة الجوز بشدة بالرغم مما يقال من أن الجوز ليس هو عائلاها المفضل، ويذكر البعض أن نشاط يرقات هذه الحشرة (الطور الضار) يتركز عند قاعدة تجمعات ثمار الجوز، ولكنها تبطن في دخول الثمرة ولا تفعل ذلك بالسرعة التي تدخل بها داخل ثمار التفاح أو الكمثرى، وقد أتضح أن سلوك هذه الآفة على الجوز هو نفس سلوكها على التفاح، ولكن مكافحتها على أشجار الجوز أمر غاية في الصعوبة .

وتختلف شدة إصابة الجوز باختلاف المناطق وكذلك باختلاف الأصناف، ومن أكثر أصناف الجوز تعرضا للإصابة الصنف بون payne وصف كونكورد concord، بينما صنف


فرانكويت-Franquette ومعظم الأصناف المتأخرة الإثمار لها درجات معقولة من المكافحة، وفي غياب المكافحة تصبح الإصابة شديدة جدا وربما أصابت ٥٠٪ من المحصول.

وقد إتضح أن اليرقات المبكرة للجيل الأول تستطيع أن تصيب المحصول، والثمار النامية لصنف بون عند عمل قطاع فيه، يكون محيطها في المتوسط نحو ١٢,٥ مم، ويمرور الوقت تبدأ قمى الثمرة في التصلب، فتدخل معظم اليرقات إلى الثمرة من موضع الكأس أو نهاية الزهرة (شكل ١٢٠، ١٢١). ومعظم يرقات الجيل الأول تدخل من هذه المنطقة، وبعد تصلب الصدفة الخارجية للثمرة، تقوم يرقات أكثر فأكثر بأخترق جانب أو قاعدة الثمرة، خصوصا إذا كان في العنقود الثمرى ثمرتين أو أكثر.

وجميع الثمار المصابة في وقت مبكر من الموسم تسقط أو تجف قبل الجمع، وبالرغم من أنها تمثل خسارة في المحصول، إلا أنها خسارة غير مؤثرة على المحصول الكلى، وفي منتصف يونية يحدث عادة سقوط كثيف لثمار الجوز التى أصيبت في وقت مبكر من الموسم، وفي حالة الإصابة الشديدة تصبح التربة تحت الأشجار خضراء اللون من جراء ماسقط عليها من ثمار.

وإذا أصابت اليرقة ثمرة نامية، فإنها تعمل على وقف نموها، وهذه الحالة يمكن ملاحظتها في (شكل ١٢٢) حيث ترى جميع الثمار المعروضة في الصورة في عمر واحد، وعينة الثمار هذه تم جمعها في نهاية شهر يونية، والثمار الموجودة في الصف لثانى في الصورة تمت إصابتها في منتصف مايو، وسقطت حديثا من فوق الشجرة، وفي شمال الصف العلوى، توجد ثمرة طبيعية، ويوجد بجانبها في نفس الصف ثمرتان إصابتهما حديثا، ومن المحتمل أن تكون الثمرتان الأخيرتان كانتا قد تقدمتا في النمو حين إصابتهما لتبقيان على الشجرة حتى ميعاد الجمع دون أن تسقطان ومن المؤكد أن الثمار التى تصاب بعد أن تتصلب الصدفة تماما، سوف تبقى معلقة بالشجرة حتى ميعاد الجمع، وهذه تشكل مشكلة في عزلها عن باقى الثمار السليمة للمحصول، وتتعرض الثمار المصابة للمزيد من الإصابة أكثر مما تعرض له الثمار السليمة، والصف السفلى من الثمار في شكل ١٢٣ منه ثمار جوز دخلتها يرقات دودة ثمار التفاح من خلال موضع الضرر الذى أنزله بالثمرة مرض لفحة الجوز، والصف السفلى لثمار سليمة دخلتها يرقات دودة ثمار التفاح من نهاية الكأس، (وشكل ١٢٤) عند قاعدة اثنين من الثمار النامية.

وبعد تصلب صدفة ثمرة الجوز فإن دودة ثمار التفاح نادرا ما تستطيع أن تقتحمها، ونتيجة لذلك فإن اليرقات تكمل نموها على القشرة تاركة صدفة الثمرة مبقعة تبقعا سيئا .



(شكل ١٣٠) ثمار جوز مشطورة نصفين لبيان يرقات ثمار التفاح الصغيرة والمسافة التي نخرتها في الثمرة في شهر مايو

وتستطيع اليرقات أن تنفذ بنجاح إلى داخل الثمرة من خلال الأنسجة الرخوة الموجودة عند نهاية حامل الثمرة، ويسبب قدرة اليرقات على إختراق غلاف الثمرة الأخضر The green husk فإنه يحدث في الثمرة المصابة تبقعا في الصدفة . وعلى أى حال فإن الإصابة المتأخرة لهذه اليرقات وبعد أن يكون غلاف الثمرة قد تشقق أو سقط فإنه من الممكن لهذه اليرقات أن تنفذ إلى الثمرة بلون أن يحدث أى تبقع .

وبعد أن تأخذ اليرقات طريقها إلى الثمرة، فإنه يمكن رؤية برازها عند نهاية حامل الثمرة،

وهذه الظاهر فضلا عن ظاهرة تبقع صدفة الثمرة من العلامات الدالة على الإصابة، وفى بعض الأحيان توجد بعض الثمار المصابة ولكن الثقب الذى دخلت منه اليرقة قد وجد فى موضع آخر غير الموضع المعتاد لدخولها وهو نهاية أو طرف حامل الثمرة، والسمات المميزة لإصابة الثمار بدودة ثمار التفاح يظهر فى شكل ١٣٥، ١٣٦، وتبدو فيه ثمار جوز قد تم فتحها لترى داخلها الدودة ومظهر الإصابة، وفى وقت الحصاد، تكون معظم اليرقات قد غادرت لثمار المصابة لتكمل دورة حياتها .



(شكل ١٣١) طرف برعم من براعم الجوز مشطور نصفين لإظهار ديدان ثمار التفاح الصغيرة والمسافة التى تعمقت فيها فى شهر مايو (مكبرة ٥ مرات)




(شكل ١٣٢) في الصف العلوي : الثمرة على الشمال ثمرة سليمة بينما الثمرتين الباقيتين في الصف بها آثار إصابة مبكرة . في الصف السفلي : ثمار سقطت على الأرض بسبب الإصابة في أوائل شهر مايو

والتي تقع الذي تحدثه بودة ثمار التفاح بغلاف الثمرة يمكن تفريقه بسهولة عن الضرر الذي تحدثه يرقات الآفات الأخرى التي تهاجم ثمار الجوز، حيث لا يوجد من هذه الآفات من يستطيع مهاجمة الثمار حتى يتشقق غلافها، وعلى ذلك فإن تبقي الصدفة لا يمكن أن يحدث إلا من الإصابة ببودة ثمار التفاح .

وحيث أن بودة ثمار التفاح تشكل خطورة على الجوز، فإنها تستطيع أن تصيب المحصول بخسارة جسيمة في وقت قصير ويمكن أن يصيب الجيل الأول من الحشرة ثمار الجوز بسرعة كبيرة مسببا خسارة في المحصول تصل نسبتها إلى ٢٠ - ٣٠٪ في خلال شهر واحد أو



أقل، ويسقط عدد كبير من الثمار المصابة على الأرض، وما يتبقى من الثمار المصابة على الأشجار حتى الحصاد تكون النودة قد أكملت إتلافها للب هذه الثمار (شكل ١٣٧).



(شكل ١٣٣) إصابة نودة ثمار التفاح لثمار الجوز النامية الصف العلوى : دخلت اليرقات من خلال جسم الثمرة أو من نهاية الكأس . الصف السفلى : دخلت اليرقة من جروح الثمرة التي نشأت من لفحة الثمار

### طرق المكافحة

#### ١ - المكافحة الطبيعية

تتأثر نودة ثمار التفاح - مثلها مثل الكثير من الآفات - بعوامل لمكافحة الموجودة في الطبيعة، وهذه العوامل قد تكون مهينة - أو قد لا تكون مهينة أحياناً - للحد من كثافتها العددية - وتندرج العوامل الطبيعية للمكافحة تحت عنصرين رئيسيين هما:


#### أ - العوامل المناخية

#### ب - العوامل البيولوجية


وعند ذكر العنصر الأول يمكن القول مثلا أن إرتفاع درجة الحرارة ودرجة الرطوبة الجوية أثناء تزواج الفراشات وعند وضعها للبيض تتسبب في هلاك نسبة كبيرة من هذا البيض وبالتالي كسر حدة الإصابة

ومن ناحية أخرى فإن الرياح الشديدة التي تطول فترة هبوبها قد تؤدي إلى هلاك الكثير من الفراشات والتأثير على درجة الإصابة.

وكذلك يمكن أن تكون العوامل المناخية ملائمة جدا للحشرة وتعمل على امتداد الإصابة بها إلى مسافات بعيدة.



(شكل ١٣٤) إصابة نموذجية لثمار جوز بنبودة ثمار التفاح حيث دخلت مكان دخول نبودة اليرقات عند قاعدة الثمار (الثمار مبكرة بعض الشيء)



(شكل ١٣٥) مظهر الإصابة المميز لدودة ثمار التفاح في ثمار الجوز عند الحصاد . الصف العلوي من الصورة يبين حوامل ثمار مصابة . والصف السفلي يبين التبقع النموذجي الذي سببه إغذاء الدودة على غلاف الثمرة- (الصورة مكبرة  $\frac{1}{4}$  مرة)


أما العوامل البيولوجية فتشمل الأعداء الحيوية من مفترسات وطفيليات موجودة في البيئة وهذه عند ملائمة الظروف قد تحد من خطورة الآفة إلى درجة كبيرة ومن هذه الأعداء الحيوية حشرات متطفلة ومفترسة وفطريات تسبب أمراضا لليرقات وكذلك الطيور التي تلتهم الكثير من الفراشات.

#### ب - المكافحة الزراعية والميكانيكية

وبتلخص هذه المكافحة في إزالة الثمار المصابة المتساقطة على الأرض وإحراقها، وكذلك يجب التخلص من أى شيء يمكن لليرقة أن تقضى فيه بياتها الشتوى. ومن هذه المكافحة أيضا جمع المحصول بمجرد نضج الثمار دون تأخير لتقليل نسبة الإصابة، وذلك لأن الثمار معرضة للإصابة حتى ميعاد الجمع.

### ج - مكافحة الكيماوية

قبل إجراء المكافحة الكيماوية، يجب إختيار الوقت الملائم لهذه المكافحة، وأفضل أنواع المكافحة هو ما يتم تنفيذه قبل أن تتمكن يرقات الجيل الأول من دخول الثمار، وتستعمل مصادد الفراشات كدليل على الكثافة العددية لفراشات الجيل الأول ومن ثم إتخاذ قرار إجراء المكافحة الكيماوية في الوقت الملائم.




(شكل ١٣٦) مظهر الإصابة المميز لنودة ثمار التفاح في ثمار الجوز وقت الحصاد (والصورة بالحجم الطبيعي) في الصف العلوى على الشمال يرى فيه ثقب دخول النودة في البرعم الزهرى أو الكأس وعلى اليمين يظهر في الصورة ثقب دخول النودة عند نهاية حامل الثمرة . في الصف السفلى مظهر إصابة نموذجي حيث ثقب الدخول أو الخروج قد نخر في الأنسجة الرخوة لنهاية حامل الثمرة

هذا وفي الولايات المتحدة، تتخذ درجة نمو ثمار الجوز كدليل بناء عليه يبنى عليه توقيت استعمال المكافحة الكيماوية، فلاتجرى أى مكافحة كيماوية قبل أن يصل قطر ثمار الجوز من ٣,٧٥ إلى ١ بوصة وهذه الطريقة منتشرة الآن ويعمل بها منذ زمن بعيد. ويختلف توقيت


المعالجة الكيماوية من موسم لآخر ومن منطقة لأخرى ففي المناطق الدافئة، تبدأ مكافحة الكيماوية متقدمة أسبوعين عن تاريخ إجرائها في المناطق الأكبر برودة.

ومن حيث عدد مرات المعالجة تفيد التقارير العلمية بأن المكافحة الجيدة ليرقات الجيل الأول تكفي وحدها حيث أن هذه المعاملة تؤدي إلى ضعف الجيل الثاني وعدم إقتصادية معالجته ويجب إستعمال المبيدات الفعالة الحديثة في مكافحة بودة ثمار التفاح وهذه المبيدات تتغير من وقت لآخر حتى لا تنتج أجيال من الحشرة مقاومة لفعل هذه المبيد أو ذاك.


ومن المبيدات الحديثة التي أنصح بإستخدامها مبيد أنثيو ٣٣ % بمعدل ١٠٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء وذلك حسب حجم وعمر الأشجار أو مبيد جاربونا ٥٠ % بمعدل ٣٠٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء، هذا مع إجراء الرش بالحجم الكبير Full coverage Spray حتي يعم سائل الرش جميع الأفرع وأجزاء الشجرة، والصورة المنشورة هنا (شكل ١٣٨) لجهاز رش يستطيع أن يغطي جميع أجزاء الشجرة برذاذ الرش.



(شكل ١٣٧) ثمرة جوز ناضجة - تم كسرها لبيان التلف المميز لإصابتها ببودة ثمار التفاح وترى البودة داخلها والصورة مكبرة مرتين



(شكل ١٣٨) أ - جهاز رش المبيدات المستخدم بكفاءة في معالجة أشجار الجوز والذي يغطي كل أجزاء الشجرة بالمبيد المستعمل .



(شكل ١٣٨) ب - جهاز رش يعمل بضغط الهواء - ذو كفاءة عالية

## ٢- دودة البندق Filbertworm

الاسم العلمى للحشرة (*Melissopus latiferreanus* (Wlsm)

فصيلة الثريتيدى Fam. Olthreutidae

هذه الحشرة تلى دودة ثمار التفاح فى خطورتها وضررها على أشجار الجوز.

### وصف الحشرة

يبلغ طول الفراشة عند الراحة ١٢,٥ مم، والأجنحة المفردة تبلغ ١٧ مم، (شكل ١٣٩)، ويبلغ حجمها نفس حجم دودة ثمار التفاح، ولكنها تختلف عن الأخيرة فى لون أجنحتها ومابه من علامات



(شكل ١٣٩) فراشة دودة البندق

ولون الأجنحة الأمامية بنى محمر أو برونزى مغبر، وعند منتصف طول الجناح الأمامى يوجد شريط عريض لونه نحاسى، وبالقرب من حافته يوجد شريط آخر أضيق من الأول ومتعرج ولونه أيضا نحاسى زاه، ولا يوجد على الأجنحة الخلفية أى علامات مميزة ولونهما أكثر سمرة من لون أجنحة فراشة ثمار التفاح.

ويوضع البيض منفردا فوق أو بالقرب من النبات العائل، والبيضة بيضاوية الشكل مفلطحة تشبه القشرة إلى حد ما ويصل حجمها إلى نصف حجم رأس الدبوس العادى، ويشبه بيض هذه الحشرة فى مظهره العام وحجمه بيض فراشة ثمار التفاح، وفور وضع البيض يكون لونه

أبيض شمعی، ولكن بعد وقت من النمو الجنینی داخل البیضة یصبح لونها غامقا، وقبیل الفقص یمكن رؤية الیرقة من خلال غلاف البیضة الشفاف.

### الیرقة أو الیسروع

یكون لون جسم الیرقة الحدیثة الفقس مبیضا ولون رأسها ولون درقة الصدر الأول كهرمانی، ویصل طول الیرقة التامة النضج نحو ١٢, ٥ مم، ولون جسمها أبيض أما الرأس فلونها كهرمانی، ویساعد لون جسم الیرقة الأبيض واللون الكهرمانی الواضح لرأسها فی تفريقها عن یرقة فراشة ثمار التفاح التي یميزها لون جسمها القرنفلی ورأسها التي ینتشر علیها علامات سوداء. وعند تمام نمو الیرقة تعذر حیثما وجدت أو قد تزحف إلى مكان آمن لتعذر فیهِ، وقبل التعذر تنسج الیرقة شرنقة حریریة تستقر فیها وتعذر داخلها، وفی البدایة یكون لون العذراء كهرمانی خفیف ولكن لونها یغمق تدريجیا حتی قبیل خروج الفراشة.

### دورة الحیاة الموسمیة:-

لهذه الحشرة جیلان وجزء من جیل ثالث فی العام، وتقضى الحشرة فترة البیات الشتوی وهی فی طور الیرقة داخل شرنقة من الحریر تصنعها لنفسها، وتوجد هذه الیرقات فی أنفاق مواد الغذاء التي أصابتها أو فی أى مكان آمن آخر، ووجد بعض الباحثین الیرقات المشتتیة فی الأوراق الجافة الملتفة الموجودة تحت الأشجار أو على سطح الأرض، أو داخل الثمار المتساقطة المصابة وتحت أنواع أخرى من الملاجیء. ووجد البعض الیرقات المشتتیة داخل شرانقها الحریریة على عمق بوصتین أو ثلاث داخل التربة.

وتعذر الیرقات المشتتیة فی الربیع إبتداء من منتصف إبریل حتی شهر یونیة، ولاتعذر كل الیرقات المشتتیة فی الموسم الأول بل قد یستمر بعضها یون تعذر حتی الموسم التالی.

ویمكن للحشرة أن تتربى على العید من العوائل منها البلوط والكریز وأشجار البندق البری والبندق والجوز واللوز، ولكن العائل الرئیسی لها فی الولايات المتحدة هو التفاح الأخضر حیث تتربى على أورام شجر التفاح الناشئة من إصابته بذبابة *Andricus californicus* (B.) التي تتواجد بأعداد كبیره على أشجار البلوط، وفی الوقت التي تخرج فراشات الجیل الأول لبودة البندق تكون أورام هذه الأشجار آخذة فی النمو والتكون السریع، وبعد التزاوج تضع فراشات هذه الآفة بیضها فوق هذه الأورام أو بالقرب منها، وبعد الفقس تحفر الیرقات



في الأورام حيث يكتمل نموها، وبعد تمام نموها تصنع اليرقة نفقا حتى حدود الورم ولكنها لا تكمل إختراق سطحه للخارج بعد ذلك تتراجع اليرقة قليلا إلى الخلف وتنسج شرنقتها التي تعذب داخلها، وعند فحص مثل هذه الأورام النباتية فإن الطبقة التي تتركها اليرقة تغطي نهاية النفق تبدو كثافة صغيرة مستديرة، وهذه القشرة الرقيقة صنعت هكذا لتسهل خروج الفراشة منها. وبعد خروج الفراشات تبدو جلود العذارى متدلية من فتحات الأنفاق. وبعد ذلك تتصلب الأنفاق وتصبح غير مناسبة لإغذاء وتربية اليرقات: وفي الصيف ينشأ جيل جديد من الأورام النباتية، وهذه الأورام مع غيرها من العوائل تشكل مادة تربي عليها الجيل الثاني من الحشرة وجزء من الجيل الثالث، واليرقات التي تدخل البيات الشتوى هي يرقات هذا الجيل.

### مظهر الإصابة والضرر

وتفيد تقارير البعض أن بودة البندق لا تستطيع أن تتربى على القشرة الخضراء لثمار الجوز، كما أنها لا تستطيع أن تخترق قشرة الثمرة حتى تبدأ هذه القشرة في الإنشقاق عند نضج الثمرة، ومن أجل ذلك يعتقد أن إصابة الجوز تنشأ من هجرة فراشات هذه الآفة من عوائل أخرى إليه ولاسيما البلوط وأورام أشجار التفاح، وبسبب عدم قدرة اليرقة على اختراق ثمار الجوز قبل أن تشقق قشرتها الخارجية، فإن صدفة الثمرة لا يحدث بها بقع مثل تلك التي أصابتها بودة ثمار التفاح. ومن ناحية أخرى فإن عدم تبقع الثمار المصابة يجعل من الصعب التعرف عليها بمجرد النظر، وتزيد الإصابة بهذه الحشرة كلما تأخر جمع المحصول وخصوصا لعادة فراشات هذه الآفة في الهجرة من العوائل الأخرى بأعداد كبيرة إلى بساتين الجوز كما أن هذه الفراشات تتواجد بكثرة أثناء فصل الخريف ولهذا فإن تأخير جمع المحصول يعرض الثمار للإصابة، ويبين (شكل ١٤٠) ثمرة جوز مصابة ببودة البندق.

### طرق المكافحة

#### المكافحة البيولوجية

قرر البعض أن لهذه الآفة نحو ١٣ من أنواع الطفيليات غشائية الأجنحة تتطفل على يرقاتها، كما يوجد نوع من الطفيليات اليرقية التي تنتمي لرتبة زوجية الأجنحة، وهذه الأعداء الحيوية هي المسؤولة من الحد من كثافة هذه الآفة إلى درجة كبيرة. المكافحة الزراعية

كما سبق أن ذكرنا لا تستطيع هذه الحشرة إصابة ثمار الجوز إلا بعد انشقاق القشرة

الخارجية للمثرة لذلك يجب جمع الثمار بمجرد نضجها حتى لا تكون معرضة للإصابة، ومن الطرق الأخرى للمكافحة تجفيف الثمار حيث لا تستطيع اليرقات الإغذاء على لب الثمار بعد تجفيفها، والجمع المبكر للثمار وعملية التجفيف المذكورة تستطيعان تخفيف الإصابة إلى درجة كبيرة جدا تجعل هذه الإصابة دون الحد الحرج للإصابة.

**أما المكافحة الكيماوية لهذه الآفة**

فليست مألوفة ولكن تكفى معالجة نودة ثمار التفاح بالمبيدات فى مكافحة هذه الآفة أيضا.



(شكل ١٤٠) ثمرة جوز ناضجة شطرت نصفين ليبان الضرر الذي أحدثته نودة البندق ذات اللون القشدي والرأس الكهرمانية اللون - ونرى اليرقة بالداخل (التكبير مرتين)

### ٣ - دودة البرتقال أبو سرّة (*Paramyelois transitella* (Walk)

سبق ذكر هذه الآفة ضمن آفات اللوز، وهى حشرة متعددة العوائل وقد سميت باسمها المألوف "نودة البرتقال أبو سرّة" فى حين أنها ليست من آفاته الرئيسية، ولكنها اكتشفت أولا على هذا البرتقال ومن هنا جاءت التسمية، وذكر الكثيرون بأن هذه الحشرة لاتصيب ثمار البرتقال أبو سرّة إلا بعد إصابة الثمار بعفن الثمار المسمى عفن الألترناريا *Alternaria rot* أو الثمار التى أصابها التلف بأى وسيلة.

ولكنها تعد من أخطر الآفات الى تصيب الجوز لدرجة هددت الصناعات القائمة على ثمار

الجوز في جنوب كاليفورنيا (1997) Armitage وزاد إنتشارها حتى أصبحت الآن توجد في جميع المناطق التي تزرع الجوز في العالم.


### وصف الحشرة

سبق وصف هذه الحشرة وأطوارها في آفات اللوز، ونورد هنا دراسات قياسية على أطوار هذه الحشرة المختلفة، ويبلغ طول الفراشة عند الراحة ١٦,٥ مم (شكل ١٤١) ولون الحشرة رمادي مفضض، والأجنحة الأمامية مزينة بخطوط ضيقة إلى متسعة متموجة سوداء اللون والبيضة بيضاوية مفلطحة، يشبه بيض دودة ثمار التفاح ويوضع البيض فرادى، وربما وجدت بيضتان أو ثلاث في مجموعة واحدة، والبيضة أصغر قليلا من رأس الدبوس والمحور الطولى للبيضة يبلغ نحو ٠,٠٤ بوصة بينما يبلغ المحور العرضي لها نحو ٠,٢٧ بوصة، ولون البيضة فور وضعها يكون أبيض لؤلؤي ثم يتحول إلى اللون الأحمر في خلال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة وذلك لنمو الجنين.



شكل ١٤١- الفراشة اليافعة لدودة البرتقال أبو سرة

ويرقة هذه الآفة أو اليسروع يبلغ طولها ٠.٦٢. ومن البوصة، ولونها قرمزي أو أحمر وتبدو للعين غير الخبيثة تشبه نودة ثمار التفاح ويتغير لون نودة البرتقال أبو سرّة تبعاً لنوع الغذاء الذي تلتهمه، وعندما تصل إلى تمام نموها يكون لون تلك اليرقة مبيضا أو يمكن أن يكون قرنفليا (شكل ١٤٢)، ويصل طول اليرقة عندئذ نحو  $\frac{1}{2}$  إلى  $\frac{2}{3}$  بوصة، ويمكن تمييز هذه اليرقة عن نودة ثمار التفاح أو نودة البندق من وجود منطقتين على السطح الظهري للحلقة الصدرية الثانية، وهاتان المنطقتان الكيتينيتان لونهما أسود وكل واحدة منهما على شكل هلال، والهلالان كل واحد منهما بعكس الآخر وهاتين المنطقتين الشيتينيتان موضحان تماما في شكل ١٣١، وقبل أن تصل اليرقة إلى تمام نضجها تقوم بغزل شرنقة حريرية متينة تعذر فيها.



(شكل ١٤٢) يرقة ناضجة من يرقات البرتقال أبو سرّة - لاحظ وجود منطقتين سوداوين كل على شكل هلال على الحلقة الصدرية الثانية (مكبرة  $\frac{1}{4}$  مرة).

يتم التعذر في الحقل عادة في أو بالقرب من الجوز المصاب وفي داخل المخزن يمكن

لليرقات أن تترك الجوز المصاب لتعذر في الخارج وليس من المعتاد أن توجد يرقات داخل الثمار، بل إنها تتحرك خارجة من الجوز المعبأ في أجولة، ولون العذراء يكون في البداية كهرماني فاتح ولكنه يصبح قاتما عند تحول العذراء إلى الطور اليافع.

### دورة الحياة الموسمية

تبعاً لما ذكره Bacon and Wade (1954) فإن دودة البرتقال أبو سرّة من الحشرات الرئيسية التي تعيش في الحقول، ويمكن لها أن تتربى في المخزن، وربيّت في المعمل دون أي صعوبة، ولها في كل عام عدد من الأجيال المتداخلة، والحشرة على أي حال حشرة كائنة نموذجية ولكن تحت الظروف المناسبة تصيب الجوز واللوز، وتتربى دودة البرتقال أبو سرّة بصفة رئيسية على الثمار النافذة وثمار الجوز التي تركت بعد الجمع معلقة بالأشجار، أو تلك التي تركت فوق الأرض، وعدد Ortiga (1950) عوائل هذه الحشرة وذكر منها اللوز والمشمش والتفاح والتين والتوت والبرتقال والكمثرى والخوخ والجوز، ومن النادر أن تشاهد الفراشات في الحقل، ولكن أثناء فترة الحصاد يمكن رؤيتها وهي مستقرة على جدران الحظائر أو مباني التعبئة، ويمكن أن تدخل بالصدفة إلى المصائد المطعمة المستخدمة في إصطياد فراشات دودة ثمار التفاح أو مصائد الذباب اليافع لآفة ذباب قشرة ثمار الجوز، وتبعاً لدرجات الحرارة تستغرق دورة حياة الحشرة من ٥ إلى أكثر من تسعة أسابيع، وفي الحقل تبلغ الحشرة أكبر كثافة لها خلال الصيف والخريف. وتبعاً لما ذكره Michellbacher & Ross (1955) فإن هذه الآفة تستطيع أن تعيش في فصل الشتاء خارج البيوت كيرقات في درجات مختلفة من النمو، حيث تكون الإصابة بهذه الحشرة كامنة وموجودة في الثمار المعلقة بالأشجار وداخل الثمار المختلفة فوق سطح الأرض، وفي الربيع والصيف، تكون هذه الديدان هي المصدر الرئيسي لعدوى المحصول الجديد، تكمل هذه اليرقات نموها وتتحول إلى الطور اليافع، وإناث هذه الفراشات تفضل أن تضع بيضها في أو بالقرب من البراز الذي دفعته اليرقات إلى الخارج، وعلى العموم فإنه في غياب أي إصابة سابقة بدودة ثمار البرتقال أبو سرّة فإن الإناث تقوم بوضع بيضها فوق غلاف ثمار الجوز التي تستطيع اليرقات التي تخرج من هذا البيض أن تخترقه، وفي نهاية الموسم عندما تبدأ أغلفة الثمار في التشقق عندما تصل هذه الثمار إلى مرحلة النضج، تستطيع اليرقات عندئذ أن تنفذ داخل الثمار بنخرها في الأنسجة الرخوة

الموجودة عند الطرف القاعى، وكذلك عندما تنشق أغلفة الثمار فقد يوضع البيض على صدفة ثمار الجوز فضلا عن الأغلفة ذاتها.

وذكر كل من Michel Bacher (1950), Ortega (1950) أن ثمار الجوز المصابة باللفحة أو تلك التى بها مساحات مصابة بحرق الشمس Sunburned لاتجذب فراشات بودة البرتقال أبو سرّة لوضع البيض عليها ولاتلعب أى دور فى إيكولوجية الحشرة، والثمار التى خلّفت على الأشجار أو تلك الموجودة من أعوام سابقة هى المصدر الرئيسى للعدوى بما تحمله من يرقات الحشرة بداخلها خلال فصل الشتاء والربيع والصيف ومنتظر حتى تقوم آفة بودة ثمار التفاح بإصابة ثمار المحصول الجديد أو حتى تبدأ أغلفة الثمار الخارجية فى الإنشقاق وحينئذ تستطيع بودة البرتقال أبو سرّة أن تدخل الثمار مباشرة، وقد تآتى العدوى للجوز من عوائل أخرى، فتهاجر هذه الآفة من هذه العوائل إلى بساتين الجوز، وهذه حقيقة ملموسة عندما تكون بساتين الجوز قريبة من بساتين اللوز المصاب أو غيره من مزارع الفواكه التى توجد بها ثمار مهملة أو ساقطة، ولهذا السبب فإن بساتين الجوز القريبة من المساكن تكون إصابتها شديدة بهذه الآفة.

### مظهر الإصابة والضرر

تظل ثمار الجوز السليمة خالية من الإصابة حتى تبدأ قشرة الثمار الخارجية فى التشقق قرب النضج، ومن هذه اللحظة تبدأ إصابة الثمار وتستمر الإصابة فى المخزن إذا لم يتم تدخينه، وإلا أكملت اليرقات دورة حياة الحشرة فيه، وتتكرر العدوى وبسبب عدم قدرة اليرقة على اختراق الثمار قبل أن تبدأ القشرة الخارجية للثمرة فى التشقق، فإن الإصابة لا ينتج عنها تبقع الصدفة، والإصابة هنا تماثل الإصابة بدودة البندق، وعدم تبقع صدفة الثمار المصابة يجعل من الصعب جدا التعرف على الثمار المصابة من شكلها الظاهري، والطريقة الوحيدة للتعرف على الإصابة هى فتح الثمرة، وإصابة الثمار المخفية هذه تسبب مشاكل كثيرة عند تسويق ثمار الجوز.

وتزيد الإصابة كلما تأخر جمع المحصول حيث أن مصدر الإصابة يكون فى الفراشات

المنتشرة، والتي تصيب ثمار المحصول الذي تأخر جمعه دون أن تكتشف الإصابة بها، ولذلك يجب جمع المحصول بمجرد نضج الثمار.



هذا ويمكن أن تصاب الثمرة الواحدة بأكثر من يرقة (شكل ١٤٣)

(شكل ١٤٣) ثمرة جوز تم فتحها لإظهار مدى الضرر الذي أحدثته يرقات بودة البرتقال أبو سرّة (الصورة مكبرة ١,٥ مرة)

وقد وجد البعض ٣٧ يرقة داخل ثمرة واحدة ويقول إنه ليس من غير المعتاد أن يوجد في الثمرة الواحدة ٨ أو ٩ يرقات ووجود أكثر من اليرقة في ثمرة واحدة عند الحصاد هي من الظواهر التي تؤكد إصابة الثمرة ببودة البرتقال أبو سرّة كذلك من مظاهر الإصابة وجود الغزل الحريري التي تفرزه اليرقات مع كمية كبيرة من برازها، وعند الإصابة الشديدة ربما الصقت ثمرتان ببعضهما بواسطة الغزل الحريري، وإذا كانت الثمار معبأة في غرائز، فإن هذه الغرائز تكون ملبدة بالغزل الحريري وتحتوى على كميات كبيرة من الشرانق الحريريّة التي تصنعها اليرقات.

## طرق مكافحة

ولا يوجد حتى الآن حتى وسيلة خاصة فعالة لمكافحة هذه الآفة كيماوياً، ولذلك فإن أفضل طرق مكافحة لهذه الحشرة في الحقل يتوقف كثيراً على المكافحة الطبيعية والمكافحة الزراعية، ونورد هنا ما يلي:

### المكافحة الطبيعية

لا يعرف لهذه الآفة أعداء طبيعية كثيرة، ولكن Ortega ذكر أنه وجد الطفيل *Microbracon hebetor* (Say) يتطفل على اليرقات.

### المكافحة الزراعية:

تتلخص هذه المكافحة في كسر السلسلة الغذائية لهذه الحشرة وذلك بجمع الثمار الساقطة على الأرض والمتخلفات الأخرى وإحراقها، كذلك يجب جمع الثمار المتبقية على الأشجار بعد الجمع وإعدامها، ومن أفضل طرق المكافحة جمع محصول الثمار بمجرد النضج لأن هذه الآفة لاتصيب الثمار أن بعد تفسخ قشرتها الخارجية قرب النضج.

### المكافحة الكيماوية

ذكر الكثيرون أن من أفضل وسائل المكافحة الكيماوية هي تدخين الثمار المخزنة في المستودعات بغاز بروميد الميثايل، وتجرى هذه العملية بعد جمع المحصول وتخزينه مباشرة، والتدخين ببروميد الميثايل لا يفيد في مكافحة هذه الآفة فحسب، بل يفيد أيضاً في مكافحة آفات المستودعات الأخرى.

كذلك يجب تعفير أرضية المخزن وجدرانه بمبيد فعال وذلك قبل تخزين الثمار فيه وذلك لقتل الفراشات التي تخرج وتستريح فوق الجدران أو أطوار الحشرة الأخرى التي تتواجد على أرضية المستودع.

## ٤- اليسروع ذو السنام الأحمر Red-humpeed catterpillar

الاسم العلمي للحشرة (*Schizura concinna* (A. & S.))



### فصيلة ليمانترييدي Fam. Lymantriidae

تعد هذه الحشرة من أهم الآفات التي تسبب تجريد شجر الجوز من الأوراق، وقد سجلت كافة من آفات الجوز منذ عهد بعيد (Vosler, 1913)

#### وصف الحشرة

فراشة هذه الحشرة لونها بني محمر إلى رمادي ويصل عرضها عند فرد أجنحتها نحو ٣,٥ سم، والأجنحة الأمامية لونها محمر والأجنحة الخلفية لونها رمادي خفيف، ولا يوجد على أجنحة الأنثى أى علامات أو توجد علامات قليلة، بينما أجنحة الذكر أمامية عليها علامات ملونة، وقرن إستشعار الأنثى خبطى بينما قرون إستشعار الذكر ريشية.

#### البيض

تضع الفراشة الأنثى بيضها فى مجموعات مكونه من ٢٥ - ١٠٠ بيضة، والبيضة دائرية الشكل ولونها أبيض لؤلؤى، ويوضع البيض على السطح السفلى للأوراق (شكل ١٤٤)، وقطر البيضة يصل ١,٥ مم.


واليرقة أو اليسروع الكامل النمو يبلغ طوله نحو ٣,٨ سم واليرقة مظهر ملفت للنظر فقاعدة الجسم لونها أصفر والجسم مزركش بأشرطة طولية لونها أبيض أو أبيض محمر، ولون الرأس والحلقة الرابعة أحمر زاه، ويوجد على الحلقة الرابعة سنام، ويخرج من حلقات الجسم زوائد سوداء، وزوج الزوائد الموجودان على السنام هما أكبرها.

وعذراء هذه الحشرة لونها كهرمانى غامق، وهى توجد داخل شرنقة حريرية تبني فى التربة أو توجد مغطاة بالركام لموجود على الأرض.

#### الدورة الموسمية

بالرغم من أن هذه الآفة آفة متعددة العوائل إلا أن دورة حياتها ليست معروفة بدقة، وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث، ولكن ذكر البعض أن لها ثلاثة أجيال فى العام فى كاليفورنيا، وتمضى هذه الحشرة فصل الشتاء وهى فى طور اليرقة، وهى فى مرحلة ما قبل العذراء وموجودة داخل شرنقة حريرية، وفترة التشرنق تحدث فى فصل الربيع وتخرج الفراشات فى

شهر مايو حيث تتزاوج وتضع البيض وبعدها تظهر يرقات الجيل الأول، وتكمل اليساريع نموها في شهرى مايو ويونيه ثم تسقط على الأرض وتعذر فى التربة أو فى الركام، وتخرج الفراشات فى شهر يولية وأغسطس، التى تتزاوج وتضع البيض الذى تخرج منه يرقات جيل الصيف، وعندما يكمل نمو يرقات جيل الصيف تسقط على الأرض وتحفر فى التربة حيث تبني شرانقها الحريرية التى تتحول فيها إلى طور ما قبل العذراء وتقضى فصل الشتاء وهى فى هذا الطور، ولكن بعض يرقات جيل الصيف تكمل مراحل تطورها وينشأ منها الجيل الثالث، وتكمل يرقات هذا الجيل نموها فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، ثم تسقط من فوق الأشجار على الأرض وتحفر فى التربة وتبني الشرانق الحريرية وتقضى داخلها فصل الشتاء فى طور ما قبل العذراء.



شكل ١٤٤ - بيض فراشة اليسروع نو السنام الأحمر على السطح السفلى لورقة جوز وبعض هذه البيض فقس وخرجت منه يرقات

## مظهر الإصابة والضرر

تصيب هذه الحشرة العديد من المحاصيل فضلا عن الجوز، وتشمل هذه المحاصيل التفاح والمشمش والكمثرى والبرقوق فضلا عن عدد من المحاصيل غير البستانية، ويحدث معظم الضرر من جيل الصيف الذي يمكن ليرقاته أن تجرد الأشجار من أوراقها (شكل ١٤٥) إذا ما تركت الإصابة الشديدة بها دون مكافحة، وفي بعض الأحيان تتبعثر الإصابة الشديدة على أفرع متفرقة كما في شكل (١٤٦).



(شكل ١٤٥) شجرة جوز صغيرة جردتها اليساريع ذات السنام الأحمر من أوراقها

وعند الإصابة الشديدة، تصبح الأرض الموجودة تحت الأشجار مغطاة بحطام الأوراق التي تسقط أثناء إغذاء اليساريع، وفور فقس البيض وخروج اليرقات الصغيرة، تقوم هذه بالاغتناء على السطح السفلي للأوراق، ومن عادة هذه اليرقات أن تحتشد مع بعضها وتقوم بالإغتناء كمستعمرة (شكل ١٤٧) ويعد أن تكبر في الحجم، تميل هذه اليرقات إلى التفرق، وتستهلك اليرقات الكبيرة كل نصل الورق ولا تترك إلا العروق الخشبية، وبعد تجرد الشجرة من أوراقها

تتعرض الثمار النامية إلى حُرقة الشمس، وإذا حدثت إصابة شديدة في بداية الموسم وجردت الأشجار من أوراقها، فإن ذلك ينبه الشجرة إلى إخراج كمية كبيرة من النموات الحديثة ولا يكون لدى هذه النموات الوقت الكافي لكي يكتمل نموها وتتعرض بعد ذلك لبرد الشتاء وتموت.




(شكل ١٤٦) - فرع صغير من شجرة جوز جرد من أوراقه بواسطة اليساريع ذات السنام الأحمر لاحظ أن كل الأوراق قد التهمت ماعدا العروق الخشبية

## طرق المكافحة

لمكافحة الطبيعية:- تلعب العوامل المناخية والأعداء الحيوية دورا هاما في الحد من الكثافة العددية لهذه الآفة وبالتالي الحد من خطورتها، ويذكر Hoffman (1953) أن هناك علاقة مباشرة بين درجات الحرارة في فصل الشتاء وبين أعداد حشرة اليسروع ذو السنام الأحمر التي تستطيع أن تكون فراشات الربيع، ويعتقد أن فورات هذه الحشرة ترتبط بالشتاء الدافئ.

وتلعب الأعداء الحيوية دورا بالغ الأهمية في مكافحة هذه الآفة حيث يهاجمها عدد كبير من

هذه الأعداء تأتي المتطفلات منها في المقدمة، ويعتقد أن الأعداد الحيوية هي المسؤولة عن إنقاص الكثافة العددية لهذه الآفة لتصل إلى مستوى غير إقتصادي في كثير من المناطق ويهاجم هذه الحشرة عدد من الطفيليات من رتبة غشائية الأجنحة منها الطفيل- Hyposoter fu gitvus (Say) كما هو واضح في (شكل ١٤٨- أ)، والكثير من الزبابير المتطفلة الأخرى من براكونيدي Braconid تتطفل على اليرقات ويرى في (شكل ١٤٨- ب) يرقة قتلها أحد هذه الزبابير.



(شكل ١٤٧) عادة تجمع اليساريع والسنام الأحمر في أعداد كبيرة وإغذائها بهذا الشكل على العائل


#### المكافحة الزراعية

تلعب المكافحة الزراعية فضلا عن المكافحة الكيماوية دورا هام في الحد من خطورة هذه الآفة، ويسبب عاداتها في الإحتشاد فيمكن قطع الفرع الذي تحتشد عليها أفراد مستعمرة وإعدامها أو جمع أفراد المستعمرة باليد وإحراقها.

ولأن اليساريع ذات السنام الأحمر هي من الحشرات المجردة لأوراق الأشجار فإن السهل القضاء عليها باستعمال جرعات صغيرة من أى مبيد فعال، ومن النادر أن تستخدم المبيدات ضدها خاصة في أى بستان. بل إن المعالجة الكيماوية لأى من الآفات الأخرى تفيد في مكافحة هذه الآفة.



(شكل ١٤٨-ا) اليساريع ذات السنم الأحمر وقد دمرها تطفل الطفيل *H. fugivas* عليها وهو أحد الزبابير المتطفلة عليها (مكبرة مرتين)



(شكل ١٤٨-ب) يسروع ذات سنم أحمر وقد دمره تطفل طفيل من مراكونيدى عليه (مكبرة ٤ مرات)

## ٥ - لافة أوراق أشجار الفاكهة

تنتشر لافة أوراق الفاكهة *Archips argyrospila* (Wik) في مزارع الفاكهة في كثير من الأقطار، وقد سبق لي ذكرها بالتفصيل في مواضع سابقة من هذا الكتاب وهي تصيب الجوز وكثير من أنواع الفاكهة الأخرى فضلا عن أشجار الظل ونباتات الزينة، وهذه الحشرة من مجردات الأشجار من الأوراق بصفة رئيسية ولكنها يمكنها أن تصيب الثمار النامية بخسائر جسيمة.

### وصف الحشرة

تم وصف جميع أطوارها في السابق كذلك ذكر دورة حياتها.

### مظهر الإصابة والضرر

في معظم مناطق زراعة الجوز لا تشكل لافة أوراق الفواكه خطرا كبيرا، ولكن يمكن وجود أضرار في أماكن متفرقة من البستان، ويمكن ملاحظة الإصابة بها قرب الجذع والأفرع الكبيرة، وإذا حدثت إصابة شديدة فيمكن أن تجرد الأشجار من أوراقها، ويحدث الضرر في أوائل الموسم خلال شهرى إبريل وأوائل شهر مايو (أنظر شكل ١٤٩ - أ، ١٤٩ - ب)

### طرق المكافحة

تقوم الأعداء الحيوية الكثيرة بمهاجمة لافة أوراق الفاكهة والحد من خطورتها، ولاتكافح هذه الآفة كيماويا بصفة خاصة ولكن المكافحة الكيماوية للآفات الأخرى تفيد في مكافحتها بشرط أن تتم هذه المكافحة في بداية شهر إبريل، وحيث أن هذه الآفة يكتمل تطورها عادة قبل أن تبدأ مكافحة بودة ثمار التفاح، ولذلك فإن المكافحة الكيماوية لبودة ثمار التفاح لاتفيد في مكافحة هذه الآفة.



شكل ١٤٨ - أ- إصابة أوراق أشجار الجوز وثماره الصغيرة بلافة أوراق الفاكهة في بداية الموسم



شكل ١٤٩ - ب- أوراق طويت جوافها بفعل يرقات لافة أوراق الفاكهة، وألصقت اللغات ببعضها بالغزل الذي تفرزه اليرقة وداخل هذه الطيات تعذر اليرقات داخل غزل رقيق (نحو نصف الحجم الطبيعي)



## ٦- دودة الجوز القياسة

الاسم العلمي للحشرة *Coniodes plumogeraria* (Hulst)

فصيلة الديدان القياسة Fam. Geometridae

تصيب يرقات هذه الآفة أوراق أشجار الجوز وتكون أحيانا خطيرة، وتصيب هذه الآفة أشجار الزيتون والبلوط هذا فضلا عن اللون، كذلك تهاجم التفاح والبرقوق وغيرها من أشجار الفاكهة

### وصف الحشرة

الفراشة الأنثى ذات لون بني يميل إلى الرمادي، غير مجنحة طولها ١٢,٥ مم وسطح البطن السفلى لونه رمادي فاتح والسطح العلوي للبطن يشوبه اللون البرونزي، والذكر مجنح وعرضه عند فرد الجناحين ٣٢,٥ مم وأجنحة الذكر لونها رمادي مفضض، وكل جناح من الجناحين الأماميين يوجد عليه أربعة شرائط عرضية ضيقة متموجة لونها بني، وكل من الجناحين الخلفيين مميز بنقطة بنية توجد قرب مركزه.

والبيضة بيضاوية الشكل، وعقب وضعها يكون لونها برونزي محمر، ولكن قرب فقسها يكون لونها أزرق فاتح، واليرقة الحديثة الفقس تكون سوداء اللون وتوجد بقع بيضاء تنتشر على طول جانبيها، ويبلغ طول اليرقة التامة النضج ٢,٥ سم ويكون لونها قرنفلي فاتح، عليه علامات اقتم لونا، ولليرقة زوج من الأقدام الكاذبة وعند زحفها يتقوس جسمها إلى أعلى ومن هنا جاء اسمها "الدودة القياسة"، وتتغذى اليرقات داخل التربة.

### دورة الحياة الموسمية

لهذه الحشرة جيل واحد في العام، وتخرج الفراشات في فبراير ومارس، وبعد التزاوج تضع الإناث البيض في كتل على الأغصان والأفرع، وتكمل اليرقة نموها في إبريل ومايو ثم تسقط على الأرض وتعذر في التربة، على عمق ٥ - ١٠ سم من سطح التربة، وعند قواعد الأشجار

## مظهر الإصابة والضرر

تغتنى يرقات هذه الآفة على أوراق أشجار الجوز، وعند الإصابة الشديدة ربما جردت الأشجار من أوراقها، ولم تدخل هذه الآفة برامج مكافحة.

## ب - الآفات الحشرية التي تصيب الجوز والتابعة لفصيلة

### متشابهة الأجنحة order Homoptera

#### أولا - المن

#### ٧ - من الجوز

الاسم العلمي للحشرة *Chromaphis juglandicola* Kalk

فصيلة المن Fam. Aphididae


تعتبر من الجوز من أهم الآفات الحشرية التي تصيب الجوز، أينما وجد ويركز هنا المن هجومه على الأوراق، وعند زيادة الإصابة بهذه الآفة فقد ينقص محصول الجوز إلى نحو ٥٠٪.

#### وصف الحشرة

من الجوز (شكل ١٥٠) حشرة صغيرة صفراء اللون يوجد عادة بأعداد كبيرة على السطح اسفلى للأوراق، ومعظم أفراد هذا المن تتوالد بكريا فى غالبية الأحوال ولذلك يتم التوالد وتكوين جيل بعد جيل بسرعة كبيرة، ويتواجد أفراد هذه الحشرة على السطح السفلى للورقة حول العرق الأوسط الرئيسى ومايتفرع منه من عروق، وأفراد المن الحديثة الولادة تكون صغيرة الحجم جدا لاتكاد ترى بالعين المجردة ولو أن تجمعاتها تميز بسهولة.

والوصول إلى طور اليافع المجنح تقوم الافراد بعملية إنسلاخ الجلد مرات عديدة، وعند


وجود أعداد كثيفة منه، يمكن رؤية جلود الإنسلاخ ملتصقة بالسطح السفلى للأوراق، ويبلغ طول الفرد اليافع المجنح نحو ١,٨ مم، وقد يلد هذا الفرد صغاراً على نفس الورقة أو قد تهاجر إلى أوراق أخرى أو حتى إلى أشجار أخرى، وهذه الأفراد المجنحة هي التي تكون الطور الشارد أو المنتشر.



شكل ١٥٠- الأجيال المستمرة من الجنين على السطح السفلى لورقة جوز (التكبير مرة)

وعند تكوين عشائر كثيفة العدد من هذا الجن أو في فصل الخريف، فإن هذه الأجيال المستمرة التعاقب يتولد عنها أفراداً جنسية، وذكر هذه الأفراد دقيقة الحجم ولون الأجنحة دخاني تهرب من الفاحص عند محاولة فحصها، أما الإناث اليافعة فهي عديمة الأجنحة ويمكن تمييزها بوجود زوج من الأشرطة الغامقة اللون تستعرض سطح الجسم العلوي، وزوج من هذه الأفراد موجودة في شكل ١٥١ وبعد التزاوج تتحرك الإناث راجعة إلى نموات الأغصان وتضع بيضها البيضي الشكل المطاول، ويوضع البيض دائماً في الأماكن الخشنة مثل الندبات Scars الموجودة على الأغصان وعلى الأوراق وغيرها من الأماكن الخشنة (شكل ١٥٢)

وطور البيض هذا هو الذي يفضل البيات الشتوي، وفي الربيع يفقس إلى ما يسمى سلالة الأمهات Stem mothers وأفراد هذه السلالة يمكن تمييزها عن غيرها من الأفراد الأخرى وتلد أفراد هذه السلالة بكرياً أفراداً مجنحة وهذه يتوالد منها الأجيال المتعاقبة، وهذه السلالة (الأمهات) تستطيع الطيران والانتشار في مزارع الجوز.



شكل ١٥١ - من الجوز على السطح السفلي لوريقة والفردان اللذان يوجد على ظهرها أشرطة قاتمة هي إناث غير مجنحة وهي التي سوف تضع البيض الذي يدخل البيات الشتوى (مكبرة ٤ مرات)



شكل ١٥٢ - بيض من الجوز المشتى موضوع على ندبات (الاماكن الخشنة) في الورقة (الصورة مكبرة ١٠ مرات)

## دورة الحياة الموسمية

لهذا النوع من المن الكثير من الأجيال سنوياً، ويتوقف عدد الأجيال على العديد من العوامل تشمل الطقس والمناخ وضعف أشجار الجوز، ويكون توالد هذا المن سريعاً في الجو الدافئ عنه في الجو البارد، ويتوالد على أصناف الجوز المبكرة عدداً أكبر من الأجيال عما يتوالد منها على الأصناف المتأخرة.

ويقضى المن الشتاء وهو في طور البيضة، ويبدأ البيض في الفقس إلى جيل سلالة الأمهات مبكراً في الوقت الذي تبدأ فيه أصناف الجوز المبكرة في دفع البراعم الورقية، في نحو منتصف شهر فبراير، وأفراد هذا الجيل يمكن أن ترى وهي تتجول فوق الأغصان العارية والبراعم، وتتغذى على القشور التي تغطي البراعم قبل تفتحها، ولاتنمو هذه الأفراد نمواً كبيراً حتى تفتح البراعم وحينئذ يتوفر لها مصدر غذائي وفير، وقبل ذلك يموت عدد كبير من الأفراد من سوء التغذية، والأفراد التي تستطيع البقاء منها تأخذ من ٦ - ٧ أسابيع حتى يكتمل نموها، بينما الأفراد التي يفقس عنها البيض بعد تفتح البراعم تكمل نموها في نحو خمسة أسابيع وبمجرد ظهور اليرقات، تتحرك سلالة الأمهات إليها وتستقر على سطوحها السفلية، وعندما تصل سلالة الأمهات إلى نموها الكامل، تلد الأفراد التي ينشأ منها الأجيال التالية، وتضع الأم الواحدة ما بين ٢٥ إلى ٣٥ فرداً، ويتوقف الوقت التي يتم فيه تكون ونضج جيل ما على عدة عوامل منها درجات الحرارة، وقوة العائل والمكان الموجود به وفصل السنة، وفي شهر يولية يكتمل نمو أفراد الجيل في خلال ١٢ يوماً وقدّر البعض أن لهذه الحشرة من ١٠ - ١٢ جيلاً في السنة وفي الظروف المناسبة يتوالد هذا المن بسرعة لدرجة أن أفرادها يمكن أن تغطي سطح الورقة وتفرز عليها كميات كبيرة من الندوة العسلية، لدرجة تجعل الشجرة وكأنها قد رشّت بمائل الندوة العسلية، والعشائر الكثيفة من هذه الحشرة قد تظهر في أي وقت من موسم نمو الجوز، وهذا المن يتواجد على أشجار الجوز من بدء ظهور أوراقه في الربيع حتى سقوط الأوراق في فصل الخريف وعند زيادة الكثافة العددية لهذا المن، يتولد لديه الميل إلى إنتاج أفراد جنسية وهذه قد توجد حتى في فصل الصيف، كذلك تشجع ظروف فصل الخريف على إنتاج مثل هذه الأفراد، وفي نهاية الموسم تتواجد الإناث غير المجنحة والذكور المجنحة حيث يتم التزاوج بينهم لتضع الإناث البيض الذي يدخل البيات الشتوي.

## مظهر الإصابة والضرر

من الجوز هو الآفة الأكثر تواجداً على أشجار الجوز والتي تشغل بال مزارع الجوز لفترة طويلة من الموسم، وتضرر هذه الحشرات الجوز بغرزها أجزاءً منها الإبرية في نسيج الأوراق وامتصاصها للعصارة النباتية مما يؤدي إلى ضمور الأوراق وإنقاص قوة الشجرة، ويعتقد أيضاً أن هذا النوع من المن يقوم بإفراز مادة سامة في أنسجة الورقة أثناء إغذائه، وفي حالة الإصابة الشديدة، تتأثر نوعية ثمار الجوز، وتسبب الإصابة الشديدة أيضاً سقوط الأوراق معرضة ثمار الجوز إلى لفحة الشمس وظهور أثر ذلك على الثمار بما يسمى حرقه الشمس Sunburn، وعند الإصابة الشديدة وتساقط الأوراق بكثرة في بداية الموسم قد يؤدي ذلك إلى تنبيه الإشجار إلى إحداث نموات جديدة لا يكون لديها فرصة للنمو ويقتلها البرد إذا حل بها الشتاء كذلك في حالة الإصابة الشديدة ينتج المن كميات كبيرة من الندوة العسلية التي تغطي السطح العلوي للأوراق وتتساقط فتلوث جانباً من الثمار وينمو عليها الفطر وتتلون باللون الأسود مما يؤدي إلى زيادة تعرض الثمار إلى ما يسمى بحرقه الشمس وتأثر جودة الثمار بذلك، أي أن الإصابة الكثيفة تؤدي إلى نقص محصول الثمار كما وصغر حجمها وإصابتها بحرقه الشمس.

## وسائل المكافحة

بالرغم من أن من الجوز مدمر للغاية إلا أن الأشجار يمكنها أن تتحمل قدراً معيناً من الإصابة، وأصناف الجوز المبكرة النضج هي أكثر تأثراً بالإصابة من غيرها، ويتوقف توقيت مكافحة من الجوز على العديد من العوامل منها درجة تواجد أعدائه الحيوية، ومستوى الإصابة بالمن، وبرامج مكافحة الآفات الأخرى على الجوز، ففي أوائل الموسم يلزم إجراء المعالجة الكيماوية قبل أن يصل عدد أفراد المن على الوريقة الواحدة من ١٥ - ٢٠ فرداً، ويمكن شرح طرق المكافحة فيما يلي:-

### المكافحة الطبيعية

يمكن تقسيم المكافحة الطبيعية إلى العوامل الطبيعية والعوامل الحيوية، والعوامل الطبيعية

مثل الرياح، والمطر وغيرها من العوامل التي تتعلق بالطقس والمناخ. وهذه لها دورها في مكافحة من الجوز، ولكنها في نفس الوقت تصيب ثمار الجوز بالضرر وتسبب له حرقه الشمس.

وتلعب الأعداء الحيوية دورا هاما جدا في الحد من خطورة المن، ومن أهم هذه الأعداء حشرات أوى العيد وذباب السرفس وأسد المن، من حشرات أوى العيد يوجد إثنان منها في غاية الأهمية وهما *Hippodamia convergens* Guering, *Olla abdominalis* Say ويوجد غيرهما من الأنواع المفيدة مثل *A. bipunctate* Le., *Adalia melanopleura* Lec. *A. frigide* Humeralissay. وهذه المفترسات تعمل على إنقاص الكثافة العددية للمن إلى درجة كبيرة، كذلك يصاب من الجوز يواحد على الأقل من الطفيليات الغشائية الأجنحة وفي بعض الأحيان يصاب بالأمراض القطرية.

وبالرغم من ذلك فإنه يأتى وقت يخمل فيه نشاط الأعداء الحيوية لمن الجوز، ولذلك يصل تعداده إلى درجة الذروة ثلاث مرات خلال الموسم الواحد لذلك نلجأ إلى استعمال المبيدات الكيماوية.

#### المكافحة الكيماوية

يعالج المن كيماويا بأى من المبيدات الحديثة التي تتغير من وقت لآخر، وينادى البعض بمعالجة المن على أشجار الجوز ثلاث مرات فى الموسم، وأحيانا تفيد معالجة واحدة فى الحد من خطورته، المهم هو توقيت هذه المعاملات بحيث تأتى فى الربيع الباكر لإبادة سلالة الأمهات، وفى نهاية الخريف لإبادة الجيل الجنسى الذى يضع البيض ليدخل البيات الشتوى.

### ٩- من الجوز المغرب للعروق Dusky - Vined walnut aphid

الاسم العلمى للحشرة (*Panaphis juglandis* (Kaltenbach)

فصيلة المن Fam. Aphididae

أحيانا يصيب هذا المن بساتين الجوز بشدة، وهو منتشر في جميع مناطق زراعة الجوز في العالم.

### وصف الحشرة

المن المفبر لعروق الجوز حشرة أكبر كثيرا من من الجوز العادى، وكذلك فهو يتواجد على السطح العلوى للورقات الجوز بعكس المن الآخر الذى يتواجد على السطح السفلى لها ويتكاثر من تغيير العروق ويكون مستعمرات لها سمات خاصة مميزة حيث تتراص هذه المستعمرات على جانبي العرق الأوسط للورقات (شكل ١٥٣).



(شكل ١٥٣) - من تغيير عروق الجوز - هذا النوع من المن أكبر كثيرا من من الجوز العادى ويوجد على السطح العلوى للورقات (صورة فوتوجرافية مكبرة مرتين).

### دورة الحياة الموسمية

لهذا المن عدد كبير من الأجيال خلال الموسم الواحد، ويقضى هذا المن البيات الشتوى وهو



في طور البيضة، وفي الربيع يخرج هذا البيض جيل سلالة الأمهات التي تلد إناثا بخاصة التوالد البكرى، وهذه الإناث هي التي يتولد عنها الأجيال المتعاقبة من هذا المن طوال الموسم، وعند قرب نهاية الموسم تنشأ إناث غير مجنحة وذكور مجنحة وهذه تتزاوج وتضع إناثها البيض الذي يدخل البيات الشتوى. ويوضع هذا البيض فى شقوق قلف جنوع الأشجار، ودورة حياة هذا قريية جدا من دورة حياة من الجوز العادى.

### مظهر الإصابة والضرر

لاحظ الباحثون أن وريقات الجوز المصابة بهذا النوع من المن تسود وتتجدد، وأكثر من ذلك فإن هذه الوريقات تأخذ مظهرا لزجا وتتبع ببقع صفراء، وتؤدي الإصابة الشديدة إلى ضعف قوة الأشجار.

### طرق المكافحة

تلعب المكافحة الطبيعية دورا هاما فى الحد من كثافة عشائر هذا المن مثل ماتفعل مع غيره من أنواع المن الأخرى، وحيث أن هذا المن يصيب الأسطح العليا للأوراق فإن مكافحته بالمبيدات تكون أيسر من مكافحة أنواع المن الأخرى التى تصيب السطح السفلى للأوراق، ويفيد العلاج الكيماوى لمن الجوز العادى فى مكافحة هذا النوع من المن فى نفس الوقت دون حاجة إلى معاملات مستقلة.

## ثانيا. الحشرات القشرية

يصيب الجوز عدد من أنواع الحشرات القشرية، ومعظم هذه الآفات ليس آفاتا رئيسية ولكن بعضها له خطورته، ويصاب الجوز بكل من الحشرات القشرية غير المدرعة والمدرعة ونوردها هنا فيما يلى:

## الحشرات القشرية غير المدرعة (الرخوة) Unarmed Scales

وتتبع هذه الحشرات فصيلة Coccidea والحشرات القشرية غير المدرعة أكثر عددا من الحشرات القشرية المدرعة وهي لا تكون درعا فوق الجسم مثل ما تفعل الحشرات المدرعة، وهذه الحشرات تفرز كميات من الندوة العسلية بينما لا تفرز الحشرات المدرعة ندوة عسلية ولو أن البعض منها يفرز القليل، ويصيب الجوز من الحشرات القشرية غير المدرعة ثلاث آفات هامة هي:

### ٩- الحشرة القشرية ثلجية المظهر

الاسم العلمي للحشرة *Lecanium pruinosum* Coquillett


لم تكن هذه الحشرة تشكل خطرا على الجوز في الماضي وذلك بسبب فعالية المتطفلات التي تقضى على أعداد كبيرة منها، ولكن بعد إستعمال المبيدات الكيماوية الحديثة في مكافحة، ظهرت هذه الحشرة كأفة خطيرة بسبب هلاك أعدادها الحيوية.

#### وصف الحشرة

الحشرة القشرية الثلجية المظهر حشرة صغيرة الحجم جدا بيضاوية الشكل (شكل ١٥٤ أ، ١٥٤ ب) مبططة صفراء اللون توجد على السطح السفلى لأوراق الجوز ويتغير لونها إلى اللون الكهرماني الغامق أو البني، ويخرج من عند قاعدة الجسم خيوط شمعية متناثرة، وفي الربيع تنمو الحشرة بسرعة ويصبح شكلها محدبا ومغطى بطبقة سميكة من الشمع لها مظهر الثلج (شكل ١٥٥) ومع نمو الحشرة وبسبب تعرض جسم الحشرة لعوامل الطقس تزول الطبقة الشمعية الثلجية هذه وتترك جسم الحشرة كما هو واضح في شكل (١٥٦)، وفي هذه الحالة يصبح لون الجسم بني أو بني مسود ويصبح قطر الجسم نحو ٦ مم، وأجسام الحشرة عندئذ تصبح محدبة محدبا شديدا بيضية إلى حد ما، ناعمة ومملوطة ببيض دقيق، والبيضة بيضية الشكل لونها قشدي في البداية ثم يتحول لونها إلى البني قرب الفقس ويفقس البيض عن زاحفات صديئة اللون ذات أرجل نامية، وتستمر الحشرات الأم فوق الأغصان حتى تنوى وتنزل.

### دورة الحياة الموسمية:

لهذه الحشرة جيل واحد في العام، ويظل البيض موجوداً تحت جسم الأمهات خلال الشتاء ويفقس في النصف الثاني من شهر مايو حتى شهر يونية، وتترك الحوريات الزاحفة قشرة الأم وتهاجر إلى الأوراق والبتلات الورقية، ونموات الأغصان الموسمية، حيث تستقر الحشرات على الأسطح السفلى لكل منها، ونمو هذه الحشرة بطيء حيث تبقى الحشرات صغيرة الحجم طوال فصل الصيف، والخريف وأوائل الشتاء، ويقدم فصل الشتاء تنسلخ الحوريات، وتحرك الأفراد التي استقرت على الأوراق راجعة إلى نموات الأغصان قبل سقوط أوراق الأشجار، وفي نهاية الشتاء يحدث للحوريات إنسلاخ آخر، وتنمو هذه الحشرات بسرعة كبيرة في أوائل الربيع، وفي هذه الفترة تصبح هذه الحشرات مغطاة بمسحوق الشمع الأبيض.




(شكل ١٥٤) الحشرة القشرية الثلجية - دقيقة الحجم في بداية نموها إلى اليسار كما تظهر على السطح السفلي لورقة - الحشرات الأكبر حجماً والمبعثرة على الورقة هي حشرات القشرية الأوروبية - إلى اليمين - جزء من السطح السفلي لورقة (مكبرة ٢٥ مره)



(شكل ١٥٤ ب) طور من أطوار نمو الحشرة القشرية الثلجية في بداية نوفمبر (الصورة مكبرة ٦ مرات)



(شكل ١٥٥) - الحشرات القشرية الثلجية مغطاة بكمية قصوى من الشمع الشبيه بالتلج إلى اليمين عينة من الحشرة القشرية الأوروبية لمقارنتها بالحشرة القشرية الثلجية (على اليسار) - (الصورة مكبرة ١,٥ مرة)



(شكل ١٥٦) الحشرة القشرية الثلجية اليافعة، الطبقة الشمعية الثلجية المظهر بدأت في التلاشي (مكبرة ٢٠, ٧٥ مرة)

## ١٠- حشرة أشجار الفاكهة القشرية الأوروبية

الاسم العلمي للحشرة *Lecanium corni* Bouché

تشبه هذه الحشرة القشرية الثلجية المظهر من حيث المظهر والعادات وربما اختلط الأمر على البعض في التعريف بين الحشرتين، وغالبا ما تتواجد الأفتان معا في نفس البستان، ولكن الحشرة الأوروبية أقل تواجدا على أشجار الجوز من الحشرة الثلجية المظهر .

### وصف الحشرة

سبق لنا وصف الحشرة بكل التفاصيل في هذا الجزء، وما يذكره هنا أن الأطوار غير اليافعة لهذه الحشرة تشبه إلى حد كبير مثيلاتها في الحشرة الثلجية المظهر، ولون الحشرة

اليافعة بنى لامع (أنظر شكل ١٥٤ على اليمين) وطولها أكبر قليلا من عرضها، وجسم هذه الحشرة محدب بشدة ويكاد أن يعطى انطباعا بأنه مكون من فصين، وجليد هذه الحشرة ليس أملسا تماما مثل جليد الحشرة الثلجية المظهر، ولكنه مغلف بكمية متناثرة من الشمع الدقيقى الثلجى المظهر، وعند نضج الحشرة يمتلأ الفرع تحت الجسم ببيض دقيق الحجم ييضاوى الشكل لونه صدأى إلى قرنفلى . ويفقس هذا البيض عن حوريات زاحفات لونها أصفر أو بنى فاتح لها أرجل تامة النمو .

### دورة الحياة الموسمية

لهذه الحشرة جيل واحد فى العام، ودورة حياتها تماثل مع دورة حياة الحشرة ثلجية المظهر مع تطابق فى العادات، ولكن الحشرة الأوربية توجد غالبا على السطح السفلى للأوراق والأغصان، وتبلغ الزاحفات طورها اليافع متقدمة بقليل عن الحشرة الثلجية فى التاريخ، وفى الحقل لا يمكن الفصل بين الحشرتين إلا فى أواخر الشتاء والربيع، وبخلاف الحشرة الثلجية، فإن الحشرة الأوربية لا تكتسى بغطاء كثيف من الشمع الثلجى المظهر، ويمكن التفريق بين الحشرتين كذلك بمظهر الحشرة الأوربية اليافعة الذى يبدو جسمها وكأنه مكون من فصين، وملمس سطح الجسم الأكثر خشونة، كذلك فإن طول الجسم يبدو أكبر قليلا من عرضه . وبهذه المقارنة يمكن التفريق بين الحشرتين .

### مظهر الإصابة والضرر

يتشابه مظهر الإصابة والضرر الذى تحدثه هذه الآفة بأشجار الجوز مع مظهر الإصابة بالحشرة الثلجية والأضرار التى تسببها ولا يمكن التفريق بينهما

### طرق المكافحة

نفس الطرق المتبعة فى مكافحة الحشرة الثلجية .

## ١١ - الحشرة القشرية المرقطة

الاسم العلمى للحشرة *Lecanium cerasorum* Cockerell

تنتشر هذه الحشرة إنتشارا واسعا فى مزارع الجوز، ولكنها لا تعتبر الآن من آفات الخطيرة بسبب إستعمال المبيدات الكيماوية الحديثة فى مكافحتها . ومن عوائلها الأخرى الكريز والكمثرى هذا فضلا عن شجيرات الزينة .

### وصف الحشرة

سبق وصفها فى مرحلة سابقة هنا، ولهذه الحشرة جيل واحد فى السنة .

### أضرارها

تضرر هذه الحشرة أشجار الجوز إذا كانت أعدادها كبيرة، فهى تمتص العصارة النباتية فتضعف الأشجار فضلا عن أنها تفرز كميات كبيرة من الندوة العسلية التى ينمو عليها الفطر الأسود فتتلف الأوراق والثمار .

### طرق مكافحتها

لهذه الحشرة أعداء حيوية كثيرة لها الفضل فى الحد من كثافتها منها حشرات متطفلة وأخرى مفترسة هذا فضلا عن الطيور التى تلتهمها بشراهة، هذا وتفيد المعالجة الكيماوية للآفات الأخرى على الجوز فى الحد من خطورة هذه الآفة .

### الحشرات القشرية المدرعة

وهذه الحشرات تتبع فصيلة Diaspididae ، ويصيب الجوز منها عدة أنواع، ولهذه الحشرات دائرة متسعة من العوائل، ومن عوائلها الأخرى عدا الجوز التفاح والمشمش والكريز والخوخ والكمثرى ومنها ما يلى : -

## ١٢ - حشرة الحلويات المحارية

الاسم العلمي للحشرة *Lepidosaphes ulmi* L.

تنتشر هذه الحشرة في جميع مناطق زراعة الجوز وتهاجم أشجار الجوز بشدة، ولها عدد كبير جدا من العوائل .

### وصف الحشرة

سبق وصفها في نفس هذا الجزء من الكتاب ولكننا نزيد هنا أن الحشرات اليافعة لهذه الآفة تشبه المحارات الدقيقة جدا ومن هنا إشتق اسم الحشرة (شكل ١٥٧) والإناث أكبر بعض الشيء عن (الذكور بيضاوية الشكل) ويبلغ طول الأنثى ٣,٥ مم، ويتراوح لونها من البني الفاتح إلى البني الغامق، والبيضة بيضاوية الشكل لونها أبيض لؤلؤي، ويفقس البيض عن حوريات زاحفات ذات أرجل تامة النمو، تتحرك بعد الفقس إلى نموات الأغصان والثمار النامية حيث تنسلخ وتستقر، وتنمو الصغار بسرعة، وفي البداية يكون لونها بنيا.



(شكل ١٥٧) غصن جوز مصاب بشدة بحشرة الحلويات المحارية (مكبرة ٢٧٥ مرة)



## دورة الحياة الموسمية

لهذه الحشرة جيل واحد على الجوز في العام ويبدأ البيض يفقس في شهر مايو، وربما يستمر الفقس خلال شهر يونية، وتحرك الحوريات الزاحفات بعد الفقس مباشرة حتى تصل إلى الأغصان والأفرع الصغيرة والثمار النامية حيث تنسلخ وتستقر، وتنمو الحشرات بسرعة حتى تصل إلى مرحلة النضج وتضع بيضها قبل طول الشتاء .

## مظهر الإصابة والضرر

أحيانا تتواجد الحشرة المحارية في أعداد كبيرة، حتى إنها لتغطي الغصون والأفرع، وعند زيادة كثافتها بدرجة كبيرة قد تغطي كل سطح الثمرة النامية، وهذه الحشرات من المغتذيات على القلف أساسا وينشأ ضررها من إمتصاصها للعصارة النباتية، ومن الممكن أنها تقوم بحقن مواد سامة في موضع إغتهاؤها، وفي حالة الإصابة الشديدة قد تغطي الحشرات الشجرة بأكملها أو تغطي بعض فروعها، وفي بعض الأحيان تصيب فرعاً هنا وفرعاً هناك بصورة متناثرة في بستان الجوز، وهي بذلك تضعف الأشجار أو الأغصان المصابة وربما ماتت الأفرع المصابة.

## طرق مكافحة

يتطفل على هذه الحشرة العديد من المتطفلات الحشرية، كما تعمل ظروف الطقس الطبيعية على كبح جماح هذه الحشرة، وعندما تظهر الإصابة بها على شكل فوره، تكون بعض هذه العوامل قد فقدت فاعليتها بسبب تدخل الإنسان في البيئة أو إستعمال المبيدات المهلكة للأعداء الحيوية، ومن المعروف أن الأعداء الحيوية الحشرية تنشط في ظروف وأوقات معينة، وإستعمال المبيدات في هذه الأوقات يقضى عليها، وقد تتسرب المبيدات بواسطة الهواء من أثناء الرش من الحقول المجاورة لبساتين الجوز فتعمل على قتل الأعداء الحيوية للحشرة في أوقات نشاطها .

وفي حالة إصابة فرع في شجرة ما بشدة يمكن مكافحة الآفة باستعمال مبيد فعال مثل الباراثيون ٢٥٪ مسحوق قابل للبلل بمعدل ٥ رطل للأكر، ووقت المعاملة بهذا العلاج هامة جداً، فيجب إجرائها قبل أن تتحول الحشرات إلى الطور الأبيض المغير أو الطور ذو الفلنسة البيضاء .

## ١٣ - حشرة الكمثرى الإيطالية

الاسم العلمى للحشرة (*Epidiaspis piricola*) (Deguer)

فى بعض الأحيان تصيب هذه الحشرة أشجار الجوز بشدة، وهى تهاجم أيضا غيره من المحاصيل مثل التفاح والكمثرى والبرقوق.

### وصف الحشرة

سبق وصفها بالتفصيل ضمن آفات الكمثرى.

### دورة الحياة الموسمية

لهذه الحشرة جيل واحد على الجوز فى السنة، وذكر البعض أن للحشرة العديد من الأجيال السنوى على أشجار الحلويات.

### الإصابة والضرر

حشرة الكمثرى القشرية الإيطالية، من الحشرات المغتذية على القلف ولذلك تتركز إصابتها على الجذع والأفرع. ويرتبط تكاثرها بالطحالب والأشنة، وحيثما وجدت هذه شجعت الآفة على التكاثر بأعداد كبيرة، والإصابة الشديدة لهذه الآفة تؤثر على قوة الشجرة وقد تقتل الأجزاء المعرضة للإصابة

### وسائل المكافحة

لحشرة الكمثرى القشرية الإيطالية عدد من الأعداء الطبيعية التى تكبح جماح تكاثرها، وهى لا تشكل خطورة أبدا إلا فى حالة جنوح الأشجار وفروعها المغطاة بالطحالب والأشنة، ولذلك يجب إزالة هذه الطحالب والأشنة من على جنوح وفروع الأشجار أثناء فصل الشتاء وذلك بتغطيتها رشا بمخلوط مكون من معلق الجير المطفى فى الماء Hydrolated lime بمعدل

١٠ - ١٥ رطلا يضاف إليها ١ جالون من مستحلب زيتي + ١٠٠ جالون ماء وذلك في فترة الخمول الشتوي وهذه المعاملة تقضى على الطحالب والأشنة.

## ١٤ - حشرة بتنام القشرية Putnam scale

الاسم العلمي للحشرة (*Diaspidiotus ancylus* Putnam)

تنتشر هذه الحشرة انتشارا واسعا في كثير من مناطق زراعة الجوز، وهي حشرة متعددة العوائل، فبجانب الجوز تهاجم التفاح والمشمش والكريز والكمثرى والبرقوق والعديد من أشجار الظل والزينة.

### وصف الحشرة

قشرة الأنثى دائرية الشكل لونها رمادي خفيف إلى قاتم، وهي محدبة تماما وجليد الإنسلاخ في أحد جانبيها، وقشرة الذكر مطاولة لونها رمادي وجليد الإنسلاخ موجود في طرف واحد والإصابة الصيفية على الجوز موضحة في (شكل ١٥٨)، وتبدو فيه الحشرة شبيهة إلى حد ما بالحشرة القشرية سان جوزيه ويمكن أن يخطئ الفاحص ويخطئ بينهما.

### دورة الحياة الموسمية

لهذه الحشرة جيل واحد على الأقل في العام مع احتمال وجود جيل ثان.

### مظهر الإصابة والضرر

بالرغم من إنتشار هذه الآفة إلا أنها لا تعتبر من آفات الجوز الرئيسية، ويبدو أن الأعداء الحيوية لهذه الحشرة تلعب دورا هاما في التزويل بكثافتها العددية إلى دون المستوى الإقتصادي، ومع هذا إن إستخدام المبيدات الحشرية الحديثة قد يكون مسئولا عن هلاك أعدائها الحيوية وزيادة خطورتها، وفي بعض الأحيان تزيد الإصابة حتى تصل إلى الحد المخرّب، فترى الأغصان في بعض الأماكن تغطت بهذه الحشرة القشرية كما هو ظاهر في شكل ١٥٨ وفي هذه الحالة تضعف الأشجار وقد تموت الأجزاء المصابة



(شكل ١٥٨) فرع شجرة جوز مصاب بشدة بحشرة بتنام القشرية كما تبدو في أوائل يوليو  
(الصورة مكبرة ٣,٥ مرة)

### وسائل المكافحة

تدل الملاحظات على أن هذه الحشرة يُتطفل عليها بشدة من قبل العديد من الطفيليات الحشرية، ويبدو أنه تحت الظروف الطبيعية فإن هذه الطفيليات وحدها كفيلة بكبح جماح خطورتها دون ماتدخل من الإنسان.

وتدل الأبحاث الحديثة على استخدام الباراثيون مع الزيت في موسم خمول الأشجار يعد من أنجح طرق المكافحة، وكذلك فإن استخدام الباراثيون في معالجة الحشرات القشرية الرخوة في بداية فصل الصيف يؤدي إلى كسر خطورتها.

### حشرات قشرية مدرعة أخرى تصيب الجوز

يصاب الجوز بعدد آخر من أنواع الحشرات القشرية المدرعة، ولو أن أى منها لا يرقى إلى

مستوى الآفات الرئيسية، ولكن في بعض المناطق وبعض المواسم تتقدم إحداها لتبدى خطورة غير مألوفة ومن هذه الآفات مايلي: الحشرة القشرية سان جوزيه، والحشرة القشرية الشرهة *Aspidiotus camelliae* والحشرة القشرية الحمراء *Aonidiella aurantii* (Maskell)

## حفارات الخشب التي تصيب الجوز

(رتبة غمدية الأجنحة Order coleoptera) يهاجم الجوز عدد من الخنافس التابعة لرتبة غمدية الأجنحة، معظمها يبحث عن الأشجار التي أضررت من الإصابة بآفات أخرى وضعفت قوتها، أما الأشجار السليمة القوية فنادرًا ماتصاب. ومن هذه الحفارات مايلي:

### ١٥ - حفار الباسفيك ذو الرأس المبطل

الاسم العلمي للحشرة *Chrysobothris mali* Horn

فصيلة بيبير ستدي Fam. Buprestidae

تعد هذه الحشرة من أكبر حفارات الخشب خطرا على الجوز في العديد من المناطق، وتهاجم هذه الآفة عدد كبير من أشجار الغابات وأشجار الظل وأشجار الفاكهة والشجيرات، وبالرغم من أن أشجار الجوز قد تصاب بشدة إلا أن الجوز ليس هو عائله المفضل.

#### وصف الحشرة

يمكن رؤية الحشرة اليافعة (الخنافس) واليرقة (في شكل ١٥٩)، والخنافس اليافعة مبطلطة يتراوح طولها ما بين ٧ مم إلى ١٢ مم، ولونها برونزي غامق إلى نحاسي محمر، مع وجود بقع نحاسية فوق غمد الجناح.


واليرقة التامة النمو يبلغ طولها نحو ١٨,٦ مم، وهي مفلطحة ولون رأسها كهرماني، والمنطقة الموجودة خلف الرأس عريضة ثم يستدق الجسم قرب نهايته الخلفية.

والعذراء مفلطحة وشكلها يشبه الخنفساء تماما، وفي البداية يكون لونها أبيض قشدي ولكن قرب خروج الحشرة اليافة يصبح لونها غامقا.

### دورة الحياة الموسمية.

لهذه الحشرة جيل واحد في العام، والتطور إلى الطور اليافع يتم من أوائل إبريل حتى يوليو، وتوجد معظم الحنافس في شهر يونية ويوليو وهذه هي الفترة التي يوضع فيها معظم البيض، والحشرات اليافة تعشق الشمس وقوية الطيران ويوضع البيض فرديا في شقوق وثنايا القلف، وعند فقس البيض، تقضم اليرقة ثقباً في قاعدة صدفة البيضة وتنخر مباشرة في القلف، وتستمر في النخر حتى تصل إلى الكامبيوم أو الخشب وتضع مخلفات الحفر وبرازها في النفق خلفها.

وحتى يكتمل نمو اليرقة، فإن كل ماتغذى به وتنخره يكون في منطقة الكامبيوم، وعندما يكتمل نموها تحفر في الخشب الخارجى وتصنع خلية شبه بيضاوية واسعة تعذر دخلها وتتحوّل بعد ذلك إلى الطور اليافع، ويكون مدخل الخلية مسدودا بمخلفات حفر الخشب، والأنفاق التي تصنع أثناء الطور اليرقى تكون منفردة ولكن أحيانا تتفرع منها أفرع صغيرة في حالة وجودها في الأفرع الصغيرة أو في جنوع الأشجار الصغيرة حيث تكون هذه المتفرعات حلزونية. ويكتمل نمو اليرقة عادة في بداية فصل الخريف، وبعدئذ تدخل اليرقة طور ما قبل العذراء وتمضى فصل الشتاء في هذا الطور، وكما أسلفنا فإن التغذر يحدث في فصل الربيع في يونية ويولية، ولكي تتحرر الخنفساء فإنها تحفر مخرجا لنفسها في جدار غرفة التعذير، وتفعل ذلك بقرض جدار الغرفة ثم السدادة الخشبية وطبقة القلف التي تغطيها، وثقب الخروج يكون متسعا بيضاوى الشكل يسمح للخنفساء بالخروج، وثقب الخروج هذا من سمات هذه الحشرة ويمكن الإستدلال منه على الإصابة بها.



(شكل ١٥٩) حفار الباسفيك مبسط الرأس - الحنفساء واليرقات يعملان في خشب البرقوق (صورة مكبرة)

### مظهر الإصابة والضرر

إذا فقدت الأشجار قوتها لأي سبب فإنها تكون معرضة للإصابة الشديدة بحفار الباسفيك، وتتعرض شتلات الجوز الصغيرة للإصابة به حيث أنها تظل لفترة في حالة ضعف حتى تأخذ طريقها في النمو، وتزيد الإصابة الشديدة بهذه الآفة إذا كانت بساتين الجوز موجودة في مناطق جبلية، وذلك بسبب وجود الكثير من عوائله الأخرى، ويحدث الضرر من إغذاء اليرقات على منطقة الكامبيوم، وهذا يؤدي إلى ضعف الجذع المصاب أو جفافه وموته.

## ١٧- حفار الأشجار المنقط

الاسم العلمى للحشرة (Lec) *Synaphaeta guexi*

فصيلة سيرا مبيديى Fam. Cerambycidae

تهاجم حفا الأشجار المنقط زشجار الجوز ولكن إصابته تقتصر على الأشجار الضعيفة، وفى نفس الوقت يصيب هذا الحفار أشجار من عوائل أخرى مثل أشجار الظل والغابات وأشجار الفاكهة.

### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة (شكل ١٦٠) خنفساء كبيرة الحجم يصل طولها نحو ١٨ مم ولونها رمادى منقط بنقط سوداء ويرتقالية اللون، وإذا كانت هذه الخنفساء مستقرة فى حالة راحة على القلف فإنه يكون من الصعب تمييزها لتوافق ألوان جسمها مع ألوان القلف، واليرقة التامة النضج ذات شكل إسطوانى ولون رأسها كهرمانى ولون الجسم أبيض قشدى ويزيد طولها عن ٢٥ مم، وتنخر هذه اليرقات فى الخشب الصمى لشجرة العائل وتصنع الأنفاق فيه ثم تعمل فى نهاية النفق فتحة تخرج منها الخنفساء اليافعة وهذه الفتحة دائرية وقطرها نحو ١٠ مم. وتوجد الحشرات اليافعة فى نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، وتترى اليرقات على الأشجار الضعيفة والمصابة والتي فى طريقها إلى الموت والميتة. والأشجار القوية لايمكن أن تصاب إلا إذا كان بها منطقة ضعيفة أو فرع مكسور.



(شكل ١٦٠) الحشرة اليافعة لحفار الأشجار المنقط



مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

<https://scholar.google.com/citations?>

[user=t1aAacgAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=t1aAacgAAAAJ&hl=en)

[salamalhelali@yahoo.com](mailto:salamalhelali@yahoo.com)

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.facebook.com/groups/  
/Biothesis](https://www.facebook.com/groups/Biothesis)

[https://www.researchgate.net/profile/  
/Salam\\_Ewaid](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Ewaid)

07807137614



## أنواع أخرى من الحفارات تصيب الجوز

يصاب الجوز بأنواع أخرى من الحفارات أقل أهمية من الحفارات السابق ذكرها ومعظمها يتبع فصيلة سيراميسيدي Cerambycidae منها:-

الحفار البحرى Nautical borer واسمه العلمى *Xylotrechus nauticus* (Mann) وهو لا يصيب إلا الأشجار الضعيفة والتي ماتت حديثا (شكل ١٦١) وحفار أشجار كاليفورنيا واسمه العلمى *Prionus californicus* Mots وهو يصيب جنور أشجار اللوز المعطوبة والميتة. ذلك يصيب أشجار البلوط وأشجار الطلويات.

والحفار الصغير واسمه العلمى *Leptidiella brevipennis* (Mulsant) وتحفر يرقاته فى أغصان أشجار الجوز، وتفضل هذه الحشرة الأشجار التى ماتت حديثا.

## المكافحة الكيميائية للحفارات وخنافس القلف


تنصح وزارة الزراعة المصرية (١٩٩١) بمكافحة حفارات الخشب وخنافس القلف كما يلى:

١ - تقلم الأفرع الجافة والمصابة وتزال الأشجار الميتة وتحرق قبل إبتداء فصل الربيع حتى لا تكون مصدرا للعدوى.

٢ - ترش الأشجار فى فصل الخريف (فى أواخر شهر أكتوبر) ثلاث رشات بين الرشاة والأخرى أسبوعين بالمبيد سيديال ٥٠ ٪ بمعدل ٢٠٠ سم / ١٠٠ لتر ماء - وإذا ظهرت إصابات أخرى فى فصل الربيع من العام التالى يكرر العلاج نفسه من أواخر مارس بإجراء ثلاث رشات بين الرشاة والأخرى أسبوعان ماعدا أشجار المشمش

## ومظهر الإصابة بهذه الخنافس عموما

هو وجود ثقب صغير على الأفرع والسوق وعند نزع القلف نجد أنفاقا مابين القلف والبشرة كما توجد كريات صغيرة من الصمغ على السوق والأفرع.



(شكل ١٦٦) لحفار البحرى

## ١٧ ذبابة الغلاف الخارجى لثمار الجوز


الاسم العلمى للحشرة *Rhagoletis completa* Cress

رتبة زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة ذباب الفاكهة والحفر Fam. Tephritidae (Trypetidae)

## وصف الحشرة

ذبابة الغلاف الخارجي لثمار الجوز ذبابة ملونة بألوان خاصة تجعل من السهل التعرف عليها، ولون الجسم العام أسمر مصفر ذو علامات صفراء، ومن الجهة الجانبية للصدر القاتم اللون يمتد شريط جانبي أبيض مصفر، والدريع Scutellum أيضا ذو لون أبيض مصفر (شكل ١٦٢) والبطن يوجد عليها أشرطة مستعرضة غامقة على سطحها العلوي، والعينين لونهما أزرق توركواز، وتعتبر العلامات الموجودة على الأجنحة هي أهم العلامات التي تميز بها الحشرة، والأجنحة زجاجية شفافة يوجد على كل جناح منها ثلاثة أشرطة مستعرضة متوازية قاتمة اللون (شكل ١٦٢)، ويتواصل الشريط البعيد حتى يصل إلى الحافة الأمامية للجناح.



(شكل ١٦٢) ذبابة غلاف ثمار الجوز يظهر بها علامات الأجنحة والدريع الأبيض المصفر ووضع الأجنحة المميز للحشرة (مكبرة ١٠ مرات)

وحجم الذبابة الأنثى أكبر قليلا من حجم الذكر ونهاية بطنها مدببة أكثر من نهاية بطن الذكر ومسلحة بألة وضع البيض.

وفي حالة الراحة لا تبسط ذبابة غلاف الجوز أجنحتها فوق ظهرها ولكن تجعلها في وضع يطلق عليها (حالة الإستعداد أو التأهب) وكما يعتقد يمكنها هذا الوضع من الطيران فورا في حالة الطوارئ، والبيضة مطاولة ومقوسة، وعقب وضعها يكون لونها أبيض لؤلؤي، ولكنه


يعتبر قاتما كلما نما الجنين داخلها، وطول البيضة ١ مم وعرضها ربع مم. وسطح البيض خشن مغطى بنقوش دقيقة.



(شكل ١٦٣) الجناح الأيمن لذبابة غلاف ثمار الجوز - يظهر عليه نموذج التخطيط المميز للحشرة (مكبرة ١٢ مرة)

## واليرقة

واليرقة الحديثة الفقس (الدودة) تكون شفافة تقريبا، وخطافى الفم ترى وكأنهما مناطق قاتمة فى نهاية الرأس. ويبدو الجهاز القصبى واضح جدا وحين تكون اليرقة على وشك الإنسلاخ يكون طولها نحو ١,٥ مم، ويمكن تمييز العمر الثانى لليرقة من عمرها الأول بظهور ثغرى التنفس الخلفيين فى العمر الثانى وحين تكون يرقة هذا العمر على وشك الإنسلاخ يكون طولها ٤,٥ مم ويكون الجسم مبيض اللون نصف مقوس ويمكن رؤية الغذاء داخل القناة الهضمية، والعمر الثالث لليرقة يكون بوى الشكل تماما وهو العمر الأخير لها ويكون لونه أصفر ويظهر خطا فى الفم الأسود، والدود التى يصيب الغلاف الخارجى لثمار الجوز يظهر فى شكل (١٦٤).



شكل ١٦٤ - أنسجة الغلاف الخارجى لثمار الجوز والمظهر المميز للإصابة بذبابة الغلاف الخارجى، ويرى النود بوضوح بعد قطع الغلاف الخارجى وصيفه.

## والعذراء

تشبه حبة القمح ولونها قشدي، (شكل ١٦٥) ويبلغ طولها نحو ٤.٥ مم وعرضها نحو ٣ مم، ويظهر بها الشغل التنفسي الخلفى القاتم اللون، كذلك يظهر بها الشغل التنفسي الجانبية على الصدر الأوسط وحلقات البطن.

## دورة الحياة الموسمية

لهذه الحشرة جيلان فى العام، وتخرج الذبابات من عذارىها فى الأسبوع الأول من شهر يولية وتستمر فى الخروج حتى شهر سبتمبر، وفى المعمل تم خروج الذباب من العذارى فى شهر يناير وفبراير تحت درجات حرارة عالية نسبيا، ويتزاوج هذا الذباب بعد ستة إلى ٨ أيام بعد خروجه، ثم تمضى الإناث فترة ١٠ - ٢٠ يوما دون وضع بيض (فترة ما قبل التبويض)،

وقبل أن تضع الأنثى البيضة، تقوم باختبار القشرة الخارجية لثمرة الجوز بآلة وضع البيض فإذا وجدت أن أنسجة القشرة لينة بما يكفي، تغرز آلة وضع البيض وتضع بيضها في أنسجة القشرة، (شكل ١٦٦)، وتضع الأنثى من ١٢ - ١٥ بيضة في كل فجوة تصنعها بآلة وضع البيض في أنسجة غلاف القشرة، ويوضع ٧٥ ٪ من البيض في النصف العلوي من القشرة أو في منطقة حامل الثمرة، ويوضع جميع البيض في الأنسجة السليمة وتستمر فترة وضع البيض في الفترة من ٢٥ أغسطس إلى ١٢ سبتمبر.



(شكل ١٦٥) الصف العلوي عذارى نودة الغلاف الخارجى لثمار الجوز يقارن حجمها بحجم حبات القمح في الصف السفلى

وبعد ٥ أيام يفقس البيض وتخرج منه اليرقات الصغيرة التي تبدأ في الإغذاء، وتفضل في إغذائها انتقاء أنسجة القشرة السليمة، وتتراوح فترة الطور اليرقى ما بين ١٨ - ٢٠ يوما.

وتظهر اليرقات التامة النمو محتشدة في الأماكن التي أصابها الضرر من غلاف الثمرة، وتصنع اليرقات الناضجة مخرجا لها في غلاف القشرة بواسطة أجزاء فمها الخطافية الشكل، ومن هذا المخرج تخرج اليرقات وتسقط فوق الأرض حيث تبدأ تحفر في التربة، ويساعدها على ذلك زيادة رطوبة التربة، وبعد ٢٤ ساعة من إختراقها للتربة تصبح اليرقات في تمام نموها ثم تدخل بعد ذلك في طور العذراء حيث يخرج منها الذباب اليافع في الموسم التالي.

### مظهر الإصابة والضرر

تسبب الإصابة بهذه الذباب في تعفن صدفة الثمرة وإسودادها، وقد يسود جزء من الصدفة أو تسود كلها حيث يسيل العصير من الجزء المصاب من غلاف الثمرة الخارجى ويلوث الصدفة التي تسود من نمو الفطريات عليها بعد ذلك، وهذا الإسوداد لا يمكن إزالته بالغسيل بالمنظفات الطبيعية أو أى طريقة أخرى، ولذلك تعتبر مثل هذه الثمار ثمارا فاقدة، ومن مظاهر الإصابة الأخرى تجعد الصدفة في منطقة إتصالها بعنق الثمرة، ومعظم الثمار المصابة لا يتشقق غلافها الخارجى بطريقة تلقائية طبيعية، لذلك تزيد الكلفة الإقتصادية في تجهيز الثمار وإزالة قشرتها الخارجية.

### المكافحة الكيماوية

في معظم مناطق زراعة الجوز، ترش الأشجار مرتين سنويا بمبيد فعال مثل الملاثيون أو الباراثيون، والرشة الأولى تجرى في الأسبوع الأخير من شهر يولية، والثانية بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة من الرشة الأولى.

### المكافحة الطبيعية

لا يوجد لهذه الآفة إلا القليل من الأعداء الحيوية، وسجل البعض بعض الفطريات الممرضة التي تصيب هذه الذبابة في المعمل، وشوهد الحلم المسمى *Pediculoides ventricosus* New وهو يفترس بيضها، وتجرب التجارب لمعرفة أنواع من المتطفلات الحشرية التي تستطيع التطفل على يرقات هذه الذبابة مثل الطفيل *Opius humilus* Sliv. والطفيل اليرقى *Diachasma leryoni* Cam. اللذين ثبت نجاحهما في برنامج مكافحة الحيوية.



هذا وقد شوهدت بعض أنواع الطيور وهي تقتنص يرقات هذه الآفة خصوصا في نهاية شهر أغسطس وسبتمبر. وقد تبين أن هذه الطيور قد قامت بتنظيف بعض الثمار المصابة من اليرقات التي أصابتها.

ولوحظ أن الدجاج يحوم حول مبنى الماكينات في وقت الحصاد ليتغذى علي يرقات هذه الآفة ويبحث عن عذارىها في التربة ويلتهمها وقام الدجاج بتنظيف المنطقة التي سمح له بالنشاط فيها من العذارى تماما

## ١ - الآفات الحشرية التي تصيب ثمار الجوز في المخزن

يوجد عدد من أنواع الآفات لحشرية للمواد المخزنة تستطيع إصابة ثمار الجوز بشدة في المستودعات، وأهم هذه الآفات جميعها هي فراشة الدقيق الهندية *Plodia interpunctella* Zell، وفراشة دقيق البحر الأبيض المتوسط *Ephesia kuhniella* Zell وخنفساء سورينام *Oryzaephilus surinamensis* (Linn)، وهذه الآفات تغتذى على كافة صور المواد الغذائية المخزنة، ويجب مكافحة مثل هذه الآفات قبل أن تصيب ثمار الجوز وتدمرها. وقد تناولنا جميع هذه الآفات بالتفصيل في الجزء الأول من هذا الكتاب.

### طرق مكافحة آفات المخازن

يقتضى مكافحة آفات المخازن التي تصيب الجوز المخزن بما يتفق والمعايير الصحية التي تحافظ على الثمار من التلوث بالكيماويات، ويمكن المحافظة على الجوز من الإصابة بتخزينه في مستودعات باردة أو مبردة كذلك يمكن تبخير المخزن بمواد التبخير المعروفة والتي لا تترك أثرا بقيا.

### ثالثا- الآفات الحشرية التي تصيب الفستق والحبة الخضراء

بزرع الفستق والحبة الخضراء في بقاع عديدة من العالم العربي مثل سوريا ولبنان والعراق، ويصاب بالعديد من الآفات الحشرية، ولسهولة عرضها نجمع كل مجموعة منها تنتمي لرتبة حشرية واحدة معا، هذا علما بأن الأبحاث التي أجريت على آفات الفستق والحبة الخضراء في العالم العربي ليست وفيرة بإستثناء ماورد عنها في بعض المحطات العلمية في العراق - ونورد ماتوفر من معلومات عن هذه الآفات فيما يلي:

### آفات الفستق والحبة الخضراء التي تنتمي لرتبة غمدية

#### الآجنحة

Order Coleoptera

#### ١- خنفساء براعم الفستق

الاسم العلمي للحشرة *Aricerus vestitus* (Muis & Rey)

فصيلة خنافس القلف Fam. Scolytidae

تصاب أشجار الفستق بهذه الآفة التي تحفر يرقاتها تحت قلف الأشجار خاصة الأشجار الضعيفة أو المتينة، والطور الضار في هذه الآفة هو كل من طور اليرقة والحشرة البالغة.

#### وصف الحشرة

خنفساء سمراء اللون إلى أسمر داكن، يبلغ طولها من ٢ - ٢,٥ مم، واليرقة لونها أبيض سمى وهي منحنية قليلا.

## مظهر الإصابة والضرر

وجود حفر على الأغصان البالغة مبتدأة من البراعم، وتصنع اليرقة أنفاقاً سطحية تحت القلف وعلى سطح الخشب الجامد.

## دورة الحياة الموسمية

تقضى هذه الحشرة بياتها الشتوى وهى فى طورها اليافع (خنفساء)، وفى شهرى يونيو ويوليو تنشط هذه الخنافس وتتزاوج وتضع الإناث الملقحة بيضها إبتداء من شهر يوليو حتى منتصف أغسطس يفقس البيض بعد ٤ - ١٠ أيام وتعيش اليرقات من ٣٠ - ٥٠ يوماً أى خلال يولية حتى منتصف أغسطس ثم تتحول إلى عذارى ويستغرق طور العذراء نحو ١٠ أيام ثم تخرج منها الحشرات اليافعة فى أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وتبدأ الحشرات اليافعة جيلاً ثانياً، وعلى هذا فلهذه الحشرة جيلان متداخلان كل عام الأول من يوليو حتى أوائل سبتمبر والثانى من أكتوبر حتى نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر.

## طرق مكافحة

تكافح هذه الآفة كيميائياً برش الأشجار فى شهر إبريل عند بداية ظهور الحشرات واستيقاظها من البيات الشتوى ويعاد الرش ثانياً بعد مرور ١٥ يوماً من الرش الأول، ويذكر عزيز العلى (١٩٨٠) أن هذه الحشرة تكافح كيميائياً فى العراق باستخدام أحد المبيدات التالية

سوميثيون ٥٠ ٪ بنسبة ٥ سم لكل جالون ماء

أو أنثيو ٢٥ ٪ بنسبة ١٠ سم لكل جالون ماء

أو ملاثيون ٥٠ ٪ بنسبة ١٠ سم لكل جالون ماء

بنظام الرشتين السابق ذكره، كما ينصح بقطع الأشجار الميتة وحرقها للتخلص من اليرقات الموجودة تحت القلف

## ٢ - خنفساء قلف أشجار الفستق

الاسم العلمي للحشرة (Chap) *Polygraphina perrisi*

فصيلة خنافس القلف Fam. Scolytidae

### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة (الخنفساء) اسطوانية الشكل بنية اللون صغيرة الحجم طولها نحو ٢ مم،  
واليرقة بيضاء سمنية اللون طولها نحو ٣ مم.

### مظهر الإصابة

وجود اليرقات تحت القلف ووجود ثقوب صغيرة جدا على سطح القلف نتيجة خروج  
الخنفساء، الثقوب تشبه الثقوب التي يحدثها رش البندقية، وتموت الأشجار في حالة الإصابة  
الشديدة.

### وقت المكافحة

في شهرى سبتمبر وأكتوبر عند ظهور الحشرات اليافعة - ولم تدخل هذه الحشرة برنامج  
المكافحة الكيميائية.

## ٣ - حفار ساق أشجار الفستق الكبير

الاسم العلمي للحشرة Pell *Capnodis cariosa*

فصيلة ناخرات الأخشاب ذات القرون الطويلة Fam. Cerambycidae

### وصف الحشرة

يرقة هذه الحشرة بيضاء سمنية اللون رأسها بني غامق وحلقة الصدر الأولى عريضة  
وطولها عند تمام نموها ٧٠ - ٨٠ مم.

## مظهر الإصابة

ضعف الأشجار نتيجة لنمو البرقات داخل السوق والأفرع وانقطاع سير الغذاء إلى أجزاء الشجرة وتموت الشجرة تدريجياً.

## طرق مكافحة

لا تصيب هذه الحفارات إلا الأشجار الضعيفة، لذلك يجب العناية بالأشجار رياً وتسميداً حتى تظل قوية وفي حالة وجود إصابة بالحفارات في الأفرع أو الأغصان، تقلم هذه الأفرع والأغصان وتحرق، ومن المفضل أن يتم هذا العمل في الشتاء، ويجب تغطية مكان التقليم أو القطع ببعض مواد الطلاء مثل شمع التطعيم التي تمنع الحشرات من وضع بيضها على الأجزاء المجروحة.

وكيميائياً ترش الأشجار وقت ظهور الحشرات اليامعة بمبيد السيفين ٨٥ ٪ بنسبة ٦ مم / جالون ماء، أو بمبيد سوبر أسيد ٤٠ ٪ بنسبة ٦ سم / جالون ماء ويمكن استعمال الأخيرة في حالة وجود الثمار على الأشجار كذلك في معالجة المشاتل.

## ٤- من أوراق الحبة الخضراء

الاسم العلمي للحشرة *Pemphigus riccobonii* De Stefani

رتبة متشابهة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة المن Fam. Aphididae

حوريات هذا المن وردية اللون والأجنحة سوداء رمادية.

## مظهر الإصابة

التفاف حواف الأوراق وتشوه منظرها وتوجد الحشرات اليافعة والحوريات داخل الأجزاء الملتفة.

## وسائل مكافحة

يكافح هذا المن عند ظهوره في شهر مارس ويكافح مرة أخرى في شهر يونيو ويستخدم في ذلك مبيد الملاثيون ٥٠ ٪ بنسبة ٨ سم / جالون ماء.

## ٥- بق الفستق الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة *Aneputlivinaria pistaciae* (Bodenh)

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة البق الدقيقى Fam. pseudococcidae

## وصف الحشرة

الحشرة اليافعة بيضاء اللون ذات رأس بنى محدب تحيط نفسها بإفرازات شمعية بيضاء  
مظهر الإصابة وجود الحشرات ملتصقة بالثمار والأوراق وحواملها حيث تمتص منها  
العصارة النباتية

## وسائل مكافحة

تكافح هذه الآفة في أواخر شهر مارس وفي خلال شهر يونيو بأحد المبدات التالية:

١ - أنتيو ٤٠ ٪ بنسبة ٦ سم / جالون ماء.

٢ - ديازيتون ٦٠ ٪ بنسبة ٦ جم / جالون ماء.

٣ - سيفين ٨٥ ٪ بنسبة ٦ جم/جالون ماء

على أن تستخدم رشاشات ذات ضغط عال.

## الآفات الحشرية التي تصيب العنب والموز

## الآفات الحشرية التي تصيب العنب

يزرع العنب في مساحات كبيرة في جميع أقطار العالم العربي ويعد محصولاً رئيسياً في بعض الأقطار مثل الجزائر، ويصاب العنب بأكثر من ٣٠ نوعاً من الآفات الحشرية تعد ١٤ منها آفات رئيسية، وبعض الآفات الرئيسية في بعض الأقطار قد لا تعتبر من الآفات الخطرة في مناطق أخرى من العالم العربي لتتنوع ظروف المناخ تنوعاً واسعاً بين جميع هذه الأقطار، كما أن الأعداء الحيوية للآفات مسئولة إلى حد كبير عن التفاوت في خطورة الآفات بين منطقة وأخرى، وسوف نعرض هنا لهذه الآفات وفق تنظيم يسهل ويوضح هذا الغرض وذلك على أساس ذكر الآفات التي تهاجم أجزاء الثبات الرئيسية وتجميعها وفق هذا التقسيم - وعليه نبدأ هذا العرض فيما يلي:

### أولاً. الآفات الحشرية التي تصيب أوراق العنب

#### ١- نطاط أوراق العنب

الاسم العلمي للحشرة *Erythroneura elegantula* Osb

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة order Homoptera

فصيلة نطاطات الأوراق Fam. Cicadellidae

ويوجد نطاط آخر لأوراق العنب في بعض المناطق هو *Erythroneura variabilis* Bee وجميع زراع العنب يعرفون هذا النطاط ويعزون إليه تبقع أوراق العنب ببقع شاحبة. ويسمى النطاط الثاني نطاط أوراق العنب المتشابه.



## مظهر الحشرة

الحشرة الياقة لهذه الآفة حشرة ضعيفة صغيرة الحجم يصل طولها نحو ٥ مم، وتتشابه يافعات نطاط العنب مع نطاط أوراق العنب المتشابه السابق ذكره، ولون حشرة نطاط العنب الياقة أصفر شاحب بها علامات ذات لون أحمر قاتم وأخرى بنية قاتمة، وفي الحشرات التي تدخل البيات الشتوي تكون هذه العلامات أغمق لونا من الحشرات التي توجد في الربيع والصيف، ويختلف نطاط أوراق العنب العادي عن نطاط أوراق العنب المتشابه حيث أن تلوين النطاط المتشابه يكون دائما أفتح ألوانا من النطاط العادي مع وجود مناطق ذات لون بني أغمق على الأجنحة الأمامية أكثر مما هي موجودة على أجنحة النطاط العادي، والنقطة البنية الموجودة على أجنحة ويرع نطاط العنب تكون أصغر وأكثر وضوحا من تلك الموجودة على أجنحة النطاط المتشابه، وتحمل كل من الأجنحة الأمامية لنطاط أوراق العنب المتشابه نقطة لونها أصفر فاتح ولا تظهر هذه النقطة على الأجنحة الأمامية لنطاط أوراق العنب العادي.

## دورة الحياة

بمجرد أن تنبت أوراق العنب في الربيع تبدأ يافعات نطاط أوراق العنب التي خرجت من البيات الشتوي في التحرك على أوراق العنب والإغذاء على تلك الأوراق الصغيرة وسرعان ما يحدث التزاوج وبعد مرور أسبوعين من تحرك هذه الياقات إلى كروم العنب تبدأ الإناث في وضع البيض، وتضع كل أنثى ما بين ٧٥ إلى ١٠٠ بيضة في خلال فترة شهر أو شهرين، ويبلغ طول البيضة نحو ٧٥ مم ويوضع البيض فرديا داخل أنسجة الورقة، تحت سطح الورقة مباشرة ويبدو البيض كنقطة صغيرة تشبه حبة الفاصوليا من كل من السطح العلوي والسطح السفلي للورقة، ويكون أكثر وضوحا إذا نظر إليه من السطح السفلي.

ويفقس بيض الجيل الأول في خلال ١٨ إلى ٢٠ يوما وفق درجات حرارة الطقس، وتخرج الحوريات من البيضة وتخرق سطح الورقة للخارج، والعمر الأول للحورية يكون شفافا غير ذي لون فيما عدا عينييه الحمراءوين، وبعد إغذاء حوريات العمر الأول تنسلخ وتدخل في العمر الثاني وتكرر هذه العملية ٥ مرات قبل أن تصل الحورية إلى الطور الياق، والعمر الأخير للحورية يكون لونه أخضر فاتح جدا.

وحيث أن الحوريات تفضل البقاء على الأوراق التي كانت البيض مغروسة داخلها فإن الأوراق المصابة بشدة تظهر عليها عدد كبير من جلود إنسلاخ الحوريات البيضاء المتعفنة.

وكل عمر من أعمار الحوريات يشبه سابقة إلا أنه يكون أكبر حجما وقواعد أجنحته أكبر. وتغذى الحوريات على السطح السفلى للأوراق، وعند إنزعاجها تسرع بالجرى في خط متعرج، ويحدث التزاوج بعد أسبوعين من وصول الحشرة إلى مرحلة التطور اليافع، ويحتاج بيض الجيل الثاني من ٨ - ١٢ أسبوعا ليفقس ويكمل الجيل الثاني، وللحشرة ثلاثة أجيال في السنة وفي فصل الشتاء توجد اليافعات في حالة بيات شتوي تحت أوراق العنب الجافة والحشائش الميتة والقش الموجود في الأسوار، وفي البرسيم، وفي أيام الشتاء الدافئة يمكن لهذه الحشرة أن تتحرك وتغذى على أي نبات أخضر تجده.


### مظهر الإصابة والضرر

تغذى حوريات ويوافع نطاظ أوراق العنب على عصارة الأوراق وذلك بغرز أجزاء فمها في نسيج الورقة وامتصاص العصارة، وتنتقل هذه الحشرات من مكان إلى آخر على الورقة، ونتيجة للثقب التي تحدثها أثناء إغذائها على سطح الأوراق وامتصاص العصارة يزول الكلوروفيل من تلك المناطق وتبدو الورقة مبقعة بألوان شاحبة تزيد هذه البقع حتى تتشابه وتجف هذه الأجزاء متحولة إلى اللون البني ثم تجف الورقة كلها وتسقط، وتفرز هذه الحشرة أثناء إغذائها كميات من النخوة العسلية تسيل على الأوراق وتسقط على الثمار ويتجمع حولها الأتربة فتغزو لزجة، ثم ينمو عليها الفطر الأسود بما يشوه شكل الثمار (شكل ١٦٦) ويعطل العمليات الحيوية التي تقوم بها الورقة، وعند جمع المحصول تقفز أسراب من الحشرات وتدخل أعين وأنوف العمال وتسبب مضايقتهم كذلك تحاول بعض الحشرات غرس أجزاء فمها في بشرة العمال وتؤلمهم.

### طرق مكافحة

يمكن مكافحة نطاظ أوراق العنب بثلاث طرق هي الرش والتعفير والرشق الضبابي Vapor Spray والرش معروف يكون بمحلول مائي أو معلق لأحد المبيدات الفعالة، ولكن يجب أن يجرى الرش قبل إزهار العنب حتى لا يترك أثرا باقيا على ثمار العنب ويعيب هذه العملية نقل الأجهزة المستخدمة في الرش وصعوبة تحريكها داخل كرمة العنب فضلا عن بطئها.

وفي حالة الرش بطريقة الضباب، يجرى إذابة المبيد في زيت خفيف وعند الرش يتكسر إلى قطيرات دقيقة جدا تشبه قطيرات الضباب فتغمر أشجار العنب وتتخلل كل أجزاء الأشجار.



(شكل ١٦٦) حبات عنب من صنف Polomino يظهر بها إفراز نشاط الأوراق وقد نمت عليها الفطر الأسود  
فشوه شكل هذه الحبات

والأجهزة المستعملة هنا خفيفة نسبياً ويمكن تحريكها بسهولة في أرجاء الكرمة ويجب إجراء هذه العملية قبل التزهير للسبب الذي ذكرناه سابقاً والرش بالزيت المضاف إليه الكبريت يضر بالأوراق والثمار ويبقى على الثمار آثار من الكبريت، ويقوم البعض بالرش بالزيت بعد مرور أسبوع من المعاملة بالكبريت، ولكن إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ودرجات الرطوبة الجوية منخفضة فإن هذه الفترة بين المعاملتين لا تكفى ويستعمل مبيد الملاثيون للرش لمكافحة هذه الآفة بنجاح ولكن يجب استعماله قبل فترة التزهير، ويستخدم الملاثيون كمسحوق قابل للبلل تركيزه ٢٥ ٪ بمعدل ١,٥ إلى ٣ أرطال لكل أكر ويحتاج الأكر إلى ٢٠٠ - ٣٠٠ جالون من محلول هذا المبيد. هذا وتوصى وزارة الزراعة المصرية باتباع نظام مكافحة التالي: يبدأ موسم

العلاج ضد آفات العنب بعد التقليم مباشرة بتقشير القلف السائب وحرق مخلفات التقشير والتقليم ثم الرش بزيت معدني بنسبة ٢ ٪ (٢٠ لتر للفدان) مضافا إليه الملاثيون بنسبة ٢ في الألف (٢ لتر للفدان) وذلك كعلاج مشترك ضد البق الدقيقى والحشرات القشرية والنطاطات مع ملاحظة أن يشمل التقشير والرش منطقة التاج.

## ٢- لافة أوراق العنب

الاسم العلمى للحشرة (*Desmia funeralis* (Hbn)

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة تورتريسيدي Fam. Tortricide

تعتبر هذه الافة من أكثر آفات العنب خطورة، وتقوم فراشة هذه الحشرة بالطيران قرب الإظلام وتستمر في النشاط طول الليل إذا كانت درجة حرارة الطقس دافئة، وتؤدي الإصابة بهذه الحشرة إلى النزول بدرجة عنب المائدة وخسارة المنتجين.

### وصف الحشرة

لون الفراشة بنى قاتم يقرب من الأسود، وعرضها عند فرد الجناحين ٢,٥ سم، ويوجد على كل من الأجنحة الامامية فى كلا الجنسين نقطتان بيضاواتان، وكل من الأجنحة الخلفية للأنثى أيضا يحمل زوج من النقط البيضاء (شكل ١٦٧) ولكن كل من جناحي الذكر الخلفيين يحمل نقطة بيضاء كبيرة فقط، ويوجد على البطن شريطان أبيضان مستعرضان، وقرن إستشعار الذكر غليظ فى وسطه ولكن قرنا إستشعار الأنثى لا يوجد بأيهما هذا التقلظ.

### دورة الحياة

لهذه الحشرة ثلاثة أجيال فى السنة، وتخرج فراشات الجيل الأول من عذارى البيات الشتوى فى بداية شهر مايو حتى نهايته، وبعد التزاوج تضع الافات بيضها على الأوراق فى الأماكن الغير معرضة للرياح، والبيضة صغيرة الحجم مبططة بيضاوية طولها ٧، مم، وأشجار العنب التى توجد فى أماكن تحميها من الرياح مثل أى نوع من مصدات الرياح هى المفضلة للحشرة لوضع البيض، ولذلك فإن أوراق العنب الكاملة النضج والمحمية من الرياح والسليمة يوجد عليها بيض أكثر من أوراق العنب الضعيف النمو، ويوضع البيض أيضا على الأشطاء المائية للعنب، لأن هذه الأماكن المحمية هى التى تقضى فيها الفراشة النهار وهى فى حالة راحة، ويوضع البيض على الأوراق وعادة ما يوضع فى الزوايا التى بين العروق وعلى سطح الورقة.

وتفضل الفراشة وضع البيض على الأسطح الملساء، ويفقس البيض الذي يوضع في الربيع في خلال ١٠ - ١٧ يوما وفقا لدرجات الحرارة، وفي البداية تقوم اليرقات الصغيرة بالإغذاء وهي في هيئة مجموعات بين الأوراق التي ألصقتها ببعضها بخيوط الغزل والإغذاء في بدايته يكون سطحيا، ولكن بعد أسبوعين، تقوم كل يرقة بالإغذاء منفردة داخل الورقة التي ألتفتها وتجعلها تشبه القلم، وتستطيع اليرقة أن تلف الورقة هكذا بغزلها بخيوط الحرير التي تثبتها في حافة الورقة من طرف وتشدها وتثبتها من طرفها الأخير بمركز الورقة، وعندما تجف الخيوط تنقبض وتحني حواف الورقة (شكل ١٦٨)، وبعد ذلك تغزل اليرقة خيوطا أخرى تجعل حواف الورقة تلتف في شكل لفافة وسطح الورقة العلوى هو الذى يشكل السطح العلوى للفاقة. وتاكل اليرقة الأطراف الحرة للورقة داخل اللفاقة، وقبل أن يكتمل نمو اليرقة تكون قد صنعت لفافتين أو ثلاث، واليرقة لونها أخضر مصفر يبدو وكأنه شفاف، وبمجرد أن تبدأ اليرقة في الإغذاء فإن أنسجة الورقة المهضومة تعطيها اللون الأخضر الزاهى، وتنسلخ اليرقة ٥ مرات، وعندما تتواجد نقطة واضحة قرب النهاية الخلفية لجسمها تكون اليرقة عندئذ في عمرها الأخير وهو العمر الذى يحدث فيه معظم إغذائها. وعندما تنزعج اليرقة تتذبذب بقوة وتسقط على الأرض، وعندما يكتمل نمو اليرقة تصنع لفافة صغيرة من الورقة أو مطروف على حافة ورقة وتربطه بخيوط الغزل بشدة وتفصله جزئيا عن الورقة، ويدخل هذه اللفاقة تتحول اليرقة إلى عذراء، والفراشات التي تخرج من العذارى في فصل الصيف تضع معظم بيضها على لفافات الورق السابق إصابتها، ويعنى هذا أن الإصابة في الصيف تتركز على الأجزاء التي أصيبت من قبل في فصل الربيع، وللحشرة ثلاثة أجيال في السنة كما سبق أن ذكرنا، وعندما تجف الأوراق في الخريف وتسقط اللفافات التي تحتوى على العذارى على الأرض فإن هذه العذارى تدخل البيات الشتوى وهي هكذا بين الأوراق الجافة والمخلفات النباتية. وبعض يرقات الجيل الثالث قد تعذر في القلف السائب لأشجار العنب.

### مظهر الإصابة والضرر

تقلل اللفافات الورقية التي تصنعها اليرقات من مسطح الأوراق التي تقوم بالوظائف الحيوية وتمد العنب بالغذاء، وفي حالة الإصابة الشديدة وتسقوط الأوراق المصابة تتعرض عناقيد العنب إلى حرقه الشمس Sunburn وفي حالة الإصابة الشديدة في العمر الثالث، تقوم يرقات هذا العمر بالإغذاء على ثمار العنب في عناقيدها وتجرح سطح هذه الثمار مما يمكن الفطريات من إصابة الثمار واسوداد لونها.




شكل (١٦٧) الى اعلى فراشة انثى لافة اوراق العنب في الوسط يرقه لافه اوراق العنب وتظهر عليها النقاط السوداء اسفل عذراء الحشره في حالة البيات الشتوى

## طرق المكافحة

### المكافحة البيولوجية

لحسن الحظ فإن العديد من الطفيليات تصيب يرقات هذه الآفة وتعمل على كسر حدة خطرهما وتجعل الإصابة بها دون الحد التي يضعها في مصاف الآفات الرئيسية، وتزيد أعداد هذه الطفيليات في خلال فصل الصيف وتقلل من حجم جيل الحشرة الثالث بما يقلل من ضرره، وتعمل المفترسات الحشرية والطيور أيضا على إنقاص الكثافة العددية لهذه الآفة، وفي السنين التي تفشل فيها الأعداء الحيوية للحشرة في العمل، تكون الإصابة بها في غاية الخطورة، فقد ذكر أن أعداد لافة أوراق العنب يتزايد بسرعة إذا استخدمت المبيدات الكيماوية في مكافحة نطاط أوراق العنب بعد منتصف شهر يولية. ومن الواضح أن هذه المبيدات تقتل



شكل ١٦٨ يرقة أوراق العنب تطوى الورقة، لاحظ وجود الخيوط الحريرية التي تشكل اللفافة، ثقبو إغذاء اليرقة الصغيرة توجد على الجزء السفلى من الورقة .

الأعداء الحيوية للآفة أوراق العنب بون أن تقتل يرقات هذه الآفة.

### المكافحة الكيماوية

من المستحسن إجراء المكافحة الكيماوية ضد يرقات الجيل الأول في فصل الربيع قبل أن تقوم اليرقة بلف أوراق العنب وحماية نفسها داخل اللغافات، ومن المعروف كما سبق أن ذكرنا أن فراشات جيل الصيف تفضل وضع بيضها على اللغافات التي كونتها يرقات جيل الربيع، ولذلك كان مكافحة جيل الربيع تعتبر أيضا مكافحة لجيل الصيف، وأفضل وقت لإجراء هذه المكافحة هو في الأسبوعين الأولين من شهر مايو. والمبيدات المفضلة هي المبيدات الحديثة الفعالة ذات الأثر الباقي.

## ٣ - دودة هيكلية أوراق العنب الغربية Grape skeletonizer

الاسم العلمي للآفة *Harrissina brillians* & M.D.

رتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة يرقات الخيام Fam. Lasiocampidac

يرقات هذه الحشرة يرقات احتشادية تعيش في مجموعات متجاورة فوق الأسطح السفلية لأوراق العنب وهذه الآفة تعد من الآفات الشديدة الخطورة والتي قد تجعل العنب يفقد نحو ٩٠٪ من إنتاجه أحيانا، وفراشات الجيل الأول التي تخرج في شهر مايو ويونيه تستطيع أن تنتج ما يكفي من اليرقات لتجريد أشجار العنب من أوراقها في بداية شهر يولية.

### وصف الحشرة

يرقات هذه الآفة ذات ألوان مبهجة كما يظهر في اسمها العلمي *Brillians* ولون جسم اليرقة أصفر عليها خطان مستعرضان لونهما قرمزي، وعدد من الخطوط المستعرضة السوداء الرفيعة، وعلى جانبي كل حلقة من حلقات الجسم توجد خصلتان من الشعر الطويل الأسود، وهذه الشعيرات سامة وعندما تلامس جلد الإنسان ينتفخ الجلد بطفح يشبه الكدمات



مثل تلك التي تنشأ عن نبات القراص Nettles (وهو نبات نوو بر شائك)، إذا لامس الجلد وعند اكتمال نمو اليرقات يصبح طولها ١٥ مم (شكل ١٦٩).



(شكل ١٦٩) - يرقات دودة هيكل أوراق العنب، وترى الورقة وقد أكلت تماما بين العروق الرئيسية

والفراشة لها أجنحة طويلة ضيقة تطوى على ظهرها عند الراحة ويتراوح لونها من معدني قاتم إلى أزرق مسود إلى أزرق مخضر، وعند فرد الأجنحة يكون عرضها نحو ٢٥ مم (شكل ١٧٠) من نهاية طرف الجناح إلى نهاية طرف الجناح الآخر.

### دورة الحياة

عندما يكتمل نمو اليرقة تفرز شرنقة حريرية تعذر داخلها، وهذه الشرائق غير منتظمة الشكل ذات لون أبيض مغبر (شكل ١٧١) ويمكن أن توجد في النفائات الموجودة حول قاعدة الشجرة أو تحت القلف السائب، وإذا فتحت الشرنقة بعناية يمكن رؤية العذراء ذات اللون البني المحمر داخلها ويمكن استخراجها ويمكن لهذه العذراء أن تحرك طرف بطنها حركة


دائرية، وبعد أن تخرج الفراشة من الشرنقة تتزاوج الفراشات اليافعة وتضع الأنثى بيضها الشبيه بالكبسولات الصفراء (شكل ١٧٢) ويوضع هذا البيض على السطح السفلى للأوراق في مجموعات مكونة من نحو ١٠٠ بيضة وهذه تكون لطعة كبيرة، وللحشرة ثلاثة أجيال في السنة.




شكل ١٧٠. فراشة بودة هيكل أوراق العنب في حجمها الطبيعي

## طرق المكافحة

أفضل طرق المكافحة التخلص من مخلفات كرمة العنب أثناء الشتاء وحرقها فتموت العذارى الداخلة في البيات الشتوى والمعالجة الكيمائية لهذه الآفة يمكن إجرائها في بداية فصل الربيع بالرش بأحد المبيدات الحديثة ذات الأثر الباقي، والحد من كثافة أعداد الجيل الأول يؤدي إلى إضعاف الجيل الثانى والثالث.



شكل (١٧١) - الشرانق الحشرية لنودة هيكله أوراق العنب الغربية



شكل ١٧٢ - بيض فراشة نودة هيكله أوراق العنب الغربية على ورقة عنب


## ٤- بقعة الفراش المزيفة False Chinch Bug

الاسم العلمى للحشرة *Nysius ericae* (Schilling)

رتبة نصفية الأجنحة Order Hemiptera

فصيلة البق كريهة الرائحة Fam. Pentatomide

هذه البقة بقعة حقيقية وعليه فإن لها أجزاء فم ثاقبة ماصة، ولونها رمادى غامق وطولها نحو ٣ مم (شكل ١٧٣)، وتظهر هذه البقة فى الربيع على الحشائش بأعداد ضخمة جدا، وعند جفاف الحشائش يهاجر هذا البق بحثا عن النباتات الخضراء، وإذا وقعت كروم العنب فى طريق زحفها تعرضت لخسارة جسيمة، وعندما تضطر لترك الحشائش الجافة والهجرة منها تكون حينئذ فى طور صغير (حورية صغيرة) ليس لها أجنحة وتهاجر مشيا، ويوجد أيضا بين هذه الأعداد المهاجرة بق مجنح ولكنه يؤثر الهجرة مشيا مع الأطوار غير اليافعة



(شكل ١٧٣) - البقة المزيفة مكبرة ١٦ مرة

## وصف الحشرة

الحشرة الياقة يبلغ طولها ٣ مم، لونها رمادي فاتح أو غامق أما الحوريات فلونها رمادي وبطنها لونها بني محمر.

## دورة الحياة

يوضح البيض دون نظام (عشوائيا) في التربة أو في شقوق التربة، ويمكن لجميع أطوار الحشرة أن تدخل البيات الشتوي، ولكن الأطوار غير الياقة هي التي تدخل البيات الشتوي غالبا، ولهذه الحشرة ٦ أجيال في السنة، وإذا نضب معين الغذاء في الخريف فقد تحدث هجرة خريفية.

## مظهر الإصابة والضرر

عندما يغزو جيش من البق المزيغ كرمه فإنه يعتلى جنوع الأشجار ومنها إلى الأوراق حيث يبدأ البق مباشرة في امتصاص العصارة النباتية، وفي خلال ثلاث ساعات قد تعدو أشجار العنب السليمة في الكرم في حالة ضعف وذبول تام، ثم يتحول لون الأوراق إلى اللون البني وتجف وتسقط، ويمكن أن تتجدد أشجار العنب تماما من أوراقها.

وأكثر الهجرات خطورة وتدميرا هي تلك التي تحدث في مايو ويوتية عندما تجف الحشائش، ولكن توجد هجرة أخرى في الخريف خلال شهر سبتمبر.

## طرق المكافحة

ربما أمكن الحد من كثافة أعداد هذه الآفة بحرق الحشائش في الأراضي المحيطة بكرم العنب قبل هجرة البق منها، ولكن عادة لا يكفي بالحرق بل تستخدم المبيدات الكيماوية غالبا.

وحيث أن البق يهاجر في اتجاه واحد، ويستقبل صف أشجار العنب الواقع على حدود الكرم أولا، فإنه يمكن عمل حاجز بالكيماويات في طريق سير البق فلا يصل إلى الكروم.

ويمكن عمل شريط عمقه ٣٠ قدم ويعفر بالسيفين وهذا يكفي كحاجز يمنع تخطي هذه الحشرات له.

أما إذا وصلت أسراب البق إلى كرمه العنب قبل عمل الحاجز الكيماوى فيمكن استعمال أحد المبيدات الحديثة الفعالة فى رش أشجار العنب.

## ٥- فراشات أبى الهول التى تصيب العنب

تتنمى هذه الفراشات لرتبة حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera من فضله فراشات أبى الهول Fam. Sphingidae وفراشات هذه الفصيلة تتميز بكبر الحجم أو متوسطة وأجنحتها الأمامية طويلة ضيقة والجسم مغزلى الشكل إلى حد ما ويستدق نحو كلا الطرفين الأمامى والخلفى، وقرون الإستطلاع صولجانية وهى غليظة نوعا عند الوسط أو قرب الطرف، والخرطوم طويل جدا ويبلغ طوله أحيانا طول الجسم أو يزيد، والفراشات قوية الطيران وبعضها يطير نهارا ولكن معظمها ينشط عند الغسق أو الأصيل، ويرقات معظم الأنواع لها قرن شرجى واضح أو زائدة تشبه الشوكة على السطح العلوى للحلقة البطنية الثامنة، وتتحول يرقات معظم الأنواع إلى عذارى مكبله فى التربة.

ومن أنواع فراشات أبى الهول التى تصيب العنب مايلى:


## أ- دودة ورق العنب

الاسم العلمى للحشرة *Chaerocampa celerio* L.

وتتغذى يرقات هذه الحشرة على أوراق العنب، كما تتغذى على بعض النباتات الأخرى أو الأعشاب، وتوجد فى جميع مناطق زراعة العنب فى مصر والبلاد العربية، وقد وجدها المؤلف فى مكة المكرمة قرب الحرم المكى الشريف ووجدها (Pitway 1979) فى مناطق جدة والرياض والهفوف.

## وصف الحشرة

الفراشة كبيرة الحجم طولها ٤ سم والمسافة بين طرفي الجناحين الأماميين منبسطين نحو ٧ سم، ولون الجسم بني بمائل إلى الحمرة، ويمتد على الجناح الأمامي شريط فضي اللون والنصف القاعدي للجناح الخلفي أحمر (شكل ١٧٤) ويبلغ طول اليرقة نحو ٨ سم ولونها أخضر فاتح وتستدق حلقاتها الصدرية إلى الأمام - كما توجد بقعة سوداء محاطة بحلقة مائلة إلى الإصفرار على كل من جانبي الحلقة البطنية الأولى ويوجد قرن شرجي على الحلقة البطنية الثانية ويبلغ طول العذراء نحو ٣,٥ - ٤ سم وخرطومها ملتصق بالجسم وتوجد في نفس الأماكن وعلى نفس العوائل التي توجد بها اليرقة.



(شكل ١٧٤) - نورة ورق العنب: ١ - يرقة - ٢ - فراشة

## ب - دودة ورق العنب المتشابهة


الاسم العلمى للحشرة *Deilephilla livornica* Esp (*Celerio lineata* Fabr)

### وصف الحشرة

الفراشة تشبه فراشة الحشرة السابقة فى الحجم تقريبا كما تشبهها فى اللون إلا أن الجزء الأحمر الموجود فى الجناح الخلفى يمتد فى الوسط إلى جهة القمة، كذلك يظهر على بطن الفراشة شريطان أسودان متبادلان مع شريطين أبيضين (شكل ١٧٥) واليرقة تبلغ نحو ٨ سم فى الطول ولونها أخضر ويمتد على ظهرها فى الوسط خط أصفر مشوب بحمرة، وعلى جانب هذا الخط يوجد خطان طوليان آخران يمران فى بقع خضراء مستديرة تتوسط كل منها بقعة سوداء على كل حلقة من حلقات الجسم - كما يوجد خطان آخران لونهما أبيض مشوب بحمرة هما خطا الثغور والتنفسية، ويوجد على القرن الشرجى أشواك قصيرة سوداء.

### المخزأء

يبلغ طولها من ٣,٥ إلى ٤ سم ولونها بنى وخرطومها ملتصق بالجسم



(شكل ١٧٥) دودة ورق العنب المتشابهة: ١ - اليرقة ٢ - الفراشة




## جـ- دودة أبى الهول أشمون Achemon Sphinx Moth

الاسم العلمى للحشرة (Drury) *Pholus achemon*

من النادر رؤية هذه الفراشة لأنها تطير ليلاً وتختبئ بالنهار، وتغتنى الفراشة على رحيق الأزهار.

### شكل الحشرة

الفراشة كبيرة الحجم حتى كأنها الطائر الطنان وتحلق فى الهواء فوق الزهرة أثناء تناولها الرحيق، ويبلغ طول اليرقة فور خروجها من البيضة نحو ٥ مم، ويوجد فى مؤخرة الجسم قرن طويل أسود أطول من طول الجسم، وعندما يكتمل نمو اليرقة يصبح طولها ١٢.٥ مم وتأخذ ألواناً مختلفة، فبعضها يستمر لونه أخضراً مثل اليرقات الصغيرة ولكن البعض الآخر يصبح لونه قرمزيًا أو بلون القرميد الأحمر، وفى هذا الوقت تفقد اليرقة قرنها ويحل محله زرار قاتم اللون، ولليرقة شريط أبيض على كل من جانبيها يمر فوق الأرجل، وطول اليرقة التامة النمو نحو ١٠ سم وتشبه فى شكلها دودة الطماطم الخضراء المعروفة جيداً (شكل ١٧٦)



شكل (١٧٦) من الشمال إلى اليمين فراشة أبى الهول أشمون، يرقة صغيرة لفراشة أبى الهول أشمون قبل أن تفقد القرن الطرفى.

## دورة الحياة

تضع فراشة أبى الهول أشفمون بيض كبير أخضر اللون ويوضع هذا البيض فرديا على السطح العلوى لأوراق العنب ويفقس البيض بعد ٦ - ٩ أيام من وضعه، وفى حالج إرتفاع درجة الحرارة تكون مدة حضانة البيض قصيرة، وبعد الفقس مباشرة تأكل اليرقة فى ورقة العنب صانعة ثقبا صغيرا ناعما مستديرا وتزحف منه إلى السطح السفلى وتستمر فى عمل ثقوبا مستديرة صغيرة فى الورقة.

وتتغذى اليرقات على أوراق العنب لمدة ٢٥ يوما، حينئذ تتجه إلى الأرض وتنفذ إلى عمق ٢ - ٦ بوصات وتبنى خلية ملساء الجدران وتعذر داخلها، والعذراء مغزلية الشكل لها لون الماهوجنى البنى (الماهوجنى نوع من الخشب) ويبلغ طولها نحو ٥ سم (٢ بوصة)، وإذا حرثت الأرض فى فصل الربيع وتعرضت هذه العذارى للهلاك فإن المزارع سوف يأمن فورة هذه الديدان فى فصل الصيف. وتقضى الحشرة البيات الشتوى وهى فى طور العذراء فى التربة، وتخرج الفراشات من التربة فى النصف الأول من شهر مايو، ويظهر الجيل الثانى من هذه الآفة فى حقول العنب فى أوائل يولية، والجيل الثانى من اليرقات يكون أكثر عدد من يرقات الجيل الأول ويحدث أضرارا بالغة فى خلال شهر أغسطس، ويكمل الجيل فى خلال ٥٥ يوما، وفى بعض السنوات يوجد جيل ثالث صغير.

## مظهر الإصابة والضرر

تظهر هذه الآفة بصفة دورية أى أنها تكون خطيرة لعدة سنوات ويعقب ذلك سنين عديدة لا يكون لها أى شأن. واليرقة الناضجة تلتهم ٩ رقات من أوراق العنب كل ٢٤ ساعة، وعندما يتم تجريد أشجار العنب تماما من أوراقها فى كرمة ما، فإن اليرقات تتركها وتسير مسافة ربما طويلة حتى تصل إلى كرمة خضراء الأوراق.

## طرق المكافحة

فى مصر لاتكافح ديدان أبى الهول لقلة أضرارها وكبر حجمها بحيث يمكن جمعها باليد، ويفيد فى المكافحة عزق الأرض وحرثها وتشميسها فى نهاية فصل الشتاء حتى تتعرض العذارى الموجودة فى التربة للأعداء الحيوية والطيور والشمس.

ولكن في الولايات المتحدة تكافح هذه الحشرات كيماويا لزيادة أخطارها هناك، وتبدأ المكافحة في بداية فصل الربيع وعند بدء ظهور الجيل الأول، وتستجيب هذه الآفات للمكافحة باستخدام أى مبيد حديث فعال.

## ٦- ذبابة العنب البيضاء

الاسم العلمي للحشرة (*Trialeurodes vitatus*) (Quaintance)

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الذباب الأبيض Aleyrodidae (Aleurodidae)

### وصف الحشرة

يبلغ طول الطور اليافع نحو ١,٥ مم - لونها أبيض وجسمها مغطى بمسحوق شمعى أبيض يغطي الجسم والأجنحة

### دورة الحياة

تضع الأنثى البيض على الأسطح العليا أو السفلى للأوراق، والبيضة صغيرة جدا ولا يمكن رؤيتها إلا بالعدسة، وتتصل البيضة بسطح الورقة بواسطة حامل صغير جدا.

بعد الفقس تزحف اليرقة لمسافة قصيرة قبل أن تستقر دون حركة على السطح العلوى لأوراق العنب، وفي خلال هذا الطور لا يمكن تمييزها عن الحشرات القشرية، وخصوصا الحشرات القشرية الرخوة البنية اللون، ويمكن تمييزها عند ثنى الورقة التي توجد عليها ثنيا حادا لجعلها أكثر وضوحا للرؤية، وهذا لا يحدث مع الحشرات القشرية، وجسم اليرقة أخضر ليمونى محاط بشريط ضيق نو أهداب من الشمع ملاصق للورقة، وأنشاء تحول اليرقة إلى الطور اليافع، يصبح لونها بنيا غامقا ذات أهداب شمعية بيضاء.

وعند اكتمال نمو اليرقة تتحول إلى الطور اليافع تاركة جلدها الأخير معلقا بالورقة.

ولهذه الحشرة عدة أجيال في السنة. وتقضي الحشرة فصل الشتاء وهي في طورها الورقي، وتكون موجودة على الشجيرات الدائمة الخضرة التي تكون الأدغال، وفي الربيع تطير الحشرات اليافعة من الأدغال وتهاجم العنب ويصاب العنب في وقت مبكر في فصل الربيع، وتتكاثر الذباب البيضاء بسرعة كبيرة وتبنى عشائر ضخمة.

## الضرر

تصيب الذبابة البيضاء الثمار بالضرر بصفة رئيسية وتفرز عليها الندوة العسلية التي ينمو عليها الفطر الأسود.

## المكافحة الكيماوية

كما سبق أن ذكرنا في مكافحة الذباب الأبيض ومكافحة آفات العنب في بداية الربيع تفيد في مكافحة هذه الآفة أيضا.

## ٧- الحشرات الثاقبة الماصة والناقلة للأمراض الفيروسية

ينتقل الفيروس المسبب لأمراض العنب بواسطة أكثر من ٢٤ نوعا من الحشرات، ومن هذه أربعة أنواع من البق الباصق، وسمى هكذا لأن حوريات هذا البق تحيط نفسها عادة بكثرة من الإخراجات لونها أبيض، والأنواع العشرة الباقية من هذه الحشرات هي من نطاطات الأوراق، وعلى أي فإن نطاط أوراق العنب نفسه ليس من الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية.

ووصف البعض مظاهر الأمراض الفيروسية التي تصيب العنب والتي تنقلها الحشرات الثاقبة الماصة فيما يلي:

أ - جفاف أوراق الشتلات المصابة وتبدأ هذه الحالة بعد منتصف الموسم .

ب - ذبول وإبيضاض وجفاف وفقد اللون شجرة العنب أو جزء منها .

ج - تأخر سقوط الأوراق في جزء من شجرة العنب أو في الشجرة كلها .


د - تبقع الأوراق السفلية (في العادة من ٢ - ٨ أوراق) في النموات الحديثة تبقعا كاملا .

هـ - تأخر نمو النموات الحديثة في جزء من العنب أو في الشجرة كلها .

د - الموت التدريجي للمجموع الجذري .

ر - موت شجرة العنب.

ومن ضمن الأربعة والعشرين نوعا من الحشرات الناقلة لأمراض العنب الفيروسية، ثلاثة منها تعتبر من أهمها في نقل هذه الأمراض، ومن هذه الحشرات (شكل ١٧٧) ما يلي :



(شكل ١٧٧) نطاطات الأوراق الناقلة للفيروسات المسببة لأوراق العنب (مكبرة ١١) مرة الصف العلوى على اليسار نطاط الأوراق الأخضر أحد مظاهره التي أخذت لونا بنيا الصف العلوى إلى اليمين نطاط الأوراق ذو الرأس الأحمر. الصف السفلى إلى اليمين نطاط الأوراق ذو اللون الأخضر المزرق .

نطاط الأوراق الأخضر *Draeculacephala minerva* (Ball) ونطاط الأوراق ذو الرأس الأحمر *Hordnia cricellata* (Baker) ونطاطات الأوراق الأخضر المزرق *Carneocephala flugida* Nott وهذه الأنواع الثلاث تنقل من الأمراض الفيروسية إلى العنب، وهذه الأنواع وغيرها من الأنواع تنقل الفيروسات المسببة للأمراض بين ٧٣ نوعا من النباتات العائلة لها والتي تعمل كمستوعات لهذه الفيروسات .

وهذه النطاطات تتبع رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera، وفصيلة نطاطات الأوراق Fam. cicadellidae

ونطاطا الأوراق الأخضر يظل لونه في معظم أوقات السنة وتكن في بعض المناطق يتحول لونه إلى اللون البني في موسم الخريف وفي الشتاء وبداية الربيع، وفي الصيف يتحول لونه إلى الأخضر ثانيا، ويصل طول الأنثى إلى نمو ٦,٢٥ مم ولون السطح البطنى لها يكون شاحبا أما الذكر فهو أصغر حجما ولون سطحه البطنى غامقا. وتقضى الحشرة فصل الشتاء في طورها اليافع، وفي الربيع تضع الإناث البيض على الحشائش والأعشاب، والهوريات التي تخرج من البيض تشبه الحشرات اليافعة تماما إلا إنها تكون أصغر حجما ولم ينمو لها بعد أجنحة، ولهذه الحشرة ثلاثة أجيال في العام- وهذه الحشرة من الحشرات المألوفة التي يمكن تواجدها بسهولة في كل مكان، وهي تفضل الإغذاء على الحشائش ولها نحو ١٢٠ عاثلا نباتيا وأنثى النطاط ذو الرأس الأحمر يصل طولها إلى نمو ٥ مم بلون رأسها أكثر إستدارة من رأس النطاط الأخضر، ويمكن تمييزها بلون رأسها الأحمر بالرغم من لون جسمها الأخضر، وتقضى هذه الحشرة فصل الشتاء في صورة حشرة يافعة، ولها ٤ أجيال في السنة، وتوجد هذه الحشرة في الأماكن الأكثر رطوبة من الأماكن التي توجد منها حشرة النطاط الأخضر، أنثى النطاط الأخضر المزرق أصغر قليلا من أنثى النطاط الأخضر، ويتماوج لونها من الأخضر إلى الأزرق الزاهي في أعلا الجسم وإلى اللون الأصفر على السطح السفلى للجسم، ويوجد على السطح العلوى للجسم علامات سوداء مميزة لهذه الحشرة، وتوجد هذه الحشرة في الزراعات الكثيفة على طول شواطئ الأنهار وفي المناطق الساحلية، وتغذى وتترى على شجيرات العنب والأشجار، وعادة ما توجد على نباتات الزينة في الحدائق المنزلية، ويغذى هذا النطاط بامتصاص العصارة من قمة سلاميات شجيرات العنب، ويقضى الشتاء وهو في طور الحشرة اليافعة وله جيل واحد في السنة .

## مكافحة نطاطات الأوراق الناقلة لفيروسات الأمراض

لم تجرى مكافحة عملية لهذه الآفات حيث أنها تتربى في أماكن كثيرة وعلى عوائل مختلفة ثم تنتقل منها إلى العنب، وهذه الحشرات متواجدة طوال الموسم، لذلك فإن مكافحتها كيميائياً تعتبر مكلفاً للغاية .

## ثانياً الآفات الحشرية التي تصيب أزهار وثمار العنب

### ٨- خنفساء الهوبليا *Hoplia beetle*

الاسم العلمي للحشرة *Hoplia oregona* Leconte

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة order coleoptera

فصيلة الجعال Fam. scarabaeidae

تشهد هذه الخنفساء على أزهار الكثير من النباتات، وهي تنجذب بصفة خاصة إلى الأزهار البيضاء والورود وأزهار الليلى *Lilies* والبراعم الزهرية للبرتقال والبراعم الزهرية لأشجار فاكهة الحلويات، وعندما تنزعج هذه الخنافس فإن تسقط نفسها إلى الأرض وتدعى الموت، بالرغم من أنها قوية الطيران.


### مظهر الحشرة

يبلغ طول الخنفساء ما بين ٦ - ٨ مم غليظة الجسم، وبطن الأنثى أعرض من بطن الذكر وهي مبطنية تقريباً والسطح العلوى للخنفساء نولون أبيض محمر والرأس غامقة اللون، والسطح البطنى لها فضى لامع (شكل ١٧٧) .

### دورة الحياة

تضع الأنثى بيضها في التربة خلال شهر يونية ثم تموت بعد ذلك، وعند فقس البيض تخرج منه اليرقات واليرقة مقوسة الشكل تغتذى على جنور البرسيم، والحشائش الخضراء

الخضراء وغيرها من النباتات بما فيها الورد، اليرقة بيضاء اللون ومقوسة على شكل حرف «C» ولها أرجل قصيرة في مقدمتها الأمامية، وجزء الجسم الخلفي منتفخ سميك وتعذر اليرقات في التربة في الربيع الباكر، وتتحول إلى خنافس يافعة في الربيع أيضا وتخرج من التربة تاركة في مكان خروجها ثقوبا دائرية. وبمجرد خروجها تطير لمسافة ما إلى الأزهار والكروم لتفتذى وتتزاوج ثم ترجع إلى نفس المكان لتضع البيض، وقد لوحظ أن خنافس الهوبيليا تخرج من التربة من نفس المكان سنه بعد أخرى.



(شكل ١٧٨) إلى أعلى خنفساء الهوبيليا اليافعة (مكبرة ٤ أمثال حجمها الطبيعي) إلى أسفل يرقة خنفساء هوبيليا عنب النبيذ الأبيض.



## مظهر الإصابة والضرر

غالبًا تظهر الخنافس في جماعات وتقوم بالأغذاء على العنب فتحدث به خسائر جسيمة، ففي الوقت الذي يبلغ فيه طول ثمرات العنب الحديثة من ١٢ - ١٤ بوصة، تطير اليه خنافس الهوبليا وتغتنى على العناقيد النامية والأوراق الصغيرة، وهذا يحدث عادة قبل أن يصل طول العناقيد الصغيرة إلى ٣ بوصات، وبذلك تضر بالمحصول ضررًا بليغًا.

وبعد ظهور هذه الخنافس في كروم العنب بنحو أسبوعين - وتظهر عادة على الصفوف الخلفية من أشجار الكرمة - تتجرد أشجار العنب المصابة من أوراقها وذلك بسبب عادة هذه الخنافس في الإحتشاد في أعداد كبيرة أثناء تناولها الغذاء، وبعد ذلك الوقت، تتوقف أشجار العنب عن تكوين النموات والعناقيد الجديدة فتتوقف الخنافس بنورها عن الإغذاء، ثم تعوض أشجار العنب أوراقها بسرعة كبيرة ويصبح ضرر هذه الخنافس بعد ذلك ضئيلاً.

## المكافحة الكيميائية

تعفر أشجار العنب بأى مبيد حديث فعال بمجرد بدء الخنافس في الظهور والأغذاء على العناقيد النامية وأنصح باستعمال طريقة المكافحة البالية.

### ١ - لمكافحة الحشرات اليافعة لهذه الخنافس

يستعمل مبيد هوستاثيون ٤٠ ٪ بمعدل لتر واحد للفدان يضاف إليه ٤٠٠ لتر ماء أو مبيد لانيت ٩٠ بمعدل ٣٠٠ جم للفدان يضاف إليه ٤٠٠ لتر ماء.

يرش أحد المبيدين على سطح التربة في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس مع مراعاة ألا يصل محلول الرش إلى العناقيد الأخذة في التشكيل، ويعتبر هذا علاجاً مشتركاً لهذه الحشرة ولحشرة جعل الورد الزغبى.

٢ - حيث أن اليرقات تعذر في التربة وتغتنى أساساً على جذور البرسيم والحشائش، فيجب حرث الأرض جيداً في الربيع الباكر لتعريض العذارى للهلاك، ويمكن إضافة مبيد فيوردان ١٠ ٪ (مسحوق محبب) بمعدل ٨٠ إلى ١٠٠ مم لكل شجرة ثم تعزق الأرض ويضاف هذا المبيد مع الأسمدة العضوية التي تسمد بها الكرمة وتروى الأرض بعد ذلك رياً غزيراً.

## ٩- بق العنب الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة (*Pseudococcus maritimus* (Ehrh)

رتبة متشابهة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة البق الدقيقى Fam. Pseudococcidae

ويوجد فى مصر نوع من بق العنب الدقيقى اسمه العلمى (*Phenococcus vitis* (Neitiel) وهو يشبه تماما بق الموالح الدقيقى.

ويستطيع البق الدقيقى للعنب أن يحول عنقودا من العنب بسرعة إلى عنقود أسود لزج بما ينمو عليه من فطر العفن وبق العنب الدقيقى *P. maritimus* يوجد على الكثير من النباتات والعوائل الأخرى ويمكن أن يوجد هذا البق فى أطوار نمو مختلفة على أوراق العنب وسوقه وفروعه أو تحت قلف الأشجار السائب، ولكن ضررها الأكبر ينصب على الثمار.


### دورة الحياة

يقضى بق العنب الدقيقى *P. maritimus* فصل الشتاء فى طور البيضة أو أطوار صغيرة جدا فى محافظ البيض القطنية تحت القلف السائب لجنوع وأفرع أشجار العنب (شكل ١٧٨) وبحلول الربيع تتحرك الحوريات فى اتجاه البراعم لتغذى على النموات الحديثة اللينة، وتتحول الحوريات إلى الطور اليافع فى شهر يونية وتبدأ فى وضع البيض ويوضع البيض فى محافظ أو أكياس البيض المكونة من الشمع القطنى الغير محكم التى تضعها الإناث، وفى معظم الأحوال تتحرك الإناث إلى القلف قبل أن تضع أكياس البيض، ويفقس البيض فى شهر يونية، وتستند الحوريات الصغيرة إلى الخشب القديم فى منطقة تاج شجيرات العنب وتلامس الخشب القديم مستندة إليها لتغذى على العناقيد التى فى دور التكوين، وتتخذ من هذا مكانا مناسباً تغذى فيه وتنمو، وتحدث أفدح الخسائر للعنب فى شهر يونية من أفراد هذه الجيل.

والبيض الذى سيكون الجيل الثانى من البق الدقيقى يوضع فى الصيف والخريف، والهوريات الصغار التى يفقس عنها هذا البيض هى تدخل البيات الشتوى، ولهذا فلهذه الحشرة جيلان فى العام.

### مظهر الإصابة والضرر

يفرز بق العنب الدقيقى سواء كان فى الطور اليافع أو أطواره غير اليافعة - قطرات من



(شكل ١٧٩) كيس بيض بعد العنب الدقيقى وهورياته الصغيرة تحت تلف شجرة العنب

الندوة العسلية التى تتجمع قطراتها الصغيرة إلى قطرات أكبر تسيل وتلوث العناقيد المتكونة والأفرع والأغصان والسوق، وعند الإصابة الشديدة تتدحرج كريات الندوة العسلية وتتكاثر مكونة سيلا منها يسيل على الأغصان والأفرع، ويتبع ذلك نمو الفطر الأسود على الأوراق والعناقيد الصغيرة والأفرع، وعند إصابة العناقيد، تتشقق حبات العنقود وتتعفن بفعل العفن الأسود وغيره من الأحياء التى تدخل من هذه الشقوق.

## طرق المكافحة

توجد عوامل عدة تمنع بق العنب الدقيقى من التكاثر إلى الدرجة التى تجعله يحدث أضرارا كبيرة، وأولها هو درجة الحرارة فى شهر يونية فى وقت فقس البيض، ماذا كانت درجة الحرارة عالية بدرجة كافية، فإن معظم الحوريات الزاحفة سوف تموت، ويتعرض البق الدقيقى أيضا للكثير من المتطفلات والمفترسات التى تعمل على إنقاص كثافته العددية، وفى كثير من المناطق، تكون هذه الأعداء الحيوية كافية لكبح جماح هذه الآفة وتقليل أضرارها، ولكن من المؤسف أن النمل الذى يزور البق الدقيقى للعنب للحصول على إفرازاته العسلية يحافظ عليه من عدوان المتطفلات والمفترسات ويحميه منها حتى تتزايد أعداده.

### المكافحة الكيميائية

والمكافحة الكيميائية لبق العنب الدقيقى أمر صعب بسبب الإفرازات الشمعية التى يحيط نفسه بها والتى تحفظه من فعل المبيدات ولما كانت أعداءه من المتطفلات والمفترسات كبيرة بحيث تستطيع مكافحة هذه الآفة، حيويًا، ولكن النمل يتدخل ويعوق عملها، فإنه يمكن عمل مصائد لجذب النمل وإعدامه .

ومن طرق المكافحة الناجحة - تقليم أشجار العنب خلال شهرى ديسمبر ويناير ثم تقشير القلف وجمع مخلفات التقشير والتقليم وحرقتها ثم الرش بأحد الزيوت المعدنية ٢٪ مضافا إليها ملاثيون بنسبة ٢ فى الألف، وفى حالة ظهور الإصابة يرش العنب بالملاثيون ٥٧٪ بنسبة ٣ فى الألف على أن يوقف الرش قبل جنى المحصول بعشرة أيام على الأقل.

## ١٠. تربس العنب

الاسم العلمى للحشرة *Derpanothrips reuteri* Uzel

ويوجد نوع من تربس العنب فى مصر هو *Relithrips syriacus* Mayet

وتصيب تربس العنب أيضا البرقوق والكمثرى والخوخ والكاكى والورد والأكاليف .

### وصف الحشرة

حشرة تربس العنب اليافعة النوع *D.reuteri* دقيقة الحجم لونها أصفر يبلغ طولها نحو ٨,٠ مم، ويحدث ضررها الأعظم عندما تخدش الثمار فى عناقيد العنب وتجعل الثمار غير طبيعية ولا تصلح للمائدة (شكل ١٨٠).



إلى اليسار شكل ١٨٠ نذبات في ثمار العنب أحدثها إغتناء حشرات تريس العنب (الصورة من ملقا في أسبانيا) إلى اليمين : الأضرار التي أحدثتها التريس في أوراق العنب في نهاية فصل الصيف  
أما الطور اليافع للنوع *R. syriacus* فيبلغ طوله ٥ , ١ مم ولونه أسمر غامق أو أسود . وهذه الحشرة موجودة في جميع أقطار العالم العربى .

والتريس يتبع رتبة هدية الأجنحة order thysanoptera وفصيلة ثريبيدى *Fam.thripidae*.

### دورة الحياة

وأنذكر هنا دورة حياة *D. reuteri*، النوع تخرج حشرات التريس من البيات الشتوى في نفس الوقت الذى تنتفخ فيه البراعم نهاية شهر مارس، ويبدو أن الإناث وحدها هي التى تدخل البيات الشتوى، وتقضى هذه الأفة الفترة تحت قلف أشجار العنب، وتحت الأوراق الجافة وفي التربة، وتغتذى الإناث التى خرجت من البيات الشتوى في الربيع على الأوراق لمدة ٢٠ يوما، وفي أثناء ذلك تضع بيضا كثيرا، وذلك بغرز آلة وضع البيض في أنسجة الأوراق والأغصان وتضع البيض على مسافة قليلة تحت سطح الأنسجة، وتفقس اليرقات الأولى في شهر إبريل. ويسرع نمو الحشرات بارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وفي منتصف الصيف، ينتج تريس العنب جيلا كل ٢٢ يوما. وبذلك يستطيع هذا التريس أن يكون ستة أجيال في الموسم الواحد، ويبلغ تعداد هذه الحشرة حده الأقصى في الأسبوع الأخير من شهر يولية، وباضطراد نمو العنب تصبح الأوراق تدريجيا غير صالحة لاغتذاء التريس فيقل تعداده

بالتدريج، وتستطيع الحشرات اليافعة إستعمال أجنحتها فى الطيران فى الأيام الدافئة، وفى خلال مدة قصيرة تهاجر الحشرات من العنب وتنتشر فى مساحات رواسعة

### مظهر الإصابة والضرر

يحدث الضرر للثمار فى وقت مبكر عندما تبلغ الثمار ثلث نموها، ويحدث الضرر من كل من اليافعات واليرقات ولكن معظم الضرر يحدث من إغذاء اليرقات، وفى خلال الصيف يتركز وجود هذه الحشرات على الثمرات الحديثة والأوراق غير الملفوفة، ولا تغتذى حينئذ على العناقيد، وعندما تكون الإصابة شديدة فإن الثمرات الحديثة تجف وتموت وكذلك تذبل الأوراق الحديثة ثم تجف وتسقط تتجدد وذلك بعد شهر يونية،

### طرق المكافحة

لم تدخل هذه الحشرة برنامج المكافحة الكيميائية ولكن المبيدات المستعملة فى مكافحة الآفات الأخرى فى بداية الربيع تفيد فى مكافحتها.

## ١١- تريبس الأعشاب

يغتذى تريبس الأعشاب ويتربى على جميع أنواع النباتات، ويوجد منه ثلاثة أنواع مألوفة هى:

*Frankliniella occidentalis* (Perg), *F. moultoni* Hood. *F. minuta* (Moulton)

وهذه الأنواع يمكن أن تصيب كروم العنب، وهذه الحشرات مغرمة بمهاجمة النموات الثمرية وتتركز داخلها قبل الإزهار

ويوجد نوعان آخران من التريبس يصيبان العنب هما:-


تريبس الفول *Hercotrips fassatus* (Preg) وتريبس الموالح *Sierothrips citri* (Moulton)

ويصيب تريبس الفول كروم العنب غير المروية ويضر بها، ويوجد تريبس الموالح فى المناطق الحارة الجافة إذا ماتجاورت بساتين الموالح مع كروم العنب.

### شكل الحشرة

يختلف شكل حشرة تريبس الأعشاب من الأصفر إلى البنى القاتم، ويبلغ طول الحشرة اليافعة نحو ٧٠ مم، ويبلغ وإذا وضعت ورقة عنب مصابة بالتريبس بشدة على كف إنسان،

ينزل التربس على راحة اليد ويجرى مسرعا بحثا عن مكان آمن. (شكل ١٨١)



شكل ١٨١ تربس الأعشاب (مكبر ٣٢ مرة قدر الحجم الطبيعي).

## دورة الحياة

يستمر تربس الأعشاب في التكاثر طول فصل الشتاء في البلاد ذات الشتاء الدافئ، وتصل أعداده إلى مقادير كبيرة على الأعشاب أو، حاصيل الحقل ثم منها إلى كروم العنب وعند جفاف الأعشاب، يتركها التربس مهاجرا إلى كروم العنب وينزل بها خسائر كبيرة، في خلال أسابيع قليلة.

## مظهر الإصابة والضرر

يحدث تربس الأعشاب ندبا في النموات الحديثة للعنب في الربيع الباكر ويسبب قزمية هذه النموات، حيث تنحني الأغصان الصغيرة عند العقد مكونة شكلا متعرجا Zigzag وتصاب الأوراق ويصبح منظرها فضيا إلى حد ما، وأحيانا تتحول الندب في الأوراق إلى ثقوب، وبالإضافة إلى ذلك عند إغذاء تربس الأعشاب على قمم حوامل عناقيد المستقبل فإنها تسبب فيما بعد تفكك العنقود عند تكوينه.

## المكافحة

يمكن أن يؤدي إستعمال المبيدات الكيماوية المستخدمة في مكافحة نطاطات الأوراق في مكافحة تريس الأعشاب، ولكن تريس الأعشاب يظهر في الربيع الباكر قبل ظهور نطاطات الأوراق ويحدث ما يحدث من أضرار، وعليه فإن ظهر هذا التريس بأعداد خطيرة يمكن مكافحته بالتعفير بأحد المبيدات الفعالة.

## ١٢ - البقة الناقرة كريهة الرائحة

الاسم العلمي للحشرة *Eusehistus conspersus* Uhler

رتبة نصفية الأجنحة Oderr Hemiptera

فصيلة البق كريهة الرائحة Fam Pentatomdae

تهاجم هذه البقة مزارع العنب في نهاية الصيف وبداية الخريف بأعداد غفيرة لحدود لها، وهذا البق يمتص العصارة من الأوراق والبتلات ولكن ذلك لا يشكل ضررا يذكر على العنب، ولكن الضرر الكبير يأتي من إغذائها على حبات العناقيد الناضجة.

### وصف الحشرة

سبق وصف هذه الحشرة فيما سبق ونضيف عليه أن طول البقة اليافعة يصل إلى نحو ٩,٥ - ١٠ مم ولون الجسم بني، ولون الأرجل كهرماني ويوجد على الأرجل نقط دقيقة سوداء، والسطح السفلي للجسم أصفر اللون أو أخضر شاحب، والجسم صلب ويشبه الدرع (شكل ١٨٢)، والبقة اليافعة لها أجنحة وتستطيع الطيران لمسافات معتبرة.

### الدورة الموسمية

تقضى هذه الحشرة فصل الشتاء وهي في طورها اليافع وتكون موجودة تحت المخلفات النباتية الموجودة فوق سطح الأرض، وتخرج من البيات الشتوي في بداية شهر إبريل وتغذى



على أنواع كثيرة من النباتات الحولية وتضع بيضها على تلك النباتات، ويتم وضع البيض في مجموعات مكونة من ١٠ - ٢٠ بيضة، ويوجد على كل بيضة صف من الأشواك الصغيرة حول الحافة العليا، ويستمر وضع البيض خلال إبريل ومايو، وتخرج من البيض الحوريات الصغيرة غير المجنحة التي تغتذى على عدد من أنواع الحشائش ذات الأوراق العريضة ولاسيما المستردة والحماض dock وأذن الذئب mullein وذلك في خلال شهر يوليو، وأغسطس وسبتمبر، وتضع عندئذ بيضا ينتج حوريات تصبح يوافع في سبتمبر وأكتوبر، ويافعات الجيل الثاني هي التي تدخل البيات الشتوي.



شكل ١٨٢ - الطور اليافع للبقة الناقرة (مكبرة أربع مرات) لاحظ النقط السوداء على الأرجل

### مظهر الإصابة والضرر

حيث أن غزو هذه الحشرة لمزارع العنب يحدث قرب موسم الجمع، فإن مكافحة الكيماوية لها تصبح شيئا مستبعدا، فلا يمكن عندئذ إستخدام مبيدات كيماوية سامة على العنب المعد للتسويق، وعند إغتذاء البقة الناقرة فإنها تغرز أجزاء قمها الثاقب الماص في حبات العنب الناضج وتمتص العصارة، وتحدث جروحا في أماكن إمتصاص البق تسيل منها العصارة الحلوة مكونة كتلة بنية لزجة (شكل ١٨٣)، ويسبب نزيف العصير إنكماش حبات العنب وتكرمشها ثم إصابتها بالفطريات بعلد ذلك.



(شكل ١٨٣) الضرر الذي تحدثه البقعة الناقرة بحبات العنب لاحظ البقع التي كونها العصير النازف من النقر التي أحدثتها البقعة

### طرق مكافحة

حيث أن الإصابة بهذه البقعة يأتى قرب موعد الجمع فإن مكافحتها بالمبيدات الكيماوية يعد أمرا مستحيلا، ومن المعروف أن أسراب البق الناقرة يدخل إلى كروم العنب فى سبتمبر وأوائل أكتوبر ويسبق فى ذلك قطع البرسيم الحجازى فى الأراضى المجاورة، ويمكن أن تقع هجرة مماثلة لهذا البق فى منتصف الصيف عند جفاف الحشائش فى الأرض المجاورة، ولذلك عندما يعلم بأن عددا كبيرا من هذا البق موجود فى الأراضى المجاورة لكروم العنب، فإنه يمكن إجراء المكافحة الكيماوية له فى هذه الأراضى قبل أن ينتقل إلى العنب، وتجرى هذه المكافحة بالرش بمبيد باراثيون رطل واحد من المسحوق القابل للبلل تركيز ٢٥ ٪ لكل ١٠٠ جالون ماء.

## ثالثا الآفات الحشرية التي تصيب السلاميات والافرع والجذع ١٣ - حفار الافرع والاعصان


الاسم العلمى للحشرة *Polycan confertus* Le Conte

رتبة غمدية الاجنح Order Coleoptera

فصيلة سيدا هيسيدى Fam. Cerambycidae

### وصف الحشرة

الانثى لونها بنى او مسود وجسمها اسطوانى ويبلغ طولها نحو ١٧ مم، والذكر يشبه الانثى وطوله ٩ مم ويوجد دائما فى حالة إنتظار بينما الانثى تغتذى (شكل ١٨٤)



(شكل ١٨٤) حفار أفرع وأعصان العنب

إلى اليسار العذراء فى الوسط اليرقة - الحشرة اليافعة (مكبرة ٦ مرات)

## دورة الحياة

تضع الإناث الملفحة بيضها في شقوق القلف الخشن للأزراع أو الجذع، ويوضع البيض منفردا والبيضة اسطوانية حادة قليلا عند أحد طرفيها، بفقس البيض عن يرقات بيضاء اللون لها ثلاثة أزواج من الأرجل الكاذبة قرب الرأس البنية اللون، ويتضخم جسم اليرقة في نصفه الأمامي قرب الرأس.


وعندما يستقر الوضع باليرقات على جذع أو أذرع العنب تحفر في الخشب وتغتنى لمدة عام، وعندما يكتمل نموها - تقريبا في شهر إبريل - تقوم بالحفر في موقع قرب قمة الذراع حيث تكون خلية فارغة تعذر داخلها، وبعد أسبوعين أو ثلاث تتحول العذارى إلى حشرات يافعة.

## مظهر الإصابة والضرر

في فصل الربيع عندما يبلغ طول النموات الحديثة في أشجار العنب نحو ٨ إلى ١٠ بوصات، تتكشف هذه النموات المصابة إذا صادفتها ريع قوية، ويفحص هذه النموات المتكشفة الذابلة تجد أن هناك ثقبا محفورا في خشب هذه الأفرع، وهذا الثقب هو من صنع الحشرة اليافعة لهذا الحفار أثناء إغتنائها، وبالفحص الدقيق لهذه الأفرع يمكن أن تجد هذه الحفارات مشغولة بمثل هذا النوع من الإغتناء، ويكون الثقب من العمق بحيث يدخل فيه كل جسم الحفار أو قد يبرز جزء من جسمه من هذا الثقب.

وتسبب اليرقات مثل هذا الضرر بحفرها في الخشب في المناطق الميتة أو التي في طريقها إلى الموت، وطالما وجدت اليرقات فإنها تاكل في كل من المناطق الحية والميتة بنفس السهولة، وفي أثناء نموها البطيء فإنها تسد أنفاق الحفر بنشارة الخشب وبمخلفاتها، وتشبه هذه النشارة والمخلفات نشارة الخشب الناعمة جدا التي تنتج من نشر الخشب بالمنشار (شكل ١٨٥).

ويمكن أن يوجد في الذراع الواحد نحو ٢٠ من هذه اليرقات .



(شكل ١٨٥) - يحمل حفار ساق أفرع العنب في الخشب، والأنفاق قد سدت بنشارة الخشب ولكن النشارة قد أزيلت من النفق الموجود في أعلى اليسار حتى يظهر النفق

## ١٤ - حفار ساق العنب





الاسم العلمى للحشرة *Clorophorus varius* F.

ويبتع نفس الرتبة والفصيلة السابقة

وتصيب هذه الحشرة أشجار العنب الأرضى ودعاماته والسيستان والغاب كما تصيب بعض الأشجار الخشبية الأخرى وتسبب جفاف الأفرع المصابة التى تنقص إذا ما حركتها الرياح

### دورة الحياة

تضع الإناث بيضها على ساق وأفرع أشجار العنب والعوائل الأخرى، وبعد الفقس تحفر اليرقات أنفاقاً فى خشب الأفرع والسوق وتتحول إلى عذارى فى الأنفاق تحت القلف مباشرة، وتبلغ اليرقة التامة نحو ٢ سم فى الطول ولونها أبيض مصفر، وتعيش اليرقات طويلاً قبل أن تتحول إلى عذارى، وتخرج الحشرات اليافعة بكثرة ما بين مايو ويوليو، وتغشى الأزهار البيضاء اللون التابعة للفصيلة الخيمية.



(شكل ١٨٦) حفار ساق العنب (١) عذراء الحفار من السطح السفلى . (٢) عذراء الحفار من السطح العلوى  
(٣) أنثى الحفار. (٤) طفيل على الحفار.

والحشرة اليافعة تبلغ نحو ٩ - ١٢ مم في الطول ولونها أسود يتخلله أشرطة صفراء، ولون الأرجل وقرون الإستشعار مائل للإحمرار، وقرون الإستشعار أقصر من طول الجسم (شكل ١٨٦).

### طرق مكافحة حفارات العنب

ثم تجر محاولات لقتل هذه الحفارات بالمبيدات الكيماوية حيث أن إبادتها بالطرق الزراعية تكفى، وحيث أن يرقات هذه الحفار تدخل أشجار العنب بإصابتها أولا لأجزاء الأفرع والأزعر الميتة والضعيفة فإنه يجب المحافظة على أشجار العنب في حالة صحية جيدة، وجمع هذه الأجزاء الذابلة والميتة وإحراقها وخاصة في فصل الشتاء، وتغتنى هذه الحشرات على أخشاب الكثير من العوائل مثل شجيرات الزينة وأشجارها بما فيها أشجار الأكاسيا واللوز والتفاح والمشمش والتين والعنب والبلوط والزيتون والخوخ والبرقوق وغيرها، لذلك يجب جمع الأجزاء المصابة بين هذه العوائل إذا كانت مجاورة لكروم العنب وحرقها قبل حلول شهر مارس بينما تكون الآفة في طورها اليرقى.

## ١٥- الحشرات القشرية

تصيب الحشرات القشرية أشجار العنب ولكن ليس لها نفس الأهمية الإقتصادية في جميع المناطق.

ويمكن تقسيم هذه الحشرات إلى مجموعتين الأولى تلك الحشرات القشرية التي يمكن أن تغتنى على أكثر من مكان من شجرة العنب، والثانية تلك التي تختار مكانا معينا من الشجرة تستقر فيه وتغتنى عليه ولا تفارقه.

وكل الحشرات التابعة للمجموعة الأولى تفرز محلولاً سكرياً (ندوة عسلية) [والحشرات الأخرى التي تفرز ندوة عسلية هي البق الدقيقى والذباب الأبيض]، وعندما تصل حشرات هذه المجموعة الأولى إلى طورها اليافع يصل طولها إلى ٥ مم أو أكثر، وتشمل هذه المجموعة الحشرة القشرية ذات الوسادة القطنية والحشرة القشرية البنية الرخوة، وحشرة القيقب Ma-ple القشرية القطنية، وحشرة المشمش القشرية البنية والحشرة القشرية الثلجية المظهر، والحشرة القشرية السوداء.

وأفراد المجموعة الثانية تغتذى حيثما وجدت في موقع على شجرة العنب تستقر عليه، وهذه الحشرات لا يمكن أبدا أن يزيد قطرها عن ٢,٥ مم، وتضم هذه المجموعة الحشرة القشرية المحارية، وحشرة الزيتون القشرية، والحشرة القشرية الحمراء وحشرة العنب القشرية والحشرة القشرية سان جوزيه، وحشرة الجوز القشرية.

وفيما يلي نذكر أهم الحشرات من المجموعتين، والحشرات القشرية كلها تتبع رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

## حشرة المشمش القشرية البنية

الاسم العلمي للحشرة *Lecanium corni* Bouche

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccide

الحشرات اليافعة لهذه الآفة بنية اللون وهي مثال لحشرات المجموعة الأولى ويصل طول الحشرة اليافعة من ٢ إلى ٥ مم وهي نصف دائرية تقريبا في شكلها (شكل ١٨٧) وقد توجد على أوراق العنب ولكن يوجد معظمها على السوق التي تكونت حديثا في نفس الموسم أو تلك التي يصل عمرها حتى ٣ سنوات، ويوضع البيض أسفل جسم الحشرة الذي سرعان ما يزيد عدده حتى يملأ الفراغ أسفل الجسم وتصبح القشرة الخارجية للجسم وكأنها غطاء لمحافظة مملوء بالبيض، ويوضع المزيد من البيض تحت الجسم يصبح جدار جسم الحشرة القشرية صلبا وبعد موت الحشرة يصبح هشاً مفككا.

وتتغذى الحشرة البيات الشتوى على خشب العنب الذي يبلغ من العمر من سنة إلى ثلاث سنوات، وتكون الحشرة حينئذ في طورها غير اليافع (حوريات) وللحشرة جيل واحد في العام وتفرز هذه الحشرة كميات كبيرة من الندوة العسلية التي تجعل عناقيد العنب لزجة سوداء اللون لنمو الفطريات عليها تماما كما تفعل حشرة بق العنب الدقيقي.

## طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة بأحد المبيدات الحديثة التالية:



باسودين ٦٠ ٪ بنسبة ١,٥ في الألف

أوسوميثيون ٥٠ ٪ بنسبة ١,٥ في الألف

أوملاثيون ٥٧ ٪ بنسبة ٢,٥ في الألف

وتستعمل هذه المبيدات رشاً مرة واحدة صيفاً خلال شهر يوليو، ويضاف إلى أيها زيت معدني بنسبة ١,٥ ٪ للرش في فصل الشتاء خلال شهر فبراير



(شكل ١٨٧) حشرة المشمش القشرية البنية

### حشرة القيقب القشرية القطنية

الاسم العلمي للحشرة *Pulvinaria vitis* (Linn)

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

توجد إناث هذه الحشرة المنتجة للبيض على سلاميات العنب النامية من الموسم السابق،

ويتوالى وضع الأنثى للبيض يتضخم كيس البيض وتضع الأنثى نحو ٣٠٠٠ بيضة، ويبقى كميس البيض لفترة بعد موت الأنثى ثم يفقس البيض وتخرج منه الحوريات الزاحفة حتى تستقر على السطح السفلى للأوراق.

ولون هذه الحوريات أصفر أو مخضر، وتفتدى هذه بفرز أجزاء فمها الرفيعة فى الأنسجة الحية حيث تمتص العصارة النباتية، وتفرز هذه الحوريات السائل السكرى الذى يسيل حيث تتجمع مستعمرات هذه الحشرة ويتساقط فوق الأوراق، والثمار التى تبدو مبتلة ولامعة، ثم ماتلبث الفطريات السوداء أن تنمو عليه فيصبح منظر عناقيد العنب غير مقبول، ويجذب السائل السكرى النمل إليه، ويمكن رؤية الأوراق اللامعة اللزجة والنمل يغشاها قبل التعرف بالرؤية على حوريات هذه الحشرة التى أصابت العنب.

وفى نهاية شهر يوليو وأوائل شهر أغسطس، تنمو الحوريات وتظهر الذكور اليافعة المجنحة الصغيرة الحجم جدا، وبعد التزاوج تزحف الإناث غير المجنحة راجعة إلى سلاميات العنب لتقضى عليها فصل الشتاء ويصل طولها فى ذلك لوقت إلى نحو ٣ - ٤ مم وتكون مبططة الجسم وبيضية فى مظهرها الخارجى ولونها بنى، وتصل إلى تمام حجمها فى شهر مايو وحينئذ يكون طول الحشرة ٥ مم.

### طرق المكافحة

إذا كوفحت حشرة المشمش القشرية البنية فى فصل الشتاء فإن هذا يكون كافيا لمكافحة هذه الحشرة أيضا.

## حشرة العنب القشرية

الاسم العلمى للحشرة (*Diaspidiotus uvae*) (Comstock)

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية Fam. Diaspididae

وتعتبر هذه الحشرة القشرية نموذجا لحشرات المجموعة الثانية، والإصابة بها تعطى العنب

مظهرا أبيض اللون قذرا عندما تكون الإصابة شديدة، وتستطيع هذه الحشرة إصابة أى جزء من الأجزاء الخضرية لشجرة العنب متى وصلت إليه وغرزت فيه أجزاء فمها الإبرية، وتوجد معظم هذه الحشرات على سلاميات العنب عمر سنتين، وعندما تزيد أعدادها ربما أوقفت نمو الشجرة وتنتج كل أنثى من ٣٥ - ٥٠ بيضة تفقس إلى حوريات صغيرة الحجم جدا، تزحف تحت سطح القلف السائب المتكون فى الموسم السابق وتستقر غالبا فى شكل صفوف، ويعد إستقرارها تغذى هذه الحوريات على مواقع أخرى من الشجرة، وتقضى الشتاء فى صورة طور نصف يافع. وتكافح هذه الحشرة مثل غيرها من الحشرات القشرية التى تصيب العنب وذلك برشها فى فصل الشتاء، وتكافح هذه الحشرات جميعا بمعاملة واحدة، فقط يجب تقشير القلف السائب قبل المعاملة بالكيماويات، ويمكن إستعمال زيت معدنى فى فصل الشتاء بمعدل ٤ جالون من الزيت إلى كل ١٠٠ جالون ماء لمعاملة كافة أنواع الحشرات القشرية التى تكون فى حالة سبات شتوى.

## ١٦ - السيكاذا أو نطاطات الأوراق

رتبة متشابهة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة نطاطات الأوراق Fam. Cicadellidae (Jassidac)

تعرف السيكاذا أو نطاطات الأوراق جيدا بسبب أصوات الطنين الذى تحدثه فى أيام الصيف الحارة خصوصا بعد الظهر، وبالرغم من أن كل إنسان قد يسمع أصواتها فإن القليل هو الذى يستطيع رؤيتها بالرغم من كثرة أعدادها، وعند تقدمها تقوم بحركات كروفر حول سوق النباتات وفى مواجهة الفاحص.

ويوجد نوع من أصفر أنواعها حجما يصيب العنب ويسمى النطاط الأصفر واسمه العلمى *Platypedia minor* Uhler ويسبب له بعض الخسائر أحيانا.

### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة للنطاط الأصفر سوداء أو برونزية اللون ويبلغ طولها نحو بوصة ولها زوج

من الأجنحة الكبيرة الشفافة، وتصدر هذه الحشرات صوت فرقة يشبه إصطدام قطعتين من الزجاج مع بعضهما بسرعة.

## دورة الحياة

يبدأ نشاط الإناث في وضع البيض في نهاية شهر إبريل، فور خروج الحشرات اليافعة، والإناث مزودة بقضيب قوى مسنن موجود في النهاية الطرفية للبطن وبواسطة هذا القضيب تستطيع الأنثى أن تحفر ثقباً في الخشب الصلب، وتحفر هذه الإناث ثقوباً في سلاميات العنب لتجهيز مكانا تضع فيه البيض، وبعد أن تنخر الأنثى الثقب تضع فيه أربع أو خمس بيضات ثم تتحرك للأمام نحو بوضة وتكرر نفس الصنيع حتى يتم لها عمل صف من هذه الثقوب مكون من ٥ - ١٠ ثقباً.

يفقس البيض بعد أسبوعين أو ثلاث، وتأخذ الصغار طريقها إلى الأرض وتحفر فيها، والأرجل الخلفية لهذا النطاط متضخمة للغاية لكي يستعملها في حفر التربة. ويستطيع أن يحفر في التربة لعمق ٣ - ٤ أقدام حيث يتغذى على جذور عدد من أنواع النباتات. وتقضى هذه الحشرات تحت سطح التربة من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل أن تصل الحوريات إلى تمام نضجها وتحول إلى يافعات مجنحة، حينئذ تترك النطاطات الصغيرة التربة وتزحف لعدة بوصات على الحشائش والأسجية والدعامات ثم ينسلخ جلدّها من أسفل الظهر وتحول إلى يافعات تاركة جلدّها الذي إنسلخ منها معلقاً وملتصقاً بشدة بالدعامات.

## مظهر الإصابة والضرر

إنّاث هذا النطاط هي التي تسبب الضرر لأشجار العنب أثناء نشاطها لوضع البيض، فكل ثقب تصنعه الأنثى في سلاميات العنب يمكن تمييزه من منظره وما يتساقط فيه من الياف خشبية فضية اللون (شكل ١٨٨) ولكن ليس من المعروف عما إذا كانت الحوريات في التربة تغتذى على جذور العنب أم لا إذ أنه من المعروف عنها أنها تغتذى على جذور البرقوق الفرنسي، ولكن عند وجود البرقوق والعنب معا فإن الإناث اليافعة تفضل العنب لعمل الثقوب التي تضع فيها بيضها، وهذا يؤكد أنه من المحتمل أن تغتذى حوريات هذه الحشرة على جذور العنب.



(شكل ١٨٨) - الأضرار التي يحدثها نطاط العنب الأصفر، لاحظ الألياف الخشبية البيضاء التي تبرز من سلاميات العنب أثناء عمل الإناث لتقوب وضع البيض

### طرق المكافحة

يمكن مكافحة هذه الحشرة بالطرق الزراعية مثل حرث التربة وقلبها وعمليات العزيق.

وعندما تصل حوريات السيكاذا إلى تمام نموها فإنها تأخذ طريقها إلى أعلا لبعد بوصة أو اثنتين أسفل سطح الأرض ويحدث ذلك في شهر فبراير، لذلك يجب حرث الأرض قبل

خروج الحشرات اليافة فى الأسبوعين الأخيرين من إبريل وهذا يؤدى إلى سحق الكثير من هذه الحشرات وهلاك عدد كبير منها ولا تمارس المكافحة بالمبيدات إلا عند الضرورة وتستخدم لذلك أحد المبيدات الفعالة فى رش الحشرة.

## ١٧- الأرضة أو النمل الأبيض

رتبة الحشرات متماثلة الأجنحة Order Isoptera

يرود النمل الأبيض مزارعى العنب فى بعض المناطق وذلك بسبب إصابتها للدعامات الخشبية التى يعدها المزارعون لعمل سنادات أو تكعيبات العنب أو كدعامات لأشجار العنب الصغيرة أو الخشب الذى يوضع كأعمدة تشد عليها الأسلاك الدعامية، وفى كثير من الأحيان لا يمكن ملاحظة الإصابة حتى تضعف هذه الدعامات الخشبية وتنكسر وتسقط فجأة، والنوع الذى يصيب العنب هو نوع تحت أرضى إسمه العلمى *Reticulitermes hesperus* Banks وتوجد أنواع أخرى كثيرة تختلف باختلاف المناطق تصيب العنب ولكن هذا النوع هو النوع الشائع فى الغرب وشرق البحر المتوسط والأماكن القريبة من الصحراء وهو يتبع فصيلة راينوترميتى

Fam. Rhinotermitidae

### شكل الحشرة

تظهر الأفراد الجنسية من هذه الأرضة خلال فصل التطريد، وهى سوداء اللون لها زوج من الأجنحة الإسطوانية الشكل، ويظن البعض أنها من النمل المجنح ولكن يمكن تمييزها بسهولة عن النمل بوسطها العريض، بينما أفراد النمل لها خصر إسطوانى رفيع جدا يكارى يكون خيطيا.

### دورة الحياة

يطرد النمل تحت الأرضى بعد سقوط أول أمطار فى فصل الخريف، والتطريد Swarming هو طيران التزاوج للأفراد الجنسية المجنحة. وبعد طيران قصير تتشابه الذكور والإناث فى أزواج تسقط على الأرض حيث يتم التلقيح وبعده تقصف هذه الأفراد أجنحتها، وكل زوج منها

يكون ملكة وملك المستعمرة الجديدة التي سوف يكونانها، ويتم ذلك بحفر هذا الزوج لثقب في التربة ثم نفق تضع الملكة فيه بيضها الذي يفقس عن أفراد غير مجنحة هي الشغالات.

والجيل الأول من الشغالات يفتدى على ما يرجعه الأبوان من محتويات معدتهما، وعندما تصبح هذه الشغالات قادرة، فإنها تبحث عن الخشب المناسب لغذائها في منطقة العيش، ولكي تدخل هذه الشغالات أخشاب شجر العنب فلا بد لها من أن تقتحمها من خلال الجروح الموجودة في خشب القلب والتي سبق أن صنعتها الخنافس، أو من الأجزاء التي أصابها العطب من هذا الخشب.

### مظهر الإصابة والضرر

عند مهاجمة الأرضة لأشجار العنب فإنها لا تغتذى إلا على خشب القلب Heart wood وتتغذى على خشب العصاري Sapwood وتعيش الأرضة سنين عديدة في خشب القلب ولا تخترق الخشب العصاري الذي يحيط بخشب القلب من الخارج وبذلك يضعف خشب القلب مما يؤدي إلى إنكسار الشجرة بعد مدة.

وتصاب أشجار العنب المسنة من جراء إصابة الأرضة لها بأضرار أكبر بكثير مما لأشجار الحديثة العمر، وفي بعض المناطق تصاب الأشجار عمر ١٠ سنوات فأكثر على وجه الإطلاق، وفي كروم العنب المسنة يصبح الخشب العصاري للأشجار أكثر نحافة، وتساعد الجروح السطحية والقطع المنشاري الجائر والذي يجعل خشب القلب ظاهراً - في زيادة احتمال الإصابة وسهولة غزو الأرضة للأشجار.

### طرق المكافحة

توجد بعض الأساسيات الواجب اتباعها في مكافحة أرضة العنب، أولها عدم تعريض أشجار العنب للجروح من جراء استخدام أدوات الزراعة بون احتراس ومن المسلم به أن القطع المنشاري للأشجار على إرتفاع ١٢ بوصة أو أكثر فوق سطح الأرض لا يسمح للأرضة بغزو هذه الأشجار، مالم تتسبب إصابة خشب القلب بفطر عفن يجعله ليناً أو كان هذا الخشب مصاباً بالخنافس الناخرة للخشب وتصنع دعامات الأشجار عادة من خشب القلب الأحمر أو

أى نوع من الأخشاب الصلبة التى تصنع منها أعمدة التليفون وهذه الأخشاب مقاومة فى صناعة الدعامات فيمكن دهانها بطبقتين من قار الفحم أو الكريوزوت أو تغمر هذه الدعامات فى الكريوزيت الساخن، ويمكن حقن الكريوزوت فى خشب الدعامات بأجهزة الحقن الحديثة، وفى هذه الحالة يجب أن يمتص هذا الخشب ١٠ أرطال من الكريوزوت لكل قدم مكعب من الخشب وتوجد بعض المركبات الكيميائية الحديثة التى يعامل بها خشب الدعامات لنفس الغرض أهمها المركب بنتاكلوروفينول Pentachlorophenol وتذاب هذه المادة بنسبة ٥ ٪ من وزنها إلى ٩٥ ٪ بالوزن من زيت بترول، وتضغط هذه المادة فى إسطوانات يغمر فيها الخشب ويزداد الضغط حتى يمتص كل قدم مكعب من الخشب ٨ أوقيات من هذا المحلول.

## رابعاً الآفات الحشرية التى تهاجم البراعم والنموات

### الصغيرة جداً

### ١٨ - الديدان القارضة

وهى تابعة لرتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الفراشات الليلية Fam. Noctuidae

تصيب الديدان القارضة براعم العنب فى الربيع الباكر وتلحق بها الأضرار وتتزامن هذه الإصابة والضرر مع الضرر الذى تنزله خنافس البراعم والخنافس المفرقة (فرقع لوز) بهذه البراعم.

ويمكن معرفة إصابة البراعم بالخنافس المفرقة بسهولة، حيث تحدث هذه الإصابة فى وضوح النهار، ولكن الديدان القارضة وخنافس البراعم حشرات ليلية تمارس نشاطها فى الإضرار بالبراعم ليلاً، وتكافح هذه الآفات الثلاث معاً بنفس المعاملة بالكيماويات، ولكن معرفة سلوك وطباع كل منها يفيد فى هذه المكافحة.

وتهاجم العنب العديد من أنواع الديدان القارضة، ولكن يشتهر منها ثلاثة أنواع هى: النودة القارضة المتشابهة *Peridroma margaritosa* (Halworth) والنودة القارضة العادية أو



السوداء (*Agrotis ypsilon* (Rothemberg) والدودة القارضة البرونزية (*Orthods rufula* (Grote) ومن هذه الثلاث تشتهر الدودة القارضة المتشابهة في بعض الأقطار والدودة القارضة السوداء في أقطار أخرى.

هذا وقد سبق لنا سرد تاريخ حياة الدودة القارضة ووصفها في مواضع سابقة من هذا الكتاب.

### مظهر الإصابة والضرر

تبدأ إصابة العنب بالديدان القارضة من وقت بدء البراعم في التضخم وحتى يصبح طول الثمرات الحديثة بضع بوصات، وفي أثناء النهار تختبئ الديدان القرصة تحت القلف السائب أو في التربة تحت قواعد شجيرات العنب، وبالليل تتسلق هذه الديدان شجيرات العنب وتغتنى على البراعم والنموات من جانب واحد، وعادة تؤكل النموات جزئياً من جانب واحد يجعلها عرضة للتقصف والسقوط.

هذا وعادة القرص الجزئي للأفرع الحديثة للعديد من النباتات هو الذي أعطى هذه الديدان إسمها، وإذا لم يوجد غذاء كاف قرب سطح الأرض فإن الديدان القارضة تتسلق شجيرات العنب وتغتنى على البراعم والنموات الحديثة وهنا تسمى الديدان القارضة المتسلقة.

### طرق المكافحة:

سبق ذكر طرق مكافحة الديدان القارضة، وتتلخص هذه الطرق بحرق الأرض أو عزقها في فصل الخريف لتعريض غذاري الدودة القارضة للأعداد الطبيعية والشمس مما يؤدي إلى التخلص من عدد كبير منها

كذلك تستخدم الطعوم السامة التي تنتثر بين الخطوط في مكافحة هذه الديدان وقد سبق لنا ذكر ذلك بالتفصيل

## ١٩ - خنفساء براعم العنب

الاسم العلمي للحشرة *Glyptoscelis squamulata* Crotch

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Oroler Coleoptera

فصيلة الخنافس الورقية Fam Chrysomelide

هذه الخنفساء من آفات العنب الثانوية، ولكنها في السنين الأخيرة أصبحت من الآفات


الرئيسية الخطيرة في بعض البلاد ودمرت نصف المحصول أو يزيد، وتصيب هذه الآفة أيضا بعض النباتات مثل الخبازي وأشجار الحور والصفصاف، والكثير من المزارعين لا يستطيعون إكتشاف الإصابة بخنفساء براعم العنب لأن طريقتهما في الإغذاء ومظهر الإصابة بها تشبه مظهر الإصابة بالديدان القارضة، وهي تختبئ نهارا وتمارس الإغذاء ليلا ولذلك يصعب إكتشاف وجودها، ولكن يمكن التأكد من وجودها باستخدام كشاف كهربائي للبحث عنها على أشجار الكروم ليلا في ليالي الربيع الدافئة.

### شكل الحشرة

لون هذه الخنفساء رمادي فاتح ذات أعماد صلبة يبلغ طولها ٦,٢٥ مم (شكل ١٨٩)، ويغتنز على براعم العنب عدد قليل منها بينما الغالبية العظمى تكون مختبئة أسفل قلف العنب، لذلك إذا وجد عدد قليل من هذه الخنافس تهاجم البراعم فلا ينبغي التقرير بأن الإصابة بسيطة ويجب حساب الأعداد المختبئة منها أسفل القلف.

### دورة الحياة

تضع الإناث بيضها في الربيع وتخفيه في أعماق شقوق قلف أشجار العنب، ويوضع البيض في شكل كتل مندمجة والكتلة منها مكونة من ٢٠ - ٣٠ بيضة، وبعد أيام قليلة يفقس البيض وتخرج منه اليرقات أو تسقط على الأرض وتبدأ الحفر مباشرة في التربة، وذلك بحثا عن جنود أشجار العنب حيث تغتنز عليها مسببا ضعفا عاما للأشجار المصابة، وقد تتعمق اليرقات لمسافة ٢ - ٣ أقدام في التربة بحثا عن جنود العنب، وتبقى اليرقات في التربة طوال الصيف والخريف والشتاء، وفي الربيع الباكر تبني اليرقة خلية ناعمة في التربة تدخل فيها وتتحول إلى عذراء، التي تخرج منها الخنفساء اليافعة فيما بعد.



شكل ١٨٩ إلى اليسار خنفساء براعم العنب (مكبرة ٦ مرات) إلى اليمين كتلة بيض خنفساء براعم العنب (٤٢) بيضة وضعتها أنثى واحدة)

### مظهر الإصابة والضرر

مثل الديدان القارضة، تغتذى خنفساء براعم العنب في الربيع على البراعم المتفتحة أثناء الليل، وعند طلوع النهار تزحف الخنفساء وتختبئ في شقوق التربة أو تحت القلف السائب لجنوع أشجار العنب وأذرعه.

وتأكل الخنافس البراعم المنتفخة أو المتفتحة، بادئة من قمة البرعم ثم تأخذ طريقها إلى القلب وتأتي عليه ليصبح البرعم مفرغا ومحاطا فقط بالقشور الخارجية ثم يموت، وبعد أن يصبح طول النموات الحديثة للعنب ١ - ٢ بوصة، يمكن معرفة البراعم المصابة لعدم نموها، وفي العادة لا يصاب إلا جانب أو أكثر من نقط النمو في البرعم ويمكن لها أن تنمو لتكون سلاميات ولكنها لا تكون مثمرة.

### طرق المكافحة

بالرغم من أن لهذه الخنافس أجنحة تامة النمو إلا أنها نادرا ما تستخدمها في الطيران لذلك يسهل مكافحتها كيميائيا بالرش بأحد المبيدات الحديثة، والمعاملات بالمبيدات التي تجرى على آفات العنب الأخرى في فصل الربيع تفيد أيضا في مكافحتها.

## ٢٠ - الخنفساء المفرقة (فرقع لوز)

الاسم العلمي للحشرة *Agrypnus notodonta* Latr

رتبة غمدية الأجنحة Oroler Coleoptera

فصيلة الخنافس المفرقة Fam. Elateridae

سبق شرح كل مايتعلق بهذه الآفة بالتفصيل في موقع آخر من هذا الكتاب، ويوجد منها في مصر وحدها أكثر من عشرين نوعا ولكن الشائع منها هو *A. notodonta* كما تنتشر منها أنواع أخرى في كافة، الأقطار العربية. وورقات هذه الحشرة تعرف بإسم الديدان السلكية، ولكن الديدان السلكية رغم إصابتها وإضرارها بالعديد من المحاصيل الأخرى لاتعتبر من آفات جنور العنب الشديدة الخطورة وربما لاتكون ضارة على الإطلاق، وتوجد الديدان السلكية في التربة المزروعة بالعنب ولكنها تغتذى فيها على جنور الحشائش والنباتات المحملة على أشجار العنب.

ولكن الحشرة اليافعة وفرقع لوز) في الطور الضار بأشجار العنب، ويوجد نوع من هذه الخنافس معروف في الغرب كافة من آفات أشجار العنب هو *Limonijs canus* Leconte وربما كان موجود في مزارع العنب في الجزائر وشمال إفريقيا.

### شكل الحشرة ودورة حياتها

سبق شرحها فيما سبق

### مظهر الإصابة والضرر

تغتذى الخنفساء المفرقة على براعم العنب في الربيع الباكر، وتتشابه الإصابة بها مع الإصابة بالدودة القارضة وخنفساء البراعم، ولكن بخلاف الحشرتان السابقتان فإن الخنفساء المفرقة قد تشاهد وهي تغتذى على قمة براعم العنب في أثناء النهار (شكل ١٩٠)، وحيث أن لهذه الحشرة أجنحة تستطيع الطيران بها فإنها تطير من برعم إلى آخر ولا تزحف كما في خنفساء البراعم، وتشاهد وهي تطير في الأيام الدافئة في فترة ما بعد الظهر.

## طرق مكافحة

نادرا ماتتواجد الخنافس المفرقة بأعداد كافية توجب إجراء مكافحة مستقلة لها، ولكن المكافحة الكيميائية التي تجرى على آفات العنب في فصل الربيع تفيد في مكافحتها.



(شكل ١٩٠) خنفساء مفرقة تدمر إنتفاخ برعمى على غصن

## ٢١ - الخنفساء البرغوثية

الاسم العلمى للحشرة *Altica torquata* LeConte

رتبة غمدية الأجنحة Oroler Coleoptera

فصيلة الخنافس الورقية Fam. Chrysomelidac

هذا وتوجد فى مزارع العنب كثير من أنواع الخنافس البرغوثية ولكن النوع المذكور أعلاه هو الذى يصيب العنب بالضرر ومن أنواع هذه الخنافس الموجودة فى مصر النوع المسمى *Phyllotreta cureiferaa* Goeze ولايشكل هذا النوع أى خطورة على العنب فى مصر.

وسميت الخنافس البرغوثية بهذا الاسم لقدرتها على الوثب مثل البرغوث.

## وصف الحشرة

لون الحشرة اليافعة معدنى لامع أو قرمزي ويبلغ طولها نحو ٣,٥ مم.

## دورة الحياة

تقضى الحشرات اليافعة فصل الشتاء تحت المخلفات النباتية السطحية الموجودة على الأرض ثم تنشط فى فصل الربيع وتهاجم براعم العنب، وبعد أن تغتذى لايام قليلة تضع الإناث بيضها فى شقوق القلف أو على قاعدة البراعم، والبيضة صغيرة الحجم لونها بنى فاتح، ويفقس البيض فى الوقت الذى تخرج فيه الأوراق الصغيرة، وتغتنى اليرقات الصغيرة على السطح العلوى للأوراق النامية لمدة ٣ - ٤ أسابيع وتثقب هذه الأوراق بثقوب صغيرة غير منتظمة الحافة، وعندما تصبح هذه اليرقات تامة النضج يكون طول الأوراق النامية قد وصل إلى ٨ مم، واليرقات الناضجة لونها بنى مصفر منقط بنقط سوداء صغيرة، وبعد تمام نمو اليرقة تسقط إلى التربة وتخترقها إلى عمق ٢,٥ سم وتبنى لنفسها خلية فى التربة تتحول داخلها إلى عذراء ثم خنفساء يافعة.

## مظهر الإصابة والضرر

عقب خروج هذه الحشرات من البيات الشتوى فى فصل الربيع - تهاجم أشجار العنب وتهاجم البراعم المنتفخة والمتفتحة وربما دمرتها تماما - وإذا كانت أعداد هذه الخنافس كبيرة فإنها قد تدمر كل البراعم فى أشجار العنب تماما.

## طرق المكافحة

تفيد المبيدات الكيماوية المستخدمة فى معاملة آفات العنب فى فصل الربيع فى مكافحة هذه الآفة.

## خامسا الآفات الحشرية التي تصيب جذور العنب

### ٢٢ - فلوكسيرا العنب

الاسم العلمي للحشرة *Dactylosphaera vitifolia* Shimer

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Oroler Homoptera

فصيلة المن Fam. Aphididae

تنتشر حشرة فلوكسيرا العنب في معظم الأقطار التي تزرع العنب في العالم، ولكنها لحسن الحظ لا توجد في مصر وبعض الأقطار العربية الأخرى، ومما يزيد من إنتشار هذه الحشرة في أقطار شرق أوروبا وجود أجيال مجنحة منها هناك تستطيع الهجرة والإنتشار، ولكن في الولايات المتحدة وبعض البلاد الأخرى لا تتكون مثل هذه الأجيال المجنحة إلا نادرا ويوجد حشر زراعي صارم في مصر لمنع دخول هذه الآفة مع شتلات العنب المستوردة من الخارج

#### وصف الحشرة

حشرات دقيقة الحجم بيضيه أو كمثرية الشكل معروفة بأضرارها الفادحة على العنب نظرا لأنها تقضى كل حياتها على جذور العنب، والحشرات اليافعة مجهرية الحجم لونها أصفر مخضر أو بني مصفر.

#### دورة الحياة

تبقى الأم ثابتة جزئيا على جذر العنب، وتضع بيضها فيما حولها، وعند فقس البيض وخروج الحوريات يبقى الكثير منها مستقرا حول الأم وتبدأ في الإغذاء، وبعض الحوريات تزحف إلى أعلى من خلال شقوق التربة وتسير لمسافة قصيرة على السطح ثم تدخل في الشقوق وتتجه إلى أسفل لتصيب جنورا أخرى وتصنع مستعمرة جديدة.

#### مظهر الإصابة والضرر

يسبب إغذاء الأم وصغارها (الحوريات) على جذور العنب تتكون أورام على الجذور، ويكون

شكل هذا الورم خطافيا على الجذيرات الصغيرة، أما على الجنور الأكبر عمرا فيكون الورم شبه دائري، وبعد شهر أو أكثر تبدأ الأورام في التحلل فتتحرك الحشرات إلى مكان آخر على الجذر لتكون ورما جديدا ويعتقد أن الأورام المتعفنة واللعب السام الذي تحقنه الحشرة في جنور العنب هما المسئولان عن تدهور أشجار العنب وضعفها. وقتل الجنور بما فيها الجذيرات الدقيقة التي تمد الشجرة بالغذاء تؤدي إلى فقد قوة الشجرة بصفة جزئية.

وتلعب نوع التربة دورا هاما في العدوى بالفلوكسيرا وعلى سبيل المثال فإن الفلوكسيرا تتطلب تربة تتشقق عند جفافها، ومثل هذه التربة تنكمش قليلا حول الجنور وبذلك تترك ممرات مفتوحة تستطيع الفلوكسيرا الزحف خلالها بطول الجنور المصابة لتصيب بعد ذلك جنورا أخرى حتى تعم الإصابة كافة المجموع الجذري، ولذلك فإن شقوق التربة هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن هذا المن من الانتقال من شجرة عنب مصابة لتصيب أخرى سليمة، ولذلك فإن التربة الرملية الجيرية والتربة الخفيفة لا تسمح بانتشار الإصابة لعدم تشققها عند الجفاف.

### طرق المكافحة

إن مكافحة الفلوكسيرا يعتمد في الأساس على إتباع طرق الوقاية منها، ومما مثلا إنتاج سلالات من العنب ذات جنور مقاومة للإصابة بالفوكسيرا، فمثلا أنتج في كاليفورنيا سلالة من العنب تستعصى جنورها على الإصابة بالفولكسيرا Rupestrisst. George هي وهجين آخر من هجن العنب المقاومة للإصابة هو Solonis Xothello 1613 ويزرع هذا العنب في الأراضي الطينية الخصبة التي يتعرض فيها غيره من الهجن إلى الإصابة - ولكنه أظهر كفاءة عالية في مقاومة الإصابة - لذلك فإن الهجين الأخير أبدى كفاءة أيضا في مقاومة النيماطودا في الأراضي المصابة بها وهو بهذا لا يقارن في جودته بأي هجين آخر سوى لهجين المسمى Ri-bier.

وتنتقل العدوى بالفلوكسيرا بوسائل شتى منها نقل الشتلات والطعوم من منطقة موبوءة إلى منطقة سليمة، كذلك بأنوات الزراعة التي تستعمل في عزق التربة المصابة أو في تقليم الأشجار وقطع أجزاء منها - كذلك بواسطة آلات التراكثورز التي تعمل في منطقة موبوءة وتنتقل للعمل في منطقة سليمة، خصوصا إذا كانت التربة طينية رطبة.

كذلك فإن معالجة الشتلات هي من أهم طرق الوقاية، فيمكن تطهير الشتلات قبل زراعتها



وذلك بغسل الجنور جيدا ثم معاملتها بأحد الطرق الآتية:

١ - بتبخيرها بغاز بروميد الميثايل في حجرة مغلقة، ويستعمل لذلك، رطل من بروميد الميثايل لكل ١٠٠٠ قدما مكعبا من الفراغ وتحت درجة حرارة ٦٥ فهرنهايت مع استخدام مروحة لتحريك الهواء.

٢ - تغمر جنور الشتلات تماما لمدة لا تقل عن ٥ دقائق في مزيج من زيت معدني متوسط الكثافة (صيفي) بمقدار ١,٥ جالون زيت نولزوجة ٧٢ - ٨٠ ونو إختبار للأثر الباقي غير الكبريت مقداره ٩٠ ٪ أو أكثر يضاف إليه مقدار بنت واحد من سلفات نيكوتين ٤٠ ٪ وبنت واحد من الكحول الكبريتي المذاب في ١٠٠ جالون من الماء.

ويجب تغيير المحلول بعد استخدامه ٥ مرات أو مرة على الأقل كل ٢٤ ساعة، وبعد إنتهاء العلاج يجب تعبئة جنور كل شتلة في رمل نظيف أو في الموس Moss أو مادة أخرى تحفظ الجنور من الجفاف أو العوى.

## ٢٣ - البق الدقيقى الأرضى

الاسم العلمى للحشرة *Rhizococcus falcifer* Kunkell

رتبة متشابهة الأجنحة order Homoptera

فصيلة البق الدقيقى Fam. Pseudococcidae

يعتبر البق الدقيقى الأرضى من آفات العنب الثانوية ويصيب هذا البق العديد من النباتات الأخرى منها الحشائش والشجيرات الحولية ذات الأوراق العريضة، والصبار المعروف بإسم عمة القاضى والموالح وأشجار الطلويات وشجيرات نباتات الزينة

وتعيش هذه الآفة فى التربة تماما، تفتدى على جنور العنب، وهذه الحشرة تشبه حشرات البق الدقيقى تماما بسبب صغر حجمها وشكلها الأسطوانى الطويل وغياب الزوائد الشمعية والخيوط الشمعية المميزة لأنواع البق الدقيقى الأخرى، ويغطى جسم هذه الحشرة بمسحوق من الشمع المتجانس (شكل ١٩١)



(شكل ١٩) - حشرة يافعة من البق الدقيقى الأرضى

### طرق مكافحة

لم تدخل هذه الآفة برامج مكافحة الكيمائية حتى الآن فى الأقطار التى يصاب بها العنب.

## سادسا. الآفات الحشرية التى تصيب الزبيب

### ٢٤ - فراشة الدقيق الهندية

الاسم العلمى للحشرة (*Plodia interpunctella* (Hbn)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة فيستيديى Fam. Phycitidae


تعتبر فراشة الدقيق الهندية من أخطر الآفات التى تصيب الزبيب فى المخزن، مثله مثل

الكثير من الفواكه المجففة والنقل، وتبلغ خطورة هذه الآفة مداها بسبب إستمرارها في وضع البيض في شقوق وتجاويف صناديق التعبئة وغيرها من أوعية التعبئة، وبعد فقس البيض تزحف اليرقة من الشقوق لتصيب الزبيب داخل وعاء التعبئة.

وتدخل الفراشة إلى المنازل وتضع بيضها على الزبيب الموجود في الأوعية المكشوفة، ولذلك كان من الأفضل تعبئة الزبيب في صناديق صغيرة يسهل السيطرة على الإصابة بها وذلك أفضل من تخزينه بكميات كبيرة يستدعى الأمر تدخينها.

### شكل الحشرة

سبق لنا وصف هذه الحشرة في موضع سابق من هذا الكتاب ويصل طول فراشة الدقيق الهندية إلى نحو ٩ مم، وعند الراحة تضم أجنحتها حول جسمها، والخطان الخارجيان للأجنحة الأمامية لونهما بني نحاسي قاتم، والخط الثالث القريب من الجسم لونه قشدي، والأجنحة الخلفية رمادية اللون (شكل ١٩٢)



(شكل ١٩٢) إلى اليسار فراشة الدقيق الهندية (مكبرة ٥ مرات)

إلى اليمين يرقة نفس الفراشة (مكبرة ٦ مرات)

## دورة الحياة

تضع الفراشة الأنثى ٣٠٠ بيضة ولون البيضة رمادي فاتح تلتصقها الأنثى بسطح الثمرة، بفقس البيض بعد ٥ أيام، ويكتمل نمو اليرقة في مدة ٣٠ - ٤٠ يوما في الصيف حيث تغزل اليرقة التامة النمو شرنقة حريرية تعذر دخولها، ولهذه الحشرة ٥ أجيال في السنة، وتقضي هذه الحشرة الشتاء وهي في طورها اليرقي إما مستقرة في الشرائق أو مختبئة داخل أنفاق التغذية في الثمار الجافة وتتحول اليرقات التي تخرج من البيات الشتوي إلى عذارى ثم فراشات في شهر مارس، وتستمر حتى شهر إبريل.

## مظهر الإصابة والضرر

يتركز الضرر الذي تحدثه هذه الآفة في نقص أوزان الزيتون المصاب فضلا عن رداءة نوعيته، ولا يقتصر الضرر على وجود يرقات هذه الآفة داخل حبات الزيتون بل يتعدى ذلك إلى تلويث الثمار بمخلفات الحشرات وجلود إنسلاخها وغزلها الحريري

## طرق مكافحة

يمر الزيتون بعمليات مختلفة قبل تخزينه ثم تعبئته مثل الفرز والتنظيف من الشوائب ثم إزالة أي إصابة بالحشرات، ثم يجري تدخين الزيتون بعد ذلك وقبل تعبئته بمدخن مناسب مثل Methyl Formate وعند التعبئة يدخن الزيتون بمدخن ثان مثل Ethyl Formate

وإذا بقيت كميات من الزيتون داخل المخزن دون تعبئة، فيجب عندئذ تدخينها بمدخن تجاري يتكون من مزيج من Carbon tetra Chloride, Ethylene Dichloride ويستخدم هذا المزيج بمعدل ملاء ملعقتين لكل قدم مكعب من الفراغ، ويوضع السائل المدخن في وعاء ضحل ثم يوضع هذا الوعاء فوق كومة الزيتون من أعلى داخل غرفة التدخين، وينبغي أن تصل درجة الحرارة أثناء ذلك إلى ٧٠ فهرنهايت أو أعلى مع مراعاة أن تظل غرفة التدخين محكمة الغلق لمدة ٢٤ ساعة.

## ٢٥- فراشة الزبيب

الاسم العلمى للحشرة *Ephestia figulitella* Gregson

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة order Lepidoptera

فصيلة فيسيتيدي Fam. Phycitidae


بالرغم من أن فراشة الزبيب تصيب ثمار العنب الناضج وهى على أشجارها، ولكنها تعد آفة رئيسية من آفات الزبيب داخل المخزن، وخصوصا وهو فى مستودعات المزارع وقبل تسليمه لبيوت التجلف والتعبئة.

### شكل الحشرة


يبلغ حجم فراشة العنب نفس حجم دودة الدقيق الهندية ولها نفس مظهرها وتضم أجنحتها حول جسمها بنفس الطريقة فى حالة الراحة، ولكن يمكن تفريقها عن فراشة الدقيق الهندية بسهولة من لون أجنحتها الامامية الرمادى المغبر. والعلامات غير الواضحة الموجودة على أجنحتها، وأجنحتها الخلفية تميل إلى البياض ولايوجد فرق كبير فى درجة اللون بين الأجنحة الامامية والخلفية كالذى يوجد بين الأجنحة الامامية والخلفية لفراشة الدقيق الهندية (شكل ١٩٣).

### دورة الحياة

تضع فراشة الزبيب بيضها على ثمار الزبيب وهى منشورة فوق ألواح التجفيف، كذلك تضع البيض أيضا على حبات الزبيب داخل المستودعات، وعندما تصل اليرقة إلى تمام نموها فإنها تترك المستودع بحثا عن مكان مناسب تعذر فيه وتتحول إلى فراشة يافعة، وأى مكان مغلق مظلم جاف يصلح لهذا الغرض، مثل أسفل الحواف والأوراق أو الأحجار، أو فى التربة، وعندما تجد اليرقة المكان المناسب تغزل شرنقتها الحريرية التى تتحول داخلها إلى عذراء وتقضى اليرقات التامة النمو الشتاء داخل شرنقتها، وتتحول إلى عذارى ففراشات فى إبريل ومايو ويونية، وتخرج الغالبية العظمى من الفراشات فى شهر يونية، وبعد الغروب وفى الأيام الدافئة تبدأ الفراشات فى الطيران وتضع بيضها لمدة نصف ساعة بعد الغروب وتستمر بعد ذلك فى الطيران لمدة ٣ - ٤ ساعات.



(شكل ١٩٣) - فراشة الزبيب مكبرة ٦ مرات



(شكل ١٩٤) يرقة فراشة الزبيب مكبرة ٥ مرات

وتعيش الفراشات لمدة ١٥ يوما وتضع الأنثى الواحدة نحو ٣٥٠ بيضة وتستغرق مدة الجيل ٤٥ يوما في الصيف، وللحشرة ثلاثة أجيال متداخلة في العام وقد يكون هناك جيل رابع صغير.

ولاستطيع فراشات الربيع وضع بيضها على الزبيب داخل المستودعات لأنه يكون غير معدا في هذا الوقت، وتستعيض عن ذلك بالطيران بحثا عن أي فاكهة جديدة جافة تضع عليها بيضها، وفي هذا الوقت تبحث عن ثمار التوت المتساقطة على الأرض والتي تكون في حالة جفاف لتضع عليها بيضها وهذه الثمار تفضلها الفراشة عن غيرها، لأنها أصلح غذاء لليرقات.

وفي شهر يونية تكون ثمار التين الموجودة على الأرض هي المناسبة للفراشات لوضع البيض، ويتلوها بعد وقت قصير ثمار المشمش والخوخ والبرقوق المتساقطة في متناول الحشرة لتضع عليها بيضها وفي شهر أغسطس تتجه إلى ثمار العنب الناضجة الموجودة على الأشجار ثم بعد ذلك إلى حبات الزبيب الموجودة على الألواح والمعدة للتجفيف.

### مظهر الإصابة والضرر

تعتبر فراشة الزبيب ضارة فقط وهي في طورها اليرقي، فاليرقات الصغيرة التي يفقس عنها البيض في مستودعات الزبيب تغتذى على حواف حبة الزبيب ولكنها قد تحفر في لحم الثمرة حتى تصل إلى البذور، ولا تستهلك اليرقة كل الثمرة بل تتحرك حولها تاركة وراءها كتلة من الفضلات وخيوط الغزل، ولكي تصل اليرقة إلى تمام نضجها فإنها تدمر نحو ٢٠ حبة زبيب من صنف Thompson العديم البذرة أو ٩ حبات من زبيب Muscat وتستطيع يرقة فراشة الزبيب أن تغتذى أيضا على ثمار العنب الناضجة فوق الأشجار.

### طرق المكافحة

من الممكن مكافحة هذه الآفات بالطرق الزراعية فضلا عن التبخير بالمبيدات الكيماوية، وكما سبق أن ذكرنا فإن فراشة الزبيب تضع بيضها ليلا فوق حبات الزبيب الجافة، وتستطيع الحرارة الشديدة في اليوم التالي أن تقضى على البيض مالم يكن مظلا، ولذلك عند ما يحين الوقت لتجفيف ثمار العنب وتحويلها إلى زبيب بوضعها على الألواح الورقية، فيجب تجهيز هذه العملية في الجزء الأخير من الظهيرة بعد أن تكون حرارة الشمس قل قتلت البيض الذي

وضع في الأمسية السابقة، وقبل أن تتمكن الفراشات من وضع بيض جديد أي قبل الساعة السابعة مساءً، ولحماية الزبيب من العنوى، فيجب أن تكون الألواح محكمة ولا يوضع فوقها كميات كبيرة من الزبيب، ويجب تعبئة الزبيب في المزرعة بمجرد إنتهاء التجفيف فوراً، ولوحظ أن زبيب الموسكات المجفف على ألواح خشبية أكثر عرضة للإصابة من ذاك المجفف على ألواح ورقية وذلك لأن البيض الموضوع في شقوق الخشب تتوفر له الحماية من حرارة الشمس أكثر من ذاك الموضوع على ألواح الورق، ويمكن تغطية الزبيب الموجود على الألواح الخشبية أو حتى المعبأ في عبوات مختلفة بغطاء من القماش لمنع الإصابة.

وكما ذكرنا فإن ثمار التوت الجافة هي الطعام الأول لليرقات في بداية الصيف، لذلك يجب حرق هذه لثمار ونقلها إلى أماكن تتعرض فيها لحرارة الشمس حتى تقتل اليرقات، ويفضل زراعة أشجار التوت الغير المثمرة لغرض الظل في أماكن زراعة العنب من أجل الزبيب.

## ٢٦ - خنفساء الثمار الجافة

الاسم العلمي للحشرة *Carpophilus hemipterus* (Linn)

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة الخنافس شاربة العصارة Fam. Nitidulidae

تنتشر هذه الحشرة في جميع أنحاء العالم، وأي مادة غذائية متحللة تصلح طعاماً لها. وتوجد هذه الحشرة عادة على التين سواء أكانت ثماره على الأشجار أم على الأرض، كذلك على ثمار الموالح المتعفنة وثمار التفاح المتحللة وثمار البطيخ المكسورة إلخ.

لذلك كان الزبيب مناسباً دائماً للإصابة بهذه الآفة طالما كانت ظروف التخزين مناسبة، وثمار الزبيب التي تتعرض للرطوبة والتحلل هي المفضلة لهذه الحشرة، وإذا وجدت هذه الحشرة على العنب في المزرعة فإن أفضل فترة لتواجدها هي الجزء الأخير من الخريف وفي فصل الشتاء، وفي خلال هذه الفترة يكثر وجود الحشرة على الزبيب.

### شكل الحشرة

لون هذه الخنافس بني قاتم والجسم مبقع ببقع كهرمانية اللون، وطول الخنفساء نحو ٣



مم والجسم بيضاوى الشكل فى حدوده الخارجية وغلظ، وغمد الجناحين مبقيين ببقع أفتح لونا من لون الجسم، وهما قصيران يتركان البطن عارية عند نهايتها، وقرنا الإستشعار منتفخان عند نهايتهما (شكل ١٩٥)، ولون الأرجل وقرون الإستشعار محمر أو كهرمانى.



(شكل ١٩٥) - خنفساء الثمار الجافة

وهذه الخنفساء قوية الطيران، وعندما علمت عددا من هذه الخنفساء وأطلقت فى الجو تم العثور عليها على بعد ٢,٥ ميلا بعد أربعة أيام، ولاتطير الحشرة إلا فى ضوء النهار وعند درجة حرارة تزيد عن ٦٥. ف، والطيران الاكبر يأخذ مجراه عند درجات حرارة ما بين ٨٠ - ١٠٠ ف.

## دورة الحياة

تضع كل أنثى نحو ١٠٠٠ بيضة تنثرها فوق حبوب الزبيب، ويفقس البيض بعد ١ - ٥ أيام وتخرج منه يرقات صغيرة شفافة مصفرة تبدأ فى الإغذاء فور خروجها، وسرعان ما يصبح

لونها أبيض قشدي ثم بني عند كلا طرفيها، واليرقة زوج من الأشواك الحادة عند طرف بطنها، وعندما يكتمل نموها يصبح جسمها مغطى بالشعر وطولها نحو ٦ مم، وهذه اليرقات الإسطوانية الشكل تكون نشطة وتحرك بسرعة، ويختلف طول مدة الطور اليرقي باختلاف درجات الحرارة ويصل إلى ١١ يوما عند درجة ٨٠. ف.

وحيثما تيسر، تدخل اليرقات الناضجة في التربة وتبنى لنفسها خليه من الطين تعذر دخولها، ولون العذراء أصفر شاحب، وتبلغ طول مدة الطور العذري نحو ٨ أيام على درجة حرارة ٨٠. ف، ويحدث التزاوج فور خروج الفراشات من طورها العذري في التربة وتضع البيض بعد يوم إلى ٨ أيام بعد ذلك، وقد يبدأ وضع البيض مبكرا بعد ٣ أيام من خروج الفراشات من الخلايا العذرية. وفي خلال الجو الدافئ قد تكون هذه الحشرة جيلا كل ثلاثة أسابيع، ولذلك فلها أجيال عديدة متداخلة كل عام ويتوقف عدد الأجيال على درجات الحرارة، واليرقات التي تدخل في التربة في فصل الخريف قد لا تتحول إلى حشرات يافعة حتى حلول الربيع بسبب انخفاض درجات الحرارة.

### مظهر الإصابة والضرر

تفتدى اليرقة مباشرة على لحم حبات الزبيب وهذا الإغذاء مضافا إليه فضلات الحشرات وجلود إنسلاخها تنقص من جودة الزبيب والفواكه المجففة، ولا يحدث إغذاء ولا نمو تحت درجة حرارة ٤٠. ف.

### طرق المكافحة

تكتمل مكافحة الحشرة داخل بيوت التعبئة بصفة أساسية، وإجراءات المكافحة في نفسها المتبعة في مكافحة فراشة الدقيق الهندية.

## ٢٧ - خنفساء الحبوب المنشارية

### أو خنفساء سورينام

الاسم العلمى للحشرة *Orizaephilus surinamensis*


رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة خنافس القلف المغلطة Fam. Cucujidae

هذه الخنفساء من الحشرات الكانسة التى تتغذى على جميع أنواع المواد الغذائية المجففة والمخزنة، فهى تصيب جميع أنواع الحبوب النجيلية مثل الأرز والقمح والذرة والشعير والعجائن (مثل المكرونة) والخبز والدقيق والنقل والنشا والعقاقير والتبناك واللحم المجفف، ويعد الزبيب من أغذيتها المفضلة .

شكل الحشرة

الخنفساء اليافعة خنفساء نشطة جدا، إسطوانية الشكل مغلطة بنية اللون طولها نحو ٥, ٢مم، ويمكن تمييزها من بروز حاد يبرز من كلا من جانبي صدرها، وهذا البروز خشن كأسنان المنشار ومنه إتخذ إسمها (شكل ١٩٦) .



(شكل ١٩٦) خنفساء الحبوب المنشارية مكبرة ٩ مرات لاحظ جانبي الصدر المستننة

## دورة الحياة

تضع الأنثى المفلطحة بيضها منفردا وفي مجموعات صغيرة بين تجاعيد سطح حبات الزبيب، ويمكن للأنثى أن تضع نحو ٦ بيضات يوما أو ٢٥٠ بيضة في حياتها، والبيضة بيضاء اللون لامعة وبيضاوية مستطيلة ويقل طولها عن ١,٢٥ مم ولا يمكن رؤيتها بالعين غير المدربة.

وفي أثناء الجو الدافئ، يفقس البيض في خلال ٤ أيام، واليرقة لونها أصفر شاحب مع وجود شريط غامق اللون على كل حلقة من حلقات الجسم، ويغطي الجسم بشعر طويل، ولون الرأس بني مصفر، واليرقة ثلاثة أزواج من الأرجل تزحف بهم غير ملتزمة بالإغذاء على حبة زبيب واحدة، وعند تمام نمو اليرقة يبلغ طولها نحو ٢,٥ مم، وتبلغ اليرقة تمام نموها في خلال أسبوعين إذا كان الجو دافئا .

وعندما تريد اليرقة أن تكمل تطورها إلى حشرة يافعة، فإنها تبني لنفسها شرنقة خشنة تصنعها من الجزيئات الدقيقة من الفتات الذي تخلف عن إغذائها وتلصقها إلى بعضها بسائل غروي لزج تفرزه من فمها، تتحول اليرقة داخل هذه الشرنقة إلى عذراء، وبعد ١٥ يوما تتحول العذراء إلى خنفساء يافعة تخرج من الشرنقة.

وإذا كان الجو دافئا فإن الفترة الزمنية من بدء وضع البيض حتى خروج الخنفساء اليافعة الجديدة يبلغ ٤٠ يوما، وللحشرة ٥ - ٦ أجيال في السنة، وعند دخول الشتاء تدخل الحشرات اليافعة دور البيات الشتوي، ولكن داخل الأماكن الدافئة تستمر الحشرة في التوالد والنمو دون الدخول في بيات شتوي ولهذا فقد تستمر الإصابة أثناء فترة تخزين الزبيب، وتسطيع الخنافس اليافعة لهذه الحشرة أن تعيش لمدة ثلاثة سنوات.

## مظهر الإصابة والضرر

تهاجم الخنفساء المنشارية كل أجزاء حبة الزبيب، وتغتذى بصفة خاصة على تجاعيد الحبة أكثر مما تغتذى على الأطراف، (شكل ١٩٧) وليس لهذه الحشرة خيوط غزل حريرية كما تفعل فراشة الدقيق الهندية أو فراشة الزبيب، وفضلات هذه الحشرة صفراء اللون وكريات البراز أصفر وأكثر إستطالة من فضلات يرقات الفراشات.

## طرق مكافحة

تتبع نفس الطرق المتبعة في مكافحة خنفساء الدقيق الهندية .



(شكل ١٩٧) إلى اليمين حبات زبيب طبيعية إلى اليسار زبيب أصابته الخنافس المنتشرة

## الآفات الحشرية التي تصيب الموز

يزرع الموز في مساحات كبيرة في العديد من الأقطار العربية مثل مصر والسودان والصومال واليمن، ويصاب في جميع مواطن زراعته بالكثير من الآفات الحشرية، ومن أهم هذه الآفات ما يلي :

### ١- من الموز

الاسم العلمي للحشرة *Pentalonia nigronervosa* Coq

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الهمن Fam. Aphidiae

### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة صغيرة الحجم خضراء اللون وهو وحيد العائل لا يصيب إلا الموز ، ويتوالد هذا المن بكريا ، ولكن أحيانا توجد منه أفرادا جنسية تتزاوج وتضع الإناث بيضا ، وقرن إستشعار الحشرة أقصر من طول الحجم .

### دورة الحياة

يصيب هذا المن أولا قواعد أوراق الموز ، ومنى إستقرت حشرة منه على القاعدة فإنها ما تلبث أن تلد أفرادا غير مجنحة تتوالد حتى تكون مستعمرة من الأفراد غير المجنحة ، تنشأ أفراد مجنحة تهاجر إلى نباتات أخرى وهكذا ، وهذه الأفراد المجنحة تعمل كناقلات للفيروس مرض تورق قمة الموز ، والفترة الزمنية الدنيا بين إمتصاص المن للعصارة التي تحتوى على الفيروس ونقله إلى نبات آخر تبلغ  $\frac{1}{4}$  ساعة ، وتظل هذه الأفراد الناقلة للفيروس قادرة على نقل العدوى إلى النباتات السليمة لمدة ٤٨ ساعة (بعض الباحثين ذكر أن هذه المدة قد تصل

إلى ١٣ يوما) ، وهذا المن ليس له أهمية تذكر إذا لم توجد نباتات مصابة يستطيع نقل الفيروس منها إلى النباتات السليمة والعائل الوحيد لهذا المن هو جنس الموز *genus Musa* ، ولكن أصناف الموز المختلفة التي تنتمي لهذا الجنس تختلف في درجة مقاومتها للإصابة بمرض تورد القمة الذي ينقله الموز ، فالأصناف الاسترالية مثلا أكثرها حساسية للإصابة بينما توجد أصناف أكثر مقاومة للإصابة مثل الصنف بوبا .

### وظهر الإصابة والضرر

يكثُر وجود من الموز في مزارع الموز من شهر يونية حتى شهر سبتمبر ، ويصيب أوراق قلب النباتات ، وينتشر بين تنايا تلك الأوراق قبل تفتحها .

ومن مظاهر الإصابة بمرض تورد القمة Bunchy top disease الذي ينقله هذا المن هو ظهور خطوط بنية قاتمة على الورقة وهذه الخطوط تكون غير منتظمة ومحبية يبلغ عرض الخط منها ٧٥ ، مجم ، ونوجد الخطوط مجاورة للعروق الشافوية للورقة وعلى السطح السفلي لقاعدة نصل الورقة وتسير بطول حامل الورقة أو بطول المنطقة القاعدية للعرق الرئيسي وقد رتكتل هذ الأعراض بظهور تجعد بسيط على طول نصل الورقة المنضغط الملتف ، وبعد ذلك تصبح الأوراق أصغر حجما في كل من طولها وعرضها ، وعندما يوجد عدد من الأوراق غير الطبيعية هذه فإن تاج الشجرة يبدو غير متناسقا وبدون تماثل الأوراق ثم يبدو عليها الضعف والتحلل ، وتصاب سباطه الموز أيضا وتكون أصابع موز صغيرة الحجم ليس لها قيمة تسويقية .

### طرق المكافحة

تؤدي مكافحة من الموز إلى التخلص من مرض تورد القمة الخطير الذي قضى على زراعة الموز نهائيا في بعض المناطق ، ويكافح هذا المن بالطرق الآتية :

- ١ - من المعروف أن خلو منطقة الزراعة من أى أثر للتلوث بالفيروس أو وجود من ناقل للمرض هو من أفضل طرق المكافحة لذلك يجب فحص شتلات الموز المعدة للزراعة جيدا للتأكد من خلوها من الإصابة كذلك يجب التفطيش باستمرار على جميع النباتات المنزوعة بالمرزعة ، أو بالمشقل في بورات منتظمة كل ثلاثة أو أربعة أشهر لإستكشاف ظهور أى أعراض لمرض تورد القمة ، والأعراض الأولية لهذا المرض هي وجود نقط أو خطوط ضيقة قصيرة خضراء داكنة اللون على أعناق الأوراق وينبغي عدم الإنتظار حتى تظهر حالة التورد بقمة النباتات السليمة المجاورة وانتقال المرض إليها .

يجب رش نباتات الموز بالمبيدات المكافحة لن الموز ويستخدم لذلك مبيد ملاثيون ٥٧٪ بمعدل ١.٥ في الألف .

٢ - صب ملء فنجان شاي من الكيروسين فوق قمة النبات المصاب لقتل حشرات المن الموجودة في قلب الشجرة أو مختبأ بين الأوراق ، ثم يقطع النبات المصاب بعد ذلك من عند منتصفه وإعادة صب نفس الكمية من الكيروسين داخل الجزء المتبقى من الساق في التربة لقتل ما قد يكون موجودا من حشرات المن به ، ثم يقلع النبات المصاب وكذلك جميع النباتات الموجودة معها في الجوز وتعدم حرقا .

٤ - يوضع قليل من الجير الحى في موضع الجورة التى إقتلع منها النبات المصاب وتترك الجورة معرضة للشمس والهواء فترة من الزمن قبل إعادة زراعتها بحيث لا تقل هذه الفترة عن أسبوعين .

٥ - عند إنشاء مزارع موز ، يجب إنتخاب شتلات سليمة من مشاتل سبق فحصها والتأكد من سلامة الشتلات الموجودة بها .

## ٢ - سوسة الموز

الاسم العلمى للحشرة *Comopolites sordidus* Germ

رتية الحشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة كركليونيدى Fam. Curculionidae

تعتبر سوسة الموز من أكثر آفات الموز خطورة في جميع مناطق زراعته في إفريقيا وآسيا ، هذا مع تفاوت خطورتها من مكان إلى آخر .

### وصف الحشرة

خنفساء بنية اللون إلى سوداء يصل طولها إلى ١ سم واليرقة بيضاء لؤلؤية ذات رأس بنية ( شكل ١٩٨ - ١ ) واليرقة عديمة الأرجل صغيرة الحجم لينة الجسم .



## دورة الحياة

تنشط السوسة اليافعة ليلاً وتتحرك أما أثناء النهار فإنها تختبئ في التربة أو في مخلفات النباتات أو أي ملجأ آخر ، وتضع الإناث الملقة بيضها على أنسجة ريزومات الموز الفضية أو على البصلة أو على أي جزء مكشوف من منطقة الجذر ، وتستمر الأنثى في وضع البيض طوال أشهر السنة مع زيادة عدد البيض في الأشهر المطيرة ، ويتراوح عدد ما تضعه الأنثى من بيض ما بين ١٠ إلى ٥٠ بيضة وأحياناً يصل هذا العدد إلى ١٠٠ بيضة ، ويفقس البيض وتخرج منه يرقات صغيرة لينة الجسم عديمة الأرجل ، وتقوم اليرقات بعمل أنفاق في أنسجة الريزومات الفضية (شكل ١٩٨ - 2) ويقفص البيض بعد نحو أسبوع إلى ثلاثة أسابيع أحياناً ، وتصل اليرقة إلى تمام نمورها بعد ٣,٥ أسبوعاً وأحياناً بعد ٦ أسابيع حسب درجات الحرارة ، وتتحوّل اليرقة التامة النمو إلى عذراء داخل النفق الذي صنّعه ثم تخرج الحشرات اليافعة (السوس) من طور العذراء بعد أسبوع من بدء التعذر ، وتعيش السوسة اليافعة عدة أشهر قد تبلغ سنتان .

## مظهر الإصابة والضرر

تحفر اليرقات في ريزومات الموز ومنطقة الجذر ، ونتيجة لذلك تذبل النباتات الصغيرة المصابة وتموت أما النباتات الكبيرة فتصاب بالضعف ويوقف نموها ، وتسقط عند تعرضها للرياح ، والأنفاق التي تصنعها اليرقات تدخل إليها فطريات التعفن مما يؤدي إلى تعفن منطقة الجذر .

## طرق مكافحة

تفيد التقارير الواردة من الكثير من البلاد بإمكان مكافحة سوسة الموز ببيولوجيا بواسطة عدد من المتطفلات والمفترسات ، وأفاد البعض بأنه استخدم بنجاح خنفساء *Plaesins javanus* وكذلك الخنفساء *Leionota quadridentata* ويرقاتها كأعداء حيوية لسوسة الموز ، وكذلك بعض أنواع الحشرات التابعة لفصيلة *Hydrophilidae* وفصيلة *Elateridae* وفصيلة *Staphylinidae* واستخدام الفطر المسمى *Metarhizium SP.* في مكافحة الحيوية لهذه الآفة بنجاح كبير .

## المكافحة الكيماوية

أما المكافحة الكيماوية فيفيد فيها مساحيق التعفير للمبيدات الحديثة الفعالة التي تعفر بها جنور الموز وكورماته ، وفي بعض المناطق يدهنون الجزء الأسفل من نبات الموز بالقطران حتى إرتفاع ٥٠ سم فوق سطح الأرض .



(شكل ١٩٨) - آفات الموز الحشرية

- ١ - سوسة الموز ٢ - الأنفاق التي تصنعها يرقات سوسة الموز في يرقات الموز ٣ - فراشة جرب الموز -  
الفراشة واليرقة ٤ - الضرر الذي تسببه يرقات جرب الموز لقشرة الثمرة ، ٥ - الطور اليافع لتريس الموز ٦ -  
الضرر الذي يحدثه تريس الموز بالثمرة .

### ٣ - التريس

رتبة الحشرات هدية الأجنحة Order Thsanoptera

فصيلة ريبيدي Fam -Thripidac

ينتمى لهذه الفصيلة عددا من أنواع التريس التي تصيب الموز ، وتمتص هذه الحشرات العصارة من أنسجة الثمار ويتبع ذلك ظهور بقع بنية اللون على سطح الثمرة ، وتلحق الحشرة ضرراً آخر بالثمار عندما تغرز آلة وضع البيض في أنسجة الثمار لتضع بيضها (شكل ١٩٨ - ٦) ومن أنواع التريس التي تصيب الموز ما يلي :

أ - *Hercotrips picintus* Bagn

ب - *Hercotrips femoralis* O.M.Reuter

ج - *Frankliniella insularis* Frankle

د - *Scirtothrips signipennis* Bagn

هـ - *Chaetanaphothrips orchidii* F.J (شكل ١٩٨ - ٤)

ويطلق على الآخر تريس الموز

وتكافح هذه الحشرات بالرش بمبيد ملايين ٥٧٪ بمعدل التر لكل ٤٠٠ لتر ماء أو مبيد اكتك ٥٠٪ ١.٢ لكل ٤٠٠ لتر ماء ، أو غير ذلك من المبيدات الحديثة الفعالة والتي تتغير باستمرار

### ٤ - بق الموز الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة *pseudococcus comstocki* Kuw

رتبة متشابة الأجنحة order Homoptera

فصيلة البق الدقيقى Fam . Pseudococcidae

وتعد هذه الحشرة من آفات الموز الخطيرة في الكثير من البلاد ، وتصيب هذه الآفة كلا من الأوراق والثمار وتكافح كيماويا بالرش بالملايئون بنسبة ٢ فى الألف

## ٥ - فواشه جرب الموز (شكل ١٨٨ - ٤)

الاسم العلمي للحشرة *Lamprosema octasema* Meyr

رتبة الحشرات حرشيفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة بيراليدي Fam. Pyralidae

تضع الفراشات الأنثى الملحقة البيض على السطح العلوي لقاعدة أوراق الموز ، وتغتنى اليرقة على البراعم وتدمر المبايض ، وأعمار اليرقة الأخيرة تغتنى على القشرة الخارجية للثمار مما يسبب ظهور بقع حرشيفية وشقوق في قشرة الثمرة تشبه الجرب (شكل ١٩٨ - ٤) وتضع الأنثى الواحدة من ٨٠ - ١٢٠ بيضة ويوضع البيض فرديا أو في مجاميع مكونة من ١٥ بيضة للمجموعة الواحدة ، ويستغرق النمو الجنيني من ١٢ إلى ٢١ يوما ثم يفقس البيض وتخرج منه اليرقات ويكمل نمو اليرقة بعد ١٢ إلى ٢١ يوما ثم تغزل اليرقات التامة النمو شرانق حريرية تتحول داخلها إلى عذارى ، وتوضع الشرنقة أسفل الثمرة ، ومدة الطور اليرقي نحو ١٠ - ١٢ يوما ثم تخرج الفراشات ، ويكون ضرر هذه الحشرة خطيرا إذا وجد على برعم واحد سبعة يرقات تامة النمو .

ويكافح تريس السباطات والثمار بمبيد حديث مثل الملاثيون ٥٧ في الألف ، وترش به اليرقات قبل تمام نموها .

## ٦ - الحشرة القشرية برسوناتا

الاسم العلمي للحشرة *Mycetaspis personata* (Comstock)

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية أو المدرعة Fam. Diaspididea

تصيب هذه الحشرة سطح الأوراق في الموالح والخوخ والمانجو والجوافة والموز والنخيل وحبل المساكين والياسمين ، وتنشر الإصابة بها في المناطق الساحلية ، تمتص هذه الحشرة

العصارة من العائل ، وفي حالة الموز يظهر مكان الإصابة في الورقة المصابة بقع بنية اللون وقشرة هذه الحشرة مخروطية سوداء ذات سرة مركزية بنية اللون ، وإذا ما أزيلت القشرة من ورقة العائل يشاهد مكانها طبقة رقيقة لونها أبيض .

### طرق مكافحة

تفترس يرقات أسد المن الأطوار المتحركة من هذه الحشرة ولم تدخل هذه الآفة برنامج مكافحة الكيمائية لآفات الموز .

## ٧- البق الدقيقى أورثيزيا

الاسم العلمى للحشرة *Orthezia insignis* Beowne

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة أورثيزيديى Fam Orthzidae

يصيب هذا البق الدقيقى العديد من العوامل منها نباتات الزينة والصوب الزجاجية والنباتات التى تتواجد في بيئات رطبة ، مثل الموز ويكثر وجوده في المناطق الساحلية لزيادة نسبة الرطوبة الجوية بها .

### وصف الحشرة

الحشرة الأنثى لونها مائل إلى الإخضرار أو أخضر غامق ويغطى جسمها بالشمع الأبيض ويمتد على محيط الجسم عشرة أزواج من الزوائد الشمعية ، ويوجد على السطح الظهرى للحشرة ١٢ زوجا من الزوائد الشمعية مرتبة في صفين طوليين يتباعدان قليلا إلى

الخارج فيظهر بينهما جزء من جسم الحشرة الأخضر اللون ، ويوجد على السطح البطنى للحشرة دائرة غير كاملة من الشمع الأبيض تلتف حول الخرطوم والأرجل ، وكذلك توجد صفيحتان شمعتان تتجهان نحو الخلف بين الرجلين الخلفيتين ، ويقع كيس البيض في مؤخرة الجسم ويتكون من خيوط أو صفائح متوازية من الشمع ، ويوجد عند الطرف الخلفى وإلى الجهة الظهرية فتحة صغيرة ، لخروج الحوريات ، ويبلغ طول الأنثى اليافقة نحو ١.٥ مم وقرن الاستشعار يحتوى على ثمانية عقل .

وتتوالد هذه الحشرة بكريا إذ لم يعثر على ذكور لها .

## دورة الحياة

تضع الإناث بيضها داخل أكياس البيض التى توجد في مؤخرة كل أنثى ، ويفقس البيض بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع حسب درجة حرارة الجو ، وتخرج منه الحوريات الزاحفة التى تغادر كيس البيض من الفتحة التى توجد في نهايته ، وتتجول الحوريات على أوراق الموز حتى تستقر في مكان تغرز فيه أجزاء فمها الثاقب الماض وتمتص عصارة النبات وللحورية ثلاثة أعمار وفي العمر الأول تكون الحورية بيضاوية الشكل وتظهر فيه قرون الإستشعار والأرجل السوداء ويبلغ طول الحورية حينئذ نحو ٦ ، مم أما العمر الثاني للحورية فيكون لونها بنيا ويغطى جسمها بعدد من صفائح الشمع ويبلغ طولها حينئذ نحو ٢ مم أما العمر الثالث فيصبح فيه جسم الحورية عريضا بيضاويا وطوله نحو ٣ مم ولونه أخضر محمر ويغطى الجسم الاسلاخ الأخير بالزوائد الشمعية وتظل الحشرة إلى تمام نموها ثم تفرز الحشرة كيس البيض الشمعى ، وللحشرة ثلاثة أجيال متواصلة في العام .

## مظهر الإصابة والضرر

عند الإصابة الشديدة تمتص الحشرات العصارة النباتية من الأوراق مما يؤدي إلى ذبول الأوراق وضعفها

# الآفات الحشرية التي تصيب نجيل البلح

## الآفات الحشرية التي تصيب نخيل البلح

تنتشر زراعة النخيل في الكثير من بلدان العالم ، وتعتبر التمور سلعة تصديرية ذات مستقبل كبير لمعظم دول العالم، والعراق هي أكثر الأقطار العربية فيما يوجد بها من نخيل حيث يوجد بها ٢٢ مليون نخلة تليها الجزائر بحوالى ٧.٥ مليون نخلة ثم مصر (٧ مليون نخلة) والمملكة العربية السعودية (٧ مليون نخلة) . وتعمل كافة البلاد العربية الآن على زيادة عند المزروع فيها من نخيل البلح وهناك مشاريع ضخمة في المملكة العربية السعودية لهذا الغرض ، ووفقاً لتقرير منظمة الزراعة والأغذية الدولية سنة ١٩٧٦ فإن نسبة أعداد النخل في العالمين العربي والإسلامي هي ٩٧.٥٪ من نسبتها في العام ، ومعدل إنتاج التمور في العالمين العربي والإسلامي أيضا يساوي ٩٦.٧٪ من إنتاج العالم ، وتقدر مساحة النخيل المزروعة في العالم بنحو ٦٠٠ ألف هكتار ، ومساحة الأراضي المزروعة بالنخيل في العالم العربي ٤٢٢ ألف هكتار ، وهذه تعادل ٥٪ من مجموع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي والمقدرة بحوالى ٨٠ مليون هكتار .

ويختلف متوسط إنتاج النخلة الواحدة من قطر إلى آخر وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة بمتوسط حوالى ٧١ كج من التمر للنخلة ، الواحدة تليها مصر وعمان والسودان والسعودية ، أما العراق والجزائر وتونس وهي من أهم البلاد العربية المنتجة والمصدرة للتمر فإن متوسط إنتاج النخلة الواحدة بها منخفض ، إذ يتراوح بين ١٩ - ٢٢ كج من التمر ، ويعزى هذا الاختلاف في الإنتاج إلى اختلاف الظروف المناخية من قطر إلى آخر ومدى العناية بالنخلة من رى وتستمر ومكافحة الآفات والحشرات التي تصيب النخيل والتمور خلال موسم النضج.

هذا يصاب النخيل بالكثير من الآفات الحشرية التي تقلل من الإنتاج منها ما يصيب المجموع الخصرى كالجنوع والسعف والبراعم ومنها ما يصيب المجموع الجذرى ، ومنها ما يصيب الثمار في جميع مراحل نموها .



وسوف نورد أهم هذ الآفات الحشرية ونرتبها تبعاً لأجزاء النخلة التي تصيبها .

## أولا - الآفات الحشرية التي تصيب الجذور والجذع

### ١ - حفار جذوع النخيل .

الاسم العلمي للحشرة *Pseudophilus testaceu*

رتبة الحشرات عمدية الأجنحة order Coleoptera

فصيلة ناشرات الأخشاب طويلة القرون Fam Cermbycidae


تنتشر هذه الحشرة في جميع مناطق زراعة النخيل في العالم العربي وتسمى في السعودية (الخنفس الأحمر كما تسمى يرقتها هناك النعيجة ، وتسمى اليرقة في بغداد "جارنب"

#### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة كبيرة طولها نحو ٢ سم لونها بني غامق أو فاتح ، وطول قرون الإستشعار يعادل طول الجسم والجسم مغطى بزغب قصير حافة السطح السفلى للحلقة البطنية الأخيرة مستقيمة في الذكر ومحدبة مع إنخفاض في الوسط في الأنثى (شكل ١٩٩) ، والبيضة متطاولة بيضاء اسطوانية طولها ٤٥ - ٥٠ مم ورأسها صغير لونه بني غامق (شكل ٢٠٠) ومدفون في الصدر ومقدمتها أعرض من مؤخرتها .

#### دورة الحياة

تظهر الخنافس اليافعة في شهر مارس وتستمر في الظهور حتى شهر يوليو ولكن يظهر غالبيتها في أوائل شهر يونيو تضع الأنثى الملقحة بيضها فرديا بين أعقاب السعف أو على الليف في رأس النخلة خلال الأسبوع الثالث من يونيو



(شكل ١٩٩) الحشرة اليافعة لحفار جذع النخيل، الأنثى على اليسار والذكر على اليمين



(شكل ٢٠٠) يرقة حفار جذع النخيل


### مظهر الإصابة والضرر

تصيب هذه الحشرة رأس النخلة بصورة رئيسية وتحفر يرقاتها في أعقاب السعف ، وتوجد عادة يرقة واحدة في كربة كل سعفة وقد يصل عددها أحيانا إلى ثلاث يرقات ، في

أواخر شهر سبتمبر تترك اليرقات أعقاب السعف الأخضر لكي تحفر في الساق ، وتقضى فصل الشتاء في النفق الذي تحفرة ، وقد يمتد أنفاق بعض اليرقات إلى منتصف ساق النخلة ، وقد يصل عدد اليرقات الناحرة في مكان واحد في الساق إلى ٨ يرقات ، وقد تحفر اليرقات مباشرة في ساق النخل دون أن تحفر في الرأس ويتبع ذلك إفرازات شمعية تسيل من مكان الحفر ولون هذا الإفرازات قاتم لامع وتكون على هيئة بقع ، وتصنع الحشرات اليافعة تفقا إسطوانيا مائلا أثناء خروجها من الساق إلى الخارج وتستمر في وضع البيض مدة طويلة نسبيا ، يفقس البيض بعد أسبوعين من تاريخ وضعه ، وتضع الأنثا البيض أيضا على الجذع مباشرة وبين أعقاب السعف أو الكرب الجاف بعد الفقس تحفر اليرقات في أعقاب السعف لمدة ثلاث أشهر تتجه بعدها للحفر في الجذع ، وتقضى اليرقات فصل الشتاء وهي في الطور اليرقى ، والنفق الذي تحفرة اليرقة في الجذع ينتهي بغرفة طولها نحو ٣ سم وعرضها نحو ١.٥ وعمقها ٢.٥ سم ، تقضى اليرقة فصل الشتاء في هذه الغرفة وهي في حالة بيات شتوى ثم تتحول إلى عذراء في أوائل فصل الربيع ، ويبلغ طول مدة الطور اليرقى نحو عشرة أشهر والطور العذري نحو ٣ أسابيع ، وبعد تحول العذراء إلى الطور اليافع تقرض الخنافس اليافعة طريقها إلى الخارج



(شكل ٢٠١) يرقة جذع نخلة مصاب بحفار جذع النخيل، يلاحظ وجود الإفرازات الصمعية عليه



(شكل ٢٠٢) يرقات حفار جذع النخل

### طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة كيميائيا في الجزائر بمبيد الديازينون ٤٠٪ القابل للبلل بنسبة ٧ جرام لكل جالون ماء وذلك إذا كانت الحشرة موجودة في رأس النخلة ، كما تكافح أيضا بالملاثيون والدبتركس ، ويجرى الرش على مرتين ، الأولى بعد ٧ - ١٠ أيام من التلقيح والثانية بعد ١٥ - ٢٠ يوما .

أما إذا كانت الإصابة في الجذع أو الكرب فيصعب مكافحتها ، ولهذا يجب تركيب النخل من حين لآخر لأن التركيب يساعد على إزالة الكثير من يرقاتها وبيضها .

## ٢- خنفساء النخل الكركنية

الاسم العلمي للحشرة *Strategus julianus*

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة المجلال Fam. Scarabaeidae

تصيب هذه الحشرات فسائل النخيل حيث تنخر في الجذع تحت سطح الأرض بقليل بالقرب من البرعم الرئيسي للنخلة مما قد يسبب موتها أحيانا ، وتصيب هذه الآفة فسائل النخل في المشتل .

ولكافحتها تغمر المشاتل بالماء فتخرج الحشرات من الثقوب ويقضى عليها .

## ٣- حفار ساق السنط

الاسم العلمي للحشرة *Macrotoma palmatia* F

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Oroler Coleoptera

فصيلة ناضرات الأخشاب ذات القرون الطويلة Fam. Cerambycidae

وصف الحشرة

الحشرة الياقة طولها نحو ٥ سم ولونها كستنائي قاتم والعقلة الثالثة في قرن الإستشعار يصل طولها إلى ١٣ مم والحلقة الصدرية الأمامية ضيقة لاصقة من أعلى وجوانبها كثيرة

الأشواك والعقلة الأولى من عقل الرسخ أطول من الثانية والثالثة معا . وطول اليرقة نحو ٥ سم ولونها أصفر فاتح .

### مظهر الإصابة والضرر

توجد هذه الحشرة في مصر وتصيب أشجار السنط والجميز والتوت والنخيل ، وهي تحفر في الأشجار الحية الكبيرة .

وتكافح هذه الحشرة كما حفار جنوع النخيل .

## ٤ - الأرضة أو النمل الأبيض

الاسم العلمي للحشرة *Microcerotermes diversus silvestri*

رتبة متماثلة الأجنحة Order Isoptera

فصيلة ترميتيري Fam . Termitide

تهاجم الأرضة أشجار ونباتات كثيرة من بينها النخيل وخاصة الفسائل ، وتوجد أنواع عديدة من الأرضة غير هذا النوع تصيب النخل في أقطار أخرى ولكن هذا النوع هو الذي يصيب النخيل في العراق والجزيرة العربية

### مظهر الإصابة والضرر

تبدأ إصابة النخيل في منطقة الجنور ، فتحفر حشرات الأرضة أنفاقا فيها صاعدة إلى الساق حيث تستمر في عمل الأنفاق داخل الساق وللأسف ساق النخلة السابق إصابتها بالحفارات ، ويؤدي ذلك إلى تآكل الساق وتظهر عليه حفرة قد تصل إلى ٩٠ سم طولاً ، ٢٣ سم عرضاً ، ١٩ سم عمقاً (عبد الحسين ١٩٧٠)

أما في حالة النخيل غير المصاب بالحفارات ، فإن الأرضة تبني أنفاقاً طبيعية على سطح

الساق صاعدة إلى رأس النخلة وتهاجم قواعد السعف أو الكرب ، وتحفر الأرضة في الكرب الأخضر أخاديد عديدة عميقة داكنة اللون ولا تهاجم الأرضة العذق ولكنها تصيب الثمار المتساقطة على الأرض .

هذا وتهاجم هذه الآفة الفسائل وتسبب موت بعضها ولا سيما المنزوعة منها حديثا ، كما تصيب جنوع النخل بعد قصها إذا ما وجدت هذه الجنوع في البستان أو عند إستعمالها في تسقيف بعض الأبنية .

### طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة بتنظيف الأجزاء المصابة من الأنفاق الطبيعية الموجودة عليها وعزق التربة حول ساق النخلة أو الفسيلة ثم رش التربة الناتجة من الحفر بمحلول الكلوردين ٧٥٪ بنسبة ١٦ سم لكل جالون ماء وقد يستعمل الألدرين ٤٠٪ أو الدايلدرين ١٥٪ بنسبة ٣٠ سم ٣ من الأول ، ٣٥ سم ٣ من الثاني لكل جالون ماء .

### ثانيا الآفات الحشرية التي تصيب السعف والعراجلين

#### ٦ - حشرة النخيل القشرية (شكل ١٩٩)

الاسم العلمي للحشرة *Parlitoria blancherdil* Tang

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية المزرعة Fam. Diaspididae

توجد هذه الحشرة على أوراق وثمار النخيل، كما توجد على الياسمين واللاتانيا والفونيكس ونبات Vinca major. ولقد تم دخول هذه الحشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق جمهورية مصر العربية والجزائر.

### وصف الحشرة

القشرة (شكل ١٥٠) بيضاوية ضيقة رمادية اللون وسرتها جانبية. وقد وجدت في

السعودية وتصيب هناك أوراق النخيل في المناطق الساحلية وتصيب الثمار في المناطق الصحراوية.

والبيضة لونها وردي غامق أو أحمر لامع وطولها ٤ مم وهي بيضية الشكل ، والحورية لونها وردي غامق أو أحمر قاتم وطولها ٣ جم وقشرتها مستديرة بيضاوية مغبرة اللون .



(شكل ٢٠٣) حشرة النخيل القشرية

## دورة الحياة

درس لطفى وجمعة (١٩٨٠) دورة حياة هذه الحشرة في منطقة الجيزة في مصر ، وتبين أن لها أربعة أجيال متداخلة في العام ، ويبدأ ظهور الجيل الأول في شهر أغسطس ويستمر حتى نهاية سبتمبر والجيل الثاني من سبتمبر حتى ديسمبر والجيل الثالث من ديسمبر حتى مارس والجيل الرابع من مارس حتى أغسطس والجيل الثاني هو أشد الأجيال إصابة للنخيل يليه الجيل الثالث ثم الرابع - وكان الجزء القاعدي للوريقات هو أشدها إصابة يليه الجزء الأوسط ثم الطرفي وكان أكبر تعداد لذكور الحشرة في أشهر ديسمبر ومارس ومايو .



## مظهر الإصابة والضرر

تعتبر هذه الحشرة من أكثر الحشرات انتشارا وخطورة على نخيل البلح - والأنثى بيضية عريضة والذكر أصغر حجما من الأنثى وهو إهليلجي الشكل منبسط أيضا ، وتوجد هذه الحشرة بأعداد قليلة أو كثيرة على سطح الخوص الأخضر وتزداد عددا على الفسيل والنخيل الصغير وقد تغطي سطح السعف الأخضر في حالة إشتداد الإصابة وتسبب ضعف النخلة لكثرة ما تمتص من عصارة مما يؤدي إلى قلة الإنتاج وتقل أصابة النخل المرتفع هذا وقد تصاب الثمار أيضا .

وقد دخلت هذه الحشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع فسائل النخل المستورد مما سبب إتلاف عدد كبيرا من النخل حتى كاد أن يقضي على زراعة النخيل هناك لولا الجهود الحثيثة التي بذلت للسيطرة عليها على مدى إحدى عشر عاما

## طرق المكافحة

### أ - المكافحة الحيوية

سجل لطفي وجمعة (١٩٨٠) طفيليان من رتبة غشائية الأجنحة يتطفلان على الحشرات اليافعة لهذه الآفة في منطقة الجيزة هما : *Aphytis SP Aspidiotiphagus loursburgi* ، وكانت أقصى نسبة للتطفل في خلال أشهر مارس وإبريل ويونية وأغسطس وأكتوبر وقد سجل ثلاثة أجيال متواصلة لهذين الطفيليين في العام وذلك خلال أشهر إبريل وأغسطس وأكتوبر

### ب - المكافحة الميكانيكية والكيميائية

تكافح هذه الحشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بقطع أوراق النخيل المصابة وحرقها ثم تسليط لهب سريع على قمة النباتات لقتل الحشرات الموجودة عليها وتسترد أشجار النخيل المعاملة بهذه الطريقة حالتها الطبيعية ثانيا بعد مرور نحو سنة أو أكثر ، وتكافح في المملكة العربية السعودية بنفس الطريقة

وتكافح هذه الحشرة كيميائيا بالرش بزيت معدني مثل زيت الفولك ٢٪ مع الملاشون ٧٥٪

مسنحلب زيتي بنسبة ٢٥٪ باستعمال مورتورات ذات ضغط مرتفع ، ولإجراء العملية يمكن استعمال خرطوم طويل مع صعود العامل القائم بالعملية فوق سلم مرتفع ولبسه قناعا واقيا لحمايه وجهه من تساقط رذاذ المحلول . ويتم هذا الرش شتاء ويكرر العلاج بعد خروج الجريد لإحتمال وجود الحشرات بين طياته قبل خروجه من قلب النخلة . وكذلك يمكن إستعمال الديازينون السائل ٦٠٪ بنسبة ٦ سم لكل جالون ماء ، أو الداي مثنويت ٤٠٪ بنسبة ١٠٪ لكل جالون ماء ، ويتم ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

إلا أن المكافحة الكيميائية لها أثرها الضار على أعداء هذه الحشرة الحيوية ، ويذكر البكر (١٩٧٢) أنه نتيجة لمكافحة حشرات النخل بالمبيدات الكيميائية بمنطقة شط العرب ، ظهرت إصابة واسعة بحشرة النخيل القشرية مما يستدل معه على فتك تلك المبيدات بالأعداء الحيوية لهذه الحشرة .

## ٦ - الحشرة القشرية الخضراء

الاسم العلمي للحشرة *Atrolecanium phoenicis* Ram Rao

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة حشرات الحفر القشرية Fam Asterolecaniidae

توجد هذه الحشرات في العراق وهي تصيب النخيل ولكنها قليلة الإنتشار في مناطق زراعة النخيل الأخرى

### وصف الحشرة

الأنثى اليافعة على شكل قشرة مقعرة الظهر خضراء مسمرة طولها ١.٢٠ مم وعرضها ٧، مم ولها نهاية مدببة نوعا والقشرة مبقعه ببقعة حمراء ، والذكر مجنح وقشرته خضراء بيضاوية الشكل متطاولة ومسطحة طولها ٣. مم والحوارية خضراء اللون وبدون قشرة.

## دورة الحياة

لهذه الحشرة جبل واحد كل ٢٠ شهرا ويقف البويض بداخل الأنثى ، ويكون البيض في أول تكوينه أبيض اللون ثم يتحول قبل فقسه إلى اللون الأخضر المشوب بصفرة ، ويتراوح عدد البيض داخل الأنثى ما بين ٧ - ٢٢ بيضة ، وتبلغ المدة ما بين تكون البيض داخل الأنثى وبدء فقسه داخل الأنثى نحو ٥ أشهر ويبدأ فقس البيض في الأسبوع الأول من شهر يونية ويستمر لما يقرب من سبعة أشهر ، وتبقى الحوريات حديثه الفقس داخل الأنثى لمدة أسبوع ، ثم تلد الأنثى هذه الحوريات داخل غرفة صغيرة تكون جزءاً من قشرتها توجد في مؤخرة جسمها وتبقى الحوريات ثلاثة أيام داخل هذه الغرفة الشمعية ثم تتركها خلال شق موجود في نهاية قشرة الأنثى ، أى أن الحورية تترك الأنثى وقشرتها خلال عشرة أيام من تاريخ الفقس ، بحثاً عن المكان المناسب لإستقرارها وبعد أن تجده تفرز فيه أجزاء فمها الثاقبة الماصة وتغتنى على العصارة النباتية وتبقى الحوريات متجولة فوق الخوص لمدة يومين بعد خروجها من قشرة الأنثى ، حتى تجد المكان المناسب ، والحوريات التى تولد في الصيف تبدأ في تغطية أجسامها بالقشرة الشمعية بعد شهر من تركها لقشرة الأنثى ويستغرق تكوين هذه القشرة أسبوعاً ، وبعد تغطية جسم الحشرة بالقشرة يمكن تمييز الإناث منها عن الذكور وتبلغ مدة طور الحورية نحو شهرين صيفاً .

أما الحوريات التى تولد في الخريف فإنها تقضى فصل الشتاء نون قشرة ، وتبدأ في تكوين القشرة في الأسبوع الأخير من شهر إبريل ، ومدة طور الحورية الخريفية ٨ - ١٠ أشهر وتبدأ الإناث اليافقة الناتجة من الحوريات الصيفية في الظور خلال الأسبوع الأول من أغسطس وتمضى هذه الإناث الخريف والشتاء يافعة بداخلها بيض لم يفقس وبعد فقس البيض وولادة الحوريات تموت الإناث اليافعة في الأسبوع الثانى من شهر أغسطس أى مدة الطور اليافع للأنثى أكثر من ١٢ شهراً .

أما إناث الخريف فتبدأ في الظهور في الأسبوع الثانى من مارس وتستمر حتى الأسبوع الثانى من ديسمبر ، والنسبة الجنسية ١:١.

## مظهر الإصابة والضرر

تصيب هذه الحشرة الخوص والجريد والعنوق والثمار ، وتمتص الحوريات والحشرات اليافعة العصارة النباتية من الأجزاء المصابة تاركه عليها بقعا صفراء ويتحول جميع سطح الخوصة إلى اللون الأصفر إذا كانت الإصابة شديدة ، وتشتد الإصابة بها في المناطق الرطبة

## طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة كما تكافح حشرة النخيل القشرية .

## ٧ - حشرة النخيل القشرية الحمراء

الاسم العلمي للحشرة *Shaerococcus (Phoenicoccus) marlatti* Ckil

رتبة الحشرة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam Coccidae

## وصف الحشرة

يبلغ طول الأنثى ١.٢٥ مم ولونها أحمر داكن والذكر غير مجنح والبيضة متطاولة طولها ٢٥، مم ولونها وردي ، والحورية لونها ورد فاتح في أعمارها الأولى ثم وردي داكن في أعمارها الأخيرة ٢ وحورية الأنثى لها ثلاثة أعمار ولحورية الذكر خمسة أعمار

وليس لهذه الحشرة قشرة ولكن في العمر الأول والثاني لحورية الذكر والأنثى تفرز هذه الحوريات مادة شمعية بيضاء حول أجسامها وكذلك تفعل الأنثى اليافعة.

## دورة الحياة

تضع الأنثى بيضها أسفل مؤخرة جسمها وهي على كرب النخيل في شهر مارس ، وعند

فقس البيض تخرج منه الحوريات الزاحفة وتتجول لمدة يومين حتى تجد مكانا مناسباً تستقر فيه ، وتفضل هذه الحوريات أجزاء الكرب الخضراء والمغطاة بالليف .

### مظهر الإصابة والضرر

تمتص الحشرة القشرية الحمراء العصارة النباتية من أعقاب السعف الأخضر وتتبع الأجزاء المصابة ببقع داكنة اللون .

### طرق مكافحة

تكافح كيميائياً بنفس الكيماويات المستخدمة في مكافحة حشرة النخيل القشرية ، ويجب استعمال المبيدات في الوقت المناسب بحيث لا تتسبب في قتل الأعداء الحيوية الطبيعية للحشرة .

## ٨. حشرة الدوباس

الاسم العلمي للحشرة *Ommatissus binotatus lybicuss* Deberg

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Orper Homoptera


فصيلة تروبيدوكيدي Tropiduchidae

سميت هذه الحشرة بهذا الاسم لأنها تفرز مادة سكرية أو ندوة عسلية تسبب تلوث السعف وبقية أجزاء النخلة ، ويطلق العراقيون على هذه المادة السكرية (دوباس) أو دبس وتعتبر هذه الآفة من أخطر آفات النخيل في العراق وإيران وعمان والبحرين ، تؤثر تأثيراً بالغاً في إنتاج التمر

### وصف الحشرة

الأنثى اليافقة لونها أخضر مشوب بصفرة وطولها ٥ - ٦ مم ، ويوجد على الجسم ٤ -

١٠ بقع سوداء بقعتان منها توجدان على جانبي السطح العلوي للحلقة الصدرية الأولى ، وكذلك توجد بقعتان على قمة الرأس وبقعة على كل من جانبي الحلقة البطنيتين السابعة والثامنة




(شكل ٢٠٣-١) حشرة الدوباس - الأنثى إلى أعلى والذكر إلى أسفل، إلى اليمين حورية حشرة الدوباس

ويبلغ طول الذكر ٣ مم ويختلف عن الأنثى في عدم وجود البقع السوداء الأربع على الحلقة البطنيتين السابعة والثامنة ، ونهاية بطن الذكر مدببة واجنحته أطول من طول الجسم (وشكل ٢٠٣ - ١) والبيضة مطاولة تشبه الخيار ولونها أخضر فاتح في أول وضعها ثم

تتحول إلى مشوب بصفرة ثم إلى أصفر لامع قبل الفقس وطول البيضة ٥ مم وعرضها ١٣ مم ، ومقدمة البيضة عليها تعرجات وزائدة إسطوانية الشكل يفصلها عن باقي البيضة بروز ظاهر .

والحورية لها ٥ أعمار وفي الطور الأول ، يكون لونها أبيضاً مع وجود ثلاث بقع سمراء على جانبي الحلقات البطنية - والعيون حمراء وبراعم الأجنحة غير موجودة ويبلغ طول الحورية ١ - ١.٢٥ مم ، وتظهر براعم الأجنحة في العمر الثاني متجهة إلى أسفل، وفي العمر الثالث تغطي براعم الأجنحة الحلقة البطنية الأولى وجزء من الحلقة الثانية ، وفي عمرها الخامس يكون طولها ٣ - ٤ مم وبراعم أجنحتها تغطي الحلقات البطنية الأولى والثانية والثالثة وجزء من الرابعة ، وتوجد في مؤخراتها خصلة من الشعر عددها ١٦ شعرة طول كل شعرة منها ٣ مم.



(شكل ٢٠٣-ب) بيض حشرة النوباس مغروس في السطح العلوي للخرقة

## دورة الحياة

لحشرة النوباس جيلان في السنة أحدهما شتوى (جبل السبات الشتوى) والآخر جبل

الصيف ، ويوجد في مؤخرة الأنثى منشاران يستعملان في عمل نفق مائل في الأنسجة النباتية فطره ١٧ - ٢ مم وعمقه ٤ - ٥ مم ، وتضع الأنثى بيضة واحدة في كل نفق بحيث تبرز مقدمة البيضة خارج النفق ، تبدأ الأنثى في وضع البيض في الأسبوع الأول من نوفمبر ويدخل هذا البيض فترة البيات الشتوى طوال الشتاء ، ويبدأ الفقس في أبريل وتضع الإناث بيضها على الخوص والجريد ، ولكن معظم البيض يوضع على السطح العلوى للخوص ، إذ أن نحو ٧٦٪ من البيض يوضع على السطح العلوى للخوص والباقي على السطح السفلى كذلك يوضع معظم البيض على صف السعف الثانى بينما يوضع القليل منه على الصفوف من ٧ - ١٠ .

ويتحول لون البيض من اللون الأصفر الفاتح إلى اللون الأصفر اللامع قبيل الفقس ، ويمكن مشاهدة الحورية من خلال قشرة البيضة . ويبدأ فقس البيض خلال الأسبوع الأول من إبريل ويستمر حتى الأسبوع الثانى من يونية ، ونسبة فقس البيض الموجود على السطح العلوى للخوص أقل من نسبة فقس البيض الموجود على السطح السفلى ، هذا ومدة الجيل الشتوى إبتداء من وضع البيض حتى موت الحشرات اليافعة الناتجة منه نحو ٢٠٣ يوما

وتبدأ الإناث فى وضع بيض جبل الصيف خلال الأسبوع الثانى من يونية ، وتضعه الإناث على السعف والعزوق ولكن لا يوجد بيض على الثمار وأقماعها ، كذلك يوضع ٧٠٪ من البيض على السطح العلوى للخوص ، ٣٠٪ على السطح السفلى لها، وتوجد أعلى نسبة من عدد البيض على الصف الرابع من السعف أما صفوف السعف الجديدة من ٧ - ١٠ فلا يوضع عليها بيض ويفقس بيض جبل الصيف فى الأسبوع الأول من أغسطس وينتهى خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر، ونسبة فقس البيض الموضوع على السطح العلوى للخوص أعلى منها بالنسبة للموضوع على السطح السفلى، وتبلغ مدة الجيل الصيفى نحو ١١٢ يوما والحورية صغيرة الحجم يتراوح طولها ما بين ٢ - ٥ مم ولونها أصفر شمعى وخرطومها صغير ثاقب ماض تتغذى بواسطته على العصارة النباتية من نسيج الخوص، وتستطيع الحورية القفز لمسافة قدمين أو أكثر كما تستطيع السير، وتفضل الحوريات الأماكن الظليلة من أجزاء النخلة ولا تفضل الأجزاء اليابسة أو المغطاة بالتراب أو أى جهة من جهات النخلة الأربع، ولغرض الهروب من الحرارة العالية أثناء الصيف تبدأ حوريات جبل الشتاء بالهجرة من



الأجزاء الخضرية والشمعية للنخلة نحو قلب النخلة ومابين الليف والكرب خلال الأسبوع الأخير من مارس، وتنتهي من هجرتها خلال الأسبوع الأخير من يونيو، كذلك تفضل الحشرات اليافعة أجزاء النخلة الظليلة وتتجه نحو قلب النخلة هروبا من الحرارة العالية في النهار، وتخرج الحشرات اليافعة من قلب النخلة إلى السعف بغرض التزاوج ووضع البيض، وتحفر الحشرة اليافعة ١ - ٢ قدم وتطير لمسافة قليلة ولا تجتذب نحو الضوء ليلا.

### مظهر الإصابة والضرر

تمتص الحشرات اليافعة وحورياتها العصارة النباتية من الخوص والجريد والعنوق والثمار، وتفرز الأجزاء النباتية المصابة مادة عسلية من الثقوب التي تحدثها بها أجزاء فم الحشرة الثاقب الماص، وكذلك تفرز الحشرات اليافعة وحورياتها مادة عسلية أو ندوة عسلية كثيفة تغطي السعف والعنوق والجذع أحيانا وكذلك النباتات المزروعة تحت النخلة، وتنمو على هذه الإفرازات العسلية الفطريات كما تلتصق بها الأتربة وتغطيها بطبقة كثيفة تعيق التمثيل الضوئي فيزيد الضرر، وتضعف النخلة ويتحول لون السعف من الأخضر إلى الأخضر المصفر، وتكون الثمار المصابة بطيئة التحول من مرحلة إلى أخرى من مراحل النضج وبالتالي يتأخر نضج الثمار ويقل حجمها وتكون حلاوتها أقل من حلاوة الثمار السليمة فضلا عن تلوث الثمار المصابة بالإفرازات العسلية والتراب التي تنقص من سعرها، وقد تؤدي الإصابات المتعاقبة الشديدة إلى موت النخلة المصابة.

### طرق المكافحة

يوجد في الطبيعة العديد من الأعداء الحيوية لحشرة النوباس منها طفيل صغير من رتبة غشائية الأجنحة، وتقترب حشرات أبي العبد ويرقاتها حوريات والحشرات اليافعة لهذه الآفة وكذلك يفترسها يرقات حشرة أسد المن ويمكن ترتيب هذه الحشرات المفترسة كما يلي:

يرقات أسد المن *Chrysopa carnea step* (Neuroptera: Chrysopidae) وأنواع أبي العبد التابعة لرتبة غمدية الأجنحة Coleoptera وفصيلة أبي العبد coccinellidae ومنها:-

أبو العبد نو سبع نقط . *Coccinella septumpunctata*

أبو العبد نو ١١ نقطة *C.undecimpunctata* L.

أبو العبد *Chilocoris bipustulatus* L.

هذا ويهاجم النمل حوريات حشرة الدوباس وحشرات اليافعة ويفتك بها.

### أما المكافحة الكيميائية

فتستعمل عند فشل الأعداء الطبيعية في الحد من خطورة الحشرة، وتستعمل الطائرات في العراق في رش المبيدات الكيميائية لمكافحتها، كذلك تستعمل آلات الرش الأرضية في ذلك، ويذكر عبد المسيح (١٩٧٠) أنه يجري استعمال الملاثيون بنسبة ٢٤٠ جرام من المادة الفعالة لكل ١٠٠ جالون ماء بالرش بالآلات الرش الأرضية، ويفضل أن تجرى المكافحة عندما تصل نسبة فقس البيض إلى ٧٥٪، وتحتاج كل نخلة إلى ١,٥ جالون من سائل الرش.

## ٩- دودة طلع النخيل أو فراشة البلح العظمى أو ثاقبة

### العراجلين

الاسم العلمي للحشرة (*Arenipses sabella* Hampsm)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة *Oder Lepidoptera*

فصيلة بيراليدي *Fam. Pyralidae*

وتنتشر هذه الحشرة إنتشارا واسعا بين مزارع النخيل في العالم ولاتكاد تخلو منطقة منها، فهي موجودة في العراق والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا والجزائر وغيرها.

### وصف الحشرة

الفراشة الأنثى يبلغ إمتداد جناحيها في حالة فردهما ٤٠ - ٤٢ مم وطولها نحو ١٨ مم،

والذكر يبلغ إمتداد جناحيه في حالة فردهما ٣٣ - ٣٥ مم، ولون رأس وصدر الفراشة بنى فاتح ولون البطن أبيض فضي، لون الجناحين الأماميين بنى فاتح جدا مع وجود حراشيف سوداء قليلة على العرق الوسطى ومنطقة الجناحين العليا، والجناحان الخلفيان لونهما أيضا بنى فاتح جدا مع وجود مناطق داكنة اللون مابين العروق، والحافتين الداخلية والخارجية بيضاء.

والبيضة كروية الشكل طولها ٢ - ٣، مم تقريبا

واليرقة لونها بنى محمر، وطولها ٢٠ - ٢٢ مم، ورأسها أسود أو أحمر قاتم، ولون الحلقتين الصدريتين الأولى والثانية بنى غامق وعلي كل منهما شعيرة طويلة، ويوجد على كل جانب من جانبي الحلقة البطنية الثانية بقعة صفراء دائرية لها مركز داكن وشعيرة طويلة.

وتوجد العذراء داخل شرنقة طولها ١٦ - ١٩مم وهي متطاولة الشكل بيضاء أو مغيرة.

### دورة الحياة


لدودة الطلع جيلان كل عام، وتبدأ فراشات الجيل الأول في الظهور في بداية الربيع (شهر مارس) وتستمر في الشهور حتى شهر إبريل، وتضع الفراشة الأنثى البيض فرديا. على الجانب الداخلى والخارجى لرأس غلاف الطلع وعلى الخوص الجديد والجريد، ويفقس البيض بعد نحو عشرة أيام، ومدة الطور اليرقى ٥ - ٦ أسابيع، وعند اكتمال نمو اليرقة، تقوم بنسج شرنقة حريرية في رأس النخلة تتحول داخلها إلى عذراء وتوجد بعض العذارى بداخل غلاف الطلع، وتبلغ مدة الطور العذرى ٦ - ٧ أسابيع، ومدة الجيل الأول ١٢ - ١٤ أسبوعا أما الجيل الثانى فتبدأ فراشاته في الظهور في شهر يولية وتستمر في الظهور حتى شهر سبتمبر، ويوضع البيض على الخوص والجريد للسعف الجديد، وعندما تصبح اليرقة تامة النمو تترك السعف وتذهب إلى رأس النخلة مابين الكرب والليف وتقوم بنسج شرنقة حريرية تتحول داخلها إلى عذراء، وتمضى حشرات هذا الجيل البيات الشتوى في طور العذراء داخل الشرنقة، والطور اليرقى مدته ٧ أشهر وتبلغ مدة هذا الجيل ٨ - ٩ أشهر.



(شكل ٢٠٤) يرقات نودة الطلع في  
أعمار مختلفة



(شكل ٢٠٥) شرانق نودة الطلع



(شكل ٢٠٦) إصابة جديد السعف  
الجديد بنودة الطلع

## مظهر الإصابة والضرر

يرقات هذه الآفة نشطة الحركة تغتذى على الطلع قبل وأثناء التلقيح ثم تحفر بالعرجون إما عند اتصاله بالنخلة أو عند قواعد الشماريخ مما يتسبب عنه جفاف الثمار فيما بعد، حيث تكون هذه الثمار صغيرة الحجم تبقى حشفا معلقا بالشماريخ ولا تسقط على الأرض.

## طرق المكافحة

يوجد لهذه الآفة العديد من الأعداء الحيوية الطبيعية منها عدد من العقارب الكاذبة التي تفترس اليرقات، كما يتطفل عليها عدد من فصيلة Braconidae التابعة لرتبة غشائية الأجنحة منها *Macrocentrus, sp. Apanteles sp.* وتتطفل على يرقات الآفة.

## أما المكافحة الكيميائية

ذكر عبد الحسين (١٩٧٠) أن هذه الحشرة تكافح رشاً بمبيد الديازينتون ٤٠ ٪ بمعدل ٧ جرامات لكل جالون ماء، كما تكافح بالملاثيون أو الديبتركس على رشتين، ويدخل برنامج مكافحة هذه الآفة ضمن برنامج مكافحة بودة البلح الصغرى ( الحميرة) حيث تظهر في نفس الوقت ويكافحها معا ضمن برنامج واحد.

## ١٠ - ثاقبة النخيل أو حفار القلف أو حفار ساق الرمان


الاسم العلمى للحشرة *Phonapathe frontalis* (Fehr)

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة *order coleoptera*

فصيلة بوس تريكيدي *Fam. Bostrichidae*

تصيب هذه الحشرة نخيل البلح وتعمل أنفاقا في الجريد مما يؤدي إلى كسره، كذلك تحفر في العراجين وتسبب جفاف الثمار، ويستدل على حفر الحشرة بالإفرازات الصمغية الكثيرة التي تتجمع حول الحشرة فتقتلها في مكانها.

والحشرة اليافعة خنفساء كبيرة الحجم طولها ١,٥ سم والجزء الأمامي العلوي من الحلقة الصدرية الأولى مسنن، (شكل ٢٠٧) والجزء الخلفي أملس لامع، ولون السطح العلوي للجسم بني قاتم أو أسود، ويغطي الوجه وأسفل البطن زغب بني مشوب بصفرة، وتوجد هذه الحشرة في مصر والعراق وليبيا وسواحل البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي، وتظهر الحشرات اليافعة في شهر مارس ويونية، وتعتبر هذه الآفات من آفات النخيل الثانوية.



(شكل ٢٠٧ - ١) خنفساء ثاقبة النخيل

## عوائل الحشرة

تصيب هذه الحشرة الرمان بشدة، كذلك تصيب العنب وجريد النخل وأشجار الإثل، وتشاهد على سوق الأشجار المصابة ثقوبا بيضاوية الشكل (في حالة العوائل الأخرى غير النخيل) قطر الثقب ما بين ٦ - ٨ مم، وإذا شق الفرع المصاب تشاهد نشارة ناعمة داخل الأنفاق، ويسهل مشاهدة الإصابة في فصل الشتاء بعد تساقط أوراق الرمان والعنب، وتشاهد الإصابة في الرمان طول العام في المملكة العربية السعودية خصوصا في وادي خليص ووادي فاطمة.

## طرق مكافحة

تقوية الأشجار بالخدمة الجيدة والتسميد والرى وعدم تعريضها للجفاف، وتقليم الأفرع المصابة في فصل الشتاء وحرقتها وتعالج كيميائياً بالرش بالأندرين ٠.٥ ٪ أو الباراثيون ٠.١ ٪ .

## ١١ - خنفساء النخيل

الاسم العلمى للحشرة *Oryctes elegans* Prell

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Oroler Coleoptera

فصيلة الجعال Fam. Scarebaeidae

تعد هذه الحشرة من الآفات الخطيرة التى تصيب نخل البلح فى العراق وإيران والمنطقة الشرقية من المملك العربية السعودية.

### وصف الحشرة

الحشرة اليافعة خنفساء لونها بنى غامق أو أسود، ويوجد بالرأس قرن يكون فى الذكر أقصر منه فى الأنثى ويحيط بهذا القرن خصلة من الشعر الكثيف، ويبلغ طول الذكر ٢٨ - ٣٤ مم وطول الأنثى ٣٤ - ٣٦ ملليمتر، والجناحان الأماميان مغطيان بوبر فاتح قصير، ويوجد بالسطح العلوى للحلقة الصدرية الأولى إنخفاض، ويكون هذا الإنخفاض واسعاً وعميقاً فى الأنثى، وصغيراً وضحلاً فى الذكر، وحافة الحلقة البطنية الأخيرة مقوسة من الجهة السفلية فى الأنثى ومستقيمة فى الذكر (شكل ٢٠٨).




(شكل ٢٠٨) - منظر جانبي لخنفساء النخيل

واليرقة بيضاء منحنية نحو الجهة البطنية، والحلقات البطنية الثلاث الأخيرة، أكبر حجماً من غيرها (شكل ٢٠٩) واليرقة غليظة مجمدة يتراوح طولها بين ٥ - ٦ سم ولها أرجل صدرية ومؤخرتها أغلظ من مقدمتها، ولاتحمل صفات حفار الساق.

### دورة الحياة

لهذه الحشرة جيل واحد في العام، وتبدأ الحنافس في الظهور في أواخر شهر مارس وحتى أوائل أكتوبر، ومع هذا تظهر معظم الحنافس في شهر إبريل، وتضع الأنثى بيضها في أنفاق سطحية تصنعها في العنوق والسعف الأخضر أو ما بين الفسيل والكرب والليف، وتبدأ الإناث في وضع البيض خلال الأسبوع الأول من مارس، وتمضي الحشرة البيات الشتوى وهي في الطور اليرقى، وتتحول اليرقات إلى عذارى في أوائل الربيع، ومدة الطور اليرقى ٩ - ١٠ أشهر، ومدة طور العذراء نحو ٣ أسابيع.





(شكل ٢٠٩) - يرقات خنفساء النخيل (حفار عذق النخيل)

### مظهر الإصابة والضرر

تأتي معظم الأضرار من الحشرة اليافعة أي الخنفساء أما اليرقة فضررها محدود، وتثقب الخنفساء العرايين وقلب النخيل وكذلك السعف، وتترك الأنسجة المقضومة بارزة من الثقوب، وقد تتسبب الإصابة في تكسر السعف والعنوق، وتعيش يرقات هذه الحشرة على المواد العضوية المتحللة وفي جنوع النخيل الميت.

### طرق المكافحة

تعيش هذه الخنفساء مختفية داخل الثقوب ولذلك يصعب مكافحتها كيميائياً، وهي تهاجم النخل الضعيف المهمل أكثر من مهاجمتها للنخل القوى المعتنى بخدمته، ويجتذب الخنافس للضوء ليلاً في فصل الصيف، ولذلك يمكن استعمال المصائد الضوئية في مكافحتها.

### المكافحة البيولوجية

يوجد في الطبيعة متطفلات تتطفل على يرقات هذه الحشرة منها ذبابة من فصيلة -Tachini

dae *Crothalia disyuncta* Weid

## ١٢ - حفار عذق النخل المتشابه

الاسم العلمي للحشرة. *Dryctes sinaicus* wik.

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة order Coleoptera

فصيلة الجعال Fam. Scarabaeidae

ذكر داوسون ومانسيوت (١٩٦٥) بأن هذه الخنافس توجد في منطقة البصرة بالعراق وتحفر في عذوق النخيل وهي تشبه الحشرة السابقة من حيث الشكل والعادات، وأشار أيضا بأنها موجودة في منطقة لحج قرب عدن وفي الجزيرة العربية وإيران ومسقط وباكستان.

هذا وتوجد خنافس أخرى شبيهة بتلك وتتبع نفس الفصيلة والرتبة هي خنافس الصحراء *Oryctess sahariensis*، وتوجد هذه الخنافس في بعض الوديان في شمال افريقية وواحات مصر والصعيد، وهي تشبه في عاداتها وطباعها الحشرتين السابقتين.

## ثالثا الآفات الحشرية التي تصيب الثمار

### ١٣ - دودة البلح الصغرى أو الحميرة

الاسم العلمي للحشرة *Batrachedra amydraula* Meyrick

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة order Lepidoptera


فصيلة هو مفدي Fam. Momphidae

تسمى هذه الحشرة بأسماء محلية عديدة فهي تسمى الحميرة أو الحشف كما تسمى لافحة الثمار البيضاء أو الحمراء، وهي تسبب خسائر فادحة للنخيل في العراق وليبيا والمغرب والجزائر وبعض مناطق النخيل الأخرى وإن كانت قليلة الإصابة للنخيل المزروع في المناطق الساحلية لإرتفاع نسبة الرطوبة بها، ويؤكد ذلك مارثن (١٩٥٨) حيث وجد أن إصابتها للثمار قليلة في الساحل الليبي بينما يشتد خطرها في فزان خاصة في واحات براك وسبها.

وتبلغ الخسارة الى تسببها هذه الحشرة في محصول التمر في العراق ٧٠ ٪ أحيانا أو أكثر كما ذكر راو (١٩٢٢).

### وصف الحشرة


الحشرة اليافعة فراشة صغيرة نحيفة سمراء اللون (شكل ٢١٠) وطول الفراشة ١٣ - ١٥ مم وامتداد الجناح ١٠ - ١٣ مم، والجناحان الاماميان مغطيان بحراشيف بيضاء ومركطة بنقط بنية اللون صغيرة جدا، والجناحان الخلفيان ضيقان لونهما أسمر فاتح، والأجنحة محاطة بشعيرات طويلة سمراء اللون، وجسم الفراشة فضى اللون والعيون المركبة بنية اللون وقرون الإستشعار فضية مركطة ببقع بنية.



(شكل ٢١٠ فراشة الحميرة)

ويبلغ طول اليرقة التامة النضج ١٢ - ١٥ مم، والحلقة الصدرية الأولى لونها بنى ولون باقى جسمها أبيض مشوب بحمرة، وتحمل كل حلقة على جانبيها درنتين متقاربتين داكنتين بخرج من كل منها شعيرة ويوجد على ظهر اليرقة درنتان قريبتان من الخط الوسطى على كل

منهما شعيرة طولها ضعف طول شعيرات الدرنات الجانبية، ويوجد درنتان أخريان بعيدتان عن الخط الوسطى على كل منهما شعيرة، وشعيرة الدرة الخلفية طويلة أما شعيرة الدرة الأمامية فقصيرة (شكل ٢١١) .



(شكل ٢١١) يرقة الحميرة

والعذراء رفيعة متطاولة لونها بني مشوب بصفرة وتوجد بداخل شرنقة حريرية صفراء فاتحة أو بيضاء فضية، والشرنقة مستدقة الطرفين وطولها نحو ١٥ مم (شكل ٢١٢) .



(شكل ٢١٢) شرنقة الحميرة

## دورة الحياة

لهذه الحشرة جيلان أو ثلاثة في السنة ما بين شهري مارس ويونية

وتبدأ فراشات الجيل الأول في الظهور في أوائل شهر إبريل، وتقوم بوضع بيضها على الشماريخ والجمرى، ويفقس البيض بعد أسبوع من وضعه، وقبل أن تبدأ الثمرة في مهاجمة الجمرى، تفرز خيوطا حريرية تربط الثمرة بالشمرخ لتمنع سقوط الثمرة ثم تشرع اليرقة في نخر ثقب صغير قرب قمع الثمرة للتغذى على محتوياتها ثم تتركها لتحفر في ثمرة أخرى وهكذا، وتستطيع اليرقة الواحدة أن تحفر في عشرين ثمرة وأحيانا أكثر بكثير، وتتساقط الثمار المصابة على الأرض ولكن اليرقات لا تسقط مع الثمار وتبقى موجودة فوق رأس النخلة، وعندما يتم نمو اليرقة تترك الثمرة للبحث عن مكان مناسب تنسج فيه شرنقتها الحريرية وتحول داخلها إلى عذراء، ومدة الطور اليرقى أسبوعان والطور العذرى أسبوع واحد ومدة الجيل الأول شهر أما الجيل الثاني فيفقس البيض وتخرج ويرقاته في أول يونية وتغتنى على الجمرى أيضا وتبلغ مدة الطور اليرقى في هذا الجيل أسبوعين والطور العذرى أسبوع ومدة الجيل كله نحو شهر.

أما الجيل الثالث فيفقس البيض عن يرقاته في الأسبوع الأول من شهر يولية وتغتنى هذه اليرقات على خلال الرطب، وتبدأ اليرقات في الإغذاء أولا على خلال الذى يبدأ في التحول إلى رطب في أواخر شهر يولية، وبعد تمام نمو اليرقة تترك الثمرة وتبحث عن مكان ملائم تصنع فيه شرنقتها وتبقى اليرقة هكذا داخل الشرنقة في حالة بيات شتوى خلال فصل الشتاء ثم تتحول إلى عذراء داخل الشرنقة في أواخر شهر مارس وتظهر الفراشات في أوائل شهر إبريل ومدة الطور اليرقى في هذا الجيل ٨ - ٩ أشهر والطور العذرى أسبوعين هذا ولا توجد شرايق هذا الجيل على الأرض، بل ذكر الباحثون أن اليرقات التامة النمو تحفر في أعقاب السعف وفي الجريد وتدخل في الحفر وتحيط نفسها بشرنقة تمضى فيها فصلى الخريف والشتاء ومدة هذا الجيل ٩ - ١٠ أشهر.

### مظهر الإصابة والضرر

تنقب اليرقة قشرة الثمرة بالقرب من القمع أو تحت القمع بقليل وتفتت على بعض محتويات الثمرة التي ماتزال صغيرة خضراء كروية، فتجف الثمرة نتيجة لذلك وتصبح محمرة اللون متحشفة ولهذا سميت بعاهة الحميرة أو الحشف، وتبدأ الثمار في التساقط من العنوق سواء أكانت جمرى أو خلال أو رطب أو تمر، وتتألف الثمار المتساقطة من ثمار مصابة بحشرة

الحميرة وأخرى سليمة، وتحدد نسبة الثمار المصابة بين الثمار المتساقطة درجة الإصابة، وتعتبر درجة الإصابة خفيفة إذا كانت نسبة الثمار المصابة في مجموع الثمار المتساقطة ٥ ٪ ومتوسطه إذا كانت هذه النسبة ٢٥ - ٣٠ ٪ وشديدة إذا كانت أكثر من ٣٠ ٪

## طرق مكافحة

يوجد في الطبيعة عددا من الأعداء الحيوية لهذه الحشرة تعمل في كسر حدة الإصابة إذا كانت الظروف مناسبة وفي مصر توصي وزارة الزراعة المصرية بإتباع الآتى للوقاية من الحميرة وثاقبة العراجين وأبى دقيق الرمان وحشرة الإفستيا

أ - العناية بالخدمة الزراعية مع إجراء عمليات مكافحة الميكانيكية وقصر مكافحة الكيماوية على الآفات التى لايمكن الوقاية منها بالطريقة الميكانيكية أو عند ظهور إصابة تستدعى العلاج.

ب - يمكن الوقاية من الإصابة بالحميرة وثاقبة العراجين وأبى دقيق الرمان وحشرات الإفستيا بإتباع الآتى:

١ - إزالة العراجين القديمة وبقايا الأغاريض الزهرية والجريد القديم واللوف وإعدامها حرقا .

٢ - جمع ثمار البلح الموجودة فى إبط الأوراق المتساقطة على الأرض وتحت وداخل نباتات الخلفة وإعدامها حرقا .

٣ - إزالة الخلفة أو تقليمها تقليما جائرا .

٤ - العزيق الجيد للتخلص من الحشائش وخاصة الحلفا ويتم هذه العملية بعد جمع محصول البلح مباشرة وحتى قبل خروج الأغاريض الزهرية (من أكتوبر إلى فبراير) .

٥ - إزالة أشجار السنط والشيشلان الموجودة داخل بساتين النخيل وتوصي وزارة الزراعة المصرية بإجراء مكافحة الكيماوية للحميرة على الوجه التالى:

تكافح الحميرة كيميائيا باستخدام مبيد ملاثيون ٥٧ ٪ بمعدل ٣٠٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء أو لبياسيد ٥٠ ٪ بمعدل ٢٥٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء أو توكوثيون ٤٠ ٪ بمعدل ٣٠٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء.

وترش الأشجار رشة واحدة بأحد المبيدات المذكورة إذ يتطفل عليها عدد من الطفيليات التابعة لرتبة غشائية الأجنحة من فصيلة براكونيدي Braconidea وهي

1 - *Bracon brevicornis* Wesm

2 - *Habrobracon hebetor* Say

3 - *Phanerotoma ocularis* Koll

ويرى المؤلف أنه ببذل المجهود والدراسة، يمكن الإستعانة بهذه الطفيليات في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وعدم استعمال المكافحة الكيميائية إلا في الفترات التي تكون فيها هذه الطفيليات في حالة خمول محافظة عليها من الهلاك، ولكن الإسراف في استعمال المبيدات الكيميائية أدى إلى تلوث البيئة وتحجيم دور هذه الأعداء الحيوية.

هذا وتكافح هذه الحشرة كيميائياً في العراق بإستعمال مبيد الديازينون ٤٠ ٪ القابل للبلل بمعدل ٧ جم من المبيد لكل جالون ماء، كذلك تكافح بالملاثيون أو الدبتركس، ويجرى الرش ثلاث مرات الأولى بعد ٧ - ١٠ أيام من التلقيح وعقد الثمار والثانية بعد الأولى بمدة ١٥ - ٢٥ يوماً، وتستخدم في ذلك الرشاشات الأرضية أو اليدوية، وترش العنوق في المرة الأخيرة في النصف الثاني من شهر مارس، هذا ويجب عدم أكل الثمار المعاملة إلا بعد مرور أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ المعاملة، ومع ذلك فإن ثمار النخيل خلال وبعد هذه الفترة تكون في طور الجمرى.

## ١٤ - حشرة الاباش

الاسم العلمي للحشرة *Diceroprocta apache* P.

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة نطاطات الأوراق Fam. Cicadellidae (Jassidea)

تصيب هذه الحشرة نخيل البلح في كثير من مناطق زراعته وتنزل به خسائر فادحة، وذكر

أنها سببت خسائر كبيرة لمحصول التمر في جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية (Elmer, 1963) وتضع الحشرة الأنثى بيضها في الشماريخ ولذلك فهي تعتبر من الآفات الخطرة على النخيل، وتتأثر حيوية النخلة بسبب إغذاء اليرقات في مراحل نموها الأولى على جذور النخيل، ويزداد الضرر بالمحصول بسبب وضع الإناث لبيضها في الشماريخ مما يؤدي إلى ذبول الثمار إما بسبب وضع البيض في أنسجة الثمار أو بسبب إعاقة جريان العصارة في الشماريخ، ويظهر موضع الإصابة واضحا على شكل ثقب اسنفجي في قمم الشماريخ المصاب والخالى من الثمار (شكل ٢١٢).


### وصف الحشرة

جسم الحشرة اليافة ضخم في كلا الجنسين، ومقدمة جسمها عريضة ويبلغ طول الحشرة من ٣,٥ - ٤,١ سم ولونها أسمر فاتح إلى أسمر غامق في السطح العلوي من الجسم. ولونها أسمر أفتح لونا في باقى أجزاء الجسم، ويقطع الظهر عرضا عند قاعدة الأجنحة خط عريض أسمر فاتح واضح المعالم، والأجنحة شفافة معرقة بعروق سمراء، والحوريات لونها أسمر غليظة الجسم والأرجل الأمامية قوية تؤهلها للحفر في التربة، وتقضى الحوريات سنتين في التربة يتم فيها تطورها وتعيش جينئذ على جنور مختلف النباتات.

### طرق المكافحة

مكافحة هذه الحشرة صعبة متعذرة لعدم ثبات الأنثى وطيرانها، ولكن ذكر أن الأغشية الورقية التي تستعمل في كاليفورنيا لحفظ العنوق من مياه الأمطار تفيد في الحد من الإصابة بهذه الآفة إذا تم وضعها في وقت مبكر، ولكن العنوق التي لم يتيسر تغطيتها فيتلف من ثمرها بسبب الإصابة بهذه الآفة نحو ٢٥ - ٨٠ ٪، ولكن استعمال الأغشية الورقية للعنوق في وقت مبكر يؤدي إلى إصابتها بمرض الوشم Checking وبعض الأمراض الفطرية الأخرى، وقد تم التغلب على هذه الصعوب بإستعمال أغشية ورقية مثقبة تسمح بتغلغل الهواء وتمنع تراكم الحرارة والرطوبة حول الثمار.





(شكل ٢١٢) ذبول الثمار نتيجة الإصابة بحشرة الأباش

## ١٥ - أبو دقيق الرمان أو دودة ثمار الرمان

الاسم العلمى للحشرة *Viracola livia* Kling

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة ليكينيدى Fam. Lycaenidae

تصيب هذه الحشرة ثمار الرمان من مايو حتى سبتمبر، والبلع من أغسطس حتى أكتوبر والاكاسيا طول العام، كما وجدت فى الجوافة والبشملة وقرون الخروب الخضراء فى برج العرب بالقرب من الاسكندرية، وتاكل اليرقة جزءا صغيرا من الثمرة ولكن معظم الضرر ينشأ من نمو الفطر حول الثقب وكذلك من يرقات ذبابة الدروسوفلا وخنافس الثمار الجافة ذات البقعتين واللثان تنجذبان إلى المواد المتخمرة.

### وصف الحشرة اليافعة

لون السطح العلوى لأجنحة الأنثى بنفسجى مشوب بحمرة والقاعدة لونها بنفسجى، أما فى الذكر فلون السطح العلوى للأجنحة يكون برتقاليا والحافة الامامية لونها بنى، ولون السطح السفلى للأجنحة فى كلا الجنسين رمادى. وتبلغ الحشرة نحو ١ سم فى الطول، ٢,٥ سم فى العرض بعد فرد الجناحين.

### دورة الحياة

ليس لهذه الحشرة بيات شتوى إذ توجد أطوارها طول السنة فى قرون أشجار الاكاسيا. تظهر الحشرة اليافعة فى الربيع وتتزاوج وتبدأ الأنثى فى وضع بيضها ويكون ذلك بعد خروجها بمدة ٢ - ٣ أيام. يوضع البيض فرديا على ثمار الرمان من الخارج وغالبا على السطح الداخلى للكأس ونادرا مايوضع على الأوراق والأزهار، وفى حالة قرون السنط والاكاسيا فان البيض يوضع دائما على سطح القرون الخضراء، وفى حالة البلع يوضع البيض أيضا على الثمار من الخارج والبيضة ذات لون أبيض مخضر وشكلها مستدير وعلى قشرتها من الخارج تضاريز واضحة.

يفقس البيض بعد نحو ٢ - ٤ أيام وتقرض اليرقات الحديثة قشرة الثمار المصابة .

تنسلخ اليرقة ٣ مرات لتصل إلى طورها اليافع، ويكون لونها عند الفقس أخضر والرأس أسود وعلى الجسم شعر أسود وعند تمام نموها يكون لونها أحمر داكن وطولها نحو ١,٥ سم، واليرقات التي تتربى على قرون السنط لونها أخضر فاتح دائما. تبلغ مدة طور اليرقة نحو أسبوع صيفا ونحو ٥٠ يوما شتاء.

وتتحول اليرقة إلى عذراء داخل الثمار وذلك بالقرب من فتحة عملها على السطح الخارجى للثمرة، وقد توجد العذارى على الساق أو أى مكان آخر، والعذراء مكبلية بنية اللون وطولها ١ سم وتبلغ مدة طور العذراء ٧ - ٨ أيام فى الصيف، ٤٥ يوما فى الشتاء.

### طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة زراعيًا بإزالة أشجار الأكاسيا من مزارع الرمان والنخيل أو التخلص من قرونها الخضراء طول السنة، ويوجد فى الطبيعة طفيل يتطفل على يرقات هذه الحشرة هو *Brachemeria brevicornis* من رتبة غشائية الأجنحة والطفيل *Euytoma sp.*

### المكافحة الكيميائية

أما المكافحة الكيميائية فمن الصعب إجرائها ولو أن وزارة الزراعة المصرية توصى برش أشجار النخيل رشة واحدة فقط بأحد المبيدات الآتية لمكافحة أبو دقيق الرمان والمبيدات هي:

سيفين قابل للبلل ٨٥ ٪ بمعدل ٢٠٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء

أو سوميثيون ٥٠ ٪ بمعدل ٢٥٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء

أو ثلاثيون ٥٧ ٪ بمعدل ٢٠٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء

## ١٦ - دودة البلح العامرى أو دودة البلح الكبرى أو دودة التين

الاسم العلمى للحشرة *Ephestia cautella weiker*

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة الفراشات ذات الخرطوم (فيسيتيدي) Fam. Phycitidae

تصيب يرقات هذه الفراشة البلح الجاف فى أماكن زراعته فى مصر والبلاد العربية

الأخرى، وكذلك تصيب الفواكه المحفوظة مثل التين والمشمش واللوز المبشور ويزور القهوة والبصل المجفف والفلول السوداني ويزور القطن وألواح الكسب وبراويز عسل النحل والشيكولاتة والفاكهة المتساقطة من الأشجار كالموالح والرمان والكمثرى وغيرها، ووجدت يرقات هذه الحشرة وهي تفترس بعض أنواع المن والبق الدقيقى.

### وصف الفراشة

تبلغ من الطول ١,٥ سم، وفي العرض ٣ سم بعد فرد الجناحين على الجانبين، ولونها رمادى قاتم فيما عدا الأجنحة الخلفية فهي بيضاء وحافتها سمراء.

### دورة الحياة

تضع الأنثى الملفحة نحو ١٠٠ - ٣٤٠ بيضة بمتوسط ١٧٧ بيضة، ويوضع البيض فرديا أو فى مجموعات (٢ - ٤) أو فى سلاسل، والبيضة بيضاوية الشكل ولونها أبيض ويوجد على قشرتها دروز شبكية من الخارج، ويبلغ قطرها ٠,٤٣ مم، وتبلغ فترات ما قبل وضع البيض وما بعد وضع البيض فى الأنثى الملفحة نحو ٥ - ٣، ٥ - ١ يوما على التوالي، ويفقس البيض بعد نحو ٣ - ٤,٥ يوما، وتنسج اليرقات نسيجا حريريا تعمل منه أنابيب تتغذى من داخلها، ولليرقة ٥ أعمار وتبلغ مدة طور اليرقة من ٣٠ - ٣٦ يوما، واليرقة التامة النضج يصل طولها إلى ٨ - ١ سم ولونها قرمزي وتصبح صفراء قاتمة قرب التعذير، وتوجد درقة غامقة اللون فى ترجة كل من الصدر الأمامى والحلقة العاشرة كما توجد بقعة غامقة على باقى حلقات الجسم، والعذراء المكبله تبلغ نحو ٧ مم طولاً وهى دائما محاطة بشرنقة حريرية، وتوجد بنهاية بطن العذراء ٨ خطاطيف، وتبلغ مدة طور العذراء نحو ٧ - ٩ أيام وعلى هذا فمدة الجيل الواحد تصل إلى ٧ - ٨ أسابيع، وللحشرة جيلان فى السنة

### مظهر الإصابة والضرر

تبدأ الإصابة عند وضع الأنثى بيضها فوق الثمار، وإذا فقس البيض ثقت اليرقات لحم

الثمار، هذا ويسهل دخولها من ناحية القمع إذا كان القمع منزوعا والفتحة ظاهرة، والثمار الجاف أو النصف جاف أكثر تعرضا للإصابة.

وأصبحت هذه الحشرة الآن واسعة الإنتشار، حيث توجد في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر وبنول شمال إفريقيا.

### طرق المكافحة

يتطفل على يرقات هذه الحشرة في الطبيعة حشرات من أنواع جنس-*Trichogramma, mi* و*crobracon* وتكافح ميكانيكيا بتعريض البلع للهواء الساخن في أفران خاصة على درجة حرارة ١٣٠ - ١٤٠ ف.

### أو المكافحة الكيميائية

توصى وزارة الزراعة المصرية برش النخيل مرتين بأحد المبيدات الآتية

سيفين ٨٥ ٪ القابل للبلل بمعدل ٢٠٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء

أو جاربونا ٥٠ ٪ مسحوق قابل للبلل بمعدل ٢٠٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء

أو زولون ٣٥ ٪ بمعدل ١٥٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء

وتجرى الرشوة الأولى في أول يونية والثانية بعد ١٥ يوما من الأولى، هذا ويجب أن تبخر ثمار البلع بعد الحصاد مهما كانت درجة الإصابة، ويتم التبخير بالتعريض لمدة ٢٤ ساعة لغاز بريمور الميثايل بمعدل ٢٤ جم لكل متر مكعب من الفراغ مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المخازن وأثناء تخزين البلع الجاف.

## ١٧ - دودة بلح الواحات

الاسم العلمي للحشرة *Ephestia calidella* Guen

وتتبع هذه الحشرة نفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة

وتوجد يرقات هذه الحشرة على البلح الجاف في مصر والعراق وغيره من الأقطار العربية، وتصيب التين الجاف في البرتغال كما تصيب الزبيب واللوز والفلين، ويطلق عليها في مصر دودة بلح الواحات لإصابتها لمحصول البلح في الواحات المصرية.

### وصف الحشرة

تبلغ الفراشة نحو ٨ مم في الطول، ١,٧ في العرض بعد فرد الأجنحة على الجانبين، ولون الأجنحة الأمامية رصاصي أو بني فاتح (كلون الخشب)، ويقطع كل جناح من الأجنحة الأمامية خطان لونهما رمادي غامق أحدهما قبل منتصف الجناح جهة القاعدة والثاني قرب طرف الجناح ولون الجناحين الخلفيين أبيض بحافة رمادية.

### دورة الحياة

تضع الأنثى الملفحة نحو ١٥٠ - ٣٠٠ بيضة، ويوضع البيض فرداً أو في مجموعات أو في سلاسل على أو قرب العائل، يفقس البيض بعد ٣,٥ - ٤,٥ يوماً والبيضة بيضاوية الشكل ويبلغ طولها نحو ٧٥ مم، وقطرها ٥٥ مم، ولونها أبيض وعلى قشرتها من الخارج تضاريز تشبه تلك الموجودة على قشرة أي بيضة من بيض جنس *Ephestia*، ولكن بيضة هذه الحشرة أعرض من أي بيضة من بيض حشرات الجنس ولليرقة خمسة أعمار، وتبلغ مدة الطور اليرقي ٣٢ - ٤٣ يوماً وتعيش اليرقة دائماً داخل أنبوبة من نسيج حريري واليرقة التامة النمو طولها من ١ - ١,٣ سم ولونها أحمر قرمزي ولكنها تصبح صفراء قرب التعذير، وتوجد درقة غامقة على ترجة كل من الحلقة الصدرية الأمامية والحلقة البطنية العاشرة وعلى الحلقات الأخرى الصدرية والبطنية توجد ببقع سمراء.

وتوجد العذراء داخل شرنقة من الحرير، وتبلغ العذراء نحو ٨ سم طولاً ويوجد على نهاية بطنها ٨ خطاطيف مميزة ومدة طور العذراء نحو ٨ - ١٠ أيام، وطول مدة الجيل نحو ٥٢ - ٦١ يوماً، وللحشرة أربعة أجيال في السنة

## مظهر الإصابة والضرر

تشبه الحشرة السابقة في الضرر الذي تنزله بالثمار، وتضع الفراشة بيضها على الثمار وهي مازالت على النخيل حيث يفقس البيض عن يرقات تقتات على التمر، وتعتبر هذه الآفة من آفات المخازن الهامة في مصر، وتوجد في ليبيا أيضا ولكنها قليلة الأهمية هناك كذلك يعتبرونها قليلة الأهمية في العراق وتصيب يرقاتها هناك التمر المتساقط والموجود داخل المخازن.

## طرق مكافحة

تكافح ميكانيكيا وكيمياويا كما في دودة البلح العامري

## ١٨ - دودة الشكولاتة

الاسم العلمي للحشرة *Ephestia elutella* H.

وهي تتبع نفس رتبة وفصيلة دودة البلح العامري

تفتذى يرقات هذه الحشرة على الحبوب المدشوشة والردة والفواكة المجففة والشيكولاتة وتعمل فيها نسيجا حريريا.

## وصف الحشرة

تبلغ نحو ٢ - ٢,٥ سم في الطول، ٤ - ٥ سم في العرض بعد فرد الأجنحة على الجانبين، ولون الجناحين الأماميين رمادي وعليهما بقع سوداء ولون الجناحين الخلفيين أبيض مائل للمسرة.

## دورة الحياة

توجد هذه الفراشات في المطاحن ومخازن الغلال والمنازل ومحال بيع الأغذية ومخازن

الدخان، وتضع الفراشة بيضها على التمر المتساقط وتدخل اليرقة الثمار لتغتذى عليها إلا أنها قليلة الأهمية وتوجد في العراق بأعداد قليلة.

وتضع الإناث البيض فردياً أو في مجموعات على أو قرب عائلها، ويوجد على قشرة البيضة من الخارج تضاريز مشابهة لبيضة نفس الحشرة السابقة وتفقس البيضة بعد ٣ - ٥ أيام، واليرقة التامة النمو يصل طولها إلى ١,٥ سم. ومدة طور اليرقة ٤ - ٥ أسابيع، وتعذر اليرقة داخل شرنقة من الحرير وتبلغ مدة طور العذراء من ٦ - ٨ أيام، وتعيش الحشرة البالغة ٦ - ٧ أيام، ومدة الجيل الواحد ٧ أسابيع.

### طرق المكافحة

تكافح كيميائياً كما في دودة البلح العامري

## ١٩ - دودة بلح كاليفورنيا

الاسم العلمي للحشرة *Ephesia figulilla* H.

وهي تتبع نفس رتبة وفصيلة دودة البلح العامري

وتنزل هذه الحشرة أضراراً جسيمة بالبلح في كاليفورنيا ولكن أضرارها في مصر قليلة.

وتضع الفراشة بيضها على الثمار الناضجة قبل قطفها، وتؤدي إلى نفس الأعراض التي تنشأ عن الإصابة بدودة البلح العامري، وتحدث الإصابة في أواخر الخريف عندما تكون فترات القطف في كاليفورنيا طويلة، وهذا يفسر قلة ضررها في مصر لأن أغلبية أصناف النخيل المصرية تعطى ثمارها في وقت مبكر عن كاليفورنيا.

### وصف الفراشة

يبلغ طول الفراشة نحو سنتيمتر واحد، وهي رمادية اللون، مخططة بخطوط داكنة مرقطة غير مميزة، جسم اليرقة أبيض مخطط بستة خطوط مرقطة أرجوانية فاتحة، وطول اليرقة



التامة النمو نحو ١٦ مم، والعذراء سمراء توجد داخل شرنقة حريرية تنسجها اليرقة في شقوق جذع النخلة وسطخ التربة وتحت الأخشاب والصناديق بالمخازن أو أى شقوق أو فجوات مناسبة.

## طرق المكافحة

نفس المكافحة الميكانيكية والكيميائية المتبعة في مكافحة دودة البلح العامرى

## ٢٠ - فراشة الدقيق الهندية

### أو دودة الدقيق الهندية

الاسم العلمى للحشرة (*Plodia interpunctella* (Hubn)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة فيسيتيدي Fam. Phycitidae

تعتبر هذه الحشرة من الآفات الضارة بالبلح فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضع الفراشة بيضها على التمر فى النخلة أو على التمر المتساقط على الأرض، وتشاهد فى التمر وهى على هيئة يرقة حية أو ميتة، كما يوجد برازها وخيوطها الحريرية فى التمر المخزون، والفراشة البالغة لاتسبب أى أضرار للتمر لأنها تغتذى على السوائل فقط، غير أن اليرقة تغتذى على التمر الناضج وهو فى العذوق على رعوس النخل وفى بيوت التعبئة وعلى التمر المتساقط على الأرض، وتدخل اليرقة الثمار عن طريق أى جرح فى القشرة، أو قد تقرض القشرة السليمة وغالبا ماتدخل الثمرة عن طريق القمع، وتفضل اليرقة غالبا التمر الجاف التام النضج وقد تقضم جزءا من النواة الصلبة أحيانا، وتغزل اليرقة خيوطا حريرية عند إغذائها داخل الثمرة كما أنها تغزل نسيجا تغطى به الثقب الذى دخلت منه إلى الثمرة، ويمكن الإستدلال على وجودها داخل الثمرة برفع القمع ورؤية النسيج تحته

## طرق مكافحة

تكافح هذه الحشرة بتعفير العنوق بالملاثيون ٥ ٪ قبل أول جمعة للثمار بمدة ثلاثة أسابيع، كما تكافح في المخازن ومصانع تعبئة الثمرور بواسطة التبخير بمادة بروميد الميثايل بنفس الطريقة السابق ذكرها.

## ٢١- دودة ثمار الخروب

الاسم العلمى للحشرة *Myelosis ceratoniae*

رتبة حرشفية الأجنحة order Lepidoptera

فصيلة بيراليدى Fam. Pyralidae

هذه الآفة من الآفات الخطيرة التى تصيب الثمرور فى واحات مصر، وتوجد بنسبة ٥٠ ٪ فى التمر المصاب بالواحاح وتعتبر كذلك من الحشرات الضارة فى الجزائر وبعض مناطق أفريقيا مثل موريتانيا وتشاد ونيجيريا، وتصيب هذه الحشرة الثمرور وهى على النخلة كما تصيبها فى لمخازن.

## ٢٢- زنبور البلح أو الزنبور الأحمر المصرى

الاسم العلمى للحشرة *Vespa orientalis*

رتبة غشائية الأجنحة Order Hymenoptera

فصيلة قسبى Fam. Vespidae

تتغذى الحشرات اليافعة على أنواع كثير من ثمار الفاكهة الطازجة كالبلح والعنب والخوخ وغيرها وعلى ثمار الخرشوف المبكرة النضج فى نهاية أكتوبر وخلال نوفمبر وكذلك على

العسل واللحوم وكثير من الحشرات مثل الذباب واليرقات المختلفة، وتغذى اليرقات على أجسام الحشرات الأخرى واللحوم والأسماك. وفى العراق لا يهاجم هذا الزنبور البلع إلا بعد أن ينقره الطير ويوجد هذا الزنبور فى فلسطين والجزيرة العربية وغيرها ويعيش زنبور البلع الأحمر المصرى معيشة اجتماعية، ويحوى العش الواحد من اعشاشه ملكة واحدة مخصبة وعدة مئات من الشغالات وعشرات من الذكور التى تظهر فى نهاية الموسم.


### الحشرة اليافعة

الملكة هى أكبر الأفراد حجما وطولها حوالى ٣,٥ سم بينما طول الذكر ٢,٥ - ٣ سم والشغالة ٢,٥ سم. واللون العام أحمر بعترضه أشرطة وبقع صفراء. ويتكون قرن الإستشعار فى كل من الملكة والشغالة من ١٢ حلقة بينما يتكون فى الذكر من ١٣ عقلة وتركب البطن فى كل من الملكة والشغالة من ٦ حلقات ظاهرة بينما تتكون فى الذكر من ٧ حلقات ظاهرة ولون البطن متشابهة تقريبا فى الذكر والشغالة من السطح العلوى أما فى الملكة فتقل مساحة اللون الأصفر الموجودة على الترجات البطنية الرابعة والخامسة.

### دورة الحياة

(شكل ٢١٢) عمر العش أو المستعمرة الواحدة لزنبور البلع الأحمر المصرى سنة واحدة تبدأ بأتش مخصبة (ملكة ربيع) خارجة من بياتها الشتوى خلال شهرى مارس و إبريل حيث تشاهد باحثة عن مكان مناسب لبناء عشها الذى يكون داخل الفجوات الموجودة فى الجدران المصنوعة من الطوب اللبن أو فى جسور الترع. وتبدأ الملكة ببناء العين السداسية الأولى لتضع فيها أول بيضة وتتلوها ببناء العين الأخرى وتضع فيها بيضة ثانية وهكذا، وعلى هذا فيصبح فى كل عين سداسية بيضة واحدة تلتصق بأحد جدرانها. والبيضة أهليجية الشكل بيضاء اللون نحو ٢,٨ مم فى الطول و ١,٢٥ مم فى القطر.

ويتكون العش فى الغالب من خمسة أدوار وتتصل أقراص العش الواحد ببعضها البعض بواسطة أعمدة رفيعة مصنوعة من نفس مادة العش، ويستغرق بناء كل من الدور الأول (العلوى) والثانى والثالث والرابع نحو ٢٥ يوما ويستغرق بناء الدور الخامس نحو ٢٠ يوما ويتوقف بناء الدور الأول عند بدء بناء الدور الثالث كما يتوقف بناء الدور الثانى عند بدء بناء الدور لرابع ويتوقف بناء الدور الثالث عن بدء بناء الدور الخامس.



(شكل ٢١٣) دبور البلح الأحمر المصرى ١ - بيضة ٢ - يرقة ٣ - عذراء ٤ - حشرة يافعة

ويفقس البيض بعد نحو ٥ أيام، وإذا فقدت الملكة من العش فإن الشغالة تضع بيضا غير ملقح يفقس عن ذكور فقط. ويستغرق طور اليرقة نحو ١٥ يوما تنسلخ خلالها ٤ مرات، واليرقة عديمة الأرجل وتبلغ عند تمام نموها نحو ٤, ٢ - ٣ سم، وعند التعذير تغزل اليرقة شرنقة تغطي بها العين السداسية وبعد ٤ أيام من ابتداء غزل الشرنقة تتحول اليرقة إلى عذراء (وعلى هذا فالأربعة أيام المذكورة أثناء غزل الشرنقة هي طور ما قبل العذراء)، ويستغرق طور العذراء نحو ٩ أيام. والعذراء الحرة تشبه الحشرة اليافعة فى الشكل والحجم ولونها فى مبدأ الأمر عاجى ولون العيون المركبة رمادى وردى، ويغمق لون العذراء بالتدرج قرب خروج الحشرة اليافعة، وتمكث الحشرة اليافعة داخل الشرنقة نحو ١ - ٣ أيام حتى تخرج من الشرنقة إلى الخارج.

وتستغرق دورة حياة الشغالة فى المتوسط نحو ٢٩ يوما والملكة ٤٢ يوما والذكر ٣٩ يوما إذا ربي فى عيون سداسية واسعة (وهى عيون الملكات)، ٤٤ يوما إذا ربي فى عيون ضيقة وهى عيون الشغالات.

وعلى العموم فجميع البيض الذى يفقس إبتداء من شهر مارس حتى نهاية أغسطس يخرج منه جميعا شغالات وكلها من عيون سداسية صغيرة الحجم، وفى أوائل سبتمبر تبدأ الشغالة وهى التى تقوم ببناء باقى العش بمجرد خروج الدفعة الأولى منها وتتخصص الملكة عندئذ

لوضع البيض فقط) وتقوم الشغلات ببناء عيون سداسية كبيرة هي عيون ملكات الخريف التي تبدأ في الظهور في أواخر سبتمبر وخلال أكتوبر وأوائل نوفمبر. وتبدأ الذكور في الظهور في أواخر أكتوبر وأواخر نوفمبر وتلقح هذه الذكور ملكات الخريف التي تدخل بياتها الشتوى حتى الربيع التالي حيث تكون كل ملكة مستعمرة جديدة وهكذا تتكرر دورة الحياة. ويتوقف إنتاج الحضنة في العش ابتداء من أوائل نوفمبر في العام التالي من خروجها ثم تموت ملكة العش بعد ذلك بأيام معدودات.

ولقد وجد أن لهذا الزنبور حوالى ٣ أجيال في السنة في عيون القرص العلوى وجبل واحد في عيون القرصين الرابع والخامس.

### المكافحة

١ - وضع بضعة براويز من خلايا النحل والتي بها أقراص عسلية منتشرة في أنحاء المنحل وعندما يتجمع عليها الزنابير تنقل بهنوء إلى مصيدة مصممة تصميمًا خاصًا فم تهز البراويز بشدة ثم يقلل باب المصيدة بعد إخراج البراويز ثم تعدم الزنابير بعد ذلك.

٢ - وجد أن الأكاروس *Pyemotes ventricosus* Newport يتطفل على عذارى الزنبور الأحمر قرب نهاية موسم نشاطه، كما وجد أيضا أن يرقات حشر *Anthrax leucogaster* Meig (فصيلة Bombyliidae من رتبة الذباب) تتطفل أيضا على العذارى.

٣ - يعمل مخلوط مكون من ٣ سم عسل نحل + الملاثيون ٥٧ ٪ أو نصف جرام من مسحوق الدبتركس ٨٠ ٪ أو السيفين الميكرونى ٨٥ ٪ يوضع جزء من هذا المخلوط على ريشة من ريش الدواجن ثم توضع الريشة في العش حوالى الساعة ٥ - ٦ مساء وبهذه الطريقة يمكن الحصول على نسبة موت قدرها ٩٠ ٪

## ٢٣ - زبابير أخرى تصيب ثمار البلح

ذكر نيكسون (١٩٥٩) أن هناك ثلاثة أنواع من زبابير الفاكهة تسبب أضرارا جسيمة لثمر مقاطعة ونترهيفن بولاية تكساس الأمريكية وهذه الزبابير تتبع نفس رتبة وفصيلة الزنبور

السابق وهي *Polistes fuscatus*, *Polistes annularis*, *Polistes exclamans*

وذكر أن الطريقة المثلى لمنع الإصابة بهذه الزنابير هي تكميم العذوق باكياس من القماش المثقب قبل نضج الثمار

## ٢٤ - ذبابة الدروسوفلا

الاسم العلمي للحشرة *Drosophila melanogaster*

رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة ذباب الخل Fam. Drosophilidae

تصيب هذه الحشرة الفواكه المتخمرة ومنها الثمر المتحمضة ويندر إصابتها للتمر السليمة، غير أنها تعتبر من الآفات المدمرة في مصانع التعبئة حيث تتجمع بأعداد كبيرة حول التمر المتخمرة ثم تتركها وتحوم حول الثمار السليمة وتفرز عليها إفرازاتها، هذا ويجب الحرص التام في منع دخول هذه الحشرة إلى أماكن التعبئة أو أماكن تخزين التمر أو تجفيفها، كذلك يجب التخلص من جميع التمر المتخمرة.


### وصف الحشرة اليافعة

(شكل ٢١٤) : حشرة صفراء اللون وعلى البطن خطوط سوداء وتبلغ نحو ٢.٥ مم في الطول .

### دورة الحياة:

تضع الأنثى البيض في الشقوق الحديثة على الثمار الناضجة أو التالفة وذلك بعد يوم واحد تقريبا من خروجها من العذراء، وقد تستمر في وضع البيض عدة أسابيع بمعدل ٣٥ بيضة في اليوم الواحد، ويبلغ مجموع ما تضعه الأنثى الواحدة طيلة حياتها نحو ٢٠٠٠ بيضة.

والبيضة بيضاوية الشكل وتبلغ نحو ٠,٥ مم في الطول ولونها أبيض لامع ولها زائدتان قرب الطرف الأمامي. يفقس البيض بعد حوالي ٢٤ ساعة وتخرج منه اليرقات التي تتحول إلى عذارى في مكان جاف نسبيا وذلك بعد حوالي ٤ أيام. واليرقة النامية النمو لونها بني سمنى أو شفاف وقد تبدو ملونة حسب لون الغذاء الموجود داخل قناتها الهضمية، وتبلغ نحو ٤ مم في الطول.



(شكل ٢١٤) ذبابة الدروسوفلا

ويستمر طور العذراء نحو ٥ أيام والعذراء لونها أصفر في مبدأ الأمر ثم يصبح اللون بنيا بعد بضعة ساعات وتبلغ نحو ٣ مم في الطول. وعلى ذلك تتم دورة الحياة إبتداء من وضع البيض حتى خروج الحشرات الياقة في ١٠ أيام (تحت درجة حرارة ٢٥ - ٢٧ م) أو ٨ أيام (تحت درجة حرارة ٣٠ م).

وليس لهذه الحشرة بيات شتوى في المناطق الدافئة والمعتدلة ولكنها في المناطق الباردة تقضى فترة الشتاء على هيئة يرقات أو عذارى كما تقتل حرارة الشمس المرتفعة أطوار الحشرة ويعيق نشاط الحشرات الياقة الرياح الشديدة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة فيقل وضع البيض تبعا لذلك. ويزداد نشاط الحشرات والياقة في الصباح وقرب الغروب وتختبئ

وقت الظهيرة عند اشتداد الحرارة بين الحشائش وفي ظل عروش وأفرع النباتات. هذا وقد يستمر نشاط الحشرة اليافعة في الأيام المليئة بالسحب.

## المكافحة:

### أولا - المكافحة الزراعية:

١ - تجنب زراعة المحاصيل التي تصاب ثمارها بالذبابة المذكورة بجوار أو بقرب مخازن الفاكهة أو شون (نوالات البطاطس) أو أماكن تجمع الزبالة.

٢ - تنظيف حقول المحاصيل المذكورة من الحشائش إذ أنها تساعد على إختباء الذباب بها وتشجعه على وضع البيض، وكذلك تنظيفها من الثمار الفاسدة العالقة أو المتساقطة.

٣ - جمع الثمار الناضجة أولا بأول وعدم تركها للنضج أكثر من اللازم، كما يجب شحنها إلى الأسواق مباشرة بمجرد جمعها وعدم تركها بعد جمعها أثناء الليل بالحقل منعا لتعرضها لوضع البيض عليها في الصباح أو وقت الغروب.

٤ - عدم تجريح الثمار عند الجمع وعدم ملء أقفاص أو صناديق التعبئة أكثر من اللازم والعناية عند نقلها من الحقل إلى الأسواق أو إلى موانئ التصدير حتى لا تنكسر الثمار وتكون عرضة للإصابة بذباب الدروسوفيلا.

### ثانيا: المكافحة الكيماوية:

١ - الثمار المعبأة داخل الأقفاص أو الصناديق: تعفر الصناديق المعبأة لتقليل أعداد ذباب الدروسوفيلا التي تصيبها بمسحوق يحتوى على ١٪ بيريثرين + ١٪ بيبرونيل بوتو كسايد piperonyl butoxide المادة الحاملة بودة تلك ويكرر التعفير كلما لزم الأمر. ويحتاج القفص أو الصندوق الواحد مايوازي ٢ - ٤ قبضات من مسحوق التعفير وبهذا يحتاج الطن من الثمار المعبأة إلى ٨ - ١٦ أوقية فقط من المادة الكيماوية الفعالة.

٢ - في معمل التصنيع أو التعبئة: ترش جدران معامل تصنيع الثمار أو تعبئتها (إذا كانت ستعمل صلصة كما في حالة الطماطم أو مربى وغيره في حالة الثمار الأخرى) من



الخارج كما ترش أيضا أماكن استلام وتخزين الثمار قبل تصنيعها بمواد الديازينون أو النلد Naled أو الرونل Ronnel بمعدل ٢٥ أوقية مادة فعالة من كل من المواد الثلاث المذكورة تذاب في ١٠٠ لتر ماء، ويكرر الرش كل ١٠ أيام إذا لزم الأمر.

أما في داخل المصنع فترش الجدران بمستحلب البيرثرم (الذي يحتوى على ١ ٪ بيرثرين + ١ ٪ ببيرونيل بوتوكسايد بمعدل ٠,٥ أوقية من المادة الفعالة في محلول الرش لكل متر مسطح، وتجرى عملية الرش عند إيقاف العمل مؤقتا بالمصنع، في عدم وجود تيار هواء شديد، وتغسل جميع أنوات وأوانى المصنع جيدا قبل تشغيلها ثانية بعد عملية الرش المذكورة.

## ٢٥ - خنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين

الاسم العلمى للحشرة. *Carpophilus hemipterus* L.

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة الخنافس شاربة العصارة Fam. Nitidulidae

يوجد من الخنافس التابعة لهذه الفصيلة نحو ستة أنواع تهاجم التمر في جميع بقاع العالم التى تزرع النخيل، وتعتبر هذه الخنافس فى جنوب الولايات المحدة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وتساعد إرتفاع الرطوبة حول زيادة تكاثرها وأول مصدر لغذاء هذه الخنافس هو التمر الذى يتساقط فى يونية والذى يساعد على تكاثرها وعلى مهاجمتها للتمر فى رعوس النخيل بعد ذلك.


وخنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين هى من أهم الخنافس التابعة لهذه الفصيلة فى مصر وغيرها من البلاد التى تزرع نخيل البلح، ووقد سبق لنا تناولها بالتفصيل.

تعتبر خنفساء الثمار الجافة آفة شديدة من آفات الحبوب والأغذية المخزونة إذ تصيب الذرة والبصل والقمح والشعير والأرز والبقوليات وبذرة القطن والدقيق المخزون والفواكة المحفوظة والتوابل والخبز والعسل وغيرها .

وبجمهورية مصر العربية تشاهد الحشرات اليافعة تطير نهارا في أشهر مايو وأغسطس في شون تخزين البصل بمنطقة القبارى بالاسكندرية ، كما تشاهد بكثرة في ثمار الموالح والتين والبرقوق المتساقطة تحت الأشجار وذكر أيوب أنها توجد في المملكة العربية السعودية ويطلق عليها اسم خنفساء التمر وهي تصبب التمر قبل جفافها وهي على النخيل فتسبب تساقطها كما أنها تصيب التمر الجافة في المخازن عقب الجنى كذلك تصيب ثمار الرمان السابق إصابتها بدودة الرمان (المسمار)

### والحشرة اليافعة

تبلغ نحو ٤.٢ مم في الطول والجسم بيضاوى الشكل ، واللون بني فاتح أو غامق ونادرا ما يكون أسمر مع وجود بقعة صغيرة على الزوايا الأمامية الخارجية للغمد وأخرى كبيرة بنهايته لونهما أصفر أو أحمر مصفر .



(شكل ٢١٥) اليرقة والحشرة اليافعة لخنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين

## ٢٦. خنفساء سورينام أو خنفساء الجوب ذات الصدر المنشارى

الاسم العلمى للحشرة . *Oryzaephilus surinamensis* L.

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة خنافس القلف المغلطة Fam . Cucujidae

تصيب هذه الحشرة هي ويرقاتها الحبوب المخزونه ومنتجاتها وكذلك الفواكة المسكرة

والدخان والتمر والكثير من المواد الغذائية وتنتشر هذه الآفة في جميع أنحاء العالم ، ويعتبر من الآفات الثانوية بالنسبة للحبوب لأنها لا تستطيع إصابة الحبوب السليمة بل تصيب الحبوب السابق إصابتها بآفات رئيسية أخرى ولكن هذه الحشرة تعد من أخطر آفات التمر في المدينة المنورة حيث تصيب التمور هناك بشدة وتشكل أهم المشاكل الرئيسية التي تصادف تجار التمور هناك وكذلك مصانع التعبئة ، مما أدى حالياً إلى ضرورة تبخير التمور قبل تعبئتها وعرضها في الأسواق .

### وصف الحشرة اليافعة

الحشرة اليافعة خنفساء دقيقه الحجم مفلطحة تبلغ نحو ٣ مم في الطول ، ولونها بني مائل للسواد ، وعلى كل من حافتي صدرها الأمامي ست أسنان بارزة (شكل ٢١٦)



(شكل ٢١٦) خنفساء سورينام

### دورة الحياة

تضع الأنثى البالغة نحو ١٥٠ بيضة ، ويوضع البيض فردياً بين فئات الحبوب المخزونة أو

على ثمار التمر المخزون أو بيوت التعبئة ، يفقس البيض وتخرج منه اليرقات التي تتجول وتتغذى على التمر ، واليرقة التامة النمو مسطحة طولها نحو ٣ سم ، ويتم نمو اليرقة بعد ٣ أسابيع تتحول بعدها إلى خنفساء داخل شرنقة من الحرير المغلف بفتات بيتها الغذائية ، ومدة طور العزراء ٦ - ١٢ يوما وتفقس الحشرات اليافعة من ٦ - ١٠ أشهر .

### طرق المكافحة

يوصى الحيدري (١٩٦٨) في العراق باتباع الآتي لمكافحة هذه الآفة قبل جنى الثمار وبعد جنيها .

أ - عدم خلط الثمر المتساقطة على الأرض مع الثمر المقطوعة حديثا ، لأن الثمر المتساقطة غالبا ما تكون مصابة بالحشرات خصوصا إذا كان قد مضى على سقوطها فترة من الزمن .

ب - يجب تغطية الثمر التي تجمع في الجراب (أماكن التجفيف) والمكدسة على حصر ، كما هو متبع في العراق ومصر - بحصر سابق رشها بمبيد الملاثيون ٥٧٪ بمقدار ٤ سم ٣ لكل متر مربع من مساحة الحصر ، ويفضل استعمال الأغذية المصنوعة من القماش بدلا من الحصر وبعد رشها أيضا بالملاثيون .

ج - يجب تعقيم المخازن المسقوفة قبل خزن الثمار بها بمبيد ملاثيون ٥٧٪ بمقدار ١ سم ٣ لكل متر مربع من أرض وجدران وسقف المخزن .

د - ينبغي تبخير الثمر في غرفة خاصة ، ويستعمل غاز بروميد الميثيل في التبخير بمعدل رطل واحد صيفا أو رطل ونصف شتاء لكل ١٠٠٠ قدم مكعب من حجم الغرفة على أن تكون درجة الحرارة أكثر من ٥٥°م (١٠٠°ف) ، وتختلف مدة التعريض للغاز من ١٢ - ٢٤ ساعة مع التأكد من غلق منافذ غرفة التبخير لمنع تسرب الغاز منها .

## ٢٧ - خنفساء الدقيق المتشابهة

الاسم العلمي للحشرة *Tribolium confusum* Duval


رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

## فصيلة تيبرويندي Fam. Tenebrionidae

تصيب هذه الحشرة منتجات الحبوب والمواد الغذائية المصنعة المصنوعة من الحبوب أو النشا ، وتصيب أيضا الفواكه المجففة والمسكرات والمكسرات المبشورة والشيكولاتة ، وكذلك تصيب التمور المتساقطة أو المخزنة في المستودعات وتوجد الحشرات اليافعة ويرقاتها وحورياتها وإفرازاته وجلود إسلاخها جميعا داخل التمر المصاب مما يقلل من قيمته التسويقية .

## وصف الحشرة اليافعة

خنفساء بيضاوية الشكل مبططة طولها ٣سم ولونها بني محمر ، ويوجد على كل من رأسها وصدرها الأمامي نقر دقيقة ، وأغمارها مخططة بخطوط طولية غائرة تتخلها نقر ، تتضخم حلقات قرن الإستشعار تدريجيا من القاعدة حتى الطرف (شكل ٢١٧).



(شكل ٢١٧) خنفساء الذببق المتشابهة

توجد جميع أطوار هذه الحشرة في الأبنية الدافئة طول العام وتفقس في مخازن الغلال

ومستودعات التمور وأماكن التعبئة ومحال البقالة والمطاحن ، وتضع الأنثى نحو ١٠٠٠ بيضة على الثمار أو العبوات أو في شقوق الأرضيات والجدران وتغطى البيضة بمادة لزجية ، ويفقس البيض بعد ٥ - ١٢ يوما وتخرج منه اليرقات التي تتغذى أيضا على التمور .

### واليرقة

اسطوانية الشكل لونها أبيض مصفر وتنتهي بطنها بشوكتين كبيرتين غليظتين لونها بني ، وتبلغ اليرقة عند تمام نموها ٦ مم طولاً ، ومدة الطور اليرقي ١ - ٤ أشهر تبعا لدرجات الحرارة ونوع الغذاء

### والعذراء

عارية بدون شرنقة بيضاء اللون يصفر لونها بعد فترة ثم يصبح بنيا في النهاية ، وطور العذراء مدته ٧ - ١٥ يوما ويستغرق الجبل الواحد ١٥ شهرا صيفا ، ٥ أشهر شتاء ولهذه الحشرة ٤ - ٥ أجيال في السنة في الأبنية الدافئة

### طرق مكافحة

كما في خنفساء سورنيام

## ٢٧. خنفساء الدقيق الصداية

الاسم العلمي *Tribolium castaneum* Cherdet

وتتبع نفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة ، ويشبهها في العادات وتاريخ الحياة وتوجد معها في نفس الأماكن ، ومع هذا فإن لون الحشرة اليافعة أغمق قليلا من لون الحشرة السابقة ، وكذلك فإن العقل الطرفية الثلاث لقرن الإستشعار أكبر بدرجة ملحوظة عن باقي العقل .

وتكافح بنفس الطريقة المتبعة في مكافحة الحشرة السابقة وفي نفس الوقت .

## ٢٩. خنفساء نوى البلح

الاسم العلمى للحشرة *Coccitrypes dactyliperda*

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Oroler Coleoptera

فصيلة سكوليتيدي Fam Scolytidae

سجلت هذه الخنفساء كافة من آفات البلح الأخضر في الكثير من مناطق زراعته في العالم ، وتحفر الخنفساء والحشرة واليافة تقبا مستديرا مميز لها في ثمرة البلح الخضراء مما يؤدي إلى سقوط الثمرة ، وتصنع الأنثى نفقا في النواه الحجرية للبلح الناضج وتقضى فصل الشتاء داخله وتلك الثمار هي الثمار المتخلفة بعد الجمع . وقد وجدت هذه الآفة في الواحات البحرية المصرية تصيب البلح الأخضر وتسبب له خسائر ملحوظة . إذ يسقط البلح المصاب بعد يومين من إصابته .

### دورة الحياة

تضع الأنثى البيض داخل النفق الذى تصنعه في النواه علما بأن ذكور الخنافس لا تستطيع إختراق النواه ، ويفقس البيض بعد ٥ - ٩ يوما وتخرق اليرقة النواه ويستمر الطور اليرقى لمدة ١٢ - ١٥ يوما ثم تعذر اليرقة التامة النمو داخل النفق ويستمر طور العذراء لمدة ٤ أيام ، ومدة الجيل الواحد هو ٢٤ر٨ يوما بالنسبة للإناث ، ٢٣ر١ يوما بالنسبة للذكور والخنافس الملقحة تستطيع أن تبيض بيضا يفقس إلى إناث وذكور ، ولكن الخنافس غير الملقحة لا ينتج بيضاها إلا ذكور ، ونعيش الإناث الملقحة ٧٢ر٣ يوما والغير ملقحة ٦٢ر٩ يوما ، وتبيت الخنفساء اليافة البيات الشتوى وهى داخل الأنفاق التى تصنعها في النوى المتساقط على الأرض .

### طرق المكافحة

تعتبر المكافحة الزراعية من أفضل طرق مكافحة هذه الآفة وتتركز هذه المكافحة في جميع النوى المتساقط على الأرض وإحراقه خصوصا في فصل الشتاء وكذلك يجب زراعة أصناف النخيل التى تقاوم الإصابة بهذه الآفة

وتوجد ههد الآفة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والجزائر وليبيا ومصر وفلسطين المحتلة ولا تجرى عليها أى مكافحة كيميائية إلا في فلسطين المحتلة فتعامل بالرش بالملاثيون ٢٥ ٪ (مسحوق قابل للبل) خلال شهر يوليه .



## بعض الأبحاث الهامة التي أجريت على آفات النخيل

### الحشرية في مصر والبلاد العربية

أجرى العديد من الأبحاث الهامة في مصر والعراق والمملكة العربية السعودية على آفات النخيل الحشرية ، وبلغ إهتمام جامعة الملك فيصل في الإحساء بهذه الأبحاث درجة كبيرة وعقدت هذه الجامعة ندوتين للنخيل في مركز أبحاث النخيل في الإحساء في سنة ١٩٨١ ، وسنة ١٩٨٤ كان لمؤلف هذا الكتاب شرف حضور الندوة الأولى منها ، وراعى العناية الفائقة التي بذلها القائمون على هذه الندوة في جمع العلماء من جميع أنحاء العالم ليعرضوا نتائج أبحاثهم في مجال تنمية النخيل ووقايته من الآفات والأمراض ، وطبعت هذه الأبحاث بعد ذلك في مرجع كبير يعتبر سفراً علمياً هاماً ،

هذه وأورد هنا نتائج بعض الأبحاث التي أجريت في مصر في هذا المضمار وكانت في صورة أبحاث منشورة أو ضمن رسائل علمية قدمت لنيل درجات الماجستير والدكتوراه وكان لي حظ الإشراف على بعضها .

هذه الأبحاث جميعاً أجريت في الواحات المصرية الموجودة في الصحراء الغربية والتي مازالت تغص ببساتين النخيل ، وذلك بعد إنقراض هذه البساتين من جنوب مصر بعد إنشاء السد العالي وطغيان مياه بحيرة السد على مئات الآلاف من نخيل البلح والتي كانت تعد من أفضل الأنواع في العالم والأبحاث الهامة منها هي : -

١- التغيرات الموسمية للإصابة وديناميكا مجتمع الآفات التي تصيب عراجن النجيل في الوادي الجديد وقد أجرى هذا البحث على بدوى وآخرون (١٩٧٧) ، وتقتطف منه ما يلي : -

#### مقدمه

يبلغ تعداد نخيل البلح في مصر طبقاً لتقديرات ١٩٧٢ نحو ٧ ملايين نخلة منها ٧٠.٠٠٠ في الصحراء الغربية والغالبية العظمى منها في الوادي الجديد ، وينتمى معظمها إلى النصف جاف المعروف محلياً باسم الصعيدي ، وقد تعرض محصول البلح في الواحات الخارجية ، والداخلية سنة ١٩٦٤ وما تلاها إلى خسائر فادحة وانخفض الناتج إلى ٣ - ٥ كجم للنخلة

الواحدة ، وهذه الخسارة راجعة إلى الاصابة بالآفات الحشرية ، وهدف هذا البحث هو الكشف عن معدل إصابة ثمار البلح بهذه الآفات في ثلاث مواسم متعاقبة (١٩٦٩ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧١) . وكانت نتائج هذا البحث كما يلي : -

سجلت الحشرات الآتية على ثمار البلح في منطقة الخارجة :

الحميرة . *Batrachedra cmydraula* Meyr

ثاقبة العراجين *Arenipses sabella* HMP

أبو دقيق الرمان *Virachola livia*, Klug

وحشرة الكادرا *Cadra Spp*, *Ephestia Spp* ويرقات خنافس الثمار الجافة من جنس *Ca-pophihus*

ونتيجة لتعداد هذه الحشرات على مدار السنة يمكن استخلاص النتائج الآتية :

## ١ - الاصابة في الثمار العالقة بالعراجين والثمار الساقطة :

يتضح أن حشرة الحميرة *B.amydraula* هي أخطر آفات ثمار البلح في الوادي الجديد . ويمكن اعتبار حشرتي الحميرة وثاقبة العراجين آفات مبكرة للثمار وقد سجلت الاصابة بكلتا الحشرتين على العراجين في أوائل الموسم (٢٥ مارس) ووصلت الاصابة إلى أعلى مستوى خلال مايو ويونيو في الوقت الذي كانت فيه الاصابة بالحشرات الثلاث الأخرى في بدايتها . وقد ظهر أعلى معدل للاصابة بدودة ثمار الرمان والكادرا وخنافس الثمار خلال شهر أغسطس . وعلى هذا الأساس يمكن اعتبارها آفات نهاية الموسم .

وقد ارتفع معدل اصابة عراجين البلح بحشرة الحميرة *B. amydraula* سريعا ووصلت ذروتها (أكثر من ٤٠ ٪) في بداية شهر مايو وحتى بداية شهر يونية . وفي نهاية شهر يونيو ، انحسرت الاصابة تدريجياً واختفت تقريبا في بداية شهر سبتمبر . وقد شوهدت الاصابة في

الثمار المتساقطة لأول مرة في شهر أبريل وكانت حينذاك متأرجحة ارتفاعا وانخفاضا وفي نهاية شهر يونيو فاقت اصابة العراجين مثيلتها في الثمار المتساقطة .

وفي مثل هذا الوقت كانت الثمار المصابة تبقى عالقة بالشماريخ بواسطة الخيوط الحريرية الدقيقة التي تفرزها اليرقات . وارتفع معدل الاصابة في الثمار المتساقطة في نهاية موسم الاثمار وقد يعزى ذلك إلى سقوط الثمار المصابة بها نتيجة عجز الخيوط الحريرية عن تحملها ومنع سقوطها (Michael ١٩٦٧) .

وتعتبر ثاقبة العراجين *A.Sabella* آفة قليلة الضرر إذا ما قورنت بالحشرة السابقة إذ أن أضرارها للثمار تقل دائما عن ١٠٪ ولم تشاهد ارتفاعا بينا للاصابة خلال الموسم باستثناء حالة واحدة (٦٩٪) في ١٩ أغسطس ، وعلى أى حال فقد كانت الاصابة مرتفعة نسبيا ابتداء من نهاية أبريل وحتى نهاية شهر مايو أما في الثمار المتساقطة فكانت الاصابة طفيفة حيث أن الثمار المصابة بهذه الحشرة لا يتحتم سقوطها على الأرض . وقد قرر Gharib (١٩٦٩) أن الضرر الذي تسببه هذه الآفة لثمار البلح في العراق كان بسيطا ولم يتعد ١٥٪ عند الحصاد .

وقد ظهرت الاصابة بأفات نهاية الموسم وهي حشرة أبو دقيق الرمان وحشرات الكادرا *Cadra Sp* وخنافس الثمار الجافة (تباعا ، وكان أول تسجيل لها على العراجين في ٦ مايو ٢٠ مايو ، أول يوليو للحشرات الثلاث السابقة على التوالي . ولم تتجاوز الاصابة ١٪ عند هذه التواريخ غير أنها ارتفعت تدريجيا حتى وصلت الذروة (٣٣ر٣ ، ٢٧ر٠ ، ٢٣ر٩٪ للآفات السابقة) في ١٩ أغسطس ، وبنهاية هذا الشهر وبداية شهر سبتمبر وصلت الى مستوى عال نسبيا في الحشرتين الآخرين .

ولم تظهر أى أعراض للاصابة بدورة ثمار الرمان على ثمار العراجين قبل شهر مايو غير أن البحث الدقيق في عوائل أخرى بالمنطقة دل على وجود عائل بديل لها وهو القرون الخضراء لأشجار السنط *A.milotica* التي اشتدت الاصابة بها في هذا الوقت واحتوت على نسبة عالية من اليرقات . وعندما جفت هذه القرون وضعت الحشرات الكاملة بيضها على ثمار البلح على العراجين وعلى شماريخها واستمرت الاصابة في ثمار البلح حتى نهاية الموسم وابتداء ظهور قرون أشجار السنط حيث أعادت الحشرة اصابتها لهذا العائل البديل مرة أخرى وهكذا . وقد جاء ذكر دورة مماثلة لهذه الحشرة بواسطة Hanna (١٩٣٩) في مصر Avidov في سنة

(١٩٥٨) في فلسطين حيث كانت قرون القتنه (*Acacia farnisiana*) هي العائل البديل لدودة ثمار الرمان التي تهاجم ثمار الرمان في المنطقتين .

أما الثمار المتساقطة فإن سقوطها نتيجة إصابتها بهذه الحشرة قد بدأ في الظهور بعد أسبوع من اكتشاف الإصابة على الثمار على العراجين وازدادت تباعا وظلت في معظم الحالات أعلى من مثيلتها في الثمار على العراجين وفي الوقت الذي كانت الإصابة في الثمار على العراجين في انخفاض سريع (أقل من ٥٠٪ في ٢ سبتمبر) وصلت ذروتها (٤١٠٪) في الثمار المتساقطة .

وقد كانت إصابة ثمار البلح المتساقطة بحشرة الـ *Cadra* متشابهة إلى حد كبير لإصابة ثمار العراجين غير أن النسبة المئوية للإصابة في الأولى ظلت على الدوام أعلى من الأخيرة .

ولم تتعرض الثمار الصغيرة الخضراء السليمة بتاتا للإصابة بحشرة خنفساء الثمار الجافة ويبدو أن الثمار المعطوبة التي تسقط كنتيجة لفعل الآفات الحشرية أو لعوامل أخرى كانت أكثر جاذبية للخنفس . ولم تظهر اليرقات في الثمار على العراجين قبل بداية يوليو ، وكان ظهورها عقب إصابة الثمار بدودة ثمار الرمان التي وصلت ذروتها في بداية يوليو . وقد وجدت اليرقات في الثمار المتساقطة في وقت مبكر نسبيا (نهاية مايو) .

وعادت تسقط الثمار التي تصاب في وقت مبكر بحشرتي الحميرة *B.amydraula*

وحشرة ثاقبة العراجين *A.sablla Hmp.*

وكذلك التي تصاب بدودة ثمار الرمان ثم تتعفن وتعطب ومثل هذه الثمار تكون جذابة لخنفس الثمار . وقد ارتفعت النسبة المئوية للثمار المحتوية على يرقات تدريجيا حتى الأسبوع الثالث من يوليو وارتفعت بعدها ارتفاعا كبيرا ومفاجئا حتى وصلت نسبتها إلى ٩٩٪ في نهاية موسم الاثمار .

## ٢ - ديناميكا المجتمع اليرقن للآفات :

أظهرت الدراسات الخاصة لهذا المجال بالنسبة للأربع آفات الأولى على فترات أسبوعية ولدة عام كامل وجود ثلاث ذروات ليرقات حشرة الحميرة *B.amydraula* Meyr. في الثمار

على العراجلين في ٢٠ مايو ، ٨ يوليو ، ٢ سبتمبر سنة ١٩٦٩ ، ويشير ذلك إلى وجود ثلاث أجيال فيما بين أبريل وسبتمبر .

وقد وجدت يرقات حية في عينات ثمار البلح المتساقطة خلال الفترة من ٧ أكتوبر ١٩٦٩ إلى ٣٠ مارس ١٩٧٠ . ورغم أن هذه اليرقات وجدت بأعداد ضئيلة إلا أنه يعتقد أن مثل هذه اليرقات هي المصدر الرئيسي لاصابة المحصول الجديد .

وقد ظهرت دروتان صغيرتان ولكنها واضحتان ليرقات *A.Sabella* خلال موسم الاثمار (فيما بين أبريل وسبتمبر) . وكان تعداد اليرقات في الثمار المتساقطة خلال الفترة من أكتوبر ١٩٦٩ إلى مارس ١٩٧٠ منخفضا جدا .

وقد تحولت جميع اليرقات إلى عذارى في بداية شهر نوفمبر . وتعتبر الفراشات الناتجة من مثل هذه العذارى هي مصدر الاصابة للمحصول في الموسم التالي وقد سجل Ghorb (١٩٦٩) جيلان لهذه الحشرة في السنة في ايران وظهرت فراشات الجيل الأول في الفترة من مارس إلى مايو بينما ظهرت فراشات الجيل الثاني خلال سبتمبر .

وقد أظهرت الدراسات الخاصة بديناميكا المجتمع اليرقي لدودة ثمار الرمان أنها تسير في اتجاه مغاير للحشرات السابق ذكرها . ففي منطقة الخارجة ، توجد أشجار السنط *Acacia* وتظهر قرونها الخضراء من أكتوبر حتى نهاية مايو . وتعمل القرون الخضراء كعائل بديل لهذه الحشرة . وقد أظهر فحص القرون الخضراء خلال هذه الفترة وجود يرقات حية غير أن وجودها كان معدوما على ثمار البلح الساقطة . وفي نهاية شهر مايو حيث تجف القرون الخضراء وتبدأ الحشرات الكاملة في مهاجمة ثمار البلح الصغيرة التي يتوفر وجودها في هذا الوقت . وتستمر الاصابة في ثمار البلح حتى نهاية موسم الاثمار بعدها تلجأ الحشرات الكاملة إلى مهاجمة قرون السنط *Acacia* الخضراء مرة ثانية .

وقد ذكر Hanna (١٩٣٩) أن ثمار الرمان وقرون الفتنة *Acacia farnisiana* كانت هي العوائل النباتية الوحيدة لدودة ثمار الرمان في الصحراء الغربية . وقد وصلت نسبة إصابة ثمار الرمان ١٠٠٪ في واحات الخارجة والداخلية والفرافرة حيث تتواجد أشجار الرمان مع أشجار الأكاسيا *Aeacia nilatica* بينما لم تشاهد هذه الآفة في سيوة حيث ينعدم وجود أشجار الأكاسيا .

ويبدو من تعداد يرقات نودة ثمار الرمان في ثمار البلح وقرون السنط خلال العام ١٩٦٩/١٩٧٠ أن لهذه الحشرة ٦ - ٧ أجيال في السنة أحدهما شوهد في ثمار البلح في ١٩ يوليو ١٩٧٠ م .

وقد سجل Avidov (١٩٥٨) ثمانية أجيال في السنة لهذه الحشرة في وادي بات شين وستة أجيال فقط في السهل الساحلي الفلسطيني .

ولم تشاهد يرقات الكادرا في ثمار العراجين قبل نصف يونية بالرغم من أن عددا قليلا من الثمار قد ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل ذلك بشهر . وكان تعداد اليرقات في الثمار المتساقطة مرتفعاً بلغ ٣ - ٤ أمثال ما وجد في ثمار العراجين . وقد بلغ عدد اليرقات ذروته في ثمار العراجين في فترتين في نهاية أغسطس (٨٤٪) ثم في نهاية سبتمبر (٢٠٦٪) وقد ظهرت ذروتان أخرتان على البلح المتساقط كان أعلاها (٣١٢٪) في بداية شهر نوفمبر وأخرى أقل حجماً (٢١٨٪) في نهاية شهر ديسمبر ونقص التعداد حتى نهاية شهر مارس ١٩٧٠ ومن المرجح أن اليرقات الموجودة في الثمار المتساقطة في مصدر الإصابة في الموسم الجديد .

وتشكل ثمار السنط عائلاً بديلاً لنودة ثمار الرمان حيث توجد بها يرقات بعدد كبير .

والإصابة بحشرة الكادرا في الثمار المتساقطة تشبه مثيلتها في ثاقية العراجين ، أو يرقات حشرة خنفساء الثمار الجافة فلا تظهر على العراجين قبل نهاية الموسم وتظهر الإصابة بها في نهاية الموسم وتحتوي جميع الثمار المتساقطة تقريباً على يرقاتها .

## ٢ - قابلية بعض أصناف البلح في الواحات للإصابة ببعض

### الآفات وتأثير ارتفاع النخيل على معدل الإصابة

وهذا البحث أجراه في الواحة الخارجة في مصر (على بدوى وآخرون سنة ١٩٧٧) .

وخلصته أن الأصناف الطرية وهي الحجازي والفالق والنصف جاف (الصعيدى) أكثر قابلية للإصابة بحشرة الحميرة من الأصناف الجافة (المنتور والتمر والكعكاع) ، وكان الصنف الصعيدى أكثر عرضة للإصابة بحشرتى دورة ثمار الرمان وحشرة الكادرا من الأصناف الطرية والجافة وكانت الإصابة بحشرة الحميرة أشدها إذا ما قورنت بالحشرات الأخرى .  
ووتتناسب الإصابة عكسيا وبصفة عامة مع ارتفاع النخيل .

### ٣ . تأثير التزميط وسبله وموعده فى وقاية عراجين البلح من الإصابة بالحشرات فى الوادى الجديد

وهو بحث منشور فى ١٩٧٧ - وأجراه على بدوى وآخرون على أثر التزميط كطريقة من طرق الوقاية الميكانيكية "التزميط" لفظ يطلقه المزارعون فى الوادى الجديد على عملية لف العراجين بحشيشة الحلفا خلال النصف الثانى من موسم الاثمار لحمايتها من الإصابة الحشرية ، ولاستقبال الثمار الناضجة المتساقطة نتيجة للرياح الشديدة أو الإصابة بالآفات .

وقد فشلت عملية التزميط فى سنة ١٩٦٩ فى حماية ثمار البلح من الإصابة نتيجة عدم دقة اجرائها اذ كان لف العراجين غير محكم مما سمح للحشرات بمهاجمة الثمار خلال الفجوات الموجودة فيها لذلك كانت الحاجة ماسة إلى مقارنة فاعلية عملية التزميط بالحلفا أو لف العراجين بأكياس الجوت فى خفض نسبة الإصابة مع تحديد أنسب الأوقات لاجراء هذه العملية .

وفى دراسة لمعرفة مدى امكان وقاية عراجين البلح من الإصابة بحشرتى أبو دقيق الرمان وفراش الكادرا عن طريق تغطية العراجين .

تبين أنه يمكن وقاية العراجين من الإصابة بهاتين الحشرتين بتغطية العراجين أما بأكياس من الخيش أو نبات الحلفا وقد أعطت الطريقة الأولى نتائج أفضل وكلما كانت التغطية مبكرة ومنذ أول يوليو كانت النتائج أفضل .

٤ - تأثير أصناف البلح وارتفاع النخيل على إصابة البلح بخنفساء نوى البلح Cocco-

tryps dactliperd

وقد قام بإجراء هذا البحث عبد ربه عيد حسين ونشره سنة ١٩٩٠ وفيه إختبر قابلية أصناف البلح المنزرعة في الواحات البحرية في مصر للإصابة بهذه الآفة ، وذكر أن صنف الفاقع والسلطاني كانت أكثر إصابة ٢٤٩٪ ، ٤ ، ٢١٪ من الصنف الصعيدي (٢٤٪) ، وفي نفس الوقت ذكر أن إرتفاع النخيل بصفة عامة ليس له تأثير على معدل الإصابة ، واكتشف أن حرارة الجو كان لها تأثير إيجابي على معدل الإصابة ، بينما لم يكن للتغير في درجة الرطوبة النسبية أى تأثير .



## الآفات الحشرية التي تصيب الفواكه الأخرى

## الآفات الحشرية التي تصيب الفواكه الأخرى

### الآفات التي تصيب الجوافة

تزرع أشجار الجوافة في جميع أقطار العالم العربي ، وهي من الفواكه الشعبية الرخيصة المحببة للناس ، فضلا عن احتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن ، وتقوم عليها صناعات غذائية هامة قبل صناعة المربى وتعليب عصائر الجوافة ، وفي السنين الأخيرة ظهرت في مصر صناعة تحويل عجائن ثمار الجوافة إلى شرائح مجففة تشبه شرائح المشمش المجفف أو القمر الدين كما يطلق عليه في مصر .

وتتعرض الجوافة للإصابة بالعديد من الآفات الحشرية نذكر هنا ما يلي :-

### ١ - حشرة الجوافة القشرية الرخوة

الاسم العلمي للحشرة *Parasaissetia nigra*

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam Coccidae

توجد هذه الحشرة على الأفوكادو والموالح والجوافة والخوخ وأشجار النخيل ، وكذلك تصيب أشجار الفيكس وبعض نباتات الزينة .

وهذه الحشرة أصبحت حتى الآن من آفات الجوافة الخطيرة ، خصوصا في المناطق الساحلية حيث نشاهد قشورها على الأوراق والأفرع

## وصف الحشرة

القشرة بيضاوية الشكل وسطحها العلوي محدب كثيرا ولونها بني غامق أو أسود، ويبلغ طولها نحو ٣ مم وعرضها ٢,٥ مم، وتفرز هذه الحشرة كميات كبيرة من الندرة العسلية على الأوراق والأفرع المصابة تلوث الأوراق والثمار وينمو عليها الفطر الأسود، وعند زيادة هذه الإفرازات تجمع الأتربة عليها قد تمنع الأوراق من القيام بعملية التمثيل الضوئي.

## طرق مكافحة:

لم تدخل هذه الآفة برنامج مكافحة الكيماوية للآفات ولكن يوجد في الطبيعة بعض الأعداء الحيوية التي تفترسها وتحد من ضررها مثل حشرات أبي العبد ويرقات أسد المن

## ٢ - حشرة الجوافة القشرية

الاسم العلمي للحشرة *Saissetiae coffeae* WIK

وتتنتمي لنفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة وهي تصيب أساسا أوراق كثير من أشجار الفاكهة ولكنها تصيب أجزاء شجرة الجوافة، وينصب ضررها الأكبر على الجوافة وخاصة الثمار، وتنتشر في المناطق الساحلية، وهي تفرز كميات كبيرة من المادة العسلية التي ينمو عليها الفطر الأسود الذي تتجمع حوله الأتربة ويصيب الأوراق بالعجز الفسيولوجي ويؤدي إلى تساقط الثمار قبل نضجها حتى وإذا نضجت لا تصلح للتسويق ولونها بني غامق أو أسود، ويبلغ طولها نحو ٣ مم وعرضها ٢,٥ مم وتفرز هذه الحشرة كميات كبيرة من الندرة العسلية على الأوراق والأفرع المصابة تلوث الأوراق والثمار وينمو عليها الفطر الأسود، وعند زيادة هذه الإفرازات وتجمع الأتربة عليها قد تمنع الأوراق من القيام بعملية التمثيل الضوئي

## طرق مكافحة

لم تدخل هذه الآفة برنامج مكافحة الكيماوية للآفات ولكن يوجد في الطبيعة بعض الأعداء الحيوية التي تفترسها وتحد من ضررها مثل حشرات أبي العيد ويرقات أسد المن.

## ٣ - بق الموالح الدقيقى

الاسم العلمي للحشرة *Pseudococcus citri* Risso

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homopra

## فصيلة البق الدقيق Fam. Pseudococcidae

سبق تناول هذه الآفة بالتفصيل عند ذكر آفات الموالح وهذه الحشرة تصيب أشجار الموالح والمانجو والعنب والجوافة والرمال وعراجين النخيل وكثيرا من نباتات الزينة .

### مظهر الإصابة والضرر

تصيب هذه الحشرة أوراق الجوافة وفروعها ، وثمارها ، وعند زيادة الإصابة تمتص الحشرات العصارة النباتية فيضعف النبات وتشوه الثمار ، فضلا عن ذلك فإن هذا البق الدقيق يفرز كميات من الإفرازات السكرية التي تتجمع حولها الاتربة وينمو عليها الفطر الأسود

### طرق المكافحة

يفترس هذه الحشرة يرقات أسد المن وحشرات أبى العيد والفداليا وأنواع من الحلم والترس ، كما يتطفل عليها حشرات من رتبة غشائية الأجنحة .

وتوصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة البق الدقيق والحشرات القشرية على الجوافة برشها صيفا بمبيد ملاثيون ٥٧٪ بمعدل ٣ فى الألف وذلك فى حالة ظهور إصابات البق الدقيق فى المناطق الشمالية صيفا مع تجنب جمع الثمار قبل مرور ٢٥ يوما على المعاملة .

## ٤- بق الهيسكس الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة *Moconelliococcus hirsutus* (Green)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة البق الدقيقى Fam. Pseudococcidae

تصيب هذه الآفة أشجار الجوافة والمانجو والعنب والمالح وثمار القشدة وأشجار التوت والنبق والسنت ، كما تصيب أيضا نباتات القطن والنيل والبامية والبقول السوداني والبادنجان .

## مظهر الإصابة

يتسبب عن الإصابة بهذه الحشرة تضخم الفروع المصابة وتوقف نموها ، مما يضطر النباتات لتجديد نموها فتتدثر فروعها وقمم نامية جديدة ويكثر نمو الفطر الأسود على الإفرازات السكرية لهذا المن ، وتشتد الإصابة به في نهاية الصيف والخريف وأوائل الشتاء .

## دورة الحياة

يوضع البيض في مجاميع مكونة من ٦٠ - ٣٠٠ بيضة داخل أكياس من خيوط غير متماسكة على سوق النباتات وفروعها بين شقوق القلف التي تؤول إليها الإناث لوضع البيض ، ثم تموت الإناث بعد وضع البيض ، البيض لونه أحمر قرنفلي أما الحشرة البالغة فجسمها بيضي الشكل ولونها أحمر قرنفلي

## طرق المكافحة

- ١ - تقلم أطراف الفروع المصابة وحرقها
- ٢ - رش الأشجار في نهاية فصل الشتاء بأحد الزيوت المعدنية بنسبة ٢٪ مضافا إليها الملاثيون ١٥ في الألف .
- ٣ - عندما تصل الثمار إلى حجمها الطبيعي ترش الأشجار بالديمثويت بنسبة ١٢٥ في الألف .
- ٤ - لهذه الحشرة العديد من الأعداء الحيوية في الطبيعة التي تعمل على الحد من كثافتها ، فيجب تنشيط هذه الأعداد والمحافظة عليها وذلك بعدم استعمال المبيدات في موسم نشاطها ، ومن هذه الأعداء ، طفيل من غشائيات الأجنحة هو *Heptowastix phenacocci* ، ومن المفترسات *Cryptolaemus montrouzieri*

## ٥ - البق الدقيقى المصرى

الاسم العلمى للحشرة *Icerya aegyptiaca* (Douglas)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptexera

فصيلة الحشرات القشرية الهاردة Fam Margarodidae

توجد هذه الحشرة على الأوراق وخاصة الأسطح السفلية متجمعة حول العرق الوسطى ، وأهم عوائلها أشجار الجوافة والفيكس والتوت والمانجو والنبق والقشدة والكثير من نباتات الزينة - كما تصيب القلقاس والملوخية .

### وصف الحشرة

سبق لنا وصف هذه الحشرة في مواضع سابقة ، وتتميز إناثها بإفرازاتها الشمعية التى تكون على هيئة زوائد سميكة تحيط بجوانب الحشرة ، ويبلغ طول الأنثى ٦ مم ، ويوجد كيس البيض مختفيا تحت الزوائد الشمعية وطوله نحو ٤ مم ، والبيض أصفر اللون - ولا توجد لهذه الحشرة ذكور فى مصر ، ولها ٣ أجيال فى العام هى جيل الشتاء من نوفمبر - فبراير ، وجيل الربيع من مارس حتى نهاية مايو - وجيل الخريف من يونية حتى نهاية سبتمبر ،

### طرق المكافحة

كما فى الحشرة السابقة

## ٦. حشرة التين الفنجانية

الاسم العلمى للحشرة *Asterolecanium pustuians* cok

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة حشرات الحفر القشرية Fam . Asterolecaniidae

تصيب هذه الحشرة جذوع وفروع أشجار التين والجوافة والتفاح والكمثرى والخوخ

والتوت ، والجميز وبعض نباتات الزينة ، وينشأ عن الإصابة تهيجا في أنسجة النبات المصاب ينشأ عنه تجاويف صغيرة مرتفعة الحواف تعيش فيها الحشرات ، وتصيب هذه الحشرة أيضا التين والتفلة في المملكة العربية السعودية .

### دورة الحياة

تضع الأنثى نحو ٩٠ بيضة شتاء ، ٢٠٠ بيضة صيفا ، ويوضع البيض على أفرع أو جنوع الأشجار بفقس البيض وتخرج منه الحوريات التي تصل إلى الطور اليافع بعد إنسلاخين فقط أي بعد نحو ٢٥٠ يوما عند برودة الجو أو اعتدال الجو في الشتاء والخريف والربيع ، وبعد ١٠٥ يوما في أشهر الصيف الحارة ، والإاث البالغة لهذه الحشرة إما أن تكون قادرة على وضع البيض وتسمى Gravid Females أو غير قادرة على وضع البيض وتسمى Nongravid Females ، ولهذا فلهذه الحشرات جيلان في العام - الأول يبدأ ظهوره في أكتوبر وينتهي في مايو والثاني يبدأ ظهوره في يونيو وينتهي في أكتوبر

### طرق المكافحة

تكافح كيميائيا مع البق الدقيقى والحشرات القشرية الأخرى بنفس المعاملات .

## ٧. من القطن

الاسم العلمى للحشرة *Aphis gossypii* Gloer

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة المن Fam . Aphididae

ينتشر هذا النوع من المن في جميع البلاد العربية وله أسماء محلية مختلفة ، فهو يعرف

بمن القطن ، ومن البصل ومن البطيخ ومن الدخان ، ويطلق عليه في المملكة العربية السعودية "عسال الحبيب".

ويصيب هذا المن أشجار الجوافة والموالح وجميع نباتات الفصيلة الخبازية والفصيلة الفرعية وبعض نباتات الزينة

وقد تناولنا هذه الآفة بالوصف المفصل في مواضع أخرى من هذا الكتاب .

وتشتد الإصابة به في مصر في شهر أبريل حيث توجد منه حينئذ أفراد مجنحة وأخرى غير مجنحة وكلها ولودة ، وبعد ذلك تظهر أفراد الصيف وهي كلها ولودة ومنها المجنح وغير المجنح ولكنها أصغر حجماً من أفراد إبريل ويختفي المن تماماً من منتصف يونية حتى منتصف أغسطس ثم يبدأ في الظهور ثانياً تدريجياً بعد منتصف أغسطس وتكثر أعداده في سبتمبر وأكتوبر ثم نقل تدريجياً بعد نهاية أكتوبر حتى تختفي في الشتاء وتظهر في إبريل التالي وهكذا

### مظهر الإصابة والضرر

يصيب هذا المن أوراق الجوافة ونمواتها الجديدة كذلك يصيب البراعم الزهرية ، وعند زيادة الإصابة تضعف الأوراق المصابة وتصفّر ثم تجف وتسقط وتفترز الحشرات النبوة العسلية عليها والتي تتساقط قطرات قتلوث الأفرع "الثمار وتنمو عليها الفطر الأسود وتتراكم حولها الأتربة مما يؤدي إلى تعطل الوظائف الحيوية للورقة

### طرق مكافحة

يوجد في الطبيعة العديد من الأعداء الحوية لهذه الحشرة منها مفترسات ومطفلات ، وإذا مارست هذه الأعداء الحيوية عملها دون تدخل الإنسان بالمبيدات فإنها قد تؤدي إلى كسر حدة الإصابة وجعلها دون الحد الاقتصادي وتوصي وزارة الزراعة المصرية في حالة وجود الإصابة بالمن بمعالجة الأشجار المصابة فقط بالملاثيون بنسبة ١٥ في الألف أو الدايمثويت ٤٠٪ بنسبة ١ في الألف أو البريمور ٥٠٪ بنسبة ٣,٧٥ في الألف ، وتجري المعالجة في حالة خلو الأشجار من الثمار .



## ٨. ذبابة ثمار البحر الأبيض المتوسط

الاسم العلمي للحشرة *Ceratitis capitata* Wieda

رتبة الحشرات ثنائية الأجنحة Order Diptera

فصيلة ذباب الفاكهة Fam Tephritidea

تصيب هذه الحشرة عددا كبيرا من ثمار الفاكهة منها الجوافة والطلويات والكمثرى والبرقوق والموالح عدا الليمون البلدى وقد سبق لنا شرح هذه الحشرة تفصيلا في مواضع سابقة من هذا الكتاب ، ويبدأ الضرر بمجرد ثقب الأنثى لجدار الثمرة بآلة وضع البيض الواخزة وذلك لكى تضع بيضها ، فيسود مكان الوخز وبعد فقس البيض تحفر اليرقات وتتجول داخل اللب مما يسهل دخول الفطر والبكتيريا داخل الثمرة وتعفننها ، وقد توجد داخل الثمرة أكثر من يرقة خصوصا فى نهاية الموسم

### طرق المكافحة

توصى وزارة الزراعة المصرية لعلاج الأشجار المصابة بذبابة الفاكهة بمبيد الدايمثويت ٤٠ % بنسبة ٢٥ سم ٣ لكل ١٠٠ لتر ماء ، ويبدأ العلاج ابتداء من منتصف يولية مرة كل ٣ أسابيع وذلك حتى جمع المحصول ، ويعتبر ذلك علاجا مشتركا ضد ذبابة الفاكهة والبق الدقيقى ، ويجب عدم جمع الثمار قبل مرور ١٥ يوما من المعاملة بالمبيدات .

## الآفات الحشرية التي تصيب التين

يزرع التين في معظم الأقطار العربية، وهو من الفواكه الشعبية التي يقبل عليها الناس، كما أنه يصنع إلى مربات وتين مجفف وتقوم عليه صناعات الحفظ في كثير من البلاد العربية . ويتعرض التين للعديد من الآفات الحشرية التي تؤثر على الإنتاج إذا لم تواجه ببرامج متشابهة المكافحة السليمة، ومن هذه الآفات عدد من الآفات الحشرية التابعة لرتبة متشابهة Homoptera الأجنحة، وبعضها سبق ذكرها في مواضع سابقة من هذا الكتاب وهذه الآفات هي :

### ١- بق الموالح الدقيقى *Pseudococcus citri* Rixo

ويصيب أوراق التين وفروعه، وعند زيادة الإصابة يزيد إفراز الحشرات لمادة الندوة العسلية التي تلوث الأوراق وينمو عليها العفن الأسود وتتجمع حولها الأتربة التي تضر الأوراق وتسبب ذبولها، وتكافح هذه الآفات ضمن برنامج مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقى .


### ٢- حشرة التين الشمعية

الاسم العلمى للحشرة *Ceroplastes rusci*

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. coccidae

تصيب هذه الحشرة في جمهورية مصر العربية أفرع التين والجوافة والعنب وبعض النباتات الزينة خاصة *Ficus corica*

يغطي جسم الأنثى بمادة شمعية على شكل مخروطي مقسم إلى ثمانية أقسام (شكل ٢١٨) لونها رمادي فاتح يميل إلى القرمزي، وفي قمة المخروط تجويف لونه محمر، والخطوط التي تفصل أقسام المخروط الثمانية لونها أيضا بني محمر، كما يوجد وسط كل قسم من الأقسام الثمانية إنخفاض دائري الشكل شكل .



(شكل ٢١٨) حشرة التين الشمعية

تضع الأنثى نحو ٨٠٠ - ١٥٠٠ بيضة بدون إخصاب (حيث أن الذكور نادرة الوجود داخل الغلاف الشمعي، وبعد موتها وتحلل جسمها لا يبقى بداخل القشرة غير بيضها، وبعد فقس البيض وخروج الحوريات يصبح هذه الغلاف فارغا ولهذه الحشرة ٢ - ٣ أجيال في السنة وتستغرق مدة الجيل نحو ٧٠ - ٨٠ يوما .

### المكافحة

ضمن برنامج مكافحة الحشرات والبق الدقيقي على التين .

## ٣ - حشرة التين الفجانية

الاسم العلمي للحشرة *Asterolecanium pustuians* cock

وهي تابعة لفصيلة حشرات الحفر القشرية Asterolecaniidae

وقد سبق لنا ذكر هذه الحشرة تفضيلا ضمن الآفات الحشرية للجوافة .

## مكافحة الحشرات القشرية التي تصيب التين

توصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة الحشرات القشرية التي تصيب التين كيميائياً باستعمال زيت معدني ٢٪ + مبيد ملاثيون ١,٥ في الألف وترش الأشجار بهذا الخليط في فصل الشتاء مع مراعاة رش الحشائش الموجودة في بستان التين بهذا الخليط أيضاً.

## ٤ - حفار ساق العنب

الأزهار البيضاء التابعة للفصيلة الخيمية .

الاسم العلمي للحشرة *Clorophoprus varius*

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

رتبة الأخشاب طويلة القرون Fam. cerambycidae

تصيب هذه الحشرة جنوع أشجار التين وفروعها مما يسبب جفافها ونقصها عند هبوب الرياح، وقد سبق لنا ذكر هذه الآفة بالتفصيل ضمن آفات العنب .

### والحشرة اليافعة

طولها نحو ٩ - ١٣ مم ولونها أسود ويتخلله أشرطة صفراء ولون الإرجل وقرون الإستشعار مائل للأحمرار وقرون الإستشعار أقصر من طول الجسم .

وتضع الأنثى اليافعة بيضها على جنوع وأفرع أشجار التين وسائر العوائل الأخرى، وبعد الفقس تحفر اليرقات أنفاقاً في خشب الأفرع والجنوع وتتحول إلى عذارى داخل هذه الأنفاق تحت القلف مباشرة، وطول اليرقة التامة النمو ٢سم ولونها أبيض مصفر، وتعيش اليرقة طويلاً قبل أن تتحول إلى عذراء، وتخرج الحشرات اليافعة بكثرة في أشهر مايو يونية ويولية وتغشى الأزهار البيضاء التابعة للفصيلة الخيمية .

## طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة ضمن برنامج مكافحة حفارات ساق التين الذي سنذكره فيما بعد .

### ٥ - ثاقبة الافرع الكبرى أو ثاقبة الافرع السودانية

الاسم العلمى للحشرة *Sinoxylon sudanicum* Lesne

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order coleoptera

رتبة الأخشاب طويلة القرون Fam. Bostrychidae

تصيب هذه الحشرة أفرع المانجو والتين والعنب والبوانسيانا والسرسوع والسنت، وتحفر اليرقات والحشرة اليافعة فى الأفرع وتتلط منطقة الكامبيوم فتموت الأفرع وتذبل أوراقها وتجف، وعند إشتداد الإصابة قد تقضى الحشرات اليافعة ويرقاتها على جميع محتويات خشب الأفرع وتحولها إلى مسحوق ناعم ولا تترك إلا منطقة القلب .

#### الحشرة اليافعة

(شكل ٢١٩) تبلغ نحو ٥ - ١٠ مم فى الطول، وشكلها أسطوانى ولونها بنى والحلقة الامامية كروية متضخمة وعلى حوافها بروزات مسننة .

#### دورة الحياة :

تظهر الحشرات اليافعة فى أواخر مايو خلال يونيو، وتحفر كل حشرة فى القلف ثقب دخول مستديرا قطره حوالى ٤ مم وتخرق القلف وجزءا من الخشب ثم تنحرف لتصنع نفقا دائريا حول الساق من الداخل فتصبح الساق ضعيفة معرضة للكسر، ويوجد فى كل نفق ذكر وأنثى يتم التزاوج بينهما، وأنفاق الحشرة اليافعة تكون خالية من المسحوق لأنها تخرجه

من حين لآخر خارج ثقب الدخول ويكون النفق مخصصا لوضع البيض . بعد الفقس تخرج اليرقات وتحفر داخل الخشب أنفاقا متعامدة مع نفق التزاوج تكون مملوءة بالمسحوق، ويتسع قطر النفق كلما إزداد نمو اليرقة، وتصنع كل يرقة لنفسها نفقا مستقلا وتمتد أنفاقا اليرقات أعلى وأسفل نفق التزاوج وتتحول إلى عذراء عند نهاية نفقها القريب من سطح قلف الشجرة. وتخرج الحشرة اليافعة بعد أن تصنع اليرقة التامة النمو قبل تعذيرها ثقباً في القلف يشبه ثقب الدخول .



(شكل ٢١٩) ثاقبة الأفرع الكبرى

### طرق المكافحة

سيأتي ذكرها فيما بعد .

## ٦ - ثاقبة أفرع لتين

الاسم العلمي للحشرة *Sinoxylon ceratoniae* L.

ونتبغ نفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة

وتصيب هذه الحشرة الأفرع القوية والضعيفة لأشجار التين، وهي تشبه في عاداتها وتاريخ حياتها الحشرة السابقة ويبلغ قطر ثقب خروج الحشرة اليافعة نحو ٣ - ٤ مم .

## وصف الحشرة

يبلغ طول الحشرة اليافعة نحو ٥ مم، ولون الرأس والصدر ونهاية الغمدين بني غامق، ولون باقى الغمدين بني مصفر، وتوجد بمقدم ترحة الحلقة الصدرية الأولى أسنان كبيرة كما ينتهى طرفها الخلفى بشوكة مدببة .

## ٧ - ثاقبة أفرع التين الصغرى

الاسم العلمى للحشرة . *Scobicia chevrieri* Villa

تتبع نفس رتبة وفصيلة الحشرتين السابقتين .

وهذه الحشرة تحفر نفقا دائريا فى كامبيوم أفرع أشجار التين وتتسبب فى موت الأفرع المصابة، ويبلغ قطر ثقب خروج الحشرة اليافعة نحو ٢ مم .

## وصف الحشرة اليافعة

يبلغ طولها نحو ٣ مم، ولون الرأس والصدر بني فاتح، وأغلب مساحة الغمدين ملونة باللون البنى القاتم، ولون مقدم كل غمد أصفر، وتوجد بأعلى الرأس خصلة من الشعر الأبيض الطويل تأخذ شكل نصف دائرة، ويوجد على النصف الأمامى لترحة الصدر الخلفى أسنان قوية .

## مكافحة حفارات ساق التين و منزوعة وحشرات القلف :

توصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة حفارات ساق التين وفروعه بالرش بمبيد سيديال ٥٠٪ بمعدل ٢٥٠سم# لكل ١٠٠ لتر ماء أو مبيد أنثيو ٢٢٪ بمعدل ٣٠٠ سم# لكل ١٠٠ لتر ماء، وترش الأشجار بأيهما بشكل غسيل لقلف السوق والأفرع عند إبتداء خروج الحشرات اليافعة (فى أوائل مايو حتى نهاية سبتمبر) على أن يكون بين الرش والآخرى ثلاثة أسابيع مع مراعاة إيقاف لرش فى خلال شهرى يولية وأغسطس لجمع الثمار ويستأنف الرش بعد ذلك .

## ٨ - ذبابة ثمار التين

الاسم العلمي للحشرة *Sibla adipata* Mcalipne

رتبة الحشرات زوجية الأجنحة order Diptera

فصيلة لونكاييدي Fam. Lonchaeidae

وحشرات هذه الفصيلة عبارة عن ذباب صغير أسود اللون لامع، ويوجد هذا الذباب في الأماكن الرطبة والظلية، كما توجد يرقاته في النباتات المتحللة وتحت القلف .

### وصف ذبابة ثمار التين : -

ذبابة صغيرة الحجم طولها نحو ٣ مم ولون الجسم أزرق قاتم والأعين حمراء والأجنحة سمراء .

### دورة الحياة

تضع الأنثى بيضها في ثمار التين وذلك خلال شهر مايو ويونيه عندما تكون الثمار صغيرة إذا لا تضع الإناث بيضها في الثمار الناضجة، بعد فقس البيض تحفر اليرقات أنفاقا في الكأس حتى تصل إلى الأزهار فتتلف الثمرة من الداخل وتتسبب في سقوط عددا كبيرا من الثمار قبل النضج، وتبلغ مدة الطور اليرقي نحو أسبوع والعذراء ٧ - ١٠ أيام وتعيش الحشرة اليافعة ( الذبابة ) نحو ١٥ يوما .

### طرق المكافحة

توصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة هذه الحشرة كيميائيا برش الأشجار بمبيد هوستاثيون ٤٠٪ (مستحلب زيتي) بمعدل ١٥٠ سك# لكل ١٠٠ لتر ماء، ويبدأ الرش إعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يونيه على أن يكرر كل ٢ أسابيع، وتحتاج الأشجار إلى رشتين أو ثلاثة خلال الموسم على ألا تجمع الثمار الناضجة لتسويقها إلا بعد أسبوعين على الأقل من نهاية الرش .



## ٩ - حفار ساق التين ذو القرون الطويلة

الاسم العلمى للحشرة *Hesperophanes griseus* F.

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة order Coleoptera

فصيلة الحفارات ذات القرون الطويلة Fam. Cerambycidae

تنتشر حشرة ساق التين ذو القرون الطويلة حول منطقة البحر الأبيض المتوسط - وقد وجد أن يرقات هذه الحشرة تحفر في سوق وأفرع أشجار التين في فرنسا، بيكارد ١٩١٨، والجزائر ترايوات ١٩٢٣، ومصر نويكلوكس ١٩٢٤. وقد سجلت هذه الحشرة على أشجار التين سنة ١٩١٤ في مصر بمعهد بحوث وقاية النباتات (وزارة الزراعة بالجيزة). وقد درس بيكارد ١٩١٩ هذه الحشرة بيولوجيا وأعطى وصفا لأطوارها المختلفة .

ويعتبر الطور اليرقى هو المؤثر على الأشجار حيث تحفر اليرقات تحت قلف أشجار التين المنتشرة في منطقة الساحل بالأسكندرية .

هذا وقد أجرى عبد القادر النحال وآخرون دراسات بيولوجية هذه الحشرة (١٩٧٨) تلخص هنا النتائج التي توصل إليها ووصف كل طور من أطوار الحشرة والمدة الزمنية لكل طور .

### (أ) طور البيضة

البيضة الموضوعة حديثا تكون أهليلجية الشكل ذات لون أبيض ناصع متوسط طولها ١,٤٩ مم (١,١٥ - ١,٧٥ مم) ومتوسط عرضها ٠,٦٢ مم (٠,٥٦ - ٠,٧٥ مم) غطاء البيض الجلدى عليه نقوش محدبة الشكل بدون نظام معين، قمة البيضة مستضيقة بعض الشئ بينما الطرف الآخر مستدير .

ويوضع البيض عادة أما منفردا أو في مجاميع صغيرة (من ٢ - ١٨ بيضة) في الشقوق الموجودة على قلف الأفرع وقد استخدمت أربع درجات رطوبة نسبية (٣٥، ٥٥، ٧٥، ٨٥٪) مع درجة حرارة ٢٠م، وقبل الفقس مباشرة أمكن مشاهدة محفظة الرأس ذات اللون الغامق خلال كوريون البيضة بسهولة .

وعند الفقس تستخدم اليرقة فكوكها لقرض جزء من كوريون البيضضة الجلدى محدثة ثقب خروج مستطيل الشكل كما لوحظ أنها تأكل هذا الجزء . وبما أن اليرقة عديمة الأرجل فإنها عادة تحدث ثقب الخروج فى اتجاه الخشب لتحفر مباشرة تحت القلف .

### (ب) الطور اليرقى

وبعد الفقس مباشرة فإن اليرقة تبدأ فى الحفر تحت قلف أشجار التين محدثة أنفاقا مطاولة غير منتظمة حيث تتغذى فى هذه الأنفاق وعندما تكبر اليرقات فى الحجم تبدأ فى الحفر والتغذية خلال منطقة الخشب الربيعى أو الخشب الصمىمى للجنوع والأفرع الرئيسية لأشجار التين . وبينما تحفر اليرقات أنفاقا فإنها تطرد مخلفاتها إلى الخلف وتخلطها مع نواتج الحفر على هيئة كتلة متماسكة وهذا تعطى لليرقات حرية الحركة والتغذية داخل النفق وعندما يكتمل نموها تبدأ فى الإتجاه إلى أعلى حيث تتعذر تحت القلف فى حجرة تسمى = حجرة التعذير = وهى تكون مغطاة بنواتج الحفر . وقد تم تقدير مدة العمر اليرقى ولوحظ إنها تتأثر بدرجات الحرارة فعندما ربيت اليرقات تحت الظروف المعملية ( ٢٧, ٢, ٦١, ٦ / رطوبة نسبية) فإن مدة العمر اليرقى بلغت ٢٦٨ = ٤.٣٥ يوما ( ٢٤٠ - ٣١٦ يوم) بينما تلك المجموعة التى ربيت على درجة حرارة ٣٠ م خلال شهور الشتاء فإن مدة العمر اليرقى كانت ١٧٦ = ٣.٦١ يوم ( ١٤٤ - ٢١٣ يوم) .

### (ج) طور ما قبل العذراء :

عندما تصل اليرقات إلى طور البلوغ فإنها تبدأ فى عمل حجرة التعذير تحت القلف ثم تمتنع عن الاغتذاء وتأخذ حلقات الجسم الشكل الأسطوانى وتتحول إلى طور ما قبل العذراء تحت الظروف المعملية ( ٢٧, ٦ م - ٦١, ٤ / رطوبة نسبية ٦, ١٥ + ٠, ١٥ - يوم) ٥ - ٧ يوم)

### (د) طور العذراء :

العذراء حرة- ذات لون مبيض عندما تكون حديثة التكوين وقبل الخروج بعدة أيام فإن الرأس وأجزاء إتصال الفخذ والساق والرسغ يتحول لونها إلى اللون البنى الفاتح . وقد أمكن

تميز الجنسين في طور العذراء بواسطة طول قرن الاستشعار والحلقات الخلفية، ففي الذكر تكون العذراء لها قرون إستشعار بطول الجسم أما العذراء الأنثى فقرون إستشعارها أكبر من طول الجسم . وفي الجهة الظهرية للذكر فإن الفتحة التناسلية تكون موجودة في منتصف الحلقة العاشرة ويمكن تمييزها بوضوح، أما في الأنثى فيلاحظ وجود إنتفاخين صغيرين بينهما شق ضيق على الحلقتين ٨، ٩. تبدأ اليرقات البالغة في حفر حجرة التعذير تحت القلف التي تكون عمودية أو شبه عمودية ويتم تغطية هذه الحجرة بواسطة نشارة الخشب (نواتج الحفر) حيث تتحول إلى عذراء داخل حجرة التعذير .

وقد وجد أن مدة طور العذراء تختلف تبعاً للإختلاف في كل من درجات الحرارة والرطوبة النسبية . وتوضح النتائج أن مدة طور العذراء كانت أقصر ما يمكن (١١،٥ يوم) على درجة حرارة ٢٠ م° بينما على درجة حرارة ٢٠ م° فإن مدة طول العذراء بلغت في المتوسط ٢٠،٥٥ يوماً .

وعلى درجة حرارة ٢٥ م° فإن هذه المدة كانت ١٤،٠٥ يوماً بينما تحت الظروف المعملية (٢٧،٧ م°) فإن مدة طور العذراء كانت ١٤،٦٠ يوماً . ويوضح التحليل الإحصائي لهذه النتائج بأن العلاقة بين درجات الحرارة المختلفة ومدة طور العذراء معنوية جداً . وهناك علاقة عكسية بينهما أي أنه كلما زادت درجة الحرارة قلت تبعاً لذلك مدة طور العذراء الجداول بين مدة طور العذراء على درجة ٣٥٪ الرطوبة النسبية تتراوح بين ١١،٦ - ١٢،٢ يوماً بمتوسط قدره ١١،٩ يوماً بينما تحت الظروف المعملية فإن هذه المدة تتراوح بين ١٤،٤ - ١٤،٨ يوماً بمتوسط ١٤،٦ يوماً (١٤،٦ يوم (٦١،٤٪ رطوبة نسبية) وعلى درجات ٥٥، ٧٥، ٨٥٪ رطوبة نسبية فإن هذه المدة كانت ١٢،٣، ١١،٥ يوماً في المتوسط على الترتيب وقد بين التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية بين مدة طور العذراء ودرجات الرطوبة النسبية المختلفة .

## (هـ) طور الحشرة اليافعة :

## ١- خروج الحشرات

يحدث ليلا عادة - وقبل خروج الحشرات اليافعة مباشرة نستطيع مشاهدتها من خلال الغشاء الجلدي للعدراء - وعندما تستعد الحشرات اليافعة للخروج فإنها تبدأ في فتح غشاء جلد العدراء لتأخذ طريقها إلى الخارج مستخدمة في ذلك رأسها وأرجلها .

وبعد الخروج تبدو الحشرات اليافعة ضعيفة جدا غير قادرة على الحركة - وتمكث في حجرة التعذير مدة تصل من ٣ - ٥ أيام حتى يأخذ كيو تيكل الجسم الصلابة الكافية - ويبدلون جسم الحشرات الكاملة في بداية الخروج كريمة ما عدا مناطق العين المركبة ، مناطق اتصال الفخذ والساق والرسغ التي تبدو وجميعها ذات لونا باهت .

أما لون الأجنحة فإنها تتحول إلى اللون البنى في خلال ٤.٢ أيام بعد الخروج وعموما فإن جسم الحشرة الكاملة كله يصبح بنى اللون في اليوم الخامس من الخروج . تخرج الحشرات الكاملة من العائل النباتى (فروع الخشب) بعد خروجها من جلد العدراء بمدة تصل إلى ٣ - ٥ أيام .

والحشرات الكاملة تأخذ طريقها إلى الخارج من الفروع المصابة بواسطة جزء من القلف على هيئة ثقب دائرى الشكل (فى المتوسط ٦.٩ مم)

ووجد أن الحرارة لها تأثير معنوى على نسبة خروج الحشرات الكاملة + فعلى رطوبة نسبية ٧٥٪ كانت نسبة الخروج أعلى ما يمكن (٩٨٪) على درجة حرارة ٢٠م وأقل ما يمكن (٨٤٪) على درجة حرارة ٢٠ م أما على درجة ٢٥م فقد وصلت نسبة الخروج إلى (٩٢٪) . ومن ناحية أخرى فإن تأثير الرطوبة النسبية على نسبة خروج الحشرات الكاملة كان غير معنوى .

وعلى كل من درجات رطوبة نسبية ٣٥ و ٥٥ و ٧٥٪ كانت نسبة الخروج من ٩٢ - ٩٨٪ أما على درجة ٨٥٪ فنسبة الخروج كانت ٩٠٪

## ٢ - التلقيح :

بعد الخروج مباشرة كان الجنسين يتجنبان الالتقاء نهارا صيفا خلال فترة ما قبل وضع

البيض التي تصل في المتوسط إلى ٨٦ يوم من خروج الحشرات الكاملة ويتم التلقيح بكفاءة عالية ليلا . ويبدأ التلقيح بدون مغازلة بأن يتسلق الذكر فجأة ظهر الأنثى ممسكا بطنها بواسطة الأرجل الأمامية بينما الأرجل الوسطى تكون ممتدة على جانبي الأنثى .

يدخل الذكر آلة السفاد في الفتحة التناسلية للأنثى ويظل الاثنان بدون حركة عدة دقائق وعادة تكون قرون الاستشعار لكل من الذكر والأنثى ممتدة إلى الأمام وأحيانا تتحرك الأنثى الى الأمام حاملة الذكر على ظهرها تحاول الهروب منه . وعموما فان عملية التلقيح تأخذ حوالي ٧٨ دقيقة في المتوسط (٢٥ - ٣ دقيقة) والأنثى الواحدة قد تلتقح من (٢-١٢ مرة) خلال فترة حياتها بمتوسط ٦٣ مرة - والتلقيح ضرورى كي تضع الأنثى البيض .

### ٣ - وضع البيض :

عادة تضع الأنثى البيض ليلا - وقبل وضع البيض يمكن مشاهدة الأنثى تدور داخل اقفاص التربية باحثه عن مكان مفضل لوضع البيض بواسطة آلة وضع البيض التي تبدو ظاهرة بوضوح والشقوق التي قد توجد على قلف الأشجار تعتبر المكان المفضل لوضع البيض - وعندما تجد الأنثى المكان المفضل لوضع البيض فانها تدفع آلة وضع البيض في هذه الشقوق . تضع الأنثا البيض أما فرديا أو في مجاميع صغيرة تصل الى ٢-١٨ بيضة لكل مجموعة . وقد تم دراسة فترات ما قبل وضع البيض ، وضع البيض ، مابعد وضع البيض التي بلغت في المتوسط (٨٥ + ٤٦) ر ، (٢٩ + ٣٣) يوما على التوالي .

تم تقدير عدد البيض الذي تضعه الأنثى الواحد خلال فترة حياتها وكان في المتوسط ٩٤١ بيضة (٥٥ - ١٧٢ بيضة)

وكان أعلى عدد للبيض يمكن أن تضعه الأنثى في اليوم (٤٠) بيضة بينما أقل عدد تضعه الأنثى في اليوم الواحد (بيضة واحدة)  
أما الأنثا الغير ملقحة فلا تضع بيض اطلاقا .

### ٤ - مدة حياة الحشرات اليافعة :

وجد أن مدة حياة الحشرة اليافعة تتأثر بواسطة التلقيح، على درجة حرارة ٢٧.٦م ،

رطوبة نسبية ٦١٪ كان متوسط حياة الذكور الملقحة ٢٣ر٨ + ١ر٠٣ يوم (١٧ - ٣٧ يوم) بينما الذكور الغير ملقحة بلغت مدة حياتها ٢٦ر٨ + ٠ر٨٣ يوم (٢١ - ٣٧ يوم) .

أما بالنسبة للإناث الملقحة فبلغت مدة حياتها ١٧ر٩٢ + ٠ر٥٨ يوم (١٤ - ٢٦ يوم) والإناث الغير ملقحة عاشت مدة أطول فبلغت مدة حياتها ٢٢ر٨ + ويوم (١٩ - ٢٩ يوم) .

وقد وضع التحليل الإحصائي بأن تأثير التلقيح على مدة حياة الحشرة اليافعة كان تأثيرا معنويا وكان واضحا أيضا بأن الذكور تعيش مدة أطول من الإناث .

## ٥ - النسبة الجنسية :

الإناث كانت تقريبا مساوية لأعداد الذكور على مدار السنة وكان متوسط النسبة الجنسية خلال موسم ١٩٨٦ ٩٥ر : ١ .

عدد الأجيال في السنة :

تحت الظروف المعملية تنتج لحشرة حفار ساق التين ذو القرون الطويلة جيل واحد في السنة وكان متوسط حياة الحشرة ٢٩٩ر٣ + ٥ر٣١ يوم (٢٦٦ - ٣٥٦ يوم) عند التربية المعملية على درجة حرارة ٢٧ر٨م ورطوبة نسبية ٦٣ر٢٪ .

## طرق مكافحة صغار ساق التين ذو القرون الطويلة :

توصى وزارة الزراعة باستعمال مبيد سيديال ٥٠٪ بمعدل ٢٥٠سم<sup>٣</sup> لكل ١٠٠ لتر ماء .

أو أنتيو ٢٢٪ بمعدل ٣٠٠سم<sup>٣</sup> لكل ١٠٠ لتر ماء ، وترش الأشجار بأحد المبيدين على أن يكون الرش غزيرا ويعمل كغسيل للسوق والأفرع ، ويجرى الرش عند إبتداء خروج الحشرات

اليافعة في أوائل شهر مايو ، ويمكن تكرار الرش على أن يكون بين الرشة والأخرى ٢ أسابيع، ولكن يجب إيقاف الرش في شهرى يوليو وأغسطس لجمع الثمار ثم يستأنف بعد إذا استدعى الأمر .

## الآفات الحشرية التي تصيب الزيتون

يزرع الزيتون في مساحات كبيرة في العالم العربي ، وتقوم عليه صناعات استخراج الزيوت والمخللات ، ويمثل جزءا هاما من اقتصاديات بعض الدول العربية مثل تونس والجزائر ويصاب الزيتون في مواطن زراعته بالكثير من الآفات الحشرية نذكر منها ما يلي :

### الحشرات القشرية

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

تلعب الحشرات القشرية دورا هاما في زراعة الزيتون في جميع مناطق زراعته في العالم ، فهذه الحشرات تضر الزيتون ضررا مباشرا بامتصاصها لعصارته النباتية ، كما تضره ضررا غير مباشر وذلك حيث يتبع الإصابة بها الإصابة بالفطر الاسود الذي يسبب موت الأوراق وتساقط الثمار ويذكر هنا اهم هذه الحشرات القشرية.

### ١- حشرة الزيتون الشمعية

الاسم العلمي للحشرة (Berrard) *Parasaoissetia oleae*


فصيلة الحشرات القشرية الرخوة (Fam coccidae) (Iecaniidae)

تنشر حشرة الزيتون الشمعية في أماكن زراعة الزيتون خاصة في أمريكا وإفريقية وتنزل بالزيتون خسائر فادحة .



وهي تصيب كذلك أفرع التين والجوافة وبعض نباتات الزينة ، ويكثر انتشارها في الأماكن الساحلية والمعتدلة الجو ، ويقل وجودها في المناطق الحارة

يغلف جسم الأنثى غطاء شمعى شكله كروى لونه بنى مسود ويوجد على السطح العلوى للغطاء الشمعى خطوط على شكل حرف H ( شكل ٢٢٠ ) . وتفرز هذه الحشرة مادة عسلية على الثمار المصابة فينمو عليها العفن الأسود بكثرة . وتوجد في المملكة العربية السعودية وتصيب الزيتون وأشجار الحلويات وبعض نباتات الزينة مثل الدفلة والورد .



(شكل ٢٢٠) حشرة الزيتون الشمعية

١- أوراق زيتون مصابة ٢- أفرع زيتون مصابة ٣- قشرة الذكر ٤- قشرة الأنثى

### دورة الحياة

التكاثر البكرى هو طريقة التكاثر في هذه الحشرة نظرا لندرة الذكور ، وتضع الأنثى الواحدة نحو ٧٧٥ بيضة في المتوسط ، ويبلغ فترة وضع البيض ١٥ - ٢٥ يوما ويفقس البيض بعد ١٠ - ٢٠ يوما ، ولهذه الحشرة جيل واحد في السنة ولها بيات صيفى من مايو حتى نوفمبر على هيئة حوريات .

## ٢ - حشرة الزيتون القشرية البيضاء

الاسم العلمي للحشرة (*Aspidiotus hederae* (Vallot)

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية أو المدرعة Fam.Diaspididae

تصيب هذه الحشرة الزيتون والمواالح والكثير من نباتات الزينة داخل وخارج البيوت


الزجاجية ، وهى تصيب ثمار الزيتون بشدة وتسبب تساقطها كذلك تصيب أفرع وأوراق الزيتون ، كما توجد أيضا على السلفيا والياسمين والسنط والصفصاف والبيجونيا ولا تصيب الموالح (الحمضيات) مطلقا فى مصر ولا يعرف لذلك سبب حتى الآن .

### وصف الحشرة

(شكل ٢٢١) مفلطحة ومستديرة الشكل وتبلغ نحو ٣-٤ مم فى القطر ، أما قشرة الذكر فهى بيضاوية نوعا وتبلغ نحو ١-٥ مم فى الطول ولون القشرة أبيض أو رمادى فاتح والسرة قاتمة اللون ووسطية ولهذه الحشرة فى مصر ٣-٤ أجيال فى السنة والتوالد جنسى

ويقتربها حشرتا *Aspidiotiphagus loundburyi* , *Chilocorus bipustulatus*

, *Aspidiotus hederae*



(شكل ٢٢١) حشرة الزيتون القشرية البيضاء *Aspidiotus hederae*

### ٣ - الحشرة القشرية السوداء

الاسم العلمى للحشرة *Chrysomphalus ficus*

فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية أو المدرعة Fam. Diaspididae

تصيب هذه الحشرة فى مصر عدا الموالح ١٠٠ نوعا من النباتات تقع تحت ٤ فصائل نباتية

مختلفة أهمها المانجو والبرقوق والزيتون والكمثرى والتفاح والعنب والتين والموز والنخيل والسنط والياسمين والبجونيا والفيكس والورد .

هذا ولقد سبق لنا ذكر ما يتعلق بهذا الحشرة بالتفصيل ضمن الآفات الحشرية التي تصيب الموالح ، وهذه الحشرة تصيب اوراق الزيتون وثماره بشدة ، وعند اشتداد الاصابة تضمثر الثمار وتنحدر صفاتها التجارية ونقل نسبة الزيت بها .

### مكافحة الحشرات القشرية التي تصيب الزيتون

يوجد في الطبيعة العديد من الأعداد الحيوية التي تكسر حدة الاصابة بالحشرات القشرية عند توفر الظروف المناسبة لنشاطها ، وقد حققت المكافحة البيولوجية نجاحا كبيرا في كاليفورنيا عندما استوردت طفيليات على الحشرات القشرية من مناطق البحر الأبيض المتوسط وخاصة *Aphytis sp* وقد نقصت الكثافة العددية للحشرات القشرية بمقدار ٩٠٪ من جراء نشاط هذا الطفيل . ولذلك يجب الاعتماد على المكافحة البيولوجية خاصة وأن الطفيليات الناجحة موجودة في بيئة زراعة الزيتون في مناطق البحر الأبيض المتوسط العربية.

ومن حيث المكافحة الكيميائية نتوصي وزارة الزراعة المصرية باستعمال أحد المبيدات الآتية في رش أشجار الزيتون المصابة بالحشرات القشرية رشة واحدة صيفاً خلال شهر يولية ، والمبيدات هي :

باسودين ٦٪ بمعدل ١٥٠ في الألف

أو سوميثيون ٥٠٪ بمعدل ١٥٠ في الألف

أو اكنك ٥٠٪ بمعدل ١٥٠ في الألف

أو ملاثيون ٥٧٪ بمعدل ٢٥٠ في الألف

أو أى مبيد من المبيدات السابقة بمعدل ١٥٠ في الألف

مضافا إليه زيت معدنى بمعدل ١٥٠ في المائة .

وهذا الخليط يستعمل في رش الأشجار سناء خلال شهر فبراير .

## ٤ - خنفساء قلف أشجار الزيتون

الاسم العلمى للحشرة *Phloeotribus oleae* Bern

رتبة الحشرات عمودية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة خنافس القلف Fam. Scolytidae

هذه الحشرة آفة هامة من آفات أشجار الزيتون الصغيرة فى شمال إفريقيا ، وتحدث به أضرارا اقتصادية كبيرة .

### وصف الحشرة

الخنفساء اليافعة صغيرة الحجم طولها ٢ مم ، ولونها بنى مسود ويغضى الجسم شعر رقيق رمادى اللون .

### دورة الحياة

تخرج الحشرات اليافعة من بيئاتها الشتوى فى شهر مارس وأبريل وبعد الزواج تضع الإناث بيضها فى شقوق قلف أشجار الزيتون ، بعد فقس البيض تخرج اليرقات التى تبدأ فوراً فى الحفر إلى أسفل مبتدئة من محاور الأغصان وهذا يسبب خسارة كبيرة للأوراق والثمار ، وتحفر اليرقة أنفاقاً متفرعة بين القلف والخشب

ولذا الحشرة ثلاثه أو أربعة أجيال فى العام ، وتدخل يرقات الجيل الأخير البيات الشتوى ثم تتحول إلى عذراء فى بداية شهر مارس ويتبع ذلك خروج خنافس جيل الربيع فى شهرى مارس وأبريل

### طرق المكافحة

يلجأ المزارعون فى شمال إفريقيا إلى إستخدام الطعوم فى مكافحة هذه الخنافس فى

بداية الربيع ، وإذ يقطعون أغصان الزيتون الفضة ويضعونها فوق الأرض أسفل أشجار الزيتون وذلك في شهرى مارس وإبريل فتتجمع عليها خنافس جيل الربيع ثم تجمع هذه الأغصان بما عليها من حشرات وتحرق.

أما المكافحة الكيميائية

فسوف نتطرق إليها عند تناولنا لمكافحة خنافس أشجار الزيتون

## ٥. خنفساء قلف أشجار الزيتون الكبيرة

الاسم العلمى للحشرة . *Hylesinus oleiperde* F.

وتتنمى هذه الحشرة لنفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة .

وتنزل هذه الخنفساء خسائر جسيمة بأشجار الزيتون فى تونس ، وهى تشبه الحشرة السابقة إلا أنها أكبر منها حجما ، ويبلغ قطر الأنفاق التى تصنعها ما بين ٥ - ٧ ملم ، ومن مظاهر الإصابة الخارجية لهذه الحشرة وجود بقع بنية اللون على الجذع والأغصان ، وعندما تزداد الإصابة يسقط القلف تماما

## ٦- حفار قلف أشجار الزيتون

الاسم العلمى *Phloeotribus scabaeoides* Bern


رتبة الحشرات عمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة خنافس القلف Fam . Scolytidae

تعد هذه الحشرة من آفات الزيتون الخطيرة فى جميع مناطق زراعة الزيتون فى العالم - وقد أفادت التقارير العلمية بخطورتها فى أسبانيا وجنوب إيطاليا وتونس والجزائر ومصر وفلسطين واليونان .

## وصف الحشرة اليافعة

خنفساء صغيرة الحجم طولها ٢ مجم وعرضها ١ مجم ولونها بني مسود ويغطي الجسم شعر دقيق رمادي اللون ، والجسم اسطوانى الشكل ويكاد يكون بيضاويا ، وقرن الاستشعار ورقى فى كل الجنسين أو يتألف من ثلاث وريقات كبيرة لونها بني فاتح ويوجد على كل من قرنى الاستشعار والفخدين بضع شعيرات طويلة والشعيرات الموجودة على قرن الاستشعار غزيرة وهى أكثر طولها فى الذكر عنها فى الأنثى (شكل ٢٢٢- ب)



(شكل ٢٢٢) حفار قلف أشجار الزيتون

ويبدأ ظهور الخنافس اليافعة لهذه الحشرة في بداية شهر مايو ثم تزداد أعدادها تدريجياً حتى يبلغ مدة مداه في شهر يونية ولهذه الحشرة أربعة أجيال متداخلة في السنة .

### دورة الحياة

بعد خروج الخنافس من بيئاتها الشتوى في شهر مايو تصبح الذكور والإناث في تمام نشاطها الجنسي حيث تحفر الأنثى نفقا رئيسيا أسفل قلف الشجرة وتبقى النهاية الخلفية لبطن الأنثى بارزة من فتحة النفق منتظرة الذكر الذي يكون موجودا في الخارج ثم يندفع الذكر إلى فتحة النفق ويلقح الأنثى ، وبعد التلقيح تأخذ الأنثى في حفر نفق البيض المكون من فرعين ، وهذا النفق يكون زاوية قائمة مع المحور الطولى للفرع المصاب ، وتضع الأنثى البيض في حفر فنجانية الشكل على جانبي نفق البيض ، ويوضع

في كل حفر فنجانية بيضة واحدة ثم تغطى الأنثى البيضة بمادة لزجة تلتصق بها نشرة الخشب.

وبعد الفقس مباشرة، تشرع اليرقة في حفر نفقها تحت القلف ويميل هذا النفق زاوية قائمة على نفق البيض، وكل يرقة تغتذى بمفردها في نفق خاص بها وتبقى به حتى تمام نموها، وتتخلص اليرقة من مخلفاتها بضغطها مع مخلفات الحفر وتتركها خلفها في النفق، وبعد تمام نمو اليرقة فإنها تقوم بصنع فتحة بيضاوية الشكل في نهاية النفق اليرقى حيث تتحول فيها إلى عذراء وبعدئذ تتحول إلى حشرة يافعة تترك النفق وتبدأ جيلا جديدا. وتتأثر نشاط هذه الحشرة بالعوامل الجوية مجتمعة أكثر من تأثرها بكل عامل على حدة.

### طرق المكافحة

#### أولا المكافحة الحيوية

وجد اسماعيل وآخرون (١٩٨٨) في مصر سبعة من الطفيليات التابعة لرتبة غشائية الأجنحة تتطفل على حفار قلف الزيتون، وخمسة وسبعون في المائة من هذه الحشرات المتطفلة طفيليات خارجية على طور ما قبل العذراء Ectoprepupal لحشرة حفار قلف الزيتون، خمسة في المائة منها متطفلات خارجية على طور العذراء وحدد الباحث هذه الطفيليات كما يلي:

*Cephalonoma* sp. (Fam. Bathylidae), *Cerocephala comigere* (Fam. Pteromalidae),  
*Eupeimus* sp. (Fam. Eupeimidae), *Euryoma* sp. (Fam. Eurytomidae), *Litomastix truncatellus*.

وتضع إناث المتطفلات بيضها فوق عائلها الذى يصاب بالشلل التام، ويعذر الطفيل داخل شرنقة العائل أو داخل شرنقة حريرية فى نفس المكان، وقد تبين أن الذروة العددية الأولى للطفيليات تظهر فى وقت ظهور الذروة العددية الأولى للحفار، وتظهر الذروة العددية الثانية للطفيليات فى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس فى نفس الوقت التى تحدث فيه الذروة العددية الثانية للعائل، أما الذروة العددية الثالثة للطفيليات وهى الأغزر عدداً من سابقتها فتظهر أيضاً أثناء ظهور الذروة الثالثة للحفار خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر.

ومن ذلك يتضح أن هذه الطفيليات تلعب دوراً بارزاً فى كسر حدة الإصابة لهذا الحفار ودرء أخطاره بشرط ألا يتدخل الإنسان بالمبيدات التى تقضى على الكثير منها.

#### المكافحة الزراعية

تتخلص هذه الآفات فى العناية بعمليات الري والتسميد، وتقليم الأفرع المصابة وحرقها فوراً حتى لا تكون مصدراً للعدوى.

## ٧. سوسة قلف أشجار الزيتون

الاسم العلمى *Rhynchites cribripennis*

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Orolera coleoptera

فصيلة السوس Fam. Curculionidae

وتنشر هذه الحشرة فى مزارع الزيتون فى شمال إفريقيا وأسبانيا واليونان، وتضع الإناث بيضها داخل مبايض أزهار الزيتون المخصبة، وتتغذى اليرقة على محتويات المبايض المخصبة مما يؤدي إلى تلف الثمار المصابة، والإصابة بهذا الحشرة ليست ذات أهمية كبيرة.



## المكافحة الكيميائية

توصى وزارة الزراعة المصرية برش أشجار الزيتون في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس عند خروج الحشرات اليافعة ومهاجمتها للأشجار السليمة، ويستعمل مبيد سيديال ٥٠ % في الآلف أو باسودين ٦٠ % في الآلف، وذلك لمكافحة جميع خنافس قلف الزيتون، ويمكن أن يكرر الرش بعد مرور ٢١ يوما على الرشة الأولى.

ومن رأى المؤلف عدم اللجوء للمعالجة بالمبيدات إلا في حالة الإضرار وفي أضيق الحدود وترك المجال للأعداء الطبيعية الحيوية لمكافحة هذه الآفات.

## ٨ - حفار ساق التفاح

الاسم العلمي للحشرة *Zeuzera pyrina*

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة كوسيدي Fam. Cossidae

سبق لنا شرح كل مايتعلق بهذه الحشرة بالتفصيل فيما سبق شرحه من آفات التفاح.

وتصيب هذه الحشرة أشجار الزيتون بشدة وتعتبر من أخطر آفاته، ويستدل على الإصابة بهذه الحشرة من وجود نشارة خشب مختلطة مع براز اليرقات حول فتحات دخول اليرقات، كذلك يفرز النبات المصاب عصارة نباتية غزيرة في مكان الإصابة، ويتبع شدة الإصابة جفاف الأفرع وسهولة كسرها بتأثير الرياح.

وبعد فقس البيض تدخل اليرقات الأفرع الصغيرة مباشرة أو أعناق الثمار أو الثمار نفسها أو أعناق الأوراق أو العروق الوسطية للأوراق أو العروق الثانوية لها، وتتجول اليرقات قليلا قبل الدخول، ثم تترك اليرقات الأفرع الصغيرة إلى غيرها من الأفرع الكبيرة بعد مدة من نموها وتتدلى بخيوط حريرية تفرزها لتصل إلى الفروع الكبيرة، وقد تنتقل إلى الأفرع الكبيرة من الداخل بون حاجة إلى الخروج من أنفاقها، وتبلغ مدة طور اليرقة من ١٠ - ١١ شهرا.

وعند التعذير تصنع اليرقة ثقباً للخروج بالأفرع الكبيرة وتعذر بالقرب منه في شرنقة من الحرير وذلك في منتصف مايو حتى سبتمبر - والعذراء مكبلة لونها بني فاتح.

**المكافحة الكيميائية لحفار ساق التفاح على أشجار الزيتون:**

توصي وزارة الزراعة المصرية برش هذه الحشرة بمبيد سيديال ٥٠ % ٣ في الألف أو باسودين ٦٠ % بمعدل ٣ في الألف - وذلك لثلاث رشات، وتبدأ الرشّة الأولى عقب خروج الحشرات الياقة في شهر مايو ويجب إيقاف الرش قبل جمع المحصول بمدة لا تقل عن شهر، أما إذا تأخر خروج الفراشات تبعاً للظروف الجوية وشم الرش مرة أو مرتين، يتم إجراء الرشّة الباقية بعد جمع المحصول.

## ٩- قمل الزيتون القافز (و حشرة الزيتون القطنية

الاسم العلمي للحشرة *Euphyllura olivina* Costa

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة قمل النبات القافز Fam. Psyllidae

لهذه الحشرة أهمية كبيرة في جميع مناطق زراعة الزيتون في حوض البحر الأبيض المتوسط وتنزل بالزيتون خسائر فادحة.

### مظهر الإصابة والضرر

لا يزيد حجم هذه الحشرة عن ملليمترات قليلة وذات لون فاتح، وتغتنى الآفة المذكورة على عصارة النبات، وتفضل مهاجمة النموات الحيدية الغضة، وامتصاص يرقات هذه الآفة لعصارة النبات والمصحوب بإفرازاتها الشمعية تؤدي إلى تأخر نمو البراعم وتمنع إنبثاق النموات الجديدة، كما تؤدي إلى جفاف الأوراق والنموات، وعادة ماتهاجم هذه الحشرة الأزهار أيضاً وتدمرها، ومن العلامات المميزة للإصابة بقمل الزيتون القافز هي وجود إفرازات شبه قطنية فوق الأغصان الصغيرة والأوراق.

## طرق مكافحة

تقليم وحرق الأفرع المصابة هي من الوسائل الفعالة في مكافحة

### أما المكافحة الكيميائية

توصى وزارة الزراعة المصرية بالرش بمبيد دايمثويت ٤٠ ٪ بمعدل ١,٥ في الألف أو ملاثيون ٥٧ ٪ ٣ في الألف وذلك عند وجود الإصابة. والرش مرة واحدة بعد تقليم الأشجار مباشرة خلال شهر فبراير على أن تغسل الأشجار بمحلول الرش جيدا.

## ١٠ - دودة أوراق الزيتون الخضراء (فراشة الياسمين)

الاسم العلمى للحشرة *Palpita (Margaronia) unionalis* Hb

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة فيسيتيدي Fam. Phycitidae

تعد هذه الآفة من آفات الزيتون الخطيرة في جميع مناطق زراعته في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتغذى يرقاتها على أوراق الزيتون وأزهاره وكذلك على البراعم والثمار.

### وصف الحشرة

يبلغ طول الفراشة من ١١ - ١٦ مم، وعرضها عند فرد أجنحتها على الجانبين ٢٠ - ٣٠ مم، ولون أجنحتها الأمامية والخلفية وكذلك لون الجسم أبيض لامع، ويوجد على الحافة الأمامية للجناح الأمامى شريط ضيق بنى اللون (شكل ٢٢٣- أ) واليرقة ذات لون أخضر وطولها عند تمام نموها نحو ٢,٥ مم وتوجد على حلقاتها الصدرية والبطنية وعلى رأسها شعيرات مصفرة، وبعد تمام نمو اليرقة تتحول إلى عذراء داخل شرنقة بيضاء اللون محاطة بخيوط حريرية، وتوجد هذه الشرنقة بين طيات الأوراق أو بين الأوراق الجافة المتساقطة والحشائش الموجودة أسفل الأشجار أو بين شقوق الساق أو تحت القلف. والعذراء مكبلة

لونها أصفر مخضر أو بني خفيف، ويوجد على حلقات بطنها قليل من الشعيرات وتنتهي حلقة بطن العذراء الأخيرة بثمانية أشواك خطافية.


### مظهر الإصابة والضرر

يبدأ نشاط هذه الحشرة في فصل الربيع ويستمر حتى شهر أكتوبر ولها تسعة أجيال في السنة إذا ماريبت داخل المختبرات.

وتغذى اليرقات على أوراق الزيتون ونمواته الحديثة الفضة فتدمرها، كذلك تهاجم البراعم الزهرية مما يتسبب في تساقطها قبل عقل الثمار.

### طرق المكافحة:

سوف نتناولها فيما بعد



(شكل ٢٢٣-١) الحشرة اليافعة لدودة ورق الزيتون الخضراء



(كل ٢٢٣-ب) أطوار بودة أوراق الزيتون الخضراء

١- اليرقة ٢- العنقاء

## ١١- ثاقبة أوراق الزيتون أو فراشة الزيتون

الاسم العلمى للحشرة *Prays oleallus* FABR

رتبة الحشرات حدشغية الأجنحة Order Lepidoptera


فصيلة هيبنونو هيتيدى Fam. Hyponomeutidae

تنتشر هذه الآفة فى جميع مناطق زراعة الزيتون فى مصر والعالم العربى، وتعتبر من آفات الخطيرة خصوصا فى المناطق الساحلية

### وصف الحشرة

الفراشة صغيرة الحجم يبلغ طولها نحو ٥ مم وتبلغ المسافة بين طرفى الجناحين الأماميين عند فردهما نحو ١٢ مم، ولون الأجنحة الأمامية رمادى غير أنها مبقعة ببقع بنية فاتحة صغيرة ويوجد عليها وبر خفيف، ولون الأجنحة الخلفية أبيض رمادى لامع (شكل ٢٢٤).

واليرقة اسطوانية الشكل يصل طولها إلى ٧ مم ولونها أخضر ثم تتحول إلى اللون البنى المخضر فى أعمارها الأخيرة وينتشر على سطح اليرقة الظهرى وبر رفيع كما يمتد على الظهر خطان لونهما رمادى غامق.



(شكل ٢٢٤) فراشة ثاقية أوراق الزيتون

### دورة الحياة

تتزاوج الفراشات بعد بضع ساعات من خروجها من طور العذراء، ثم تبدأ الفراشات الملقحة في وتضع البيض بعد يومين من تلقيحها، ويوضع البيض فرديا على السطوح السفلى للأوراق، وتوضع الفراشة البيض على البراعم الزهرية أو على الثمار الصغيرة حديثة التكوين، يفقس البيض بعد أسبوع وتخرج منه اليرقات التي تبدأ فوراً في الحفر بين بشرتي الأوراق مكونة أنفاقاً رفيعة قد تكون مستقيمة أو متعرجة، وتقضي الحشرة البيات الشتوي وهي في طور اليرقة، وبعد اكتمال نمو اليرقات تترك الثمار المصابة وتتحول إلى عذارى فوق سطح التربة بالقرب من الأشجار أو تحت قلف الساق.

ولهذه الحشرة ثلاث أجيال في السنة آخرها جيل الخريف.

### مظهر الإصابة والضرر

في حالة وضع البيض على البراعم الزهرية تغتذى اليرقات على هذه البراعم وتلتهم جميع

محتوياتها فتذيل الأزهار وتجف، أما في حالة وضع البيض على الثمار الحديثة التكوين فإن اليرقات تدخل الثمار وتغتنى على البنور اللينة، فتسقط الثمار على الأرض.

### طرق مكافحة

تكافح هذه الحشرة والحشرة السابقة مكافحة مشتركة حيث يتبع الآتى:

١ - في حالة المكافحة الزراعية تجمع الثمار المصابة والساقطة على الأرض تحت الأشجار وتعدم بما فيها من يرقات.

### المكافحة الحيوية

أما المكافحة الحيوية فقد جرب إستعمال بكتريا *Bacillus thuringiensis* فى مكافحة يرقات هذه الآفة فنجحت التجربة وقضت على نحو ٩٢ إلى ٩٥ ٪ من تعداد الآفة.

وتوصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة هذه الآفة والآفة السابقة معا بالرش بمبيد الدايمثويت ٤٠ ٪ بمعدل ١,٥ فى الألف، ويجرى الرش مرتين أحدهما فى المشتل إذا كان بالشتلات إصابة أما رش الأشجار المستديمة فيجرب فى شهر مايو

## ١٢ - ذبابة ثمار الزيتون

الاسم العلمى للحشرة *Dacus oleae* Gmel

رتبة الحشرات زوجية الأجنحة Order Diptera

فصيلة ذباب الفاكهة Fam. Tephritidae (Trypetidae)

تهاجم هذه الحشرة ثمار الزيتون فى جميع مناطق زراعته، ويذكر أن تونس هى القطر الوحيد الذى لا تشكل هذه الآفة أهمية ما فيه، وتلف يرقاتها نسبة كبيرة من الثمار، ويبدأ ظهور الذباب اليافع فى أوائل مايو ويستمر حتى شهر نوفمبر، ويبدأ إصابة الثمار قبل نضجها، وينشأ عن وخز الذبابة الأنثى للثمرة بآلة وضع البيض بقعة سمراء على سطح الثمرة

ترى بوضوح، بعد فقس البيض تحفر اليرقات أنفاقها داخل لب الثمار وتتغفن الثمرة ويصبح لبها إسفنجيا جافا أسمر اللون، وفي معظم الحالات لا يتغير شكل ولون الجزء الباقي غير المصاب من الثمرة، وينشأ عن الإصابة تساقط الثمار المصابة قبل نضجها خصوصا في سبتمبر وأكتوبر وتنقص نسبة الزيت في الثمار المصابة وتزداد حموضته.

### الحشرة اليافعة

(شكل ٢٢٥): ذبابة متوسطة الحجم صل إلى نحو ٥ مم في الطول، والأجنحة شفافة وحافتها الأمامية الخهارجية مبقعة ببقعة صغيرة صفراء، ولون الصدر أصفر سمى والأرجل صفراء محمرة.

### دورة الحياة

يكثر خروج الحشرة اليافعة من العذراء في الصباح حتى الظهر عادة والنسبة الجنسية ١: ١ في جميع الأجيال، وتخرج الحشرة اليافعة غير مكتملة النضج الجنسي وتحتاج لعدة أيام لبلوغ النضج الجنسي ثم التزاوج الذي يتم عادة بالليل.

تعيش الحشرة اليافعة المجموعة من الحقل نحو ٤,٥٥ يوم والحشرة المغذاة على ماء ٦,٣ يوم والمغذاة على محلول سكرى ٢٥,٩٥ يوم، ومحلول سكرى + خميرة بيرة ٢٥,٥٥ يوم، محلول سكرى + خميرة بيرة + بروتين ٢٦,٤ يوم، ولم تظهر فروق معنوية في حالات التغذية الثلاث الأخيرة ومن هذا يتضح أن الحشرة اليافعة تحتاج أساساً إلى مصدر كربوهيدرات في تغذيتها وليس لاضافة البروتين أو الفيتامينات تأثير على إطالة عمر الحشرة. ويتأثر طول عمر الحشرة اليافعة بدرجات الحرارة السائدة فتتقصر فترة حياتها في أجيال الصيف وتطول في أجيال الخريف والشتاء.

هذا والإناث المغذاة على ماء فقط وضعت ٦,٢ بيضة، وعلى المحلول السكرى ٩٥,٨ بيضة، وعلى محلول سكرى + خميرة بيرة ١٦٨,٢ بيضة، وعلى محلول سكرى + خميرة بيرة + بروتين ١٨١,٢ بيضة، ويتضح من هذا أن للخميرة والبروتين تأثير على وضع البيض، ويتبين كذلك أن غذاء الحشرات اليافعة في الطبيعة الذي يتكون من الندوة العسلية للمن والحشرات القشرية ورحيق الأزهار وإفرازات الثمار المتعفنة للفاكهة المختلفة المتساقطة تتوافر



فيه نسب متفاوتة من الكربوهيدرات والفيتامينات مما يدعم الاعتقاد بارتفاع الكفاءة التناسلية للأنثى في الطبيعة وللحرارة تأثير على وضع البيض فتضع الأنثى نحو ١٢٤,٩ بيضة تحت درجة ٣١ م بينما وضعت ١٦٨,٢ بيضة تحت درجة ٢٦,٥ م ويرجع ذلك إلى طول فترة وضع البيض للأنثى تحت درجة الحرارة الأخيرة، ولم يظهر تأثير لنسبة وجود الزيت في الثمار التي تتغذى عليها اليرقات على الكفاءة التناسلية للأنثى التي تنتج منها.


ويفقس البيض بعد نحو ٦٩ ساعة تحت درجة ٢٤,٥ م، ٣٨ ساعة تحت درجة ٢٦,٥ م، ٢٨٨ ساعة تحت درجة ٣١ م:

ويبلغ طول مدة طورى البيضة واليرقة معا نحو ١٣,٥ يوم، ٩,٣ يوم، ٨,٢ يوم تحت درجات حرارة ٢٤,٥ م، ٢٦,٥ م، ٣١ م على التوالي.

وتعذر اليرقات داخل أو خارج الثمار، وقد اتضح أن العامل المتحكم في ذلك هو المنافسة بين اليرقات داخل الثمرة. فعندما يكثر عددها داخل الثمرة الواحدة فإنها جميعا تترك الثمرة لتكوين العذراء خارجها بينما إذا كان العدد لا يزيد عن ثلاثة فإنها تكون العذارى داخل الثمار تحت القشرة الخارجية للثمرة مباشرة بعد تهيئة الفتحة المناسبة لخروج الحشرة اليافعة من الثمرة. كما أن تكرار الإصابة في نفس الثمرة يؤدي بالتالى إلى استهلاك الثمرة وفسادها بحيث لا تكون صالحة للتغذية بداخلها. وتعذر اليرقات في التربة على أعماق من ٢ - ٤ سم في التربة الجافة وعلى عمق ١ - ٢ سم في التربة المبتلة.

وتتأثر فترة طور العذراء بدرجات الحرارة فتقصر بارتفاع درجات الحرارة حيث تبلغ نحو ١٥,٢، ١٠,١، ٩,٦ يوم عند درجات الحرارة ٢٤,٥ م، ٢٦,٥ م، ٣١ م على التوالي.

ولهذه الحشرة ٥ أجيال متداخلة خلال موسم الزيتون حيث تبدأ الإصابة في أوائل شهر يوليو، وتنتج الحشرة جيلين حتى منتصف أغسطس والجيل الثالث يظهر في منتصف سبتمبر والرابع في منتصف أكتوبر والخامس في نهاية نوفمبر. وتمضى الحشرات اليافعة لهذا الجيل فترة الشتاء على هيئة حشرات يافعة تتميز بطول عمرها بسبب انخفاض درجة الحرارة في الخريف والشتاء وتعيش في الحقول حتى ظهور ثمار الزيتون الجديد ووصوله إلى الحجم المناسب للإصابة لتبدأ عملية وضع البيض.



(شكل ٢٢٥) ذبابة ثمار الزيتون أ - الذكر ٢ - الأنثى ٣ - اليرقة ٤ - عذراء ٥ - ثمار زيتون مصابة بيرقة ثمار الزيتون

وتوجد الحشرة على مدار السنة في منطقتي برج العرب والنوبارية غير أن كثافتها تختلف باختلاف الأشهر حيث توجد بأعداد كبيرة في نهاية شهر سبتمبر ومنتصف أكتوبر، وكذلك فإن الفترة ما بين نهاية أغسطس حتى بداية سبتمبر التي تكونت فيها هذه الأعداد تشكل فترة حرجة ينبغي فيها المقاومة المكافحة للحد من أعداد هذه الآفة. وتبدأ أعداد الحشرة في التناقص بعد جمع محصول الزيتون وتغير الظروف البيئية حيث تتناقص درجات الحرارة إلى الحد غير الملائم لنشاطها وتسقط الأمطار وتزداد سرعة الرياح.

هذا وقد اتضح أن أعداد الحشرة في منطقة برج العرب الساحلية في مصر كانت أكثر منها في منطقة النوبارية الصحراوية، وترجع هذه الزيادة أساساً إلى ملاحة الظروف الجوية للحشرة في المنطقة الأولى عنها في المنطقة الثانية والتي تصل فيها درجة الحرارة القصوى صيفاً إلى ٤٥ م بينما تصل هذه الحرارة القصوى إلى نحو ٤٠ م في المنطقة الأولى. كما أن الرطوبة النسبية أكثر جفافاً في فترة الصيف بمنطقة النوبارية إذ تتراوح بين ٣٩ - ٥٠ ٪ بينما تصل في منطقة برج العرب في نفس الوقت إلى ٥٧ - ٧٠ ٪. هذا ومساحات الزيتون المنزرعة بمنطقة برج العرب يتصل بعضها ببعض على طول الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح مما يساعد على انتشار الإصابة.

وتبدأ الإصابة بسيطة عند بداية موسم الإصابة في شهر يوليو ثم تزداد تدريجياً حتى تصل إلى نحو ٣٥ ٪ عند جمع الثمار في منتصف أكتوبر وتختلف أصناف الزيتون في قابليتها للإصابة، فالأصناف الصغيرة الحجم مثل الشمالى والأصناف الأكثر صلابة مثل المشن هي أقل الأصناف قابلية للإصابة، بينما الأصناف الكبيرة الحجم من السفلالو والأصناف الأقل صلابة مثل الحامضى هي أكثر الأصناف قابلية للإصابة، أما في نهاية الموسم، فقد كانت الأصناف التي تحتوى ثمارها على نسبة عالية من الزيوت مثل الشمالى والمشن هي أقلها إصابة، ولذلك فإن من الأفضل زراعة الأصناف الصغيرة الحجم والأكثر صلابة والتي تزيد محوياتها من الزيت مثل صنفى الشمالى والمشن حيث أنها أقل قابلية للإصابة.

## طرق المكافحة

### أولاً: الطرق الزراعية

١ - حرث الأرض تحت أشجار الزيتون حرثاً عميقاً بعد جمع المحصول لتعريض البيرقات

والعذارى الموجودة في التربة للعوامل الجوية.

٢ - تنظيف الأرض من الحشائش وأكوام السماد العضوى.

٣ - جمع الزيتون الأخضر المتساقط على الأرض والتخلص منه بالحرق.

٤ - الإسراع في جمع الزيتون الذى قارب النضج وعصره في أقرب فرصة.

٥ - وضع شبكة من السلك الرفيع الضيق الفتحات على نوافذ معاصر الزيتون لمنع الذباب اليافع لهذه الحشرة من الدخول أو الخروج من المعاصر.

٦ - تنظيف المعاصر من جميع الفضلات وغسل الأحواض وسد جميع الثقوب الموجودة في المخازن والتي قد تلجأ إليها يرقات الذباب.

### المكافحة الكيميائية

تتصح وزارة الزراعة المصرية باتباع الآتى في مكافحة هذه الآفة.

الرش بأحد المبيدات التالية:

دايمثويت ٤٠ ٪ بنسبة ١,٥ فى الألف

أو أنتيوس ٣٣ ٪ بنسبة ٢ فى الألف

أو أكتك ٥٠ ٪ بنسبة ١,٥ فى الألف

ويبدأ الرش فى المناطق الشمالية من مصر فى الأسبوع الأول من شهر يولية ويكرر الرش بعد ٢١ يوما أما فى الفيوم فيبدأ الرش فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ويكرر بعد ٢١ يوما

## ١٣ - ذبابة فاكهة البحر الابيض المتوسط

الاسم العلمى للحشرة *Ceratitis capitata* Wiedemann

وهذه الحشرة تنتمى لنفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة، ولقد سبق لنا ذكرها ذكرها موسعا فيما سبق.

وهذه الآفة عالمية الانتشار، فهي توجد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقية وأستراليا وجنوب أمريكا وهاواي، وتصيب هذه الحشرة ١٨٠ نوعاً من العوائل النباتية منها الزيتون، وتختلف طباع وعادات هذه الحشرة عن غيرها من ذباب الفاكهة، فالأنثى تضع بيضها تحت قشرة الثمار الناضجة أو التي قرب نضجها، وتغتنى اليرقات على لب الثمرة، وتسقط الثمار المصابة على الأرض حيث تخرج منها اليرقات التامة النمو وتعذر في التربة. وتكافح هذه الآفة على الزيتون بنفس الطرق المتبعة في مكافحة ذبابة ثمار الزيتون.

## ١٤ - هاموش أورام الزيتون

الاسم العلمي للحشرة *Dasyneura olea* F.

رتبة الحشرات ثنائية الأجنحة Order Diptera

فصيلة الهاموش Fam. Chironomidae

ويصيب هذا النوع من الهاموش أشجار الزيتون في لبنان وله أهمية إقتصادية خاصة.

### دورة الحياة

تضع الإناث بيضها على أوراق الزيتون الصغيرة، ويفقس البيض بعد ٣ - ٤ أيام وتخرج منه اليرقات وتبدأ في إمتصاص عصارة الأوراق مسببة تهيجا في أنسجة الورقة حيث تنتفخ هذه الأنسجة، وبعد ١٢ - ١٥ يوما تتحول هذه الإنتفاخات إلى أورام تحيط باليرقة، وتعذر اليرقة داخل الأورام وتظهر الحشرات اليافعة للجيل الثاني في بداية شهر مايو، وتخرج حشرات الجيل الثالث في بداية يونية، وفي حالة الظروف المناخية المناسبة يتكون لهذه الحشرة جيل رابع، وقد يظهر على الورقة الواحدة خمسة أورام كل ورم منها يحتوى على يرقة واحدة.

## طرق مكافحة

يمكن رش الأشجار المصابة بمبيد الملاثيون ٥٧ % بمعدل ٢٠٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء، ويمكن إجراء الرش ثلاث مرات بين الرشة والأخرى ١٠ - ١٥ يوما

## ١٥- تربس الزيتون

الاسم العلمى للحشرة *Liothrips oleae costa*

رتبة الحشرات هذبية الأجنحة order thysanoptera

فصيلة Fam. Thripidae

ويهاجم هذا التربس أوراق الزيتون ويمتص العصارة منها، وفي حالة الإصابة الشديدة تذبل الأوراق وتجف وتسقط وليس لهذه الآفة طريقة خاصة للمكافحة، ولكن المكافحة الكيميائية التى تجرى على آفات الزيتون الأخرى تفيد فى مكافحته (شكل ٢٢٦).



(شكل ٢٢٦) ١- تريس الزيتون ٢- مظهر الإصابة بتريس الزيتون

## الآفات الحشرية التي تصيب المانجو

تزرع المانجو في العديد من أقطار العالم العربي مثل مصر والسودان والصومال، وفي مصر تحتل المانجو المرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة بها بعد الموالح (تزرع في نحو ٤٥٤٠٤ فداناً)، وهي تعطى عائداً كبيراً للمزارع وتسوق محلياً وتصدر للخارج وتقوم عليها صناعة التعليب والحفظ.

وتتعرض أشجار المانجو للإصابة بالكثير من الآفات الحشرية التي تسبب لها أضراراً بالغة إذا لم تواجه ببرنامج مدروس للمكافحة. وسوف نستعرض هنا أهم هذه الآفات.

### ١ - حشرة المانجو القشرية الرخوة

الاسم العلمي للحشرة (*Kilifia acuminata* (Sign)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

تنتشر هذه الحشرة في مناطق زراعة المانجو في العديد من أقطار العالم، وهي حشرة متعددة العوائل تهاجم الكثير من أنواع الأشجار، فهي تصيب المانجو والياسمين والتفاح والكمثرى وغيرهما وقد ذكر أنها موجودة في جرينادا وبريانوس وبومينكا وأنجوا وترينداد وجاميكا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.



تتوالد هذه الحشرة توالد بكريا ولم يشاهد لها ذكور في مصر ولهذه الحشرة جيلان في العام، جيل في الربيع وآخر في الخريف وهو أقوى الجيلين، ومدة جيل الربيع تصل إلى ٧ شهور ومدة جيل الخريف ٧ - ٧,٥ شهرا.

### وصف الحشرة

الحشرة القشرية اليافعة ذات لون أخضر فاتح، وشكلها بيضاوي مطاول، مدبب في مقدمتها عريضة في مؤخرتها، مستديرة في مؤخرتها، ويبلغ طولها ٢,٦ مم وعرضها ١,٩ مم (شكل ٢٢٧) والأنثى اليافعة لها عين جانبية صغيرة وقرن استشعار قصير وثلاثة أزواج من الأرجل، وتضع الأنثى البيض داخل جسمها (أسفل الجزء الخلفي من الجسم) وتحتفظ به هكذا حتى يفقس (شكل ٢٢٨).

### دورة الحياة

بعد فقس البيض، تخرج الحوريات الزاحفة خارج قشرة الأم، ولكن هذه الحوريات تبقى قبل ذلك وفور خروجها من البيض تحت قشرة الأم لمدة ٣ - ٤ أيام نون إغتناء لحماية نفسها، وبعد هذه المدة ترفع الحشرة الأم نهايتها الخلفية لتسمح للحوريات بترك قشرة الأم والتحرك بعيدا عنها.

والحورية الزاحفة بيضاوية الشكل مطاولة ولونها أخضر فاتح ويبلغ طولها ٣٢٤ ميكرونا وعرضها ٢٠٢ ميكرونا (السيد علوان ١٩٩٠).

وتفضل الحوريات الزاحفة أن تستقر فوق الأسطح السفلى لأوراق المانجو وعلى طول العرق الوسطى والعروق الجانبية للورقة فضلا عن حواف الورقة، وبمجرد إستقرار الحورية (بعد ٣ - ٤ ساعات من خروجها تحت قشرة الأم) تبدأ في غرز أجزاء فمها في أنسجة النبات وتقوم بامتصاص العصارة والإغتناء عليها، وبعد مرور يوم واحد يصبح جسمها ملتصقا بشدة بسطح الورقة السفلى (شكل ٢٢٩).

ويستمر الحوريات المستقرة فوق سطح الورقة السفلى في الإغتناء ويصبح لونها أغمق عن ذي قبل ثم تتسلخ الحورية للمرة الأولى، ويحدث الانسلاخ من خلال خط شق في الجلد في

مقدمة الجسم ويبقى جلد الإنسلاخ معلقاً في نهاية الجسم لأيام قليلة وحوريات العمر الأول بيضاوية عريضة لونها أخضر فاتح، ويصل طولها إلى ٦٨٨ ميكرونا وعرضها ٤٧٠ ميكرونا، وبعد تمام الإنسلاخ تترك الحورية موقعها الإغتناثي على الورقة وتتحرك بحثاً عن موقع إغتناثي آخر مناسب، وفي أحوال قليلة تبقى بعض الحوريات في موقعها الأول.



(شكل ٢٢٧) حشرة المانجو القشرية الرخوة قبل أن تكون كيس البيض

وبعد استقرار الحورية تأخذ في الإغتناث وتصبح أشد التصاقاً بسطح الورقة ثم تنسلخ للمرة الثانية (شكل ٢٣٠)، لعمر الحورية الثاني أرجل وعيون وقرون استشعار، وهي بيضاوية

الشكل، عريضة عند مؤخرتها ومدمبة عند مقدمتها وطولها ١١٤٢ ميكرونا وعرضها ٧٢٢ ميكرونا. ويبلغ طول عمر الحورية الأول من ٢٢ - ٢٧ يوما ويبلغ طول عمر الحورية الثاني من ٢١ - ٢٤ يوما، وقد يصل إلى ٨٨ يوما في جيل الشتاء (من سبتمبر حتى إبريل) وبعد الإنسلاخ الثاني تستمر الحورية في الإغذاء حتى تصل إلى مرحلة الأنثى اليافعة التامة النضج، وطول مدة ما قبل وضع البيض تصل إلى ٣٣ - ٣٧ يوما (في جيل الربيع والصيف) بينما وصل طول هذه المدة إلى ١٠٩ يوما في جيل الخريف والشتاء، وتعيش الأنثى اليافعة نحو ١٤٨ يوما في جيل الصيف، ١٨٥ يوما في جيل الخريف والشتاء.



(شكل ٢٢٨) أ - أنثى حشرة المانجو القشرية الرخوة وقد وضعت بيضا أسفل الجزء الخلفي العريض من جسمها - ب - أغلفة البيض البيضاء تبدو من تحت سطح الجزء الخلفي لجسم الأنثى

### مظهر الإصابة والضرر

تفرز هذه الحشرة كميات كبيرة من المادة العسلية حول قشورها على أوراق المانجو، حيث


نشاهده هذه الأوراق وهي مغطاة بطبقة كثيفة من العفن الأسود، ويلتصق بها الأتربة فتعطل الوظائف الحيوية للورقة، وقد تتساقط قطرات المادة العسلية فوق الثمار فتتعرض لنمو العفن الأسود عليها الذي يشوه منظرها ويجعل تسويقها أمرا صعبا.

### طرق المكافحة

سنتعرض له فيما بعد



(شكل ٢٢٩) العمر الأول للحورية ملتصقا بشدة بسطح الورقة السفلى



(شكل ٢٣٠) العمر الثانى لحورية قشرة المانجو القشرية الرخوة ويظهر به جلد الإنسلاخ

## ٢ - حشرة المانجو المحارية

الاسم العلمى للحشرة *Inulaspis pallidula* (Green)

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية المدرعة Fam. Diaspididae

تنتشر هذه الحشرة فى جميع مناطق زراعة المانجو فى العالم، وهى تصيب العديد من العوائل النباتية الأخرى.

## وصف الحشرة

تفرز الحشرة اليافعة الأنثى الشمع الذى يمتد للخلف ليكون قشرة مطاولة، ويبلغ طول القشرة المكتملة ٢,٧ مم، ٥٨ مم عرضاً، ويصبح لون الطبقة الشمعية بنياً فاتحاً، وهذه القشرة الشمعية لينة شفافة ولذلك يمكن رؤية جسم الأنثى من تحت هذه القشرة الشفافة (شكل ٢٣١)، ويهد إزالة القشرة يبدو جسم الأنثى أبيض اللون مطاولاً فى شكله، ويبلغ جسم الأنثى ١,٥ مم وعرضها ٣٦ مم، وفى حالة قشرة الذكر فهى أقل طولاً وأضيق من قشرة الأنثى ويبلغ طولها ١,٢٦ مم وعرضها ٣٥ مم، ولون القشرة الشمعية للذكر رمادى فاتح (شكل ٢٣٢).



(شكل ٢٣١) الأنثى اليافعة لحشرة المانجو المحارية



(شكل ٢٣٢) الذكر يافع لحشرة المانجو المحارية

## دورة الحياة

بعد الإنسلاخ الثالث لحورية الذكر، تتحول إلى ذكر يافع يستطيع الخروج زحفاً من تحت القشرة، بينما تظل الأنثى ثابتة في مكانها لتكمل دورة حياتها وتضع البيض، وتخرج الذكور عادة من تحت القشرة أثناء الليل لعدم قدرتها على تحمل أشعة الشمس وحرارة الجو نهاراً، يطير الذكر بجناحيه باحثاً عن الأنثى البالغة فإذا وجدها يقوم بتلقيحها بألة السقاد من تحت قشرتها، ويستطيع الذكر الواحد تلقيح أكثر من أنثى، وبعد تلقيح الأنثى تكف عن إفراز الشمع وتتفرغ لوضع البيض، وتضعه الأنثى تحت قشرتها، والبيضة بيضاوية الشكل مطاولة طولها ٢٠٦ ميكرون وعرضها ١٠٨ ميكرون، ولونها أبيض مصفر، وقشرة البيضة ملساء نون أى تعاريج.

يفقس البيض وتخرج منه الحوريات الزاحفة التي تترك قشرة الأم وتتحرك لتتخذ مواقع

على أوراق النبات العائل وأقصر فترة لحضانة البيض هي ١٩ يوما وذلك للبيض الذي يوضع في شهرى يولية وأغسطس، وأطول فترة حضانة هي للبيض الذي يوضع في فصل الشتاء (٣٧ يوما).

والحوريات الزاحفة يكون لونها أبيضاً فور الفقس وشكلها بيضاوى مطاول ويبلغ طولها ٢٤٧ ميكرونا وعرضها ١٢٥ ميكرونا ولها أعين وقرون إستشعار وأرجل، وبعد الفقس تظل الحوريات موجودة تحت غطاء الأم لمدة يوم ثم بعدئذ تزحف خارجة من تحت قشرة الأم وتحرك فوق عائلها لتختار المكان المناسب لإستقرارها وتستغرق هذه العملية نحو ٢٤ ساعة، وبعد إستقرار الحوريات تغرز أجزاء فمها في أنسجة العائل وتشرع في الإغتذاء على العصارة النباتية، ثم ماتلبث أن تسحب فرون الإستشعار والأرجل تحت جسمها وتبدأ في إفراز الشمع لتكون قنيسوه بيضاء في خلال ٢ - ٣ أيام وهذه القنيسوة نصف كروية ويبلغ قطرها ٣٣٠ ميكرونا.

ولحورية الأنثى عمريين إثنين بينما تمر حورية الذكر بأربعة أعمار قبل وصولها للطور اليافع، والمدة التى تستغرقها حورية الأنثى حتى تصل إلى الطور اليافع هي ٧ أيام بالنسبة لعمر الحورية الأول، ٥، ٧ يوما بالنسبة للعمر الثانى وذلك خلال فصل الصيف.

أما المدة التى تستغرقها حرية الذكر حتى تصل إلى الطور اليافع فهي ٦ ثم ٥، ٥ ثم ١، ٥ ثم ٦ يوما على التوالي لكل عمر من الأعمار الأربعة من الأولى حتى الرابع وذلك خلال فصل الصيف، وتطول هذه المدة عن ذلك خلال فصل الشتاء.

وتبلغ فترة ما قبل وضع البيض للأنثى ٨ أيام صيفا، ٢٤ يوما شتاء، وتستمر الأنثى في وضع البيض لمدة ٣٢ يوما في نهاية شهر مارس وتطول هذه المدة إلى ١٢٨ يوما في منتصف شهر نوفمبر، وتضع الأنثى الواحدة نحو ١٢٦ بيضة.

### مظهر الإصابة والضرر

تصيب هذه الحشرة أوراق المانجو ونمواتها الحديثة وكذلك الثمار، وتزداد الإصابة في وسط الشجرة وجزؤها السفلى أكثر من جزؤها العلوى، وتمتص هذه الحشرة العصارة النباتية وعند زيادة الإصابة تجف الأوراق والنموات الحديثة وتتشوه الثمار، ويقل حجمها عن الحجم المألوف.



## طرق مكافحة

يوجد في البيئة العديد من الأعداء الطبيعية الحيوية للحشرة من مفترسات مثل حشرات أبى العبد ويرقات أسود المن، وهذه المفترسات كانت في السابق ذات فعالية في كسر حدة الإصابة بحشرات المانجو القشرية، ولكن بعد إستعمال المبيدات الكيماوية هلك الكثير من هذه الأعداء الحيوية وزاد ذلك من ظهور هذه الآفات مما يستلزم الحد من المكافحة الكيميائية.

وتوصى وزارة الزراعة المصرية بمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي التي تصيب أشجار المانجو بالرش بأحد الزيوت المعدنية بتركيز ٢ ٪ مضافا إليه مبيد ملايين ٥٧ ٪ تركيز ١,٥ في الألف ويبدأ موسم العلاج في النصف الثاني من أكتوبر ويمكن أن يكون الخلط بنسبة ٢ لتر زيت إلى ١٥٠ سم ملايين يضاف إليها ١٠٠ لتر ماء.

### ٣ - الحشرات القشرية السوداء

الاسم العلمي للحشرة *Chrysomphalus ficus* Raily

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Orde Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية المدرعة Fam. Diaspididae

سبق لنا وصف هذه الحشرة وكل مايتعلق بها بالتفصيل عند ذكر آفات الموالح.

وهذه الحشرة تصيب أوراق وثمار المانجو وتمتص عصارتها وتشوه شكل الثمار وتقل أحجامها، والإصابة الشديدة تتسبب في تساقط الثمار قبل نضجها.

## طرق مكافحة

سبق ذكرها في الحشرة السابقة.

### ٤ - الحشرة القشرية الحمراء

الاسم العلمي للحشرة *Aonidiella aurantii* Mask

وتتنمى لنفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة وتصيب أوراق وثمار المانجو وتمكافح بنفس الطريقة.

## ٥- بق الموالح الدقيقى

الاسم العلمى للحشرة *Pseudococcus citri* Risso

فصيلة البق الدقيقى Fam. Pseudococcidae

وتتنمى لرتبة الحشرات متشابهة الأجنحة، ولقد سبق لنا تناوله بالتفصيل فى أكثر من موضع

ويصيب هذا البق فروع أشجار المانجو وأوراقها، ويفرز الندوة العسلية التى ينمو عليها الفطر الأسود

ويكافح بنفس الطريقة التى ذكرت فى مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقى.

## ٦- ثاقبة الأفرع الكبرى *Sinoxylon sudanicum* Lesne

سبق تناول هذه لحشرة بالتفصيل عند ذكر أنثا التينوهى تحفر فى أفرع أشجار المانجو وتتلغ منطقة الكامبيوم فتموت الأفرع وتكافح كما سبق أن ذكرنا

## ٧- ذبابة ثمار البحر الأبيض المتوسط

أو ذبابة الفاكهة *Ceratitis cepitata* Wied

وهذه الحشرة تنتمى لرتبة ثنائية الأجنحة Diptera وفصيلة ذباب الفاكهة Tephritidae

وسبق لنا تناولها بالتفصيل فى مواضع أخرى

وهذه الحشرة تصيب ثمار المانجو فى نهاية الموسم، وينتج عن ذلك تعفن لب الثمرة ودخول العفن الأسود إليه.

## طرق مكافحة

توصى وزارة الزراعة المصرية برش أشجار المانجو في أواخر شهر يولية وأوائل شهر أغسطس مرتين بينهما ٢ أسابيع في المناطق التي تتعرض فيها ثمار المانجو للإصابة بذبابة الفاكهة، ويستعمل للرش مبيد دايمثويت ٤٠ ٪ بنسبة ٥٧ سم لكل ١٠٠ لتر ماء.

## الآفات الحشرية التي تصيب أشجار القشطة Castard-apple

تزرع القشطة في بعض البلاد العربية ذات الجو الحار ولها أسماء محلية عديدة اخترنا منها هذا الاسم المعروفة به في مصر واليمن وأردفنا به الاسم الإنجليزي لها وذلك لعدم شيوع هذه الفاكهة - وتصاب أشجار القشطة بالعديد من الآفات الحشرية سبق لنا أن ذكرنا أنها تصيب أشجار فاكهة أخرى، ولذلك نوجز هنا في سرد هذه الحشرات وهي:

١ - البق الدقيقى المصرى (*Icerya acgyptiaca* (D.)

٢ - بق الهيسكس الدقيقى (*Moconellococcus hirsutus* (G.)

وهما تابعان لرتبة متشابهة الأجنحة Homoptera

والأول تابع لفصيلة الحشرات القشرية الماردة Fam. Margardidea

والثانى يتبع فصيلة الحشرات القشرية الرخوة Fam. CoccidaE

هذا والبق الدقيقى المصرى يصيب أوراق القشدة ويتجمع حول العرق الوسطى للورقة، ولهذه الحشرة جيلان جيل الربيع من مارس حتى نهاية مايو، جيل الخريف من يونية حتى نهاية سبتمبر.

وإذا إشتدت الإصابة به تجف الأوراق وتذبل وتتبقع ببقع بنية ماتلبث أن تنتشر على سطح الورقة التي تجف وتسقط، وهذا يؤثر على المحصول.

أما بق الهيسكس الدقيقى فيصيب ثمار القشدة ويمتص منها العصارة، ويفرز إفرازات سكرية ينمو عليها الفطر الأسود الذى يشوه الثمرة، والثمار المصابة لاتبلغ حجمها الطبيعى ويتأثر طعمها وصفاتها من جراء الإصابة.

## طرق المكافحة

لمكافحة حشرات البق الدقيقى على القشدة يجرى الآتى:

- ١ - تقلم أطراف الأفرع المصابة وتحرق
- ٢ - رش الأشجار في نهاية فصل الشتاء بأحد الزيوت المعدنية بنسبة ٢ ٪ مضافا إليه الملاثيون تركيز ١,٥ في الألف.
- ٣ - عندما تصل الثمار إلى حجمها الطبيعي ترش الأشجار بالدايمثيويوت بنسبة ١,٢٥ في الألف.
- ٤ - عدم زراعة العوائل المعتادة للحشرة مثل الجوافة والتوت والنبق مجاورة لأشجار القشدة.
- ٥ - من الأعداء الطبيعية النشطة لحشرة بق العبسكس الدقيقى طفيل من غشائية الأجنحة يعرف باسم *Heptowastix phenococci* ومفترس من غمدية الأجنحة هو *Cryptolaemus mon-trouzieri*

### ٣- حشرة التين الفجانية

*Asterolecanium Pustuians Cock*

سبق لنا أن تناولنا هذه الحشرة بالتفصيل في آفات التين، وهي تصيب جنوع وفروع أشجار القشدة، وينشأ عن الإصابة تهيجا في أنسجة النبات المصاب يؤدي إلى حدوث تجايف صغيرة مرتفعة الحواف تعيش داخلها الحشرات، ومن هنا جاء تسميتها بالفجانية بسبب الشكل الفجاني لهذه التجايف - وهذه الحشرة جيلان في العام الأولى يبدأ في أكتوبر وينتهي في شهر مايو، والثاني يبدأ ظهوره في شهر يونية وينتهي في شهر أكتوبر.

#### طرق المكافحة

تكافح هذه الحشرة كيميائيا كما في الحشرات القشرية والبق الدقيقى.

## الآفات الحشرية التي تصيب الرمان

يزرع الرمان في جميع بلاد العرب، وهو من الفاكهة المشهورة التي يقبل عليها الناس في كل مكان، وزاد من تقدير الناس لهذه الفاكهة ذكرها في القرآن الكريم على أنها من معجزات الله وأية من آياته، ويصاب الرمان بالكثير من الآفات نذكر منها مايلي:

### ١ - من الرمان أو من الدورانتا

الاسم العلمي للحشرة *Aphis durantae* Theobald

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة المن Fam. Aphididae

#### وصف الحشرة

حشرات صغيرة الحجم خضراء اللون، توجد طول العام على الأسطح العلوية لأوراق نبات النورانتا، وفي بداية الصيف تتكون من هذا المن أفراد مجنحة تنتقل إلى أشجار الرمان عند خروج نمواتها الجديدة وبراعمها الزهرية فتصيبها، وتمتص الحشرات عصارة النبات بغزارة وتفرز الندوة العسلية على أسطح أوراق العائل فينمو عليها العفن الأسود، وتحول البراعم الخضرية والزهرية المصابة إلى اللون الأسود وتجف وتموت ولا تتكون الثمار، هذا وينتشر هذا المن في المملكة العربية السعودية ويصيب أوراق الرمان بشدة

#### طرق المكافحة

في حالة الإصابة الشديدة ترش الأشجار بمبيد الملاثيون ٥٧ % بنسبة ١,٥ في الألف. ويعتبر هذا علاجاً مشتركاً لمن الرمان وذبابه الرمان البيضاء، كذلك يمكن إستعمال مبيد بريمر ٥٠ % بنسبة في ٢,٧٥ الألف لنفس الغرض.

مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

<https://scholar.google.com/citations?>

[user=t1aAacgAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=t1aAacgAAAAJ&hl=en)

[salamalhelali@yahoo.com](mailto:salamalhelali@yahoo.com)

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.facebook.com/groups/  
/Biothesis](https://www.facebook.com/groups/Biothesis)

[https://www.researchgate.net/profile/  
/Salam\\_Ewaid](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Ewaid)

07807137614



## ٢- ذبابة الرمان البيضاء

الاسم العلمى للحشرة *Siphoninus granati* prisoner & Hosny

رتبة الحشرات متشابة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الدباب الأبيض Fam. Aleyrodidae

تصيب هذه الحشرة أوراق الرمان خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ونشاهد حورياتها وعذارها ملتصقة بالسطح السفلى لأوراق الرمان، والعذراء رمادية اللون وعلى جانبها أهداب شمعية بيضاء، وتقسم حلقات البطن واضح.

وتسبب الإصابة بهذه الحشرة إصفرار الأوراق وتجعداها وسقوطها فى حالة الإصابة الشديدة، وينمو العفن الأسود على الإفرازات السكرية لهذه الحشرة فيسبب إسوداد الأوراق.

### طرق مكافحة

يتطفل على حوريات هذه الشبهة الطفيل *Encarsia parrenopea*

وتكافح هذه الحشرة كيماويا مع من الرمان كما سبق أن أسلفنا .

## ٣- أبو دقيق الرمان أو دودة ثمار الرمان

الاسم العلمى للحشرة *Virachola livia* Kling

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة ليكنيديه Fam. Lycacnidae





تصيب هذه الحشرة ثمار الرمان من مايو إلى سبتمبر والاكاسيا طول العام كما تصيب ثمار البلح من أغسطس إلى أكتوبر وتاكل اليرقة جزءا صغيرا من الثمرة، ولكن معظم الضرر ينشأ من الفطريات التى تنمو حول الثقب وكذلك من إنجذاب ذبابة البورسوفلا إليه وكذلك الحشرات الأخرى التى تنجذب إلى الثمار المتخمرة مثل يرقات خنفساء الثمار الجافة وخنفساء الثمار ذات البقعتين وتسقط الثمار المصابة ويضيع مايزيد عن نصف المحصول أو المحصول



كله، وتسمى هذه الحشرة فى المملكة العربية السعودية المسمار وتصيب هناك الرمان والتمور والسدر والسنت وتفضل الرمان وقرون السنت على التمر.

### وصف الحشرة اليافعة (أبو دقيق)

لون السطح العلوى للأجنحة بنفسجى مشوب بحمرة فى حالة الأنثى وقاعدة الجناح لونها بنفسجى، أما فى الذكر فلون السطح العلوى للجناح يكون برتقاليا والحافة الأمامية لونها بنى، ولون السطح السفلى للأجنحة فى كلا الجنسين رمادى ويبلغ طول أبى دقيق الرمان نحو ١ سم، وعرضه ٢,٥ سم عند فرد الجناحين



(شكل ٢٣٣). عذراء من السطح الظهري - الحشرة أطوار نودة ثمار الرمان

١- الحشرة اليافعة (نكر) ب- البيضة ج- الحشرة اليافعة (أنثى) د - عذراء من السطح السفلى

## دورة الحياة

ليس لهذه الحشرة بيات شتوى إذ توجد أطوارها طول السنة في قرون أشجار الأكاسيا، ولكن تظهر في الربيع بكثرة، وتبدأ الأنثى في وضع البيض بعد خروجها من طور العذراء بثلاثة أيام، ويوضع البيض فرديا على قشرة ثمار الرمان وغالباً ما يوضع على السطح الداخلى للكؤس ونادراً ما يوضع على الأوراق والأفرع والأزهار، يفقس البيض بعد ٣ أيام وتخرج منه اليرقات التي تتجول قليلاً على سطح الثمار ثم تثقبه وتنفذ داخل الثمرة وتغتنى على البنور وتلف الكثير منها، تنسلخ اليرقة ثلاثة إنسلاخات ويبلغ طولها عند تمام نموها ١٥ - ٢٠ مم، ويكون لون اليرقة بعد الفقس مباشرة أخضر والرأس أسود ويكون جسمها مفلطح قليلاً ولكنه مدبب الطرفين، ومدة الطور اليرقة نحو أسبوعين صيفاً ونحو شهر ونصف شتاءً تتحول اليرقة بعدها إلى عذراء، ومدة طور العذراء نحو أسبوعين في الصيف ونحو شهر في الشتاء تتحول بعدها العذراء إلى حشرة يافعة (شكل ٢٣٣).

## مظهر الإصابة والضرر

تختلف المواقع التي تختارها الأنثى لوضع بيضها باختلاف حجم الثمرة، حيث يوضع البيض داخل كأس الثمرة الصغيرة الحجم أو حوله من الخارج، أما إذا نمت الثمرة وكبر حجمها فإن الحشرة تضع معظم البيض على السطح الخارجى للثمرة، وبعد الفقس تنفذ اليرقات إلى داخل الثمار وتصل إلى البنور وتغتنى عليها ولكنها لا تستطيع الإغتناء على جلد الثمرة لاحتوائه على حمص الجالاتونيك ولذلك تدفع فتات الجلد أثناء حفرها للثقب إلى الخارج وتغتنى اليرقات على الطبقة اللحمية للبنور ثم على البنور نفسها قبل تصلبها، ولكن إذا نضجت البنور وتصلبت لا تغتنى اليرقة إلا على الطبقة الخارجية اللحمية العصيرية فقط، ويمكن لليرقة الواحدة أن تغتنى على أكثر من بذرة واحدة كما تستطيع الانتقال من ثمرة إلى ثمرة، ولكن كما سبق أن ذكرنا فإن الضرر الذي يحيق بالثمرة يرجع إلى مهاجمة الفطريات والخمائر لموضع الثقب ودخولها إلى الثمرة الذي يتقحم لونه ويسود ثم تتبع ذلك تخمر الثمرة وإصابتها بخنافس الثمار وذبابة النورسوفلا فتتشقق الثمرة المصابة وتسقط.

## طرق المكافحة

### أولا المكافحة الزراعية:

١ - إزالة أشجار الأكاسيا من مزارع الرمان أو التخلص من قرونها الخضراء.

٢ - يلجأ البعض لحماية الثمار من الإصابة بوضع أكياس من الورق الشفاف أو البولي إيثيلين المثقب حول الثمار، إلا أن هذه الطريقة لها عيوبها فهي تمنع تلون الثمار مع صغر حجمها عن الحجم الطبيعي وزيادة حموضتها، وكذلك يلزم تغيير الأكياس التي تتمزق بين حين وآخر، وقبل وضع الكيس حول الثمرة فإنه لابد من مسح قشرة الثمرة لإزالة ما يكون عليها من بيض

### ثانياً المكافحة الحيوية

يتطفل على عذارى هذه الحشرة الطفيل *Barchimeria brevicornis* من رتبة غشائية الأجنحة والطفيل *Eurytoma sp.*

### ثالثاً المكافحة الكيميائية:

ترش الأشجار في حالة الإصابة بأي من المبيدات التالية:

مسحوق السيفين ٨٥ ٪ بمعدل ١٥٠ مم لكل ١٠٠ لتر ماء

أو جاريونا ٧٠ ٪ بمعدل ١٢٥ سم لكل ١٠٠ لتر ماء

أو مسحوق جاريونا ٥٠ ٪ القابل للبلل بمعدل ٢٠٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء

ويبدأ الرش في أواخر شهر مايو، وتجرى عملية الرش أربع مرات بين كل رشة والأخرى ثلاثة أسابيع.

## آفات أخرى تصيب الرمان

يصاب الرمان بآفات حشرية أخرى منها ذبابة الموالح البيضاء والحشرة القشرية السوداء وبق الموالح الدقيقى وحفار ساق التفاح وقد ذكر الكثير عن هذه الآفات في مواضع سابقة - وإذا استدعى الأمر علاج هذه الآفات فيتبع في علاجها ما سبق لنا ذكره في مكافحة هذه الآفات على أشجار الفاكهة الأخرى.

## الآفات الحشرية التي تصيب الأشجار الخشبية وأشجار الغابات

## الآفات الحشرية التي تصيب الأشجار الخشبية وأشجار الغابات

يحتاج العالم العربي إلى كميات كبيرة من الأخشاب يستورد معظمها من الخارج - وتتزايد الحاجة إلى الأخشاب بتزايد حركة العمران، وتزدح في البلاد العربية العديد من الأشجار الخشبية في مساحات محدودة، وإن كانت الغابات توجد في بعض المناطق مثل الغابات الإستوائية في جتوب السودان وغابات البلوط في جبال أطلس في الجزائر والمغرب وأحراش العراق وجبل لبنان.

وفي السنوات الأخيرة تنبّهت بعض الأقطار العربية مثل ليبيا إلى خطورة ظاهرة التسحر، وشرعت في زراعة الأشجار في شكل مصدات للرياح والرمال حول المدن وفي أماكن عديدة من الصحراء، ولاشك أن ذلك سوف يفيد في تثبيت التربة ومنع طغيان الرمال المتحركة على الأراضي الزراعية بما يعرف بظاهرة التسحر، كما سوف يؤدي إلى تحسين الطقس حول الأماكن المزروعة بالغابات وقيام صناعات إقتصادية قيمة على الأشجار.

وتصاب الأشجار الخشبية بالعديد من الآفات الحشرية الخطيرة أهمها ناخرات الجنور والجزع والأفرع وخنافس القلف فضلا عن الحشرات التي تصيب الأوراق والحشرات القشرية وأنواع المن وغيرها.

وسوف نتناول هنا هذه الآفات وفق تنظيم يسهل به تتبعها والاستفادة من شرحنا لها.

### أولاً: الآفات الحشرية التي تصيب المجموع الخضرى للأشجار الخشبية والأوراق

يصاب المجموع الخضرى للأشجار الخشبية وأشجار الغابات بآفات عديدة، منها ما هو

شديد الخطورة، إذا ما إشتدت الإصابة بها قد تجرد الأشجار تماما من أوراقها، لذلك يجب الاهتمام برصد هذه الآفات الحشرية وإجراء الدراسات اللازمة للسيطرة عليها مع تجنب تلوث البيئة أو الإضرار بالحياة البرية، وسنورد هنا أهم هذه الآفات وطرق مكافحتها.

## ١ - الفراشة الغجرية The gypsy moth

الاسم العلمى للحشرة (*Lymantria dispar* (L.)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة ليمانترييدي Fam. Lymantriidae

تعتبر هذه الحشرة من أخطر الآفات التى تصيب أشجار الفاكهة والظل والأشجار الخشبية والغابات، وتوجد هذه الحشرة فى مناطق كثيرة من العالم منها جميع أقطار أوروبا وشمال إفريقيا وسوريا ولبنان وبلاد الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية، وهذه الآفة من الحشرات الجياشة army insects التى تتحرك يرقاتها من موقع إلى آخر فى شكل جيوش كثيفة لاتبقى ولاتنثر، وغابات أشجار البلوط والصنوبر أكثر الأشجار الخشبية تضررا من الإصابة، إذ قد تجرد يرقات هذه الحشرة الأشجار من أوراقها تماما.

وفراشات هذه الحشرة متوسطة الحجم تشبه فراشات فصيلة Noctuidae وتختلف عنها فى عدم وجود العيون البسيطة وفى كون الخلية القاعدية الصغيرة فى الجناح الخلفى أكثر ولون أجنحة الأنثى أبيض تتخلله علامات سمراء ويطننها عريضة وفى نهايتها خصلة من الشعر وطول الأجنحة عند فردها ٥ سم والأنثى لاتطير ولون الذكر بنى وعليه علامات صفراء وطول أجنحته عند فردها ٧,٥ سم وهو يطير نهارا.

واليرقات مغطاة بشعر كثيف لامع - يسبب تهيج جلد الإنسان عند إمساكه باليرقات.

## دورة الحياة

تقضى الحشرة فصل الشتاء وهى فى طور البيضة التى تضعها فراشات الجيل الثانى فى شقوق قلف الأشجار، وفى شهر مايو، يفقس البيض عن يرقات صغيرة تصل إلى تمام نموها فى شهر يوليو ومدة الطور اليرقى ستة أسابيع ثم تتحول إلى عذراء تخرج منها الفراشات فى شهر يوليو وأغسطس وتضع بيضها على أوراق الأشجار فى شكل لطم على السطح السفلى للأوراق تغطيتها بالرغب يفقس البيض وتخرج اليرقات التى تغتذى على الأوراق وتجرد

الأشجار تماما من أوراقها ثم تهاجر في أسراب ضخمة زاحفة تلتهم كل ما يصادفها من خضر وفاكهة وأوراق أشجار الغابات من شتى الأنواع ولعادة الهجرة الزاحفة هذه سميت وصنفت هذه الآفة ضمت ما يسمى باليرقات الجياشة Army worms وفي الخريف تضع إناث الفراشات بيضها في شقوق قلف الأشجار ويدخل هذا البيض البيات الشتوى ليفقس في شهر مايو، وعليه فلهذه الحشرة جيل واحد في السنة.

### طرق المكافحة

إتبع طرقا عديدة لمكافحة هذه الآفة، منها إستخدام مصائد الجاذبات الجنسية لرصد نشاط الآفة واتخاذ القرار المناسب لمكافحتها كيميائيا في الوقت المناسب وتستخدم الطائرات في رش أشجار الغابات بالمبيدات الحديثة الفعالة لمكافحة هذه الحشرة.

## ٢ - حشرات ليرقات جياشة أخرى من فصيلة الفراشات

### الليلية Noctuidae

#### رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة

وكما سبق أن ذكرنا فإن يرقات هذه الحشرات تزحف في شكل جيوش تجتاح كل ما يقابلها من خضرة ومن أشهر هذه الحشرات مايلي:

أ - دودة ورق القطن *Spodoptera littoralis* Boisd وتستطيع فراشات هذه الحشرات وضع بيضها على الكثير من العوائل منها أوراق جميع الأشجار الخشبية، وفي حالة الإصابة الشديدة تجرد اليرقات الأشجار من أوراقها وتحدث بها خسائر ضخمة.

ب - الدودة الخضراء أو دودة ودق القطن الصغرى *Spodoptera exigua* B وتتشابه مع الحشرة السابقة في إحداث الأضرار بالأشجار الخشبية، وتفضل هذه الحشرة المناطق الأكثر حرارة عن الحشرة السابقة وهي أقل خطرا منها.

ج - الدودة الجياشة ذات الخطوط الصفرة *prodenia ornithogali* B. وتنتشر هذه الحشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا وغابات الشمال الإفريقي.

ويبلغ طول اليرقة التامة النمو نحو ٣,٧٥ سم، ويوجد خط أصفر واضح على كل جانب

من جانبي اليرقة، كذلك يوجد على سطحها الظهرى خط أصفر يمتد بطول الظهر، ويوجد العديد من الخطوط الموازية للخطوط الصفراء ذات ألوان فاتحة تمتد بطول الحشرة ولذلك تظهر اليرقة وكأنها مخططة بمنطقة عريضة على جانبيها وفي أسفل الخطوط الجانبية يظهر خط جانبي قرمزي اللون ولذلك فيرقات هذه الآفة مميزة تماما هذه الآفة مميزة تماما عن غيرها، أما لون منطقة الظهر بين هذه الخطوط ففسوداء اللون وأحيانا تكون إردوازية اللون وفراشات هذه الحشرة ذات لون قاتم ويوجد على أجنحتها الأمامية علامات ذات لون رمادي فاتح، ويبلغ عرض الفراشة عند فرد أجنحتها نحو ٣,٥ سم، والأجنحة الخلفية لهذه الفراشة بيضاء اللون مع وجود شريط غامق اللون بجوار الحافة الخارجية للجناح (شكل ٢٣٥).



(شكل ٢٣٥) فراشة اليرقة الجياشة ذات الخطوط الصفراء مكبرة ٢,٥ مرة

### ٣ - دودة المستنقعات المالحة Saltmarsh Caterpillar

الاسم العلمي للحشرة *Estegmene acrea* (Drury)

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة يرقات الخيام Fam. Lasiocampidce

ويرقات هذه الحشرة تعد من الآفات الخطرة التي تلتهم أوراق أشجار الغابات التي تنمو



فى الاراضى الغدقة، وقد تجرد هذه اليرقات الأشجار من أوراقها تماما، وهى عديدة العوائل ويمكن أن تصيب أيضا محاصيل الخضر والفاكهة والقطن وتتبع هذه اليرقات اليرقات الجياشة، حيث أنها تتحرك فى أسراب ضخمة زاحفة على الأرض من محصول إلى آخر وتاكل فى طريقها كل ما هو أخضر، ويعد القطن من عوائلها المفضلة وتوجد هذه الآفة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشمال إفريقيا.

### وصف الحشرة

تبدو فراشة هذه الآفة بيضاء فى وقت راحتها، مع وجود بقع صغيرة سوداء مبعثرة على أجنحتها (شكل ٢٣٦)، ويبلغ طولها فى هذه الحالة ٢,٥ سم، وعند فرد الأجنحة يظهر جسم الفراشة بلون برتقالى مخطط بخطوط سوداء، والأجنحة الخلفية للفراشة الأنثى بيضاء بينما يكون لونها برتقاليا فى الذكر، وعند فرد الأجنحة يبلغ عرض الفراشة ٥ سم، وتضع الفراشة الأنثى بيضا مستديرا لونه أبيض لؤلؤى، ويبلغ قطر البيضة ٨. مم، ويوضع البيض فى شكل كتل أو لطح كبيرة (شكل ٢٣٧).



(شكل ٢٣٦) - فراشة بودة المستنقعات المالحة مكبرة مرتين

وعند الفقس يكون لون اليرقات الصغيرة أسودا وجسمها مغطى بشعر أسود طويل، وتغذى لفترة بالقرب من موقع لطعة البيض ثم تنتشر بعد ذلك، ويبلغ طول اليرقة التامة النمو نحو ٥ سم، ويكون جسمها مغطى بشعر أسود صدأى اللون ومنها جاء اسمها الدب الصوفى Wolly bear (شكل ٢٣٨)، ولهذه الحشرة جيلان فى العام.

### طرق مكافحة آفات الديدان الجياشة:

من الصعب مكافحة هذه الديدان بالمبيدات الكيماوية نظرا لاتساع مساحة الغابات حتى


عند استعمال الطائرات في الرش فإن اليرقات التي تكون موجودة في الجزء السفلى من الأشجار تنجو من فعل المبيد.

ويذكر البعض بأنه أمكن الحد من خطورة هذه اليرقات المهاجرة بوضع حواجز في الأماكن التي تجتازها هذه الديدان من منطقة إلى أخرى، والبعض ذكر حواجز من ورق الألومنيوم والبعض يقترح وضع المبيدات الفتاكة على هذه الحواجز فتبيد واليرقات الزاحفة.

ويوجد لهذه الآفات في الطبيعة العديد من الأعداء الحيوية التي يمكن تنشيطها والإستفادة منها في عمليات المكافحة.



(شكل ٢٣٧) ٦٩٧- قطعة بيض فراشة دودة المستنقعات على ورقة شجرة



(شكل ٢٣٨) دودة المستنقعات المألحة على غصن شجرة

#### ٤ - دودة أوراق السنط الصغيرة

الاسم العلمى للحشرة *Nadiasa undata* Klug

رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة Order Lepidoptera

فصيلة يرقات الخيام Fam. Lasiocampidae

تتغذى يرقات هذه الحشرة على أوراق السنط، وعند وجودها بأعداد كبيرة قد تجرد

الأشجار تماما من أوراقها، وتشاهد شرانقها بكثرة على أفرع الشجرة وسوقها في فصل الشتاء.

### وصف الحشرة اليافعة (الغراشة):

تبلغ الغراشة نحو ١,٢ سم في الطول، ٢,٥ - ٣ سم في العرض بعد فرد الجناحين. ولون الجسم والجناحين الأماميين بني، ويقطع الجناح عرضا ثلاثة خطوط متعرجة لونها بني مائل إلى السواد، ولون الجناحين الخلفيين بني مائل إلى البياض.

### دورة الحياة:

تضع الأنثى بيضا شكله بيضاوي وسطحه الخارجى أملس ولونه أخضر زاه في كتل على الأفرع، وتشاهد اليرقات طول الصيف تتغذى بأوراق الشجر وبعض اليرقات تشاهد شتاء، وتغطي أجسام اليرقات بشعر طويل أشبه بالشوك وتضم كل شوكة فتحة عدة سامة موحدة بأسفلها على جدار جسم اليرقة فإذا لمسها إنسان سببت إتهابا في جلده ونسج اليرقات شرانق من الحرير الأسمر لتتحول داخلها إلى عذارى، وقد ينسج عدد كبير من اليرقات شرانق متماسكة. وتترك اليرقة مع الشرنقة جزءا من شعرها المذيب فإذا دخل جسم الإنسان سبب له آلاما شديدة.

هذا وتوجد حشرة أخرى تنتمي لنفس الفصيلة وهي:

### ٥- دودة أوراق السنط الكبيرة الملونة *Nodiasa acaciae klug*

تتغذى يرقات هذه الحشرة أيضا على أوراق أشجار السنط وتسبب أضرارا مشابهة للحشرة السابقة.

### وصف الحشرة اليافعة (الغراشة):

تبلغ نحو ٢,٥ سم في الطول، ٦ سم في الأنثى، ٤ سم في الذكر في العرض بعد فرد الجناحين ولونهما أبيض رمادي على الرأس والصدر وأبيض مصفر على البطن والجناحين

الخلفيين، كما توجد بقع بيضاء رمادية غامقة متصلة على الجناح الأمامي ويوجد أيضا شريط به بقع رمادية فاتحة ويقع بيضاء مصفرة وأخرى برتقالية مجاورة للحافة الخارجية لهذا الجناح الأمامي.

### دورة الحياة:

تضع الأنثى بيضها على أشجار السنط، والبيض كبير الحجم ولونه أسمر مشوب بحمرة. وتبلغ اليرقة التامة النمو نحو ٧ سم في الطول، ويختلف لونها من أسمر محمر إلى أسمر برتقالي، ويغطي الجسم بشعر ناعم قصير وخصلات من الشعر الطويل على جانبي الجسم تحت الفتحات التنفسية، كما توجد خصلات طويلة على الحلقات الصدرية، وعلى كل من الحلقتين الصدريتين الثانية والثالثة كيس غدي تخرج اليرقة عند تعرضها للخطر تتوعن لحميين على كل منهما شعر أسود خشن، ويوجد على الحلقة الثامنة قرن شرجي، وعلى كل من الحلقات البطنية من الثانية حتى العاشرة زائدتان قصيرتان لونهما أحمر، وتنسج اليرقة شرنقة بيضاء أو سمراء مغزلية الشكل على الأغصان الصغيرة، وتشاهد العذارى بكثرة في فصل الشتاء.

## ٦- دودة أوراق العبل

الاسم العلمي للحشرة *Nadiasa repanda aegyptiaca* Bang-Hess

وتتنتمي هذه الحشرة لنفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة وتغذى على أوراق أشجار العبل وضررها محدود.

### وصف الحشرة

يبلغ طولها ٢,٥ سم ثم ٤,٥ سم عند فرد الجناحين ولون الأنثى أسمر مشوب بحمرة وتشبه لون صدأ الحديد، والذكر أغمق لونا من الأنثى.

## دورة الحياة

يوضع البيض على الأوراق والأفرع، واليرقة التامة النمو تشبه يرقة أوراق السنط الكبيرة الملونة وتنسج شرنقة مماثلة على أفرع الأشجار، وتشاهد الشرائق بكثرة في فصل الشتاء.

مكافحة ديدان أوراق السنط والعليل:

إذا استدعى الأمر مكافحتها ترش الأشجار بالدبتركس مستحلب زيتي ٥٠ ٪ بتركيز ٠.٣ ٪.

## ٧- البق الدقيقى

أ- البق الدقيقى المصرى *Icerya aegyptiaca* (Douglis)

ب- البق الدقيقى الأسترالى *Icerya purchasi* Mask

رتبة الحشرات متشابهة الأجنحة Order Homoptera

فصيلة الحشرات القشرية الماردة Fam. Margarodidae

وقد سبق لنا تناول هذه الحشرات بالتفصيل فى مواضع سابقة من هذا الكتاب ، وهى نصيب معظم الأشجار الخشبية ، ومن المعروف أن أوراق التوت والسنط تصاب بشدة بالبق الدقيقى ، وتوجد الحشرات على السطح السفلى للأوراق حول العرق الوسطى ، كما تصاب أيضا أطراف الأفرع والأفرع الصغيرة الفضة، وتمتص الحوريات والحشرات اليافعة العصارة النباتية من هذه الأجزاء وتسبب جفافها وموتها .

## طرق المكافحة

فى حالة الإصابة الشديدة ترش الأشجار بأحد الزيوت المعدنية (٢٪) مضافا إليه الملاثيون (٥٪) بتركيز ٢٪ ، وتصلح هذه المعاملة لكافة أنواع البق الدقيقى والحشرات القشرية

هذا ويوجد فى الطبيعة عدد كبير من الأعداء الطبيعية لهذه الآفات التى تعمل على الحد

من نشاطها وتقلل من خطورتها في حالة توفر الظروف المناسبة لها وعدم التعرض لها بالمبيدات

### جـ - بق الهبكس الدقيقى *Moconelloccsus hirsutus*

وهذه الحشرة تتبع فصيلة البق الدقيقى Fam pseudococcidae

وتصيب كثيرا من الأشجار الخشبية مثل السنط واللبخ والهبكس والتوت والنبق ، ويصيب الأوراق والفريعات ، مما يؤدي إلى تضخم الفريعات ، المصابة وتوقف نموها ، فتجدد النباتات غيرها ، ويفرز البق الدقيقى إفرازات عسلية تنمو عليها الفطر الأسود وتشتد الإصابة به في الصيف والخريف وأوائل الشتاء ويكافح بنفس طريقة أنواع البق الدقيقى الأخرى .

### ٨ - الحشرات القشرية

تصاب أوراق وفروع الأشجار الخشبية وأشجار الغابات بجميع أنواع الحشرات القشرية وأهمها الحشرة القشرية السوداء والحشرة القشرية الحمراء وحشرة الزيتون القشرية وحشرة التين الشمعية

وإذا استدعى الأمر نكافح هذه الآفات بنفس طريقة مكافحة الحشرات القشرية السابق ذكرها في مواضع أخرى من هذا الكتاب

## ثانياً: الآفات الحشرية التي تصيب الجذع والافرع

وهذه المجموعة من الحشرات تعد من أخطر الآفات التي تصيب الأشجار الخشبية وأشجار الغابات وتنزل بها أفدح الخسائر وهي تنتمي لرتبة الحشرات غمدية الأجنحة Coleoptera ويمكن تقسيم هذه الآفات إلى مجموعتين :

- أ - الحشرات الناقرة لقلب الأشجار وتسمى Shot hole borers أو Bark borers أى الحشرات التي تحدث فى القلب ثقوباً تشبه ثقوب طلاقات الرش ، وهذه المجموعة تشمل الخنافس الاسطوانية من فصيلة Scolytidae وتثقب خنافسها اليافعة فى القلب وتصنع أنفاقاً فى الكامبيوم حيث تضع البيض الذى يفقس عن يرقات تتغذى على الكامبيوم
- ب - الحشرات الناقرة فى الخشب Wood borers وتثقب يرقات هذه الخنافس خشب جنوع الأشجار وفروعها ، وأهمها الحشرات التي تنتمي لفصائل Buprestidae , Cerambycidae وبعض هذه الحشرات تصيب الأشجار القوية ، والبعض الآخر يصيب خشب الأشجار الضعيفة والميتة .
- ونتناول هنا الموضوع بالتفصيل فيما يلى :

### أ - الحشرات الناقرة فى قلب الأشجار :

ويتبع معظم هذه الحشرات فصيلة Scolytidae ، وتعد من أكثر الحشرات ضرراً على أشجار الغابات والأشجار الخشبية وحشرات هذا الرتبة اسطوانية الشكل لونها بنى غامق أو أسمر ، ويختلف حجمها من ملليمتر واحد إلى ٩ ملليمترات ، وأغمادها قد تكون ملساء أو قد تغطى بشعر دقيق ورأسها قد يكون ظاهراً أو مختفياً تحت الصدر الأمامى ، وأجزاء فيها قارضة وفكوكها العلوية قوية .



وتحفر خنافس هذه المجموعة أنفاقا فى القلف تضع فيها بيضها ، وتنشط داخل هذه الأنفاق وتمضى حياتها مختبئة داخل هذ الأنفاق ، وتضع الإناث بيضها فى أنفاق تحت القلف لها أشكال خاصة أو قد تصنعها داخل منطقة الخشب ولكل نوع منها نظام خاص فى حفر الأنفاق

وتبدأ الخنافس فى الحفر فى الأجزاء اللينة من القلف حيث تصنع مدخل النفق ثم تستمر فى الحفر حتى تصل إلى منطقة الخشب وفى أثناء ذلك تقوم بقذف مخلفات الحفر من النشارة الدقيقة والبراز إلى خارج النفق من خلال المدخل ، فتتجمع هذه المخلفات حول ثقب المدخل وتتماسك .

هذا ونفق البيض ونفق المدخل أوسع وأكبر حجما من الحشرة وكثيرا ما تقوم ذكور الخنافس بسد مدخل النفق بجسمها عند قيام الإناث بوضع البيض ، ويموت الذكر وهو يؤدي وظيفته فى حراسة المدخل ، فيصبح جسمه بعد موته كحاجز يمنع دخول الطفيليات والمفترسات .

ويتكون نفق البيض من نفق المدخل على سطح الخشب وتصنع الحشرة أنفاقا للتهوية على جانبي نفق البيض وكذلك تصنع حجرة خاصة يتم فيها التزاوج بين الذكر والأنثى ، ويفقس البيض عن يرقات صغيرة الحجم تبدأ فور خروجها فى صنع أنفاق دقيقة ثم تتسع هذه الأنفاق كلما كبرت اليرقات ،، وبعد تمام نمو اليرقات تتحول إلى عذارى فى خلايا تصنعها لهذا الغرض ، وعند تكون الحشرات الياقة (الخنافس) تترك العائل وتخرج من ثقب خاص يسمى ثقب الخروج وتشعر فى مهاجمة عائل جديد ، وقد تبقى فى العائل القديم حتى يتم بلوغها ، ومعظم أنواع هذه الفصيلة ذات جيل واحد فى العام وقد يكون لبعضها جيلان ، وأهم الحشرات الناقرة فى قلف أشجار الغابات والأشجار الخشبية ما يلى : -

## ١ - الحشرات التابعة لجنس *Dendroctonus*

وتصيب هذه الحشرات غابات الأشجار المخروطية Coniferous وتترك بها خسائر فادحة

، ومن هذه الأشجار أشجار السرو والعرعر ، وتصيب حشرات هذا الجنس قلف الأشجار الحية والميتة ، ومن مظاهر الإصابة بها وجود أنفاق أنبوبية ونشارة بنية على جذع الشجرة المصابة ، وتصاب بها الأشجار السليمة في فصل الربيع والصيف ولعظم هذه الحشرات جيل واحد في السنة .

## ٢ - حشرات من جنس Ips

وتصيب أشجار الصنوبر وأشجار التنوب Spruces ، وتعد من أخطر آفات الأشجار الصغيرة لأنها تتغذى على الكامبيوم وتتخر فيما بين القلف والخشب ، وتبدأ الإصابة بقيام نكر هذه الخنافس بحفر نفق في القلف يمتد حتى يصل إلى منطقة الكامبيوم في نهاية هذا النفق يبني حجرة الزواج ثم تقوم الأنثى بعد تلقيحها بصنع أنفاق وضع البيض في القلف والخشب الحى ، ويدل على الإصابة بها وجود نشارة الخشب خلال شقوق القلف المصاب .

## ٣ - خنافس جنس Phloesinus

هى تصيب أشجار السدر (النبق) وينشأ عن الإصابة الشديدة موت الأشجار المصابة .

## ٤ - الخنافس التى تنتمى لجنس Scolytus

وهى خنافس سمراء صغيرة الحجم محدبة الجسم ، تقوم بنخر أنفاق مستقيمة أو متفرعة فى الكامبيوم واللحاء والخشب ، وهى تصيب أشجار الفاكهة وبعض الأشجار الخشبية ، والبعض منها يصيب القمم النامية والبراعم ، وتشتد الإصابة بها خلال شهر مايو ولها جيل واحد فى السنة .

## ٥ - خنافس الأمبروزيا Ambrosia beeteles

وهذه الخنافس تصنع إنفاقا داخل الخشب الحى ، وكذلك تحفر فى قلب الخشب وتصنع

أثناء ذلك ثقبوا دقيقة تسمى الثقوب الإبرية ، ثم تلوث جدران أنفاقها بنوع خاص من الفطريات يسمى فطر الأمبروزيا ينمو هذا الفطر ويتكاثر على جدران النفق وتغذى عليه الخنافس اليافعة ويرقاتها

ومن أمثلة خنافس القلف الشهيرة خنفسا سوسة قلف أشجار الحلويات *Scotus reguloSis* وهي تصيب قلف أشجار الحلويات وغير هامة على الاشجار الخشبية وسبق لنا تناول هذه الحشرة فى آفات الكمثرى ومثلها خنفساء قلف أشجار الحلويات المصرية *Ectoptogaster aegyptiacus* Pic وكذلك فلق أشجار التفاح المبطط الرأس *Chrysobothris mali* Horm الذى يصيب الأشجار الصغيرة وأشجار المشاتل وقد سبق لنا تناول هذه الحشرة ضمن آفات التفاح.

## ب - الحشرات الناقرة فى الخشب

وتضم هذه الحشرات مجموعات عديدة من الخنافس الحفارة منها الحفارات المسطحة الرأس أو المبططة الرأس وهى تتبع فصيلة *Buprestidae* ولهذه الخنافس ألوان معدنية زاهية ، ويرقاتها بيضاء وعديمة الأرجل مبططة الرأس ، وتغذى حشرات اليافعة على أوراق الأشجار كما تغذى على القلف ، أما يرقاتها فكلها ناقرة للخشب ، وكذلك تضم هذه المجموعة الخنافس الساحقة للأخشاب من فصيلة *Fam. Lyctidae* ويرقاتها عادة النخر فى الخشب وتحوله إلى مسحوق ناعم ، ومنها خنافس تنتمى لفصيلة ثاقبات الأفرع *Fam. Bostrychidae* كذلك منها أنواعا تنتمى لفصيلة *Fam. Cerambycidae* وتسمى الحفارات المستديرة الرأس هذا ونتناول هنا أهم حفارات هذا القسم بالتفصيل :

### ٩ - حفار ساق العبل

الاسم العلمى للحشرة *Steraspis squamosa* King

رتبة الحشرات عمدية الأجنحة *Oder Coleoptera*

فصيلة ناقرات الأخشاب البراقة *Fam. Buprestidae*

تظهر الخنافس اليافعة من شهر ديسمبر وتضع بيضها على أشجار العبل حيث تحفر اليرقات فى الأفرع وتسبب جفافها وتفصصها .

## وصف الحشرة اليافعة

خنفساء طولها ٣ سم ولونها أخضر زمردى وجوانب الأعماد ذات لون نحاسي مائل للإحمرار .

وتبلغ اليرقة التامة النضج ٧ سم طولاً وتتميز بوجود درقة سوداء اللون على كل من ترجة واسترنة الحلقة الصدرية الثانية والحلقات البطنية مبعدة ببضع سمراء

## طرق المكافحة

- ١ - العناية بالأشجار منذ زراعتها وتقويتها .
- ٢ - دهان سوق الأشجار من أسفل بالجير الأبيض
- ٣ - الرش بالدبتركس أو الجوزرائيون .

## ١٠ - خنفساء اللكتس الإفريقية

الاسم العلمي للحشرة *Lyctusu africanus* L

فصيلة الخنافس الساحقة للأخشاب Fam. Lyctidae

رتبة الحشرات عمدية الأجنحة Order Coleoptera

تصيب هذه الخنفساء الأثاث المنزلي وخشب الأبواب والشبابيك والأكشاك وأعمدة التليفون الخشبية وخشب الباركية ويظهر على السطح الخارجى للأخشاب المصابة ثقبوب عديدة متجاورة مستديرة قطرها يبلغ نحو ٢.٥ - ٥.٤ مم يخرج منها مسحوق دقيقى

## والحشرة اليافعة

خنفساء مستطيلة الشكل لونها بني يصل طولها إلى ٤ مم

## دورة الحياة

تقضى هذه الحشرة بياتها الشتوى على هيئة يرقات داخل الأنفاق فى الأخشاب ، وفى الربيع تتحول إلى عذارى ، وتظهر الخنافس فى إبريل ومايو وتتزاوج خارج الأخشاب ثم تبدأ الإناث فى وضع البيض خلال يونيو ويوليو ، ويوضع البيض فى النقر الموجودة على سطح الخشب يفقس البيض بعد ٣ - ٧ أيام وتخرج منه اليرقات التى تحفر أنفاقا داخل الخشب فى اتجاهات مختلفة من مكان وضع البيض ، وعند اكتمال نمو اليرقات تعمل ثقوب الخروج المستديرة السالفة الذكر ثم تتحول إلى عذارى داخل الخشب قرب ثقوب الخروج ، وتظهر الحشرات اليافعة فى شهر أغسطس وسبتمبر ، ولهذه الحشرة عدة أجيال فى السنة

## طرق المكافحة

تكافح هذه الآفة بحقن الأنفاق بحقن خاصة مملوءة بسائل المبيد الفعال ، وتسد الأنفاق بعد ذلك بالمعجون المستعمل فى سد ثقوب الأثاث ثم يدهن المعجون بعد ذلك بالاستر لتغطية المعجون ، وقد أثبتت التجارب فعالية مادة بنتاكلوروفينول فى علاج هذه الحشرات لمدة طويلة قد تصل إلى ٥ سنوات عند دهان أخشاب الأثاث بها

## ١١ - ثاقبة الأفرع الكبرى أو السودانية

الاسم العلمى للحشرة *Sinoxylon sudanicum* Lesne

رتبة الحشرات غمدية الأجنحة Order Coleoptera

فصيلة ثاقبات الأفرع Fam . Bostrychidae

تصيب هذه الحشرة أفرع المانجو والتين والعنب والبوانسيانا والسرسوع والسنت . وتحفر اليرقات والحشرة اليافعة فى الأفرع وتتلصص منطقة الكامبيوم فتموت الأفرع وتذبل أوراقها وتجف . وعند الإصابة قد تقضى الحشرات اليافعة ويرقاتها على جميع محتويات خشب الأفرع تاركة منطقة القلب وتحولها إلى مسحوق ناعم ولا تترك إلا منطقة القلب .

## وصف الحشرة اليافعة

خنفساء اسطوانية الشكل بنية اللون يصل طولها إلى ٥ - ١٠ مم ، والحلقة الصدرية الأمامية كروية متضخمة وعلى حوافها بروزات مسننة .

## دورة الحياة

تظهر الحشرات اليافعة في أواخر مايو وخلال يونية ، وتحفر كل حشرة في القلف ثقباً مستدير قطره نحو ٤ مم وتخترق القلف وجزءاً من الخشب ثم تصنع نفقا دائريا حول الساق من الداخل فتصبح الساق ضعيفة معرضة للكسر ، ويوجد في كل نفق ذكر وأنثى يتم التزاوج بينهما والأنفاق التي تصنعها الحشرة اليافعة تكون خالية من المسحوق لأنها تخرجه من حين لآخر خارج ثقب الدخول ، ويكون النفق مخصصا لوضع البيض ، وبعد الفقس تخرج اليرقات وتحفر داخل الخشب أنفاقا متعامدة مع نفق التزاوج تكون مملوءة بالمسحوق ، ويتسع قطر النفق كلما إزداد نمو اليرقة ، وتصنع كل يرقة لنفسها نفقا مستقلا وتمتد أنفاق اليرقات أعلى وأسفل نفق التزاوج وتتحول إلى عذراء عند نهاية نفقها القريب من سطح قلف الشجرة ، وتخرج الحشرة اليافعة من ثقب الخروج الذي تصنعه اليرقة التامة النضج قبل تحولها إلى عذراء .

وتكافح هذه الحشرة كما في الحشرة السابقة

## ١٢ - حفار ساق الكازورنيا

الاسم العلمي للحشرة *Stromatium fulvum*


رتبة غمدية الأجنحة Order coleoptera

فصيلة ناخزات الأخشاب ذات القرون الطويلة Fam . Cerambycidae


تحفر يرقاته التي تبلغ نحو ٢٥ سم في الطول عند تمام نموها في أشجار الكازورنيا (شكل ٢٣٨) والكافور والجراندا والفيكس والألنيدس *Alnidus Sp* كما تحفر يرقاته في خشب الأثاث والباركيه

## الحشرة اليافعة

تبلغ نحو ١٨ سم في الطول ، واللون العام بني فاتح بلون الخشب وقرن الاستشعار خيطي . (شكل ٢٣٩) .



(شكل ٢٣٨) حفار ساق الكازورنيا قطع من الخشب الصلب يرى بها التلف الناشئ عن الحفار



(شكل ٢٣٩) حفار ساق الكانورنيا مكبر ثلاث مرات

### ١٣- حفار ساق السنط .

الاسم العلمي للحشرة *Macrotoma palmata* F.

تحفر يرقات هذه الحشرة التي تبلغ نحو ٥ سم في الطول في سوق أشجار السنط وتسبب لها تلفا على مدى الزمن . وهو يتبع نفس فصيلة الحشرة السابقة

#### الحشرة اليافعة

أصغر قليلا من حفار ساق الشينار وتقرب منه في اللون والشكل إلا أن العقلة الثالثة في قرن الاستشعار تبلغ نحو ١٣ مم في الطول والحلقة الصدرية الأمامية ضيقة لامعة من أعلى وجوانبها كثيرة الأشواك ، والعقلة الأولى من عقل الرسغ من الثانية والثالثة معا . هذا وينبع فصيلة ناخرات الأخشاب طويلة القرون أيضا الناخرات التالية.



## ١٤ - حفار ساق الشنار *Rhesus serricoilis* Motsch

تحفر يرقات هذه الحشرة التي يصل طولها نحو ٤ - ٥ سم عند تمام نموها في شجر السنط والشنار .

### الحشرة اليافعة:

طولها نحو ٥ - ٦ سم ولونها كستنائي قاتم وصدرها الأمامي عريض وجوانبه غير خشنة وقليلة الأشواك وطول العقلة الثالثة من عقل قرن الاستشعار تبلغ نحو ٦ مم وتتساوى العقلة الأولى في الرسغ بكل من العقلتين الثانية والثالثة في الطول .


## ١٥ - حفار ساق اللبغ : *Xystrocera globosa* ol

قلت الاصابة بيرقات هذه الحشرات في السنين الأخيرة نظرا لانقراض أشجار اللبغ ، وأحيانا تصيب أشجار السنط والشنار والمشمش .

وتضع الأنثى بيضا أصفر اللون في مجموعات صغيرة في شقوق القلف أو في الجروح الموجودة به . بعد فقس البيض تحفر اليرقات نحو ٤ - ٥ سم في القلف أو في الخشب وعندما يصل طول اليرقة نحو ٤ . ٥ سم في الطول تعذر في أحد الأنفاق ، وعندما تتكون الحشرة اليافعة تتقرب في نهاية النفق القريب من السطح ثقباً بيضاوي الشكل يسمح بخروجها

### الحشرة اليافعة:

شكل (٢٤٠) : تبلغ نحو ٢.٥ سم في الطول ، ولونها بني يميل إلى الاحمرار ، ويوجد على الصدر الأمامي للحشرة من أعلى شريط دائري أخضر اللون لامع يميل إلى السواد ، ويمتد على منتصف كل غمد شريط طولي من نفس اللون .



(شكل ٢٤٠) حفار ساق اللبخ

### مكافحة ناخرات الأخشاب

- ١ - ترش النباتات الخشبية بالمبيدات الفعالة كوقاية حتى إذا وضعت الإناث بيضها تموت.
- ٢ - تحقن الأخشاب الجافة والأشجار، بمستحلب زيتى أو ثانى كبريتيد الكربون .
- ٣ - يسخن الخشب الجاف المعد للتصنيع فى أفران الهواء الساخن لقتل اليرقات داخل أنفاقها .
- ٤ - فى حالة الأرضيات الخشبية والاثاث تدهن الأرضيات الخشبية بدهان مكون من محلول الكلوردين ٧٥٪ بنسبة ٢٪ مع الكيروسين أو الهوستاشيون . ٤٪ بمعدل ٦٪ مذاب فى الكيروسين ويرش الاثاث المصاب بنفس المبيدات والنسب وفى حالة وجود طبقة من البلاستيك فوق الأرضيات الخشبية يجب إزالتها أولاً ثم الدهان .

## ١٦ - النمل الأبيض أو الأرضة

رتبة الحشرات متماثلة الأجنحة Order Isoptera

يعتبر النمل الأبيض أو الأرضة من الآفات العامة الخطيرة التي تصيب الأشجار والأخشاب ، وإذا إشتدت إصابته ربما دمرت الأسقف والأرضيات المصنوعة من الخشب ، وبعض أنواع النمل الأبيض يهاجم الأشجار الضعيفة ويقضى عليها ، كذلك يتعرض الأثاث المنزلى والآثاث إلى هجوم النمل الأبيض وتخريبه لها لذلك نورد هنا كل ما يتعلق بهذه الآفة كإحدى آفات الخشب الخطيرة .


### الصفات التقسيمية للنمل الأبيض

يعرف من هذه الرتبة نحو ١٠٠ نوع منتشر في جميع أنحاء العالم ، والنمل الأبيض أو الأرضة حشرات صغيرة أو متوسطة الحجم وأجسامها رخوة ولوانها باهتة . قرون الاستشعار عقدية أو خيطية . أجزاء الفم قارضة ، العيون المركبة موجودة ويوجد معها زوج من العيون البسيطة .

ويعيش النمل الأبيض عيشة إجتماعية في مجموعات (أو مستعمرات أو أعشاش) ، فيوجد في المستعمرة الواحدة أفراد ذات أجنحة طويلة وأفراد ذات أجنحة عادية وأفراد غير مجنحة بالمرّة . وفي حالة وجود الأجنحة يوجد منها زوجان غشائيان ذات تعريق مختزل نوعاً ما والعروق الموجودة جهة الطرف الأمامي لكل من الأجنحة شديدة الصلابة وواضحة ، ويوجد على الأجنحة تجاعيد شبيهة بالعروق ، ويمكن للأجنحة أن تنقص وتنكسر عند دروز موجودة عند قواعدهما ، وعلى العموم فالأجنحة الأمامية والخلفية متماثلة في الحجم والشكل ومن ذلك اشتق إسم هذه الرتبة ، وتمتد الأجنحة عند وجودها - مبسوطة على الجسم أثناء الراحة وتزيد على طول الجسم ، ورسغ الأرجل مكون من ٤ عقل . القرن الشرجي قصير أو قصير جداً . آلة السفاد في الذكر وآلة وضع البيض في الأنثى غير موجودة أو أثرية ، التطور بسيط .

### أفراد المستعمرة

تحتوى المستعمرة الواحدة (أو العش الواحد) للنمل الأبيض على الأشكال أو المظاهر Castes (شكل ٢٤١) الآتية:



(شكل ٢٤١) مظاهر النمل الأبيض

### ١- المظاهر التناسلية Reproductive castes

الملكات والملوك هي أفراد ناضجة تناسليا ألوانها تامة التكوين وعيونها مركبة . الملوك صغيرة أما الملكات فتتضخم بطونها كثيراً عند إمتلاء مبايضها بالبيض . وتعيش الملكة أحياناً لمدة عدة أعوام (قد تصل إلى ٢٥ عاماً تضع خلالها آلاف البيض الذي يبلغ من ٣٦.٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ .

وتترك الملكات والملوك المستعمرة (عند وجودها بأعداد وفيرة) في أسراب تتزوج ، ثم يكون كل زوج (ملكة وملك) مستعمرة جديدة ، وتتقصف أجنحة الملكات والملوك بعد التزاوج ولا تبقى من الأجنحة سوى آثار متصلة بالصدر يطلق عليها اسم Wingpads

### ٣- المظاهر التناسلية الإضافية Supplementary Reproductives

وتختار من بين الشغالات أو الحوريات الكبيرة ولونها أفتح من لون المظاهر التناسلية ، ولها أجنحة قصيرة وعيونها المركبة أصغر نسبيا من المظاهر التناسلية أيضا تتفاوت هذه المظاهر التناسلية الإضافية بدرجة كبيرة في العش وتعاون الملكة في بناء مستعمرتها .

وقد يوجد في بعض الأنواع مظهر تناسلي إضافي آخر . وحشرات تشبه أيضا الشغالات في الشكل غير أن لها القدرة على التناسل كما في المظهر التناسلي الإضافي السابق .

### ٣- الشغالات Workers

يشتمل هذا المظهر من حشرات يافعة (ذكور وإناث) عقيمة باهتة اللون عديمة الأجنحة وليست لها عيون مركبة أو بسيطة في العادة وفكوكها العليا صغيرة نسبيا مثل فكوك المظاهر التناسلية . تنمو الأجنحة للأفراد المهاجرة فقط من الشغالات والتي تكون حينئذ قادرة على التناسل تقوم الشغالات بمعظم أعمال المستعمرة ، فهي تجمع الغذاء وتطعم الملكات والملوك والعساكر والصغار الحديثة الفقس كما أنها تبني الأعشاش والممرات والأنفاق والردهات . ويساعد الشغالة في جميع أعمالها الحوريات التي مضى على فقسها مدة من الزمن . وتتغذى الشغالات والحوريات الكبيرة على المواد النباتية كالأخشاب ومنتجاتها فقط ولكنها تغذى الأفراد الأخرى على برازها وعلى سائل تفرزه من فمها ومن نهايات قناتها الهضمية وعلى جلود الانسلاخ والأفراد الميتة .

### ٤- العساكر soldiers

يشتمل هذا المظهر على حشرات يافعة (ذكور وإناث) عقيمة ، وهي عادة أكبر قليلا في الحجم من الشغالات وتتضخم رؤوسها وفكوكها العليا وعيونها المركبة قد تكون موجودة أو غير موجودة وتهاجم العساكر الدخلاء عند ازعاجها للمستعمرة ، كما تحاول أن تسد برؤوسها أي ثقب في جدار إحدى الردهات .

ويوجد في بعض الأنواع مظهر آخر من مظاهر العساكر يعرف بذات البوز وفيه يسطيل الرأس إلى الامام كثيرا في شكل بوز ضيق يقذف منه على الدخيل إفراز لزج (من غدة بالرأس تسمى Frontal Gland تفتح في مقدمة البوز) غير أن فكوكها العليا مختزلة ولذلك تعمل نوات البوز كالعساكر السابقة الذكر على الدفاع عن المستعمرة .

هذا وفي بعض الأنواع الأولية من أنواع النمل الأبيض لا تحوى المستعمرة سوى مظهرين فقط هما التناسلي (الملكات والملوك) والعساكر ، وتقوم الافراد الصغار لهذين المظهرين بجميع أعمال المستعمرة .

### سعيشة النمل الأبيض :

هذا وتعيش بعض أنواع النمل الأبيض تحت الأرض في الأخشاب الرطبة المدفونة بالأرض أو التي تلامس التربة ، وقد تدخل بعض أفراد هذه الأنواع في الأخشاب الموجودة خارج التربة ولكن لا بد لها من ممر يوصلها من هذا الخشب العلوى إلى الأرض حتى يمكنها أن تحصل على الرطوبة اللازمة لترطيب هذا الخشب العلوى ، وأعشاش مثل هذه الأنواع المذكورة قد تكون مدفونة في الأرض أو تبرز فوق السطح (لبعض الأنواع الاستوائية أعشاش يبلغ إرتفاعها فوق سطح الأرض نحو ١٠ أمتار) . ويعيش البعض الآخر في الأخشاب الجافة فوق الأرض كأعمدة التلغراف أو الأشجار أو بقاياها أو في المباني المشيدة من الخشب ، ويتلف بذلك الأبواب والنوافذ والأسقف والآلات الزراعية كما يثقب في الأقمشة والملابس ، ويهاجم الخبز والحاصلات المخزونة والكتب والأوراق والجلود وقد يتلف الأبسطة والحصص وجدران المباني المصنوعة من الطوب اللبن الذي يحتوى على التبن كما أنه ينخر في فلنكات السكك الحديدية وأعمدة التليفونات والتلغراف ويحدث بها ضررا جسيما . وهذا ويتمز الإصابة بالنمل الأبيض بالآتى :

١- وجود سراديب من الطين والرمل على أنابيب تصنعها حشرات النمل الأبيض أثناء تجوالها للبحث عن الغذاء وذلك لكي تتحاشى التعرض للضوء والجفاف وتشاهد هذه السراديب على أسطح الجدران المصابة وأخشاب النوافذ .

- ٢ - التصاق الحصر والحبوب بالأرض ، وذلك بواسطة الطين ووجود تآكل فى بعض أجزائها .
- ٣ - وجود أنفاق (قنوات) ضيقة على الأخشاب فى اتجاهات طولية .
- ٤ - مشاهدة الأجنحة التى تسقط من الحشرات المجنحة على التربة فى مواسم الهجرة .
- وفىما يلى أهم الصفات المميزة للفصائل التى تتبعها أنواع النمل الأبيض المذكورة .

#### **فصيلة هو دوترميتيدي Fam, Hodotermitide**

غده الجبهة Frontal ganglion والعيون البسيطة غير موجودة . ترجه الحلقة الصدرية الأمامية محدبة قليلا لأعلى واضيق من الرأس . ويوجد مظهر الشغالة فى بعض الأجناس تعيش أفرادها فى الأخشاب الرطبة تحت سطح الأرض .

#### **فصيلة راينو ترميتيدي Fam Rhinotermitidae**

غدة الجبهة موجودة . ترجه الحلقة الصدرية الأمامية مستوية من أعلى . مظهر الشغالة موجود . تعيش أفرادها أيضا تحت سطح الأرض .

#### **فصيلة كالوترميتيدي Fam Kaloermitidae**

غدة الجبهة غير موجودة . العيون البسيطة . ترجه الحلقة الصدرية الأمامية مستوية من أعلى وغالبا ما تكون أعرض من الرأس . تعيش أفراد هذه الفصيلة داخل الأخشاب الجافة الموجودة فوق سطح التربة .

### **المكافحة**

#### **أولا: الطرق الوقائية**

- ١ - تنظيف قطعة الأرض التى تنشأ عليها المبنى من التبن والقش وبقايا الأحطاب وكسر الأخشاب ، ولأن المواد المذكورة تحتوى على السيلولوز وهو الغذاء الأساسى للحشرة .
- ٢ - يلاحظ فى المباني الخشبية جعل الأجزاء الخشبية منها أعلى من سطح الأرض بمسافة

٤٠ - ٥٠ سم على الأقل ووضع فاصل معدني بين الأساس وبين البناء الخشبي مع بروز حافة هذا الفاصل بعرض ٣ - ٥ سم وعدم ترك قطعة مدفونة في الأرض أثناء عملية البناء .

٣ - غمر الأخشاب المستعملة في البناء - وخاصة القريبة من سطح الأرض - في الكريوزوت أو كلورور الزئبقيك أو سلكوفلورور الصوديوم أو خامس كلورور الفينول أو خامس كلورفينات النحاس أو الزانثون أو التكتوكيتون .

٤ - رش الحوئط والأخشاب من الداخل والخارج رشاً كاملاً بأحدى المواد الآتية :

أ - مركبات الكلوردين والدأى ألدرين المخففة بالبترول بنسبة ١٪ من المادة الفعالة ويلاحظ تكرار هذا العلاج على الأخشاب مرة كل سنة .

ب - دهان جميع الأجزاء الخشبية المتصلة بالجدران والأرضية مباشرة وما حولها من الجدران الملاصقة لها بمسافة ٢٥ سم تقريباً لحدود وأنطقة وأعتبة الأبواب والشبابيك على ارتفاع ٢٥ سم تقريباً أو ما يحل محلها بالكريوزوت ٣ مرات على الأقل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ١٠ أيام ويكرر هذا العلاج مرة كل ٣ سنوات . كما تعامل العروق والمكتل الخشبية السابقة بالكريوزوت بلون زيتي آخر خاصة في المدن لتغطية لون الكريوزوت الأسود .

٥ - يلاحظ في مباني الطوب أن يكون البناء على أساس - حتى ارتفاع ٧٥ سم تقريباً من سطح الأرض - من الطوب الأخضر المصنوع من تبن مشبع بمادة الكريوزوت وذلك بمعاملته (غمرة) لمدة ٣ ساعات تقريباً بمعدل جزء بالوزن من المادة إلى ٤ أجزاء من التبن ولا مانع بعد ذلك من تكملة البناء بالطوب الأخضر العادي ، أى داخله تبن لم يعامل ، أو بناء الأساس من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بالارتفاع المذكور ثم يكمل البناء بالطوب الأخضر العادي مع ملاحظة عدم طلاء الطوب الأحمر بالمونة المخلوطة بالتبن بل يجب طلائها بالمونة العادية المكونة من الجير والرمل والأسمنت ويجب العناية بإزالة الأنابيب الرملية أو الطينية أولاً بأول بمجرد ظهورها على سطح جدران الطوب الأحمر .



٦ - العمل على إيجاد نوافذ كافية فى المباني لنفاذ الضوء والتهوية إذ أن من المعروف أن الحشرة تفصل الظلام وأن التهوية والإضاءة الطبيعية فى المباني لها أثرها فى الحد من نشاطها .

٧ - لما كانت صوامع تخزين الحبوب تقام على الأرض مباشرة فيراعى عند إنشائها عمل قاعدة لها من كسر الطوب الأحمر على أن تطلّى بطبقة من الأسمنت سمكها نحو ٥ سم تقريبا .

٨ - عند عمل المداود التى تصنع من الطوب الأخضر يستحسن معاملة التبن بالكريوزوت مع تبطين المداود داخليا (أى الأماكن التى توضع فيها العليقة) بطبقة أسمنتية رقيقة سمكها ١ سم تقريبا .

٩ - دك أرضية المخازن بالدقشوم أو ما يحل محله ثم فرش الأرضية بطبقة عازلة من الأسمنت أو الأسفلت سمكها لا يقل عن ٣ سم تقريبا وبحيث تغطى الأرضية وتكون متصلة بالحوائط وتمتد خارجها قليلا .

١٠ - لما كان التبن يحتوى على نسبة عالية من السليولوز وهو الغذاء الأساسى للحشرة لذلك كان من أهم العوامل فى انتشارها ، ولذلك يجب عدم تخزينه فوق أرضية الغرف بل يستحسن أن يكون مكان التخزين فوق سطح الأبنية .

١١ - وجد أن أخشاب الحور والسيكامور والصفصاف والتوت الأبيض والسنط تصاب بالنمل الأبيض بعد تعريضها له بمدة ٤ - ١٠ أشهر فى حين أنه لم يصب الكافور بعد تعريضه للنمل الأبيض لمدة ٤ سنوات مما يدعونا إلى تشجيع استخدام خشب الكافور فى المناطق الموبوءة بالنمل الأبيض ، كما ظهر أن الغاب شديد المقاومة للإصابة بالنمل الأبيض لذا يمكن استخدامه فى عمل الأسقف إذ استحال استعمال الألواح الخشبية .

## ثانيا : الطرق العلاجية :

١ - إزالة جميع السرايب وبيوت الطين التى تشاهد على الحوائط والأخشاب فى المباني الريفية مع تنظيفها تنظيفا تاما .

٢ - يعامل الفراغ تحت الأرضيات الخشبية في مباني المدن المصابة بالتدخين بمخلوط مكون من أكسيد الزرنيقور والكبريت بنسبة ١ : ٣ بواسطة أجهزة خاصة .

٣ - حقن أنفاق النمل الأبيض في الأخشاب المصابة (أخشاب المباني الموجودة فوق سطح الأرض أو الأعمدة أو الأشجار ) بغاز برومور الميثايل أو غاز فلورور السلفهدريك ( $\text{SO}_2\text{F}_2$ ) .

## نتائج بعض الأبحاث التي أجريت في مصر على ناخرات الأخشاب .

أجرى في مصر الكثير من الأبحاث التي تتناول أخرة للأخشاب والخص هنا نتائج بعض هذه الأبحاث الهامة الحديثة :

### ١ - حصر العوامل النباتية المصابة بثاقبة الأفرع السودانية

*Sinoxylon sudanicum* L (Coi : Bostrychidae) في مصر

أجرى هذا البحث أحمد لطفي السلام ، وهدي هلال وعادل عقيل سنة ١٩٨٤ ونشر في مجلة حوليات مشتهر للعلوم الزراعية مجلد (٢٢) ، ١٩٨٤ وتورد فيما يلي ملخص هذا البحث تهاجم ثاقبة الأفرع السودانية التي تتبع رتبة غمدية الاجنحة فصيلة (Bostrychidae) الأخشاب الجافة أو الحديثة القطع وكذلك الأخشاب المخزونة في كثير من أقطار العالم . ويكمن الخطر في مهاجمة كل من الحشرات اليافعة واليرقات هذه الأخشاب حيث تحفر داخلها أنفاقا . وعند اشتداد الإصابة فإن الأخشاب المصابة بها تتحول إلى مسحوق ناعم . لذلك اتجهت هذه الدراسة إلى حصر الأشجار العائلة لهذه الحشرة في كل محافظات مصر على مدى أربع سنوات من سنة ١٩٧٧ إلى ١٩٨٠ .

واتضح من نتائج هذه الدراسة أن تلك الآفة يمتد انتشارها ليشمل ٦٦ مركزا تنتمي إلى ٢٣ محافظة وأن العوائل المصابة بهذه الآفة بلغ ١٤ عائلا نباتيا احتل اليونانسيانا مركز الصدارة في الإصابة بهذه الآفة في حين أتت إصابة نبات البامبو بهذه الحشرة في نهاية المطاف ولقد سجلت هذه الآفة لأول مرة تصيب العوائل التالية في مصر . الهيجاتوكسيلون التوت ، الصفصاف المصري ، البزنا ، كاسيونوروزا، البامبو والسسبان.

## ٢ - دراسة المحتوى المائي للخشب كعامل محدد لدرجة الضرر الناتج عن

### الاصابة بناخرة الخشب السودانية S. Sudanicum

أجرى هذا البحث ونشر في مجلة جولييات مشتهر للعلوم الزراعية مجلد (٢٢) ١٩٨٤ وقد قام بإجرائه هدى هلال ، أحمد لطفى عبد السلام ، هلال احمد هلال ، عادل عقيل أجريت دراسات عام ١٩٨٢ لمعرفة تأثير المحتوى المائي للخشب على الاصابة بناخرة الخشب المسحوقية زينوكسيلون سودانيكم واشتملت الدراسة أيضا تحديد الخسارة الناتجة عن كل من الفقد في الوزن والخواص الميكانيكية للخشب مثل تأثير الاصابة على مقدار الثنى ومقدار التحمل للضغط (كج / سم) وذلك على أربعة أنواع من الاخشاب مثل : بوانسيانا البيزيا لبيك ، فيكس كاريكا ، سيسيانا اكيوليتا .

كانت النتائج المتحصل عليها كالآتى:

١ - ازدياد الاصابة بهذه الحشرة بارتفاع المحتوى المائي للخشب حتى تصل إلى ٣٥.٦٪ ثم تنخفض مرة أخرى وعلى ذلك فان ارتفاع نسبة المحتوى المائي حتى ٣٥.٦٪ تشجع الاصابة بهذه الآفة وانخفاضها عن ذلك يقلل من الاصابة .

٢ - تختلف كمية الخسارة الناتجة في الوزن من عائل لآخر ، وجد أن الخسارة الناتجة من زوج واحد من الحشرات تراوحت من ٠.٣ إلى ١.٥٨ ج جم ويزداد مقدار الفقد في الوزن نتيجة النسل الناتج من هذا الزوج من الحشرات إلى مدى يتراوح من ٩.٨ إلى ١٩.٥ جم

٣ - تسبب الاصابة بهذه الحشرة تأثير كبير على قوة الثنى ليصل إلى ٤٥١٩ وحدة ب في خشب اليوانسيانا و٦٦٤ وحدة في خشب الالبيزيا ، أيضا تؤثر الاصابة على مقدار تحمل الخشب للضغط ففي اليوانسيانا يصل إلى ١ : ٤ وفي البيزيا ١ : ٤٠ .

### ٣ - دراسة المظاهر البيولوجية لناخر الخشب

دينوديرس بانفوفيولاتس فى مصر - Bostry- *Dinoderus bifoveolatus* Woll (coleoptera : chidae).

هدى هلال ، أحمد لطفى عبد السلام ، يسرى السباعى سنة ١٩٨١، ١٩٨٢ .


وقد اجريت التجارب لدراسة طرق التربية وطبيعة الضرر والسلوك وكذا تأثير درجات الحرارة والرطوبة النسبية الثابتة على بعض الأطوار النامية لناخر الخشب دينوديرس . بايفوفيولاتس . وأظهرت النتائج أن أطول فترة زمنية للطور العذرى (٤. ١٢ يومياً) على درجتى ٢٠ و ٢٥ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية بينما أقلها (٤.٧ يوم) على درجة ٢٥ م مع ٧٥٪ رطوبة نسبية ، وكانت أعلى نسبة خروج للحشرات اليافعة (١٠٠٪) على درجة ٢٥ م مع ٧٥٪ رطوبة نسبية ، بينما أقلها (٥٢٪) على درجة ٢٠ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية .

وتأثرت مدة حياة الحشرة اليافعة بالتلقيح والتغذية ، فوجد أن الحشرات غير الملقحة عاشت من ٤.٦ إلى ٤.٣ يوماً لكل من الذكر والأنثى ، بينما عاشت الملقحة من ٩.٥ ، ٦ ، ١١ يوماً لكل من الذكر والأنثى .

وتحت الظروف المعملية ولدة عامين متتاليين (١٩٨١، ١٩٨٢) وجد أن لهذه الحشرة ثلاثة أجيال سنوياً .

حيث يبدأ الجيل الأول أول إبريل ، وينتهى فى منت صف شهر يونيو والثانى من أول مايو إلى منتصف سبتمبر ، والثالث من نصف يوليو إلى أول نوفمبر .

نشر هذا البحث فى مجلة البحوث الزراعية المصرية مجلد ٦٤ عدد (١) - ١٩٨٦ .



(شكل ٢٤٢) الطور الياقاع الناقرة الخشب *D. bifoveolatus* ١ - منظر جانبي للخنفساء الياقعة . ب - شكل ظهري للخنفساء الياقعة . ج - بيضة . د - يرقة . هـ - طور العذراء .

## ٤ - دراسة تأثير العائل المفضل لناخرتى الخشب

بوستريكويسس ريشى ودينوديرس بايفوفيلولاس فى مصر , *Bostrychopsis reichei* Mard

*D.bifoveolatus* W (coleoptera Bostychidae

هدى هلال ، أحمد لطفى عبد السلام ، يسرى السباعى

أجريت تجربتان أساسيتان (إختيارية ، وإجبارية) لمعرفة مدى قابلية الأنواع المختلفة من الأشجار المزروعة فى مصر للإصابة بى الناخرات بوستريكويسس ريشى ودينوديرس بايفوفيلولاس ، وأوضحت التجارب أطول مدة للحياة فى الحشرات اليافعة للنوع الذى بوستريكويسس ريشى من ١٥ - ١٩ يوماً على البوانسيانا ، وأقلها من ٥ - ٧ يوماً على السنط العربى ، وأقلها ٨٦ يوماً على حطب القطن ، ولكن فشلت فى إعطاء أى جيل على كل من الكافور ، الكزازينا ، والصفصاف البلدى والإفرنجى . وكان أكبر نسل للأنثى (٢١٦ حشر) على هيماتوكسلين ، بينما أقلها (٦,٢ حشرة) على السنط العربى، كما كانت أطول فترة لخروج الخنافس (٥٥ يوماً) على حطب القطن وأقصرها (٢٩,٨) على البامبو.

وبالنسبة للنوع دينوديرس بايفوفيلولاس كانت أطول فترة لحياة الحشرة اليافعة تتراوح من ٢٤ - ٢٧ يوماً على البوانسيانا، وأقلها من ١٠ - ١١ يوماً على كل من الصفصاف الإفرنجى والبلدى، والهيماتوكسلين. وكانت أطول مدة جيل (١٠٠ يوماً) على اللبخ، وأقصرها (٢, ٧٤ يوماً) على البوانسيانا، وفشلت فى إخراج جيل عند تربيتها على كل من السنط العربى، الكزازينا، والصفصاف البلدى والإفرنجى. وكان أقل نسل للأنثى على اللبخ (٤, ٥ حشرة)، وأكثرها (١, ٢١ حشرة) على البامبو، وأطول فترة للخروج من الخشب (٤٢ يوماً) على البامبو، بينما أقلها (٨, ٢٨ يوماً) على الهيماتوكسلين.

نشر فى مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة المصرية ٦٤ (١) - ٨٣ - ٨٩ (١٩٨٦).

## ٥- دراسة التذبذبات والتغيرات الموسمية للمجموع الحشري للناخر بوستريكويسس ريشى فى منطقة الجيزة

هدى هلال ، أحمد لطفى عبد السلام ، يسرى السباعى

أجريت دراسات إيكولوجية على الناخر بوستريكويسس ريشى إشمملت على التغيرات الموسمية، وتوزيعات المجموع الحشري السنوى، ودراسة تأثير ثلاثة عوامل جوية مختلفة على هذا المجموع، وأيضاً على هذا المجموع، وأيضاً دراسة التأثير المشترك لهذه العوامل، وذلك خلال عامى ١٩٨٠، ١٩٨١.

وأوضحنا النتائج أن لهذه الحشرة ثلاثة أجيال سنوياً، ويبدأ الجيل الأول من آخر فبراير وأول مارس حتى يونيو، والجيل الثانى من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر، والجيل الثالث من يوليو وأغسطس إلى ديسمبر.

وأظهرت الدراسة علاقة موجبة قوية بين المجموع الحشري والحرارة العظمى حيث أثرت هذه الحرارة على المجموع الحشري بفترات سابقة تراوحت بين ٦ - ٨، ٥ - ٦، ٣ - ٤ أسابيع على ظهور الحشرات لكل من الأجيال الأول والثانى والثالث، على الترتيب. ومن ناحية أخرى أظهرت الحرارة الصغرى نفس التأثير ولكن بصورة سالبة. أما الرطوبة النسبية فأنظهرت علاقة سالبة قوية لكل من الجيلين الأول والثالثة وعلاقة موجبة للجيل الثانى خلال عامى الدراسة.

وأوضح تحليل التباين المشتق من التحليل الإحصائى أن مجموع العوامل المؤثرة على خروج الحشرات من خلال العوامل الثلاثة الجوية كانت نسبته ٧٦، ٨٣، ٩٠٪ للعام الأول، ٨٢، ٨٢، ٧٢٪ للعام الثانى للأجيال الثلاثة على الترتيب.

نشر فى نفس العدد من المجلة السابق ذكرها



## ٦ - دراسة تأثير درجات الحرارة والرطوبة النسبية الثابتة

### على النشاط البيولوجي لحشرة بوستريكويسس ريشى فى مصر

هدى هلال ، أحمد لطفى عبد السلام ، يسرى السباعى

أحرثت دراسات لمعرفة تأثير درجات الحرارة الثابتة (٢٠، ٢٥، ٣٠، ٣٥ م) مشتركة مع درجات رطوبة نسبية (٤٥، ٥٥، ٦٥، ٧٥٪) على بعض الظواهر البيولوجية لحشرة بوستريكويسس ريشى مشتملة على مدة حياة الحشرة اليافعة، مدة الجيل، النسل، فترة خروج الخنافس، والنسبة الجنسية، وتبين من النتائج أو أطول مدة حياة الحشرة اليافعة ٢٠، ٢٣ يوما لكل من الذكر والأنثى على درجة ٢٠ م مع ٧٥٪ رطوبة نسبية، وأقلها (١٨، ٩ يوما على الترتيب) على درجة ٣٥ م مع ٧٥٪ رطوبة نسبية. وكانت أطول مدة جيل ١٣٢ يوما على درجة ٢٠ م مع ٧٥٪ رطوبة نسبية، وأقصاها ٦٧ يوما على درجة ٣٥ م مع ٧٥٪ رطوبة نسبية. وكان أكبر نسل للأنثى (٢٦، ٨ حشرة) على درجة ٣٠ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية، أقل نسل (٩ حشرات) على درجة ٢٠ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية.

وطالت فترة الخروج إلى ٤٩ يوما على درجة ٣٥ م مع ٤٥٪ رطوبة، وقصرت إلى ٢٤، ٨ يوما على درجة ٢٠ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية. وتأثرت النسبة الجنسية للنسل الناتج فكانت ٥٢، ٢٪ ذكور على درجة حرارة ٢٠ م مع ٧٥٪ رطوبة، وإنخفضت إلى ٤٥٪ ذكور على درجة ٣٠ م و ٥٥٪ دطوية نسبية.

نشر فى نفس العدد من المجلة السابقة.

## ٧- دراسات بيولوجية على ناخر الخشب

بوستريكويسس ريشي في مصر

هدى هلال ، أحمد لطفى عبد السلام ، يسرى السباعى

إشتملت الدراسة البيولوجية على خنافس بوستريكويسس ريشي على: طريقة التربية، البيض، اليرقة، العذراء، الحشرة اليافعة، تأثير درجات الحرارة والرطوبة الثابتة، السلوك وطبيعة الضرر، مدة الجيل، عدد الأجيال السنوية.


وأشارت النتائج المتحصل عليها أن الأنثى تضع البيض فى الشقوق وتحت القلف، وأحيانا يرى البيض فى مخلفات الحفر الساقطة، ويوضع عادة فى مجاميع وأحيانا فرادى. ووجد تحت الظروف العملية أن فترة الحضانة تراوح بين ٢ - ٩ يوما بمتوسط ٤,٥ يوما خلال الجيلين الأول والثانى، ومن ٣ - ١٢ يوما بمتوسط ٦,٣ يوما فى الجيل الثالث.

وكانت أكبر نسبة خروج للخنافس (١٠٠٪) على درجة ٣٥ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية، وأقلها (٥٢٪) على درجة ٢٠ م مع ٤٥٪ رطوبة نسبية.

وتتغذى الذكور والإناث من ٢ - ٣ يوما بعد الخروج قبل عملية التلقيح، وتبدأ الأنثى فى الحفر لعمل نفق لوضع البيض، ومتوسط فترة ما قبل وضع البيض ٥,١ يوما حيث تضع الأنثى ٣٧,٣ بيضة فى المتوسط، وفترة وضع البيض ١٣ يوما، وفترة ما بعد وضع البيض ٦ أيام. وتعيش الذكور والإناث الملقحة ٢٠, ٢٢ يوما، على الترتيب، بينما غير الملقحة ١٧, ١٠ يوما، على الترتيب، ومتوسط فترة حياة الحشرة اليافعة بدون تغذية حوالى خمسة أيام.

وتحت الظروف العملية وجد أن لهذه الحشرة ثلاثة أجيال خلال عامى ١٩٨٢، ١٩٨٣، ويبدأ الجيل الأول من مارس إلى يونيوى (حوالى ١٦٠ - ٢٢٢ يوما) بمتوسط ١٧٧ يوما، ويبدأ الجيل الثانى من يونيو إلى سبتمبر (حوالى ٧٤ - ١١٤ يوما) بمتوسط ٩٢,٩ يوما، ويبدأ الجيل الثالث من سبتمبر إلى ديسمبر (من ٦٥ - ١٠٥ يوما) بمتوسط ٨٠,٦ يوما.

نشر فى نفس العدد من المجلة السابقة.



(شكل ٢٤٢) أطوار حشرة *Bostrychopsis reichei* Mars - شكل جانبي للخنفساء اليافعة . ب - شكل ظهري للخنفساء اليافعة . ج - بيضة . د - يرقة تامة النمو . هـ - شكل جانبي للعذراء

**الافات الحشرية التي  
تصيب نباتات الزينة  
والنباتات الطبية والعطرية**

## الآفات الحشرية التي تصيب نباتات الزينة والنباتات

### الطبية والعطرية

تزرع نباتات الزينة في جميع البلاد العربية، ويزداد الإقبال عليها عاما بعد عام لإرتفاع المستوى الاقتصادي للأسر وحرص كل أسرة على إقتناء مثل هذه النباتات، وتصدر بعد البلاد العربية مثل مصر والأردن مقادير كبيرة من نباتات الزينة إلى البلاد الأجنبية خصوصا في فصل الشتاء، وأصبحت هذه النباتات مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي – كذلك تقوم عليها صناعات إستخلاص الزيوت العطرية في مصر أما النباتات الطبية والعطرية فتزرع منذ أزمان سحيقة في مصر وسائر الأقطار العربية، وكان الطب الفرعوني والطب اليوناني والعربي يعتمد على عدد كبير من هذه النباتات في التداوي، وفي عصرنا الحاضر إرتفعت الأصوات بالرجوع إلى الأعشاب كمصدر للدواء والبعد عن الأدوية المخلقة والكيمائيات المركبة لما لها من آثار جانبية على الإنسان.

هذا وتصاب هذه النباتات جميعا بالكثير من الآفات الحشرية ويتطلب علاج هذه الآفات حرصا شديدا حتى لا تتعرض مثل هذه المنتجات المرتفعة الأسعار إلى أى قدر من التلوث، ونورد هنا أهم هذه الآفات وفق التقسيم التالي:

### أولا: الآفات الحشرية التي تصيب نباتات الزينة

#### ١- تريبس نباتات الزينة

الاسم العلمى للحشرة، *Heliothrips haemorrhoidalis*

*Hercinothrips femoralis*

## رتبة هدية الأجنحة Order Thysanoptera

## فصيلة فليوثريبيدي Fam. Phloethripidae

وتتعرض أغلب نباتات الزينة خصوصا تلك المزروعة في البيوت المحمية إلى الإصابة بهذين النوعين من التربس،

تضع الأنثى بيضها في أنسجة الأوراق ويفقس البيض بعد ٢ - ٧ أيام وتخرج منه حوريات صفراء نشطة تغتذى بامتصاص عصارة الأوراق، تنسلخ الحورية أربعة إنسلاخات وتتحوّل إلى شبه عذراء ثم عذراء ثم حشرة يافعة لونها بني وطولها نحو ٢ مم.

وتمتص الحوريات والحشرات اليافعة عصارة النباتات فينشأ عن ذلك التواء الأوراق وذبولها وعدم تفتح البراعم.

## ٢- تربس القرنفل

الاسم العلمي للحشرة *Hampliothrips cottie* (Vuill)

وينتمي لنفس الرتبة والفصيلة التي تتبعها الحشرتان السابقتان وتوجد هذه الحشرة بين أنصال أوراق وسوق نباتات القرنفل، والحشرة اليافعة كبيرة الحجم نوعا يبلغ طولها نحو ٢,٥ مم ولونها أسود.

## ٣- تربس الفيكس تندا

الاسم العلمي للحشرة *Cynaikothrips ficorum* Marshall

وتتنتمي لنفس فصيلة الحشرة السابقة، وتصيب أوراق نبات الفيكس تندا مما يسبب ظهور بقع فضية على الأوراق وانطباق حافتي الورقة المصابة على إمتداد العرق الوسطى خاصة في الأفرع الطرفية، وتعيش الحشرات داخل هذه الأوراق المنطبق حوافها حيث تضع الإناث

البيض، ويتقدم الإصابة يحمر لون الأوراق ثم تجف وتموت، والحشرة اليافعة كبيرة الحجم يبلغ طولها نحو ٣ مم ولونها أسود وأجنحتها رمادية.

## ٤- تربس العنب

الاسم العلمي للحشرة *Relithrips syriacus* Mayer

فصيلة تريبيدي Fam. Thripidae

وتصيب هذه الحشرة العنب والبرقوق والكمثرى والخوخ والكاكي والورد والأكاليفيا، وتمضي الحشرة بياتها الشتوى على هيئة حشرة يافعة تحت الأوراق الجافة وعلى سوق الأشجار، وتنشط فى الربيع وتضع الإناث بيضها داخل أنسجة النبات، والحشرة اليافعة صغيرة لاتتجاوز طولها ١,٥ مم ولونها أسمر غامق أو أسود، وتوجد هذه الحشرة فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والأردن وسوريا والعراق.

## ٥- تربس الجلادبولس

الاسم العلمي للحشرة *Taenothrips simplex*

وتتنمى لنفس فصيلة الحشرة السابقة، وتصيب الجلادبولس والإيرس والليلي، وتسبب الإصابة ضررا كبيرا للمحصول ولاتتفتح الأزهار جيدا، وتصبح الكورمات المخزونه لزجة من العصارة التى تسيل من الكورمات المصابة وعند زراعة الكورمات المصابة تتكاثر الحشرة على الأوراق والأزهار، وتضع الإناث بيضها الكلى الشكل داخل أنسجة الأوراق أو الكورمات، ويفقس البيض عن حوريات صفراء اللون تغتذى بامتصاص العصارة وتنسلخ إلى طور الحورية الثانية ثم طور شبه العذراء والعذراء ومدة الجيل من أسبوعين إلى شهر.

### مكافحة التربس

تكافح هذه الحشرة كيميائيا مع المن والحشرات القشرية والبق الدقيقى بالرش بالملاثيون ٥٧ ٪ بنسبة ٣ فى الألف أو ١ لتر من المبيد يضاف إليها ٤٠٠ لتر ماء.

## ٦- الحشرات القشرية

رتبة متشابهة الأجنحة Order Homoptera

تصاب نباتات الزينة بأنواع عديدة من الحشرات القشرية منها:

أ - مجموعة الحشرات القشرية المدرعة أو الحقيقية Fam. Diaspididae وتنتمي إليها الحشرات التالية:

حشرة الأوليندر *Aspidiotis heolerae* Vel

حشرة اللاتانيا القشرية *Aspidiotis latania* Sig

الحشرة القشرية السوداء *Chrysomphalus ficus* Riley

الحشرة القشرية الحمراء *Aonidiella aurantii* Mask

حشرة النخيل القشرية *Parlatoria blanchardii* Targ

حشرة الورد القشرية *Aulacaspis rosae* Bouche

حشرة الكاميليا القشرية *Aspidiotus camelliae* Sign

حشرة الكاميليا القشرية الأرجوانية *Lepidosaphis camelliae* Sign

الحشرة القشرية برسوناتس *Mycetaspis personata* (Comstock)

والقشرة في أفراد هذه الفصيلة منفصلة عن جسم الحشرة وتظل الإناث تحت الغطاء القشري حتى تصبح حشرة يافعة وتضع بيضها أو تلد تحت هذه القشرة، وتنمو الذكور



كالإناث إلا عمر حورية الذكر الأخير الذي يسبق طور الحشرة اليافعة يكون ساكنا ويسمى بالعذراء والذي تنمو الأجنحة فيه خارجيا.

وتصيب هذه الحشرات القشرية أوراق نباتات الزينة والأفرع والنموات الغضة وتمتص منها العصارة النباتية مما يؤدي إلى جفاف الأوراق والنموات وموتها، وإذا أصابت البراعم الزهرية لا تتفتح هذه البراعم، وأكثر نباتات الزينة تأثرا بهذه الآفات هي الورد والهيسكوس واللاتاينا والأوليندر والنخيل والياسمين والتفلة.

### ب - مجموعة الحشرات القشرية الرخوة Fam. Coccidae

الأنثى في هذه الفصيلة منبسطة مستطيلة وبيضاوية ولها هيكل خارجي صلب ناعم أو قد تكون مغطاة بالشمع وقد تكون الأرجل موجودة ولكنها مختزلة جدا، وقد يكون الذكور مجنحة، وتضم هذه الفصيلة عدد من الأنواع الضارة بنباتات الزينة منها مايلي:

#### حشرة الموالح الشمية *Ceroplastes floridensis* Comst

وهذه الحشرة تصيب البلازونيم والهيدرا والياسمين والفيكس والأوليندر، وتفرز هذه الحشرة مادة عسلية بشدة على الأوراق والأفرع المصابة فينمو عليها العفن الأسود - ولهذه الحشرة ثلاثة أجيال في السنة.

#### حشرة التين الشمعية *Ceroplasts rusci*

تصيب هذه الحشرة الكثير من نباتات الزينة خاصة نبات الفيكس *Ficus corica* وتفرز المادة العسلية التي تكاثر عليها الفطر.

#### الحشرة القشرية الرخوة *Coccus hesperidum*

تكثر هذه الحشرة على نباتات الزينة المزروعة داخل الصوب والبيوت المحمية وتصيب أفرع وأوراق هذه النباتات وتصيب كذلك أشجار النخيل والفيكس ولها من ٣ - ٦ أجيال في السنة.

## حشرة الزيتون الشمعية (*Parasaissetia oleae* (Barnard))

تصيب هذه الحشرة بعض نباتات الزينة خصوصا في المناطق الساحلية، وتفرز المادة العسلية التي ينمو عليها الفطر .

### مكافحة الحشرات القشرية على نباتات الزينة.

#### المكافحة الحيوية

يوجد للحشرات القشرية في البيئة الكثير من الأعداء الطبيعية من حشرات مفترسة وأنواع الأكاروس المفترسة - وهذه الأعداء لها فاعليتها في الحد من خطورة هذه الآفات بشرط السماح لها بالنشاط وعدم استعمال المبيدات الكيماوية في حالة نشاطها - لذلك يجب إجراء دراسات مستفيضة على هذه الأعداء ومعركة أفضل الطرق للاستفادة منها، وفي الولايات المتحدة، تقوم بعض البيوتات بتربية هذه الأعداء الحيوية وإكثارها وبيعها للأهالي لمكافحة حشرات نباتات الزينة المنزلية وتحقق من ذلك عائدا كبيرا، ولكل من هذه الأعداء مواعيد يكون نشاطها فيها كبيرا ومن ذلك ماسجله المؤلف من وجود طفيليان من غشائية الأجنحة يتطفلان على الحشرات اليافعة لحشرة النخيل القشرية في منطقة الجيزة في مصر هما *Aspidiotiphagus loursburgi* Beri, *Aphytis* Sp. وهما من رتبة غشائية الأجنحة وكانت قمة نشاط هديه الطفيلين في أشهر مارس وإبريل ويونية وأغسطس وأكتوبر، علما بأن لهما ثلاثة أجيال في العام.

كذلك يفترس الحشرات القشرية العديد من أنواع حشرات أبي العبد ويرقات أسد المن وتكثر في الربيع والخريف وحشرة *Gonwentside psociformis* من رتبة شبكية الأجنحة والحلم المفرس المسمى *Pediculoides ventricoccus*

#### المكافحة الكيماوية

إذا كانت هناك ضرورة تكافح الحشرات القشرية والبق الدقيقي والمن على نباتات الزينة معا بالرش بمبيد الملايون ٥٧٪ بنسبة ٢ في الألف أو بمبيد أكتلك ٥٠٪ بنسبة ١,٥ في الألف.

## ٧- البق الدقيقي

تصاب نباتات الزينة بأنواع عديدة من حشرات البق الدقيقي، وخصوصا نباتات الزينة

الورقية مثل الكروتون وعمة القاضى (الكاكس) والجاريدونيا والبيجونيا والداسينا والأوليندر والكريزانثم والورد وتصاب أوراق هذه النباتات وأفرعها الفضة، وتسبب الإصابة الشديدة جفاف الأوراق والفروع، وإذا أصاب البراعم الزهرية تجف هذه البراعم ولا تتفتح، ويكون البق الدقيقى مشكلة لمنتجى نباتات الزينة المزروعة فى البيوت المحمية ومن أنواع البق الدقيقى التى تضر نباتات الزينة منها ما ينتمى لفصيلة البق الدقيقى Fam. Pseudococcidae ومنها بق الموالح الدقيقى *Pseudococcus citri* Risso تصيب هذه الحشرة العديد من نباتات الزينة مثل نخيل الزينة.

### بق الهبسكس الدقيقى *Moconellicoccus hirsutus* (Green)

ويصيب الكثير من نباتات الزينة مثل الهبسكس

ومن أنواع البق الدقيقى التى تصيب نباتات الزينة وتنتمى لفصيلة الحشرات القشرية الماردة Fam. Margarodidae ما يلى:

### البق الدقيقى الإسترالى *Icerya purchasi* Mask

وتمتص حشرات اليافعة وحورياته العصارة لأوراق نباتات الزينة وفروعها وتسبب جفافها

### البق الدقيقى المصرى *Icerya aegyptiaca* (Douglas)

وهو يصيب الكثير من نباتات الزينة مثل سالفه

### مكافحة البق الدقيقى على نباتات الزينة

كما سبق أن ذكرنا فإن البق الدقيقى أعداء حيوية فى البيئة من مفترسات وطفيليات منها خنفساء الفيداليا *Rodalia cardinalis* وتتطفل على حوريات البق الدقيقى ذبابة تسمى *Cryptochaetum iceryae* وفى حالة الإضرار للمكافحة الكيميائية تعامل هذه الآفات كما سبق أن ذكرنا فى معالجة الحشرات القشرية ويكون العلاج مشتركاً.

## ٨- المن

تصاب نباتات الزينة بالعديد من أنواع المن التي تنتمي جميعاً لفصيلة Aphididae وتصيب المن نباتات الزينة في الزراعات المكشوفة والبيوت المحمية، ويغتنى المن بامتصاص العصارة من الأجزاء النباتية الغضة ويفرز عليها المادة العسلية مما يؤدي إلى جفاف هذه الأجزاء ونمو الفطر الأسود عليها، وإذا اشتدت الإصابة بهذه الآفة فقد يقضى على المحصول بكامله وينقل المن لعوائله الكثير من الأمراض الفيروسية مثل أمراض الموزايك ومرض البقع الدائرية ومن أنواع المن الشهيرة التي تصيب نباتات الزينة خارج البيوت المحمية وداخلها مايلي:

من البنفسج *Macromyzus violae*

من الورد *Macrosiphum rosae* ThE

من الكريزانتيم *Myzus rosatum*

من البسلة *Macrosiphum pisi*

من البقول *Aphis laburni*

من الفول *Aphis fabae*

من القطن *Aphis gossypii*

من الخوخ *Myzus persicae*

### طرق مكافحة

ينصح المؤلف بتنشيط دور المفترسات والمتطفلات من أعداء المن الحيوية في الطبيعة وقد سبق لنا ذكر الكثير منها، وإذا اضطّر الأمر للمكافحة الكيميائية فيتبع في ذلك ما سبق أن ذكرنا في الحشرات القشرية.

## ٩ - الذباب الأبيض

يتعرض الكثير من نباتات الزينة للإصابة بالذباب الأبيض من فصيلة Aleyrodidae، ومن

نباتات الزينة التي تتعرض للإصابة بهذه الآفة البيجونيا والهسبكس والفل والورد والدوراننا والسالفيا، وتظهر هذه الحشرات ويشد ضررها في الفترة من يولية حتى سبتمبر، وتفضل الذبابة البيضاء النباتات الصغيرة الغضة وكذلك النباتات القوية ويقل عددها كثيرا في أشهر الشتاء وتؤى آنذاك إلى الحشائش وأوراق النباتات السفلية، وتفرز الذبابة البيضاء المادة العسلية التي ينمو عليها الفطر الأسود، ولكن ضررها الأكبر يكمن في قيامها بنقل بعض الأمراض الفيروسية الخطرة بين النباتات مثل مرض الثقاف الأوراق ومن أنواع الذباب الأبيض الذي يصيب نباتات الزينة مايلي:

ذبابة القطن البيضاء *Bemisi gossypiperda*

ونوعان آخران هما *Trialeurodes vaporariorum*, *Dialeurodes kirkaldyi*

### مكافحة الذباب الأبيض على نباتات الزينة

يفترس الذبابة البيضاء في البيئة يرقات أسد المن وحوريات مفترسة تابعة لفصيلة Meridae من رتبة نصفية الأجنحة، كما يتطفل عليها طفيل داخلي من رتبة غشائية الأجنحة هو الطفيل *Eerimocers diversiciliatn1*

وفي حالة الإضرار تعالج كيماويا علاجا مشتركا مع المن والبق الدقيقي.

## ١٠- الذباب الصانع للانفاق الورقية

من فصيلة Agromyzidae

رتبة ثائية الأجنحة Order Diptera

وهذا الذباب صغير الحجم، تضع الإناث الملقحة بيضها على أوراق نباتات الزينة وأغصانها الغضة، ويفقس البيض عن يرقات صغيرة تخترق بشرة الورقة وتشرع في صناعة نفقا متعرجا بين البشريتين، وتتغذر اليرقة في غرقة متسعة في نهاية النفق ثم تتحول العذراء إلى حشرة يافعة تترك الورقة وتطير ولكل نوع من أنواع هذا الذباب أنفاق ذات طابع مميز لها،

ويمكن معرفة نوع الذباب من شكل النفق الذي تصنعه اليرقة، وتصيب هذه الحشرات من نباتات الزينة أبو حنجر والداليا والسلفيا السيناريا وغيرها، وأهم أنواع هذا الذباب مايلي:

*P. minuscula, Phytomyza atricornis*

### طرق مكافحة الذباب صانع الأنفاق

يتطفل على عذارى هذه الحشرات أنواع مختلفة من المتطفلات منها طفيليان من رتبة غشائية الأجنحة هما *Diglyphus sp.* من فصيلة، *Entophidea* والطفيل *Opius sp.* من فصيلة *Brachonidae*

#### المكافحة الكيميائية

فلا طائل منها طالما إذا ما إستقرت اليرقات داخل الأنفاق، ولكن ينصح البعض بالرش رشة وقائية قبل الإصابة بمبيد الدايثوثويت ٤٠٪ بنسبة ١٥ ٪

## ١١- ذباب النرجس

يصاب النرجس بذباب الأبصال التابع لفصيلة ذباب الأزهار (*Syrphidae*) (رتبة ثنائية الأجنحة)، ويحوم ذباب هذه الفصيلة طائرا حول الأزهار، ومنه

ذبابة النرجس الكبيرة *Meredon equestris* Fab، وهي ذبابة سمراء اللون يوجد على جسمها حلقات برتقالية أو صفراء والجسم مغطى بالشعر، وتحدث هذه الذبابة طينيا عاليا أثناء طيرانها، وتضع الأنثى بيضها فرديا بالقرب من الأبصال من مناطق جفاف أوراق النرجس، وتضع في حياتها نحو ٤٠ بيضة، ويفقس البيض عن يرقات لودية تثقب الأبصال وتضع داخلها أنفاقا وتتحول في نهاية النفق إلى عذراء برميلية تخرج منها الذبابة اليافعه

ذبابة النرجس الصغيرة *Eumres strigatus* Fall.

وتظهر هذه الذبابة في شهرى إبريل ومايو، ولونها أسود ويوجد على الجسم علامات

هلالية الشكل تضع الأنثى الملقحة عشرة بيضات على كل بصلة، بعد فقس البيض تقتحم اليرقات قمة البصلة حيث تخترقها وتلفها، وتتعدى اليرقات داخل البصلة ويخرج منها الذباب اليافع

### طرق مكافحة

عدم ترك الأبصال معرضة بعد جفاف الأوراق وتحسن وضع الأبصال في ماء ساخن (١١٠ ف) لمدة ساعة

## ١٢ - الذباب المسبب للأورام

ينتمي هذا الذباب إلى فصيلة Cecidomyidae رتبة ثنائية الأجنحة Diptera ، وينشأ عن إصابته للأجزاء النباتية تكون أورام في مكان الإصابة، ويصيب هذا الذباب براعم وسوق نباتات الزينة مما يؤدي إلى نقص إنتاج الأزهار ومن هذا الذباب مايلي:

### ذبابة البنفسج *Daysmeura offinis* Kieff

وهي ذبابة صغيرة الحجم يصل طولها إلى ١,٥ مم وتصيب نباتات البنفسج، وينشأ عن الإصابة التلف حواف الورقة حول نفسها ثم يصبح لونها مسودا وتجف، وعند فحص الأوراق المصابة نجد يرقات صغيرة لونها أحمر خفيف - وتوجد داخل الجزء الملتوى من الورقة، وينشأ عن الإصابة قلة الإنتاج.

### ذبابة الورد *Rosemidge*

وهي ذبابة صفراء بنية اللون تضع بيضها على براعم وأوراق الورد، وعند فقس البيض تخرج اليرقات الصغيرة التي تغتذى داخل البراعم وتسبب ظهور أورام عليها ينشأ عنها عدم انتظام تكوين الأزهار.

### ذبابة الكريزانثم *Chrysanthemum midge*

وهي ذبابة صغيرة رفيعة أرجلها طويلة ولونها برتقالي تسبب جفاف الأوراق وظهور أورام على البراعم المصابة وقلة إنتاج الأزهار.

## مكافحة الذباب المسبب للأورام

تكافح هذه الآفات بقطع الأوراق التي تظهر عليها الإصابة وحرقها

### ١٣ - حفار ساق الذرة الأوروبي *Ostrinia nubilalis*

من رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة فصيلة Pyraustidae

وقد سبق لنا ذكر هذه الحشرة في مواضع سابقة من هذا الكتاب، وتصيب يرقاته نباتات الداليا والكريزانثم والجلاديولس والزينيا والجيرانيوم، وتتلف حوامل الأزهار نتيجة ثقب الحشرات داخلها مما يسبب عدم إنتظام شكل الأزهار وليس له مكافحة كيميائية على نباتات الزينة.

### ١٤ - الجعال

تنتمي الجعال إلى فصيلة Scarabaeidae رتبة غمدية الأجنحة، وتصاب نباتات الزينة بعدد من الجعال منها:

أ- جعل الخوخ *Pachnoda fasiata*

ولقد سبق لنا تناوله ضمن آفات الخوخ، وتغذى حشرات الياقة على أزهار الورد والحناء.

ب - جعل الورد الزهردي *Potosia cuprea igincollis* Gong

وتغذى حشرات الياقة على أزهار الورد وتتلف براعمه الزهرية وتسبب له خسائر كبيرة

ج - جعل الورد الزغبى *Tropinota squalida* Scop



وتظهر حشرات اليافعة من نوفمبر إلى إبريل وتغذى على رحيق الأزهار وبتلاتها خصوصا أزهار الورد وتفضل إصابة الأزهار البيضاء.

### مكافحة الجعال على نباتات الزينة

أفضل طريقة لمكافحتها هي جمع اليرقات والحشرات اليافعة الموجودة حول جذور النباتات المصابة وعلى أزهارها وإعدامها حرقا.

وتوصى وزارة الزراعة المصرية برش شجيرات الورد المصابة بالجعال بمبيد هوستاثيون ٤٠٪ بمعدل لتر واحد للفدان يضاف إلى ٤٠٠ لتر ماء أو مبيد لانيت ٩٠٪ بمعدل ٢٠٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء للفدان.

### ثانيا الآفات الحشرية التي تصيب النباتات الطبية والعطرية

تزرع النباتات الطبية والعطرية في أقطار العالم العربى منذ عهد بعيد، ولعلماء العرب فى الماضى سجل حافل فى علم الأقربازين المستند إلى معرفة دقيقة بمثل هذه النباتات والأعشاب، وقد ظل العالم حتى نهاية القرن الثامن عشر يعتمد على مؤلفات ابن سينا وأبو داود الأنطاكى فى تركيب الأدوية والتطبيب بها، والآن تزرع فى مصر والبلاد العربية الأخرى مساحات من الأرض بالنباتات الطبية والعطرية يستخرج منها مستخلصات دوائية وتقوم عليها صناعات وطنية قوية ويصدر منها إلى الخارج كميات كبيرة تشكل جزءا من الدخل القومى، مما شجع الكثيرون على الدخول فى هذا المضمار وزراعة هذه النباتات فى مساحات جديدة خصوصا فى الأراضى الصحراوية الحديثة الإستزراع.

وتصاب النباتات الطبية والعطرية بآفات كثيرة، ولكن لأن لم تستأثر هذه الآفات بالدراسات المستفيضة لذلك سوف أتناول هذا الموضوع مع شح فى المراجع والأبحاث.

### أهم النباتات الطبية والعطرية التي توجد فى أقطار العالم العربى

ذكر فوزى قطب ١٩٨١ أن أهم النباتات التى توجد فى أقطار العالم العربى على سبيل

المثال لا الحصر وفقا للمزروع منها في كل قطر عربي مايلي:

- ١ - اليمن: حناء - مر - بن - سنامكى
- ٢ - المملكة العربية السعودية: مر - حناء - سنامكى
- ٣ - العراق: عرقسوس - حنظل - زعتر - مغات - بابونج سكران - شاي جبلى.
- ٤ - الكويت: رطريت - حلبة
- ٥ - سوريا: عرقسوس - ورد - عقص - نعناع - زعتر - بابونج - حصالبان - خطمية - حبهان - لوزمر.
- ٦ - الأردن: عقص - حنظل - زيتون - مصاص
- ٧ - لبنان: شيع - بصل العنصل - خردل أبيض - خردل أسود - سكران أوروبى - بردقوش.
- ٨ - فلسطين: لوز حلو - زيتون - شطة - عقص - بصل - عنصل - بصل فار - خروج.
- ٩ - مصر: خله بلدى - خلة شيطاني - سكران مصرى - داتورة - سنامكى - بايونج - حناء - مصاص - بصل عنصل - بصل فار - لعبة مرة - خروج - خطمية - شيع - كركديه - لحلاح - ينسون - كراوية - كمون - كزيرة - نعناع - حصا البان - سولانم.
- ١٠ - السودان: كركديه - صمغ عربى - سنامكى - شطة - تمر هندی - سكران - داتوده - حناء - حنظل - حلبة - جوز مقى.
- ١١ - ليبيا: زيتون - مصاص - حنظل - بصل عنصل - بصل فار - لحلاح - زعتر - خروج - داتورة - لعبة مرة .
- ١٢ - تونس: زيتون - بصل - عنصل - مصاص - داتورة - لعبة مرة - بصل فار - سكران أوروبى.
- ١٣ - الجزائر: زعتر - سكران - داتورة - شيع - مصاص - حنظل - حصا لبان - حلبة.
- ١٤ - المغرب: خلة بلدى - خلة شيطاني - حنظل - حصا لبان - كسبرة - بصل عنصل ، بصل فار.

وهذه الحاصلات لها أهمية إستراتيجية كبيرة لا يستهان بها - لذلك كان الحفاظ عليها من الآفات واجبا صعبا، ومما يزيد الموضوع صعوبة أن إستعمال المبيدات الحشرية لمكافحة الآفات

على هذه الحاصلات لا يمكن التوصية بها، فكيف ندخل السموم ولو بآثار ضئيلة على المستخلصات الدوائية التي يعالج بها البشر لذلك كان إستعمال طرق السيطرة الأخرى البعيدة عن إستعمال الكيماويات هو الأساس في مكافحة هذه الآفات وذلك من مكافحة زراعية وحيوية وغيرها، ونورد هنا أهم الحاصلات الدوائية والآفات الحشرية التي تصيبها بطريقة الحصر لا التفصيل - إذا أن معظم هذه الآفات تصيب المحاصيل الزراعية وسبق لنا أن تناولناها في مواضع أخرى من هذا الكتاب - ويضم الجدول التالي أهم هذه الحاصلات والآفات الحشرية التي تصيبها

أسم الحاصل الدوائي	الآفات التي يمكن تصيبه
بابونج	كلاب البحر أو الحفارات - المن - الذباب الأبيض - نطاطات الأوراق - التريس - الديدان الجياشة (بودة ودق القطن الصغرى والكبرى) - الديدان القارضة (السوداء والبنية) - بودة قرون السمسم.
داتورة	كلاب البحر (الحفار الكبير والافريقي) - المن - الذباب الأبيض - نطاطات الأوراق - التريس - بودة ورق القطن - الديدان القارضة - بودة درنات البطاطس - بق الموالح الدقيقى.
خلة بلدى وخلة شيطاني	كلاب البحر، المن - الذبابة البيضاء - نطاطات الأوراق - البودة القارضة - بودة ودق القطن .
سكران	كلاب البحر، المن - نطاطات الأوراق - الذبابة البيضاء - التريس - الديدان القارضة.
سنامكى	المن - نطاطات الأوراق - التريس - الذباب الأبيض - الديدان القارضة
بصل عنصل	المن - التريس - الذباب الأبيض - الديدان القارضة - البق الدقيقى.

الآفات التي يمكن تصيبه	أسم الحاصل النواتي
المن - التريس - نطاطات الأوراق - الذباب الأبيض - نودة ورق القطن.	بصل الفار
المن - التريس - نطاطات الأوراق - نودتى ورق القطن - صانعة أنفاق أوراق الخروع - البق الدقيقى.	حناء
نودتى ورق القطن - البق الدقيقى - جعل الورد الزغبى.	خروع
كلاب البحر - المن - من الجنور - نطاطات الأوراق - التريس - الذباب الأبيض - نودتى ورق القطن - حفارات الساق.	خطمية
المن - التريس - نطاطات الأوراق - ذبابة العشار	عرقسوس
كلاب البحر - التريس - المن - الذبابة البيضاء - النودة القارضة - نودتى ورق القطن.	عشار
كلاب البحر - التريس - المن - الذبابة البيضاء - الديدان القياسة ونصف القياسة.	شيع
التريس - المن - الذبابة البيضاء - نودتى ورق القطن - نودتى اللوز القرنفلية والشوكية - البق الدقيقى.	كراوية
نودتى ورق القطن - المن - النودة القارضة.	كركديه
نودتى ورق القطن - الديدان القارضة - المن.	كزبرة
الديدان القارضة - المن - التريس - نودة ثمار القرعيات - الحفارات.	كمون
كلاب البحر - التريس - نطاطات الأوراق - المن - الذباب الأبيض - نودة اللوز الأمريكية - حفار ساق الباذنجان.	حنظل
كلاب البحر - التريس - المن - الذباب الأبيض - النودة القارضة - نودتى ورق القطن.	سولانم
	ينسون

# **الآفات الحشرية التي تصيب النباتات المزروعة في البيوت المحمية**

## الآفات الحشرية التي تصيب النباتات المزروعة في البيوت المحمية

الزراعة المحمية هي إقامة منشآت تحمي النباتات المزروعة داخلها سواء أكانت خضرا أم نباتات زينة، وهذه المنشآت مكلفة للغاية ثابتة وليس من السهولة نقلها من مكان إلى آخر، وهذه المنشآت قد يكون بيوتا من البلاستيك أو ما إصطلح على تسميته صوبا بلاستيكية أو من الزجاج ( صوبا زجاجية)، وتزود هذه البيوت بمصادر للتهوية والتدفئة ونظام دقيق للرّي والصرف وإستعمال الأسمدة والمبيدات، وتعمل هذه البيوت (وتسمى بالإنجليزية البيوت الخضراء (green houses) على حماية النباتات المزروعة بها من العوامل البيئية الشديدة والغير ملائمة مثل الرياح والبرودة الشديدة، وبذلك يمكن زراعة بعض أنواع الخضر والأزهار تحت هذه البيوت في غير موعدها عن طريق زيادة التدفئة شتاء والتهوية صيفا، ويتيح الحيز المحدود للبيوت المحمية للمزارع إجراء عمليات تسميد مركزة أو إتخاذ أساليب للوقاية أو المكافحة من الأمراض والحشرات فعالة - وتتكلف الزراعة المحمية مصاريف باهظة، لذلك تباع منتجاتها بأسعار غالية، وقد إنتشر هذا النوع من الزراعة في الكثير من الأقطار العربية خاصة الصحراوية مثل المملكة العربية السعودية وبنول الخليج والأردن، واستطاعت هذه النول توفير الخضر للإستهلاك في فصل الشتاء القارس البرودة بممارسة هذا النوع من الزراعة في الأراضي المستصلحة الجديدة وأصبحت تنتج كميات كبيرة من الخضر ونباتات الزينة التي تصدر للخارج .

وتصاب الخضر ونباتات الزينة المزروعة تحت البيوت المحمية بأفات حشرية عديدة نجل منها ما يلي : -

### أولا الصوب والبيوت المحمية المخصصة لإنتاج الشتلات

تزرع بنور بعض الخضر مثل الطماطم والخيار والكتالوب والفلفل في صوانى الشتلات

ذات العيون بعد تعبئة الصواني بمخلوط من بيئة زراعته قد تكون مثلاً مكونه من حجم من البيت موسى إلى جزء مساو من الفيرمكبوليت يتم خلطهما ما معا حتى التجانس ثم تخصب الخلطة بإضافة لمخصبات الكيماوية كذلك يضاف للخلطة بعض الكيماويات المقاومة للأمراض التي قد تتعرض لها البذور أثناء الإنبات، وتروى صواني الزراعة بالماء حسب حاجة النبات حتى تمام ظهور البادرات، وطبعاً توضع هذه الصواني في صوب الشتلات مع توفير التهوية لها وعدم سقوط ضوء الشمس المباشر عليها، ويراعى إتخاذ الإجراءات الآتية في صوب إنتاج الشتلات:

- ١ - إزالة جميع الحشائش الموجودة في الصوبة مع تمهيد الأرض.
- ٢ - رش الصوبة قبل بدء الزراعة من الداخل والخارج بمبيد السليكرون ٢ ٪ بمعدل ٢٥٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء أو مبيد الثمارون بمعدل ٢٥٠ سم لكل ١٠٠ لتر ماء مع رش الحشائش والنباتات التي قد توجد حول الصوبة.
- ٣ - وضع شبكة من قماش الموسلين على الجانب البحرى (أو الشمالى) من الصوبة.
- ٤ - مراعاة التهوية الجيدة في الصوبة.
- ٥ - تلافي سقوط ضوء الشمس المباشر على الشتلات.
- ٦ - رفع بنور الشتلات لتكون بمنأى عن القوارض والحشرات الزاحفة.
- ٧ - مراعاة حفظ درجات الحرارة والرطوبة داخل الصوبة حسب توصيات المختصين حتى تساعد على سرعة نمو الشتلات.
- ٨ - وضع صواني الشتلات على ارتفاع ٨٠ - ٩٠ سم من سطح الأرض متى يسهل التعامل معها ونقلها وإبعادها عن ضرر القوارض والحشرات الزاحفة.

### أهم الحشرات التي تصيب شتلات الخضر في البيوت المحمية

تصاب شتلات الخضر (مثل الخيار والكتنالوب والطماطم والفلفل) بآفات قد تقضى على الشتلات تماماً أو تسبب ضعفها وفقدان القدرة على الإنتاج وأهم هذه الحشرات هي:

#### ١ - المن

يتواجد المن رعلى جميع الخضر التي تزرع في البيوت المحمية، وتصيب هذه الحشرة

شتلات العروة الربيعية بشدة لللائمة الجو، وإذا أصاب المن شتلات الخيار والكنتالوب فإنه يتوالد بسرعة ويسبب وقف نمو النبات وتتجمع الأوراق وتلتف نهاية الورقة إلى أسفل ويختفى المن داخل هذه الجزء الملتف بعيداً عن الحرارة والأعواء الحيوية، ولا تصل إليه المبيدات، وتتسبب الإصابة الشديدة في موت البادرات.

## ٢- الذبابة البيضاء


تعد هذه الحشرة من الآفات الخطيرة التي تصيب بادرات الخضر المحمية في عروة الخريف، وفضلاً عن إمتصاصها للعصارة النباتية فإنها تنقل الأمراض الفيروسية إلى النباتات المصابة (شكل ٢٤٤)

وعند إصابة شتلات الطماطم بهذه الأمراض الفيروسية تنتج عنها نباتات تظهر عليها أعراض الإصابة وهي في طور الإزهار وتختلف أعراض الإصابة على النباتات المصابة باختلاف نوع الفيروس المسبب للمرض، وتؤدي الإصابة بالأمراض الفيروسية إلى بقاء نمو النباتات المصابة أو توقف النمو وقلة عقد الثمار ونقص حاد في المحصول، وترجع خطورة هذه الأمراض إلى أنه لا تظهر على الشتلات المصابة أى أعراض للمرض ولا تظهر هذه الأعراض إلى في دور النضج وبداية الإنتاج حيث لا ينفع العلاج.

## طرق مكافحة المن والذبابة البيضاء والحشرات ذات الغم الثاقب الهام:

- ١ - وضع شاش على الأبواب البحرية للصوب وذلك للحد من دخول الحشرات إليها.
- ٢ - لمكافحة الذبابة البيضاء، يمكن إستخدام نوع من البلاستيك الأصفر اللون وعليه مادة لاصقة ويوضع على الأبواب البحرية للصوبة فتلتصق به الحشرات التي تحاول دخول الصوبة.
- ٣ - ترش الشتلات داخل الصوبة بمبيد أكتك مع مبيد آخر مثل التمارون (على الطماطم) وذلك لمكافحة الذبابة البيضاء.
- ٤ - الرش بمبيد الأكتك ٥٠٪ بنسبة ٣ - ٤ في الألف أو بريمر ٥٠٪ بنسبة ٣ - ٤ في





(شكل ٢٤٤) الذبابة البيضاء وجورياتها على أوراق شتلة خيار داخل صوبة بلاستيكية .

الآلف لمكافحة المن والذبابة البيضاء وياقى الحشرات ذات أجزاء الفم الثاقب الماص.

هذا ونورد هنا برنامجا للوقاية من الإصابات المرضية والحشرية فى صوب إنتاج الشتلات - وهذا البرنامج من وضع وزارة الزراعة المصرية (اللجنة القومية للزراعة المحمية).

### ١ - مشاتل الطماطم

الرشة الأولى (بعد تكامل الإنبات وبدء ظهور الورقة الحقيقية الأولى - بعد حوالى ١٢ يوما من الزراعة)

تمارون (١٥ سم / ١٠ لتر ماء).

الرشة الثانية (بعد أسبوع من الرشة الأولى).

تمارون (١٥ سم / ١٠ لتر ماء).

الرشة الثالثة مع نظام الري (بعد أسبوع من الرشة الثانية).

فايديت (٧٠ سم / ١٠ لتر ماء)

### الرشة الرابع (بعد أسبوع من الرشة الثالثة)

تراى ميلتوكس + تمارون (٢٥ جم + ١٥ سم / ١٠ لتر ماء).

الرشة الخامسة مع نظام الري (قبل نقل الشتلات مباشرة).

بنليت (١٠ جم / ١٠ لتر ماء).

### ب - هشاتل الفلفل

الرشة الأولى (بعد أسبوع من نقل شتلات الفلفل إلى صوانى التشثيل) تمارون (١٥ سم / ١٠ لتر ماء + ٥ سم ترايتون ب)

الرشة الثانية (بعد أسبوع من الرشة الأولى) أكتليك (٣٠ سم / ١٠ لتر ماء + ٥ سم ترايتون ب)

الرشة الثالثة (بعد خمسة أيام من الرشة الثانية)

تمارون (١٥ سم / ١٠ لتر ماء + ٥ سم ترايتون ب)

الرشة الرابعة مع نظام الري بعد أسبوع من الرشة الثالثة

فايديت (٧٠ سم / ١٠ لتر ماء)

الرشة الخامسة (بعد خمسة أيام من الرشة الرابعة)

تراى ميلوتكس (٢٥ جم / ١٠ لتر ماء + ٥ سم ترايتون ب)

الرشة السادسة مع نظام الري (قبل نقل الشتلات مباشرة)

بنليت (١٠ جم / ١٠ لتر ماء)

### ج - هشاتل القرعيات (الخيار والكنتالوب)

## ١ - الصرودة الخريفى:

الرشة الأولى (بعد ظهور أول ورقة حقيقية - بعد ٧ - ١٠ أيام من الزراعة).

أكتيليك (٣٠ سم / ١٠ لتر ماء)

الرشة الثانية (قبل نقل الشتلات بأسبوع)

تراى ميلتوكس + تمارون (٢٥ جم + ١٥ سم / ١٠ لتر ماء).

الرشة الثالثة مع نظام الري (قبل نقل الشتلات مباشرة).

بنليت (١٠ جم / ١٠ لتر ماء).

## ٢ - الصرودة الربيعى

الرشة الأولى (بعد ظهور أول ورقة حقيقية بعد ٧ - ١٠ أيام من الزراعة)

أفيوجان (١٠ سم / ١٠ لتر ماء)

الرشة الثانية (قبل نقل الشتلات بأسبوع).

تراى ميلتوكس (١٥ جم / ١٠ لتر ماء).

الرشة الثالثة (قبل نقل الشتلات مباشرة).

بنليت (١٠ جم / ١٠ لتر ماء).

## ثانياً: الآفات الحشرية فى الصوب والبيوت الزجاجية الإنتاجية

تصاب الخضر ونباتات الزينة المزروعة فى البيوت المحمية الإنتاجية بالكثير من الآفات الحشرية يمكن أن نتناول أهم هذه الآفات فى الجدول التالى:

الآفة الحشرية	مظهر الإصابة	طرق الوقاية والعلاج
١ - الحفار	يقرض الحفار جنود النبات داخل الصوب الإنتاجية من أسفل التربة ويترتب على ذلك إصفرار الأوراق وذبول النباتات ويلاحظ وجود أنفاق متعرجة على سطح التربة هى مسار الحفار.	يعالج الحفار واللودة القارضة علاجاً مشتركاً بإستعمال طعم سام مكون من: ١,٥ كجم أندرين ٥٠ ٪ (مسحوق قابل للبلل + ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٥ لتر ماء.
٢ - البودة القارضة	تقرض النباتات وهى فى طور البادرة فوق سطح الأرض فيسقط النبات ويموت أو يميل النبات وتصفّر الأوراق.	أو ١,٢٥ كجم تمارون ٦٠ ٪ + ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٥ لتر ماء أو ١,٢٥ كجم هوستاسيون ٤٠ ٪ + ٢٥ كجم ردة ناعمة + ٢٥ لتر ماء وينثر الطعم السام فى الصوب بعد رى الأرض، ويوضع بجوار النباتات قبل الغروب

الآفة الحشرية	مظهر الإصابة	طرق الوقاية والعلاج
٢- المن	يكثر جود المن في الصوب في فترتين الأولى من فبراير حتى يونية والثانية في أغسطس حتى أكتوبر وتبدأ الإصابة على البراعم الطرفية في قمة النبات وكذلك الأوراق الصغيرة ثم تمتد الإصابة إلى أسفل وتكثر الإصابة على السطح السفلي للأوراق التي تتجدد وتتدلى حوافها إلى أسفل وينشأ عن شدة الإصابة وجود إفرازات عسلية ينمو عليها الفطر الأسود.	رش النباتات بأحد المبيدات التالية: ١- ملاثيون ٥٧٪ بتركيز ١,٥ في الألف أو بريمر ٥٠٪ تركيز ١ في الألف أو أكتك ٥٠٪ بمعدل ٢ في الألف أو تمارون ٦٠٪ بمعدل ٢ في الألف
٤- الذبابة البيضاء	تمتص الذبابة البيضاء العصارة النباتية من الأوراق محدثة بقعا صفراء متفرقة ماتلبث أن تتجمع مكونة مساحات صفراء ثم بنية.	للوقاية من هذه الحشرة ينصح بوضع شاش على أبواب الصوبة البحرية والقبليّة، كما يمكن تعليق ملصقات لزجة على الجهة البحرية للصوب أما العلاج الكيماوي فهو نفس العلاج المتبع في مكافحة المن

هذا وقد وضعت وزارة الزراعة المصرية برنامجا للوقاية من الآفات غير الحشرية والحشرية ومكافحتها في الصوب الإنتاجية نوردته فيما يلي:

## تعقيم التربة

ينصح بتعقيم تربة الصوب الإنتاجية وذلك للتخلص من آفات التربة وأهمها الفطريات وحشرات التربة والنيماطودا وبذور الحشائش الضارة وتستخدم إحدى المبيدات الآتية:

### ١- بروميد الميثايل

(ميتابروم  $\times 980$  (يتكون من ٩٨ ٪ بروميد، ٢ ٪ كلوروكيرين).

تجهز أرض البيوت البلاستيكية بالحرق العميق أكثر من ٢٠ سم بعد خلطها بالسماذ البلدي مع تعقيم التربة وتسويتها ثم تروى الأرض وتترك حتى تجف وبها نسبة رطوبة (تستحرق) ثم تغطى التربة المراد تعقيمها بالبلاستيك جيدا ويضاف برومور الميثايل بمعدل ٥٠ - ٨٠ جم لكل متر مربع من مساحة الصوبة وذلك بالطريقة الساخنة ولاتتم الزراعة قبل أسبوعين من المعاملة.

### ب - البازاميد المحبب

بعد تجهيز التربة وخلطها بالأسمدة العضوية يضاف مبيد البازاميد المحبب بمعدل ٥٠ جم/ متر مربع حيث يتم خلطه بالتربة جيدا ثم يترك على أن ترش بالماء يوما بعد يوم حتى لا يتسرب المبيد إلى الجو. وقد تغطى التربة بالبلاستيك بعد إضافة البازاميد المحبب وتقليبه بالتربة. ولاتتم زراعة الصوب قبل أربعة أسابيع من المعاملة بالمادة.

## الاحتياطات الواجب توافرها عند التعقيم

فى حالة التعقيم بغاز بروميد الميثايل:

- يترك الغطاء البلاستيك لمدة ٤ أيام على الأقل.

- بعد إزالة الغطاء البلاستيك تغسل التربة جيدا بالرى الغزير.

- لاتتم زراعة الصوبة قبل أسبوعين من التعقيم خوفا من قتل الشتلات أو امتصاص المواد السامة فى التربة.

- يجرى تعقيم التربة في أى وقت من السنة ويراعى ألا تقل درجة حرارة التربة عن ٦ م.
- يفضل أن يكون تعقيم التربة سنوياً.
- لا ينصح باستخدام بروميد الميثايل فى الأراضى الثقيلة أو الواقعة بالقرب من المجرى المائية.

## البرامج الوقائية والعلاجية للآفات والأمراض في الصوب الإنتاجية

### ١- الطماطم

#### البرنامج الوقائي من الأمراض

بعد أسبوعين من نقل الشتلات يفضل وضع مادة بنليت ٥٠٪ مع مياه الري خاصة في العروة الثانية (يناير/ فبراير) والتي لا تتم بها تعقيم التربة بالغازات بمعدل (١ في الألف) أو التوبسين (١ في الألف). وترش النباتات بعد أسبوعين من المعاملة السابقة وقائياً بأحد المواد الآتية:

– مانكوبر بمعدل ١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– كوبروازان سوبرد بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– تراي ملتوكس فورت بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

ويكرر الرش الدوري كل ١٠ – ١٥ يوما

وعند ملائمة الظروف الجوية من حرارة ورطوبة لإنتشار الأمراض الفطرية تعالج النباتات بأحد المواد الآتية:

– رينوميل/ مانكوزيب بمعدل ٢٥٠ جك/ ١٠٠ لتر ماء

– رينوميل بلاس نحاس بمعدل ١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– ساندوفان بمعدل ٢٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء



– جالين مانكوزيب بمعدل ٢٥٠ جك/ ١٠٠ لتر ماء

مع ملاحظة عدم تكرار الرش بهذه المبيدات أكثر من مرتين متتاليتين.

### النيماتودا

يضاف مبيد الفايديت ٢٤٪ سائل بمعدل ١٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ متر مربع مع ماء الري وذلك بعد ثلاثة أسابيع من نقل الشتلات في الصوب الإنتاجية في حالة عدم تعقيم التربة. أو في العروة الثانية (يناير – فبراير) علما بأن جميع أصناف الطماطم للصوب مقاومة للنيماتودا ويكرر استخدام نفس المبيد بذات التركيز عند ابتداء عقد الثمار أو أثناء الإثمار المبكر.

## البرنامج الوقائي من الآفات الحشرية

### الذبابة البيضاء

ترش نباتا الطماطم المنقولة حديثا للصوب الإنتاجية رشاً وقائياً دورياً كل ٥ – ٧ أيام حسب درجة انتشار الذبابة البيضاء للوقاية من مرض تجعد أوراق الطماطم. وذلك باستخدام أحد المبيدات الآتية:

– سليكرون ٧٢٪ بمعدل ١٥٠ سم مكعب – ٢٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء حسب عمر النبات

– اكثك ٥٠٪ بمعدل ٣٠٠ – ٤٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء حسب عمر النبات

– مارشال ٢٥٪ بمعدل ١٥٠ جم – ٢٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء حسب عمر النبات

على أن يكون الرش بالتناوب وعلى أن يوقف الرش عند بداية عقد الثمار.

### المن

بعتبر البرنامج الوقائي للذبابة البيضاء علاجاً مشتركاً عند ظهور الإصابة بالمن.

### العنكبوت الأحمر

عند ظهور أفراد من العنكبوت الأحمر ترش نباتات الطماطم باستعمال إحدى المبيدات

الآتية: كالثين زيتى ١٨,٥٪ أو تديفول ٢٤,٥٪ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء من أى منهما.

## دودة ورق القطن وديدان الثمار

ترش باستخدام مبيد لانيت ٩٠٪ بمعدل ٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء أو ريلدان ٥٠٪ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء.

### ب - القرعيات (الخيار - الكنتالوب)

#### البرنامج الوقائى من الأمراض

#### ١ - عروة سبتمبر و اكتوبر

ترش النباتات بعد نقلها إلى الصوب الإنتاجية فى عمر أسبوعين ضد مرض البياض الدقيقى وقائيا باستخدام أحد المبيدات الآتية:

- بايلتون ٢٥٪ بمعدل ٢٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- أفيجان بمعدل ١٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

- روبيجان ١٢٪ بمعدل ١٠ سم/ ١٠٠ لتر ماء

مع ملاحظة أن يتم الرش وقائيا بالمبيدات السابقة كل أسبوعين وذلك لحين البدء فى البرنامج الوقائى لمرض البياض الزغبى والدقيقى معا بعد ١ - ١,٥ شهر من الزراعة وتستخدم إحدى المبيدات الآتية:

- تراى ملتوكس فورت بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- كوبراوزان بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– مانكوبر بمعدل ١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

وعند ظهور مرض البياض الزغبي منفردا تستخدم إحدى المبيدات العلاجية الآتية:

– ريدوميل/ مانكوزيب بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– ريدوميل بلاس نحاس بمعدل ١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– ساندوفان بمعدل ٢٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

### النيماتودا

يضاف إلى ماء الري مادة الفايديت ٢٤٪ سائل بمعدل ١٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ م من أرض الصوبة في عمر أسبوعين لنباتات الخيار والكتنالوب ويكرر نفس العلاج عند بداية العقد. ويعتبر إضافة الفايديت مع ماء الري علاجا مشتركا ضد النيماتودا والإصابات الخفيفة لبعض الحشرات الثاقبة الماصة.

## ٢- العروة الصيفية المبكرة (يناير وفبراير)

يراعى عند زراعة الخيار والكتنالوب في العروة الصيفية المبكرة إزالة بقايا نباتات المحصول السابق وكذلك الحشائش مع خدمة وتجهيز التربة جيدا مع عدم إضافة أى أسمدة عضوية ولاداعى لإجراء عملية تعقيم التربة في هذه العروة.

ويكتفى بإضافة إحدى المبيدات الفطرية الآتية مع مياه الري وذلك للوقاية من أمراض التربة الكامنة مثل أعفان الجنور والذبول ولفحة الساق الصمغية وهي

– بنليت ٥٠٪ بمعدل ١٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

فيتافاكس/ كابتان بمعدل ٠٠- جم/ ١٠٠ لتر ماء

- تراى ملتوكس فورت بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- ريديميل/ مانكوزيب بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

ويبدأ برنامج الرش الوقائي ضد البياض الزغبى فى القرعيات بعد أسبوعين من نقل الشتلات كما سبق ذكره فى عروة سبتمبر وأكتوبر.

وفى حالة ظهور البياض الدقيقى يتبع برنامج عروة سبتمبر وأكتوبر بنفس المعدلات السابق ذكرها

### نيماتورا

يتبع نفس البرنامج السابق ذكره فى عروة سبتمبر

### عفن الثمار الرمادى والأبيض

فى حالة ظهور الإصابة بعفنى الثمار الرمادى والأبيض ترش النباتات بإحدى المواد الآتية:

- سوميسليكس بمعدل ٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- روفرال بمعدل ٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء -

- رونيلان بمعدل ٨٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- بنليت بمعدل ١٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

### التبقع الزاوى البكتيرى

عند ظهور الإصابة بالتبقع الزاوى البكتيرى ترش النباتات بمبيد تراى ملتوكس فورت بمعدل ٢٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء أو كوبرزان بمعدل ٢٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

## مرض الأنثراكنوز

في حالة ظهور المرض ترش النباتات كل ١٠ أيام باستخدام أحد المبيدات الآتية:

– داكونيل ٢٧٨٧ بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– برافو ٥٠٠ بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– انتراكول بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– كبريت ميكروني بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

## برنامج وقائي من الآفات الحشرية

### المن

عند ظهور أفراد المن ترش النباتات بأحد المبيدات الآتية:

– ملاثيون ٥٧٪ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

– بريمور ٥٠٪ بمعدل ٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– اكثك ٥٠٪ بمعدل ٣٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

صابون سائل بمعدل ٢٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

### دودة ورق القطن والديدان القياسة

عند ظهور الإصابة بدودة ورق القطن والديدان القياسة ترش النباتات باستعمال أحد المبيدات الآتية:

– لانيت ١٠٪ بمعدل ٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– نيودرين ٩٠٪ بمعدل ٧٥ جم/ ١٠٠ لتر ماء

– ريلدان ٥٠٪ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

## الذبابة البيضاء

عند ظهور أفراد من الذبابة البيضاء ترش النباتات بأحد المواد الآتية

– اكتك ٥٠٪ بمعدل ٣٠٠ – ٤٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

– مارشال ٢٥٪ بمعدل ١٥٠ – ٢٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

## العنكبوت الأحمر

عند ظهور أفراد من العنكبوت الأحمر ترش النباتات بأحد المواد الآتية:

– تديفول ٢٤,٥٪ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

– كالثين ١٨,٥٪ بمعدل ٢٥٠ سم مكعب/ ١٠٠ لتر ماء

تستخدم جميع المبيدات السابقة بالتبادل عند ظهور الإصابة فقط ويحظر استخدام مادة سليكرون ٧٢٪ على القرعيات حتى لاتحدث حروق للنباتات.

## ج - الفلفل

### البرنامج الوقائي من الأمراض

بعد أسبوعين من نقل الشتلات إلى الصوب الإنتاجية تضاف مادة البنليت للتربة خاصة في العروة الثانية (يناير/ فبراير) والتي لاتتم بها تعقيم التربة بالغازات بنسبة ١٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء أو تراى ملتوكس فورت بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء مع مياه الري وذلك للوقاية من أمراض أعفان الجنور والذبول.

## البياض الدقيقى وأعفان الثمار

ترش نباتات الفلفل وقائياً كل ١٠ - ١٥ يوم بعد شهر من الزراعة ضد مرضى البياض الدقيقى وأعفان الثمار باستعمال أحد المبيدات الآتية:

- داكونيل ٢٧٨٧ بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- مانكوبير بمعدل ١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

- كوبروزان/ سوبر/ د بمعدل ٢٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء

على أن يتم رش هذه المبيدات بالتناوب

## النيماتودا

عند بداية عقد الثمار يضاف الفايديت ٢٤٪ سائل مع ماء الرى بمعدل ١٠٠ سم مكعب/ ١٠٠ م من مساحة أرض الصوبة مرة واحدة فقط فى حالة الزراعة بالعروة الثانية (يناير/ فبراير) والتي لا تتم أثناعها تعقيم التربة بالغازات.

## برنامج وقائى من الآفات الحشرية

يصاب الفلفل بالحشرات الآتية:

المن - الذبابة البيضاء - نودة ورق القطن وديدان الثمار والعنكبوت الأحمر

عند ظهور إصابة بهذه الآفات ترش النباتات بنفس المبيدات السابق ذكرها فى الطماطم والقرعيات.

## إرشادات عامة

- ١ - عدم خلط المبيدات الحشرية والفطرية أو الأسمدة الورقية معا.
- ٢ - لا تقل الفترة بين الرش بالمبيدات المختلفة وبعضها من ٢ - ٣ يوم.
- ٣ - يوقف رش المبيدات عند ارتفاع درجات الحرارة.
- ٤ - يراعى فتح الصوبة عند بداية الرش مع عدم غلق الصوبة حتى تجف النباتات من تأثير الرش.
- ٥ - العناية بتهوية الصوب جيدا خاصة بعد الرش.
- ٦ - لتقليل استخدام المبيدات الحشرية فى الصوبات البلاستيكية ينصح بوضع شاش على المدخل من الجهة البحرية وخاصة فى الصوب المعدة كمشتل.
- ٧ - ترش الصوب من الخارج قبل فتحها للقضاء على الحشرات وعدم تمكنها من التسرب لداخل الصوب.
- ٨ - يفضل الرش على البلاستيك الداخلى بعد نقل الشتلات إلى الصوب الإنتاجية باستخدام المبيدات الموصى بها ضد الذبابة البيضاء والمن.
- ٩ - يوقف الرش الدورى للمبيدات الحشرية بعد بداية عقد الثمار.
- ١٠ - عند وجود إصابة حشرية تستدعى الرش بالمبيدات يجمع المحصول أولا جمعا جائزا ثم يجرى الرش.
- ١١ - يجب استخدام الملابس والأقنعة الواقية عند الرش بالمبيدات الحشرية أو الفطرية.
- ١٢ - يجب أن تكون المياه المستخدمة فى الصوب البلاستيكية خالية من الأملاح أو الكلور.



١٣ - يفضل وضع البلاستيك الأسود قبل نقل الشتلات على المصاطب في الزراعات الصيفية خاصة في الأراضي الخفيفة.

١٤ - في حالات الضرورة القصوى للرش الحشري يراعى أخذ جمعة جائزة للثمار قبل الرش مباشرة ثم يوقف جمع الثمار لمدة ٥ - ٧ أيام من الرش، أما إذا اقتضى الأمر جمع الثمار قبل هذه المدة فتجمع وتوضع بالثلاجات باقى المدة قبل الاستهلاك.

## المراجع

### أولا - المراجع العربية

- البكر، عبد الجواد ١٩٧٢ : - نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها - مطبعة العائى بغداد.
- الحديدى، جبر صالح ١٩٦٨ : دليل مكافحة الآفات الزراعية فى العراق، قسم الحشرات والأمراض النباتية، نشرة ١١٧ - العراق - أبو غريب .
- أحمد لطفى عبد السلام - هدى هلال - عادل تحصل - ١٩٨٤ - حصر العوائل النباتية المصابة بثاقبة الأفرع فى مصر - مجلة حوليات مشتهر للعلوم الزراعية مجلد ٢٢ .
- إسماعيل إسماعيل - نعمة أبو زيد - فتحى فهم - ١٩٨٠ : -
- دراسة النشاط الموسمى وسلوك حفارات الزيتون وطفيلياتها .
- مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة المصرية مجلد ٦٦ عدا .
- برنامج مكافحة آفات البساتين والخضر ١٩٩٠ : -
- وزارة الزراعة - جمهورية مصر العربية .
- شاكر محمد حماد - أحمد لطفى عبد السلام ١٩٨٥ : الحشرات الإقتصادية فى مصر والبلاد العربية - دار المربخ - الرياض
- عبد الحسين - على ١٩٤٠ : -

النخيل والتمور وآفاتهما في العراق .

عبد القادر مصطفى النحال - نعمت هانم أحمد عوض، صبحي زقلة، محمد قناوى ١٩٧٨،  
دراسات بيولوجية على حفار التين نو القرون الطويلة مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة  
- غالقاهرة العدد الأول - يناير -

عزيز على ١٩٩٠ : - دليل مكافحة الآفات الزراعية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى -  
بغداد .

محمد حسن حسنين ١٩٥٨ : -

آفات المحاصيل والبساتين - مطبعة الشعراوى بطنطا .

محمد محمود حسنى - محمد عبد الحليم عاصم - السيد عبد النبى نصر - ١٩٧٦ : -

الآفات الزراعية الحشرية والحيوانية - دار المعارف بمصر

على بنوى - عبد الحكيم - محمد رمضان صالح ١٩٧٧ .

التغيرات الموسمية للإصابة وديناميكا مجتمع بعض الآفات التى تصيب النخيل فى الوادى  
الجديد .

مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة المصرية - العدد الأول يناير

١٩٧٧.

قابلية بعض أصناف البلح للإصابة ببعض الآفات وتأثير إرتفاع النخيل على معدل الإصابة  
مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة العدد الأول.

التزميط وسبله وموعده فى وقاية عراجين البلح من الإصابة بالحشرات فى الوادى الجديد.

١٩٧٧

مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة المصرية العدد الأول

- عبد الحى شاهين ١٩٧٣.

دراسات بيولوجية عن خنفساء الحمراء .

مجلة البحوث الزراعية - العدد الأول ١٩٧٣ .

١٩٧٧

:دراسات إيكولوجية على آفات الطماطم فى مصر .

مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة المصرية - العدد الأول - يناير .

فتحى حسين سعيد القحطانى - يوسف والى، ١٩٧٩ : -

زراعة النخيل وإنتاج التمور فى العالمين العربى والإسلامى - مطبعة جامعة عين شمس.

هدى هلال - أحمد لطفى عبد السلام - هلال أحمد هلال - عادل عقيل - ١٩٨٤ : -

دراسة المحتوى المائى للخشب كعامل مجدد لدرجة الضرر الناتج عن الإصابة بناخرة  
الخشب السودانية حوليات مشتهر للعلوم الزراعية ، مجلد ٢٢ .

هدى هلال- أحمد لطفى - يسرى السباعى ١٩٨٦ : -

دراسة المظاهر البيولوجية لناخرة الخشب من Dinoderus فى مصر .

مجلة البحوث الزراعية - وزارة الزراعة المصرية مجلد ٦٤ عدد ١ .

١٩٨٦

دراسة تأثير العائل والعائل المفضل لناخرات الخشب، فى مصر .

مجلة البحوث الزراعية المصرية - مجلد ٦٤ عدد ١ .

١٩٨٦

دراسة التذبذبات والتغيرات الموسمية للمجموع الحشرى للناخر بوستريكويس ريشى فى

منطقة الجيزة - مصر .

نشر في نفس العدد من المجلة السابقة .

١٩٨٦

دراسة تأثير درجات الحرارة والرطوبة النسبية الثابتة على النشاط البيولوجي لحشرة  
بوستريكويس ريشى نفس العدد من المجلة السابقة.

١٩٨٦

دراسات بيولوجية على ناخرات بوستريكويس ريشى في مصر .

نشر في نفس العدد من المجلة السابقة .

فوزى قطب ١٩٨١

النباتات الطبية

## المراجع بلغات اجنبية

A...A.A. Sharaf El Din., 1980.

Biological, Ecological and Control Studies on some Colepterosus tree borers in Egypt Ph. D. Thesis, Fac. of Agric., Cario Univ.

A. E. Michelbacher & J. C. Ortega, 1958.

Study of insects and related pests attacking walnuts.

Calif. Agric. Exper. stat., Bulletin 764.

A. L. Abdel Salam & A. El Saeady, 1987.

Ecological studies on *Ephestia calidella* (W.) and *E cautella* (G) as date insect pests at Baharia oases.

First. Symp. of the date plam, King Faisal Univ., Saudi Arabia.

A. Hussein. 1990

Date varieties and plam height in relation to infestation with date stone bectle, *Coccetryptes dactyyliphera* F.(Coleoptera, scolytidae).

Anal of Agric. Sc. Mushtohor, 28 (4).

Balley, Stanley F. 1948.

The peach twig borer. Calif, Agric. Exp. 708. 1 - 56

Boyce, A. M, 1929.

The walnut husk fly, *Rligoletis juglandis* Gesson. Jour, Econ. Ent. 22 (6)  
567 - 66

---

1934

Bionomics of the walnut husk fly *R. Juglandis*.

Helgardia 8 (11): 363 - 579.

---

1935

The codling moth in Persiah walnuts. Jour, Econ. Ent 28 (6) 864 - 73

Cuille J., 1950. Recherches sur le charancon du banier *Cosmopolites sor-*  
*dradus* G.

I. F. A. C., Serrie technique No. 4

Elmer, H. S. 1963

Production of dates from injury caused by the "Apache cicada" in Califor-  
nia

J. Econ. Ent., 56 875 - 876.

El Sayed Abdel Hamid Elwan, 1990

Ecological And biological studies on certain insect-pests in infesting Man-  
go trees.

Ph. D. Thesis. Fac. of Agric., Al Azhar Univ. Cairo

Francis, N. Summers 1962

Pests of Almonols.

Calif Agric. Exper, stat. Serv., Circular 513

Gomea. A. A. 1980: Studies on palm -trees insects blonging to super Fam-  
ily Cococcrdes Ph. D. Thesis, Fac. of Agric, Al Azhar univ. Cairo

G. Frohlich and W. Rodewald, 1970

Pests and diseases of tropical crops and their control. Permagon Press.

Harrold F. & Martin M. 1959

Pests of pear in California.

Calif. Agric. Exper. Stat-Ext. Serv. Circular 478

Harid F. Madsen & L. B. Mcnelly (1965).

Important pests of Apricots Div. of Agric. Sc., Univ. of Calif., Bulltis 783

Huffaker C. B. et al 1962.

Biological control of olive scale *Parlatoria oleae* in California by imported  
*Aphytis maculicornis* (Hymenoptera, Aphelinidae).

Helgardia (Berk. Calif.) 32, 13, 541 - 636

Leslie M. Smith & E. M. Stafford 1959.

Grape pests in california.

Div. of Agric. Sc., Univ. of Calif.



M. A. Abo Sheasha, 1987.

Ecological Studies on *Prays citri* (Mill).

M. Sc. Thesis, Fac. of agric, Al azhar Univ.,

Martin M. & Harrold f., 1967

Insect and mite pests of apple in Californai .Calif. Agric. Exper. Stat. Ext. Serv., circular 5

Nixon R. W. 1959.

Growing dates in the United states.

U. S. D. a. Information Bull., 207 : 50 pp

Picar F., 1918.

La Faune entomologique de Fignier.

Ann. Servic. de Epiphyties, Paris Vi, 34 - 174

---

1919

Surun Icheneumonid (*Sycophumus hesperophanes*. n. g. et. sp.) Parasite de *I. Hesperophanes griseus*. F. dans les braches de Figuier Cull. Soc. Entom (3). 77 - 80

Said M. Haggag, 1991.

Ecological and biological studies on certain Coleopterous wood. borers in Egypt.

Ph. D. Thesis, Fac. of Agric. Al azhar Univ.,

W. A. Shands & B. J. Landis 1969.

Potato insects, their biology and cultural control.

Agric. Res. Serv., USA Dep. of Agric.

Handbook No 264

Willcocks f. C., 1924

A Survey of the more important insects and mites of Egypt with notes on life history, habits, natural enemies and suggestions for control.

Bull. Agric. Society, 15 and 218

William W. Allen, 1959

Strawberry pests in California.

Calif. Agric. Exp. Stat. Circular 484.

رقم الإيداع

---

١٩٩٣/١٨٩٢

ISBN : 977 - 5201 - 22 -5

